


EVCHSIV
DE PLANT

12081



VERSANTUR HIS TRIBUS



Pharmacopœi Parisienses


Ex Dono Magistri
Eœup: Nicol: PLA.


1765



De historia stirpium commentarii
insignes, Leonharto Fuchsio
medico autore. Lugduni, 1547. (3)
ou Paris, 1546 - in 16.

611
24





IN PLANTARVM HISTORIAM

à Leonharto Fuchsio picturis elegantibus expressam adnotationes.

Absinthium officinis Romanum idem cum pontico rectè sentis, à vulgari autem id esse diversissimum ex Galeni Methodo abunde probatur.

Santonicum à Santonia regione prope Burdegalam albius Romano est, folio non multo latiore. Vtrunque enim & Seriphium est tenuifoliū, cum vulgare sit latifolium. Aloine nobis dictum ab insigni Aloes amaritudine.


DE ABSINTHIO.

CAPVT I.

NOMINA.



Ἀνίσιον Gracè, **Absinthium** Latine appellatur. In officinis suam appellationem retinuit Gallicè de Laloine, quasi prohibens hilaritatem & alacritatem, ob immensā suā amaritudinem, nominatur. Nomen hoc Græci ab ἀλκιδω, id est, cōtrechādo,



Absinthii tractando, per ὀντίφραστον deflexerūt, quòd nullum unde lum animal, ob eximiam amaritudinem, hanc herbam attingat. Veteres Græci Comici ἀπίνθιον quoque conformi etymo, quasi impotabilem dixerunt, quòd hæc nemo, propter insignem amarorem, bibere possit.

GENERA.

Absinthij genera sunt tria, Galeno & Dioscoride testibus. Vnum quod Romanum, vulgare seu commune vocant, & est id quod passim in Germania nascitur. Huius generis est quod à Ponto regione, in qua nascitur, Ponticum cognominatur, estque cæteris multò præstantius. Alterum genus est Scirphium, quod Scirphium nominant. Tertium Santonicum, à Santonibus Gallie populis, apud quos plurimum gignitur, dictum est. Hinc nonnulli eius semen corrupta voce Sanctum, quoniam Santonicum dicendum esset, appellant. Nisi id nominis ob insignem eius efficaciam, quam in necandis lumbricis obtinet, illi imposuerint. Hodie semen lumbricorum nuncupant, Gallicè Mort de vers.

FORMA.

Absinthium vulgare, herba est caule ramoso, foliis incanis, multipliciter sectis, aureo flore, semine Vulgare rotundo, racematim coherente. Scirphium verò Scirphiū. herba est prætenues ramos cirrōsve habens, minori similis Abrotono, exiguis referta seminibus, subamarum, & graui odore. Siquidem herba est tenuibus cirris,

cirris, Abrotono femina similis, semine in siliquis paruo, grauiter odorata, & subamara. Santonicum Santonis simile est Absinthio, sed non adeò copioso semine cum. scatens, & subamarum.

LOCVS.

Nascitur, Oribasio & Apuleio autoribus, locis cultis, montosis & saxosis: plurimum autem præstantissimūque in Ponto, Cappadocia, & Tauro monte. Seriphium passim circa itinera, macerias vinearum, & sepes prouenit: vt verum sit quod à Plinio dictum est, plerāque herbas pedibus cōculamus, quarum si nobis virtus perspecta esset, eas in cœlum laudibus ferremus. Santonicum in Galia, vt diximus, copiosè gignitur.

TEMPVS.

Colligendum in fine Iulij mensis, ac in vmbra exiccandum, quo etiam tempore floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Ponticum minus calefacit, quod astrictioris multæ sit particeps. Minus etiam cæteris generibus extenuat, non minus tamen resiccat. Gale-
no itaque autore calidum in primo gradu, & sic-
cum in tertio statuitur. Succus autem eius lon-
gè quàm herba ipsa calidior est. Vulgare qui-
dem astrictoriam, amaram & acrem qualitatem
obtinet haud secus atque Ponticum. In hoc tamen
ab eo differre videtur, quòd in illo maior sit ama-
a ij ritudo

ritudo quàm adstrictio. Quanuis neque Ponticum modicè amarum sit, quod Ouidius satis iis innuit versibus:

Turpia deformes gignunt Absinthia campi,

Terræque de fructu, quàm sit amara docet.

Loquitur autem de Ponto. Seriphium ipsum Abrotono minus est calidum, verùm Absinthio calidius. Santonicum in extenuando, & calefaciendo desiccandove, Seriphio paulò imbecillius.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Absinthium calfacit, adstringit, bilémque stomacho & ventri inharëtem expurgat. Vrinæ cit. Crapulam praesumptum arcet. Inflationibus, venarisque & stomachi doloribus, cum Seseli & Nardo Gallico potum prodest. Fastidia discutit. Morbo regio correptos, dilutum aut decoctum eius per singulos dies cyathis tribus haustum sanat. Menses cum melle sumptum aut appositum euocat. Strangulationibus fungorum ex aceto potum subuenit. Ixiæ, cicutæ, muris aranci morsibus, & draconi marino cum vino aduersatur. Anginis cum melle & nitro iungitur. Contra epinyctidas ex aqua, sugillata verò & oculorum caligines cū melle, similiter auribus ex quibus manat sanies illinitur. Decocti eius vapor suffitusve, dentium auriumque dolores lenit. Decoctum cum passo dolentibus oculis obliniatur. Præcordiis, iecinori, & stomacho dolenti, ac longo tempore affecto, cum cerato Cyprino tritum illinitur.

illinitur. Stomacho autem cum rosaceo subactum. Cum ficis, nitro, & farina loliacea, aquæ inter cunctem, lienosisq; subuenit, Preterea vestiariis arcisq; inditum Absinthium, vestes ab erodentium iniuriis seruat. Culices cum oleo perunctum à corporibus abigit & arcet. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Par est etiam succum hæc omnia facere, attamen in potionibus improbatur, stomacho enim obest, & capitis dolores adfert. Seriphium verò per se, vel cum oryza decoctum, & cū melle sumptum, ascaridas & rotundos lumbricos necat, aluum simul leuiter subducens. Eadem potest præstare cum edulio aut lenticula decoctum. Santonicum eadem quæ Seriphium potest.

EX GALENO.

Absinthium adstrictoriam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, excalfaciens pariter & extergens, roborans & desiccans. Proinde biliosos vëtris humores per egestionem infernam propellit, ac per vrinam euacuat. Magis verò quod in venis est biliosum per vrinas expurgat. Ideo cōtentam in ventre pituitam, sumptum nihil iuuat. Sic neque si in thorace aut pulmone contineatur: nam adstringens in eo facultas, quàm amara valentior est.

EX PLINIO.

Stomachū corroborat, & ob hoc sapor eius in vina transfertur. Bibitur decoctum in aqua, & postea

ea nocte & die refrigeratum sub dio : decoctis sex drachmis foliorum cum ramis suis in coelestis aquae sextariis tribus. Oportet & salem addi. Tritum, vt aiunt, raro in vsu est, sicut & succus expressus. Bibitur & madefacti dilutum. Exprimitur autem cū primū semen turgescit, madefactū aqua triduo recēs, aut siccū septem diebus, deinde coctū in aereo vase ad tertias, decem heminis, in aquae sextariis quadraginta quinque, iterumq; percolatū, herba eiecta, lentè coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minore Cētaurio queritur succus. Sed hic Absinthij succus inutilis stomacho capitiq; est, cūm (vt tradunt) sit illud decoctū saluberrimum: nā stomachum adstringit, bilemq; detrahit, vrinam cit, aluum emollit, & in dolore sanat, vētris animalia pellit. Malaciam stomachi & inflationes cū exiguo Sili & Nardo Gallico, addito aceto, discutit. Fastidia abstergit, cōcoctiōes adiuvat. Cruditates detrahit cū ruta, & pipere, & sale. Antiqui purgationis gratia dabāt cū marinæ aquae veteris sextario, seminis sex drachmis, cū tribus salis, & mellis cyatho. Efficacius purgat duplicato sale. Quidē in polenta dedere supradictum pondus addito Pulegio. Alij cōtra paraly sin. Alij pueris folia in sico, sic vt amaritudinem fallerēt. Facile thoracem purgat cū Iris de sumptū. In regio morbo crudū bibitur cū Apio, aut Adiāto. Aduersus inflationes calidū paulatim sorbetur ex aqua. Iecinoris causa cum Gallico Nardo,

do, lienis cum aceto, aut pulce, aut fico sumitur. Ad-
uersatur fungis ex aceto. Item visco, cicutæ ex vis-
no, & muris aranei morsibus, draconi marino, scor-
pionibus. Oculorum claritati multum confert. Epi-
phoris cū passo imponitur, sugillatis cū melle. Au-
res eius decoctum vaporis suffitu sanat: aut si ma-
nat sanies, cum melle tritum. Vrinā ac menses ciūt
tres quatuorve ramuli, cum Gallici nardi radice
vna, cyathis aquæ 6. menses priuatim cum melle
sumptum, & in vellere appositum. Anginis subue-
nit cū melle & nitro. Epinyctidas ex aqua sanat:
vulnera recentia, priusquam aqua tangantur im-
positum: prætereaque capitis vlcera. Peculiariter
ilibus imponitur, cum cypria cera, aut cum fico. Sa-
nat & pruritus. Non est dādum in febrī. Nauseas
maris arcet in navigationibus potū: inguinum tu-
morē in vētrali habitū. Somnos allicit olfactū, aut
inscio sub capite positum. Vestibus insertum tincas
arcet. Culices ex oleo perunctis abigit, & fumo
si vratur. Atramentum librarium ex diluto eius
temperatum, literas à musculis tuetur. Capillum
denigrat absinthij cinis, vnguento rosaceoque per-
mixtus. Marinum, quod quidam seriphium vocāt,
stomacho inimicū. Aluum mollit, pellitq; animalia
interancorum. Bibitur cum oleo & sale, aut in fari-
næ trimestris sorbitione dilutū. Coquitur quantum
manus capiat, in aquæ sextario ad dimidias.

VINI ABSINTHITIS VIRES.

a iij

EX

PLANTARVM HISTORIAE

EX DIOSCORIDE.

Absinthites vinum stomacho accommodatum est, urinam cit. Tarde concoquentibus vtile: iecinorosis itidem, nephriticis, & regio correptis morbo. Cibum non appetentibus, & stomacho male affectis, & longis praecordiorum distensionibus ac inflationibus, rotundis lumbricis, & suppressis mensibus auxiliatur. Contra iuxta venena hausta, copiosius potum, & vomitionibus redditum prodest.

CONFECTIO.

Variae vini Absinthitis sunt confectiones, ut ex Dioscoride constare potest. Optimum tamen fit, si tussae Pontici absinthij drachma octo, linteo raro ligatae, in amphoram vini coniciuntur. Mustum deinde mittitur, relicto vno vasis spiraculo ne effervescens foras exiliat.

APPENDIX.

Semen lumbri. Santonici, quod ut commemoratum est, hodie sebricorum. men lumbricorum vocant, praecipuus hoc tempore ad lumbricos ex corpore pellendos & enecandos usus est. Et si genuinum est, magna efficacia cum melle assumitur tam à pueris, quam adultis. Seriphium quoque aduersus lumbricos à multis commẽ-
Mors veris datur, eoque nomine Mors vermiu appellatur. Sunt
mium. etiam qui lumbricorum semen nomenclant.

DE ABROTONO.

CAP. II.

Pro foemina abrotono absinthium Romanum

manum videris pictura exprimere, quam id vulgo syluestrem cypressum à similitudine & odore foliorum eiusdem appellari scribis. Quam postea ex Plinio chamæcypressum pingis, quibusdam videtur abrotonum fœmina.

NOMINA.

Aβρότονον Græcis, Abrotonum Latinis nominatur. Officinæ antiquū nomen retinuerunt.

Gallis Auronne appellatur. Hoc autem nomen Abrotonū sibi usurpauit, vt Nicandri testatur interpretes, διὰ unde διὰ τὸ πρὸς ὄψιν, ἀβρόν καὶ ἀπαλὸν φαίνεσθαι. Etym. ἄλλως τε καὶ διὰ τὸ δύσπικτον εἶναι. hoc est, quòd conspectu tenerū, molle & delicatū appareat, aut quòd grauē, acréμνε & difficultē halitū prospiret.

GENERA.

Abrotonum duorum est generum, veterum & recentiorum omnium sententia, mas & fœmina. Plinius lib. 21. cap. 7. mas quidem campestre vocat Abrotonum, fœminam verò montanum. Vulgus, syluestrem cypressum, à similitudine & odore foliorum eiusdem, nomenclatura herba fruticisve vocat. Gallicè Cypres.

FORMA.

Abrotonum, quod mas appellamus, sarmentum Abrotonū sum, minutis foliis, minus album quàm fœmina, mas. tenui semine ac numeroso vti Absinthium. Semen autem non quouis tempore producit, sed ad Septembris

ptembris duntaxat mensis initia, quo si diligenter
obseruabis tempore, semine pragnans esse compe-
ries. Rectè igitur *Ἀμπρότον* in Dioscoride les-
gitur, huic lectioni non solum veterum codicum fi-
de, verumetiam sensu suffragante. Fœmina frutex
est, arboris speciem habens, candicantibus foliis,
Scriphij modo minutim circũ ramulos incis, flori-
bus refertus in summo auri fulgore comãtes corym-
bos obtinens, odoratus etiam cũ gravitate quadam.

Abrotonũ
fœmina.

LOCVS.

Mas passim apud Germanos in hortis, & in cam-
pestribus nascitur: fœmina verò in collibus & mon-
tibus sua sponte prouenit.

TEMPVS.

Floret vtrunque Augusto. Colligitur autem in
autumno, potissimum Septembri mense: hoc enim
tempore semen, vt diximus, profert.

TEMPERAMENTVM.

Abrotonum calidum & siccum, inq; tertio ordi-
ne seu recessu post media situm est, id quod amari-
tudo eius, quam gustu præ se fert, facile monstrat.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Vtriusque Abrotoni semen feruifaculum, & cru-
dum tritum, cum aqua potum, non nisi recta cere-
uice spirantibus, ruptis, conuulsis, ischiadicis, vrie-
nae difficultatibus, & suppressis mensibus auxi-
liatur. Potum in vino exitialium venenorum an-
tidotum est. Cum oleo rigentibus illinitur. Serpẽ-

tes lecto instratum & suffitum fugat. Cum vino potum aduersus eorundem morsus, peculiariter autem scorpionum & phalāgiorū, prodest. Oculorum inflammationibus cū cotoneo cocto, aut pane illitum subuenit. Tritum cū farina hordeacea decoctumq; tubercula discutit. Admiscetur irino vnguento.

EX GALENO.

Non instrenuè excalfacit & desiccāt. Nam siue comam cum floribus (reliqua enim eius palea inutilis est) contusam vlceri puro illinas, mordax & irritans videbitur, siue eo in oleo macerato, caput aut ventrem perfundere voles, admodum calefacere reperies. Quin & si qui per circuitum rigoribus capiuntur, eos ante inuasionem rigorum hoc voles confricare, minus vtique rigore concutientur, imò & sensus confestim vbi admotū fuerit ipsum calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat par est, nimirum quum sit amarum. Protinus vero quod & digerendi & incidendi vim habeat, scies. Præterea abrotonum vstum calidum & siccum facultate est, magis etiā quàm cucurbita sicca vsta, & anethi radix. Illa enim vlceribus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis prosunt, ac proinde maxime vlceribus iis quæ in pudendorū præputiis sunt competere videntur: at cinis Abrotoni vlceribus omnibus mordax est, ac idcirco cum oleo tenuium partium, Cicino scilicet, aut Raphanino, aut Sycionio veteri, potissimum Sabinos, ad alopecias

alopecias confert. Barbam etiam segnius tardiusque enascentem cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed nec minus illis, lentiscino maceratum. Raresfaciendi enim vim, eo quod tenuium est partium, obtinet, & mordax est, & calidum. Abrotonum vero inimicum stomacho existit.

EX PLINIO.

Vsus est & foliis, sed maior semine, ad calefaciendum, ideo nervis utile, tussi, orthopnoicis, urinae, torminibus, convulsis, ruptis, lumbis. Datur bibendum manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & sementusum in aqua drachmae pondere. Prodest & vulvae. Concoquit panos cum farina hordeacea, & oculorum inflammationibus illinitur cotoneo malo decocto. Serpentes fugat. Contractus eorum bibitur in vino, illiniturque. Efficacissimum contra ea quorum veneno tremores & frigus accidunt, ut scorpionum & phalangiorum, & contra alia venena. Prodest quoquomodo argentibus, & ad extrahenda ea quae inhaerent corporibus. Pellit interancorum mala. Ramo eius, si subiiciatur puluino, venerem stimulari tradunt: efficacissimamque herbam esse contra omnia veneficia, quibus coitus inhibeatur.

DE ASARO. CAP. III.

Asarum seu baccar nobis per metathesin Cabaret.

NOMINA.

Aσάρων Gracè, Asarum Latine dicitur. Officinis hodie nomen retinet. Gallicè du Cabaret. Asaron autem dictū est, quòd in ornatum Asarō cur non veniat, vel ut Plinius lib. 21. cap. 6. inquit, dictum. quoniam in coronas atqueserta non addatur: vel quod manualibus scopis, quæ odoris gratia gestantur, minimè solitum sit inseri.

FORMA.

Folia hederae similia habet, longè tamen molliora, rotundioraque. Flores inter folia ad radicem purpureos odoratos, Hyoscyami cytino similes, in quo semen acino nō dissimile. Radices multas, geniculatas, tenues, obliquas, gramine persimiles, longè tamen graciliores, odoratas, calefacientes, & linguam admodum erodentes. Cæterum hic admonendum esse lectore duximus omnia Dioscoridis exemplaria hoc in loco deprauata esse, perperamq; habere vel *πικρότερα* vel *μικρότερα*, cum potius scribendū sit *μαλακώτερα*, id quod partim Plinij testimonio, partim etiam iudice sensu ipso cōprobari potest. Plinius siquidē lib. 12. cap. 13. Asarum sic depingit: Est hederae foliis rotundioribus tantum, mollioribusq; . Si quis verò ea de re ad iudicem sensum referat, Asarumq; cum hedera conferat, Asari certè folia neque dēsiora, neque minora hederae foliis esse comperiet, quàm Asari folia maiora multò sint quàm hederae. Proinde cum folia hederae illo-

Dioscoridis locus emēdatus

rum

PLANTARVM HISTORIAE

rum cōparatione multò minora sint, cuidētissimum est pro $\mu\kappa\rho\gamma\tau\omicron\rho\alpha$. legendum esse $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\omega\tau\omicron\rho\alpha$, huic nimirū lectioni adstipulantibus Plinio & seruis iudicio, ut dictū est: ad tactū enim huius folia tōgè sunt hederæ molliora. Accedit quòd ab vnā di-
 ctione in aliā facilis sit trāsitus. His itaq; rationi-
 bus motus, Asari folia $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\omega\tau\omicron\rho\alpha$, hoc est, mol-
 liora hederæ foliis esse dixi, ut reuera etiam sunt.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis locis, montibus potissimum & syluis: aspera enim macrāve & sicca loca amat.

TEMPVS.

Bis anno, vere nimirum & autūno floret. Colligendum in fine Augusti, à die videlicet decimoquin-
 to eius mensis, vsque ad octauum Septembris.

TEMPERAMENTVM.

Asarum in calefaciendo & exiccando ordinis tertij existit, radices potissimum eius.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radices Asari calefaciunt & vrinā mouēt. His dropicis & ischiadicis diuturnis prosunt. Ducunt mēses pōdere drachmarū sex cū mulsō potæ. Purgāt Ellebori albi modo. Ruptis præterea, conuulsis, tussis veteri, difficultati spirandi, & vrinæ conferunt. Cum vino potæ ferarum morsibus salutare. Folia adstringunt. Illita capitis doloribus, oculorum inflammationibus, egilopis incipientibus, mammis à partu tumentibus, ignibusq; sacris prosunt. Cognā
 somnum

somnum etiam conciliat. Sic Crateias herbarius
de Asaro proditum reliquit.

EX GALENO.

Asari radices vtilis sunt, facultate similes radicibus Acori, intensiores tamen. Itaque ex iis, quae de illis prodita sunt, hinc facienda coniectura.

EX PLINIO.

Nardi vim habet Asarum, quod & ipsum alii qui syluestre Nardum appellant.

EX MARCO AEMYLIO.

Est Asarum Graece Vulgago dicta Latine.

Hac calida & sicca virtutis dicitur esse.

Tertius est illi gradus, ut dicunt, in utroque.

Prouocat urinam, potatâque menstrua purgat.

Hocque modo iccoris medicatur sumpta dolori,

Hydropicósque inuat, schiasim fugat hausta fies

Et vuluae morbis decoctio subuenit eius. (quæter.

Dicitur ictericum potata repellere morbum.

Elleboriq; modo vomitu præcordia purgat.

Sed non est huius purgatio tam violenta,

Nec metucnda quidem, si fiat taliter illa:

De foliis eius triginta recentia tollens,

Adde meri tantum quo possint cuncta recondi.

Tota nocte mero facias macerentur in illo,

Mane terens, vino quo sunt macerata resolve.

Tunc olus excoctum cum pingui carne recenti

Porcina, prius aegroto da sufficienter.

Et sumat vini vult quantum fortis & albi,

Sic Asari succum colatum trade bibendum.
 Fortibus & magnis est hic numerus foliorum
 Sufficiens, reliquis, vt diximus, est minuendus
 Iuxta quod vires, ætas, & cætera poscunt.

APPENDIX.

Lixiuum in quo Asarum decoctum est, si co-
 caput lauetur, cerebrum roborat, & memoriam.
 Succus etiam eius cum Pompholyge, caligantibus
 oculis confert.

DE ACORO. CAP. IIII.

Acorus officinarum, gladiolus aquæ vul-
 gò dicitur, flore luteo non vtendus, sed
 indicus vulgò galanga maior quæ verus
 esse Dioscoridi Acorus videtur.

NOMINA.

AKopov Græcè, Acorũ Latinè appellatur. Of-
 ficinis nomen retinet. Gallicè flame bastar-
 de ou glaieul de Riuiere ou de Mares voca-
 tur. Acorò aphrodisiam quasi veneream Greci etiã
 vocant. Apuleius, quicumque ille fuerit, in commẽ-
 tario quod de aliquot herbis scriptum à se relia-
 quit, Piper apium dictam fuisse hanc herbam tes-
 tatur, quòd ea in alueariis suspensa, nunquam dis-
 fugiant apes.

FORMA.

Folia iridis habet, angustiora tamen. Radices nõ
 dissimiles, implicatas, neque in rectum enatas, sed
 obliquas, & in superficie existentes, geniculis seu
 internodiis

internodiis distinctas, subalbas, gustu acres, odore non ingratas. Præstat densum, candidum, non ca-
 riosum, plenum & odoratum, cuiusmodi est in Colo-
 chide & Galatia. Ex qua sanè Dioscoridis descri-
 ptione satis liquet, Acorum nostrū, quo hodie officinæ Acorum
 ne vtuntur, etsi nō verū sit, tamen aliquam saltem officinariū
 Acori speciem esse: Iridis enim folia obtinet, angu- nō est ve-
 stiora tamen. Radices quoque similes, implicatas non aco-
 & inuicem adnatas, non in rectum, sed in obliquū rum.
 tendentes: non in profundo delitescentes, sed in su-
 perficie existentes, & modico cespite tectas: deni-
 que geniculis seu internodiis interceptas. Neq; etiā
 in colore ab eo quē Dioscorides pingit, variare vi-
 detur: nostrum enim Acorū non raro ὑπολόχης,
 hoc est, subalbas seu candicantes radices habere cō-
 spicitur. Accidit autem vt & rubētes intus habeat
 radices, quæ tamen cū candicantes passim inter-
 currentes venas obtineant, rectè subalbæ dici pos-
 sunt, quod nimirum neque vere rubescant, neq; cā-
 didum etiam prorsus colorem referāt, sed eū potius
 qui ex rubro & cādidō mixtus sit. Cæterum radi-
 ces Acori quæ intus candicant, foris vt plurimum
 subrubent. Hinc est quòd Serapion in Acori descri-
 ptione Dioscoridis verbareferens, ὑπολόχης di-
 ctionem ita vertere voluit: Et color radicum exte-
 rior tēdit ad rubedinem. Proinde qui hac sola ra-
 tione, quod Acori radix intus interdum rubescat,
 mouentur, vt diuersum nostrum prorsus à Dioscori-

dis credant, ñ non vtuntur argumento quod tantū
momenti sit, vt quod conantur, persuadere aliis possint.
Cū enim Dioscorides Acori radices ὑπολδύ-
νους, hoc est, albicantes faciat, noster certè nunquā
non tales habere deprehenditur: vel enim vere cā-
dicantes sunt, vel subrubentes, quas etiā ὑπολδύ-
νους rectè dici posse iam ostēdimus. Porro quāuis
odoratæ non sint eius radices, tamen nihil obstarē
posset odor, quo minus nostrum verum esse putarē-
mus Acoriū, quum abunde cōstet illum, haud aliter
quā colorem, secundū diuersas regiones in eadem
sæpe herba mutari: si non esset aliud, quod vt di-
uersum certo crederemus nos vrgeret, hoc nempe,
quod nostri Acori radices gustu acres nō sint, quod
tamen omnes veteres vno ore de Acoro affirmant,
sed potius adstringentes. Quapropter etsi tota ferè
descriptio illi respondere videatur, tamen quia acris
nō est, vires eas quas vero Acoro tribuunt veteres,
habere nō potest: vt hoc nomine vehemēter errent
qui a solis descriptionibus tantū pendent. Nec mi-
nus hallucinantur officinæ quæ ad vrinas mouen-
das, aut menses euocandos, lienēsve minuendos co-
utuntur. Perperā etiā Diacori cōpositionem ex eo-
dem cōficiunt. Curent itaque vt verum Acoriū ha-
beāt, quod iā in multis Galliæ officinis prostare pu-
to. Nam radix illa quæ à nonnullis seplasiarīs nūc
sub nomine maioris Galægæ vēditur, si cætera etiā
respondeant, haud dubie radix veri Acori est. Et
debent

debent seplasiarū ea vti, quoties in cōpositionibus
medicamentorum Acori sit mētio, præcipuè autem
in Diacori compositione apparanda, quòd hæc ca-
lesfaciendo concoctionem stomachi supra modū iu-
uet. Et hoc cō confidentius faciendum esse hortor,
quòd Galāgam maiorem veri Acori radicem esse
existimē: geniculis enim scater, foris subrubra, intus
subalba, gustu acris, odore nō ingrata, vthoc noīc il-
la tutò & sine errore officinæ pro Acorovti queāt.

LOCVS.

Apuleius locis cultis, pratis ac hortis nasci, ra-
rāque inuentu herbam hanc tradit. Nostri Acco-
rum iuxta amnes, & passim in aquosis & palu-
sibus locis provenit.

TEMPVS.

Legitur radix Acori æstatis initio, & siccatum
in umbra digitalibus frustis.

TEMPERAMENTVM.

In calefaciendo & desiccando tertij est ordinis.
Nostrium quidem desiccet, at citra calefactionem.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Acori radix calefaciendi vim habet. Decoctum
eius potum, vrinam cit. Prodest lateris, thoracis &
iecoris doloribus: torminibus, ruptis, conuulsis. Lie-
xes minuit. Vrina stillicidio, & venenatorū morfi-
bus subuenit. In sessu, quēadmodum Iris, ad mulico-
bria utilis est. Succus radicis caligines oculorū dis-
cutit. Antidotis præterea radix vtiliter miscetur.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Acori vtimur radice qua gustu acris est, & modicè amara, odoréque non iniucunda. Hinc manifestum est hanc facultate calidam, & consistentia tenuium partium esse. Huic consentaneum est, vt urinam moueat, & lienes induratos iuuat, tñ cornea membrana crassitiem detergeat simul atque extenuet. Ad hoc autem melior est ipsius succus. Omnino verò siccificum esse clarum est.

EX PLINIO.

Vis ei est ad calefaciendum extenuandúmque efficax, contra suffusiones & caligines oculorū succo eiusdem potio, contráque serpentes. Pectoris doloribus subuenit, & ideo antidotis miscetur. Iecinori medetur, thoraci quoque & præcordiis. Vrinā citius decoctum, & omnia vesica vitia sanat. Testiū tumores radix decocta in vino, tritáque & illita minè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat decocto huius herba fountibus. Contusis & euersis pota duobus obolis in mulsi cyathis tribus radix prodest. Acoron quoque vtile est interioribus fœminarum morbis.

ACORI OFFICINAR. VIRES.

Acori a dulterini facultates. Gustus abundè monstrat eius radicem immensam adstringendi facultatē obtinere. Hinc est quòd diuersam planè à veri Acori radice vim sortita sit. Nam vt hac tenuium est partium & facultate calida, atque adeò detergit, extenuat atque discutit:

ita

ita illa consistentia crassarum partium, ac facultas
 te frigida constringit, densat, cogit & contrahit.
 Quare urinā non cit, ut verum Acorum, nec menses
 euocat, sed potius supprimit. Sanguinem etiā vn-
 decunque manātem cohibet. Proinde rectē Pādes-
 etarū author scribit, eum qui secū Acori radicem
 gēstet, à nullo sanguinis profluvio corripī. Et ex re-
 centioribus aliqui hanc facultatē Acori nostrī ob-
 servarunt, atque hinc ad eò tradunt eius succū igne
 expressum, menses nimium promanātes constringe-
 re posse, id quod certē de Acoro affirmare vanissi-
 mū erit. Ex iis itaque intelligentiā seplasiarj, quis
 vsus nostri etiam in medicina sit Acori: nec cōmit-
 tent, ut fanatici cuiusdam, qui nuper Morophrasti
 impudentis hominis pestilentissimas nugas & in-
 eptias tegere, atque ad eò epistola aliqua operi il-
 lius temerē prae fixa commendare, ac prae illo mon-
 stro reliquos omnes medicos, si diis placet, conte-
 mnere ausus est, consilio obsecuti, hoc prorsus abii-
 ciant, cū illius immensa sit adstringendi, quod
 demonstravimus, facultas.

DE ALTHAEA. CAP. V.

Althæa, vulgo Bismalua dicitur.

NOMINA.

Aλθαία, ἡ ἰβίσκος, ἡ ἰβίσκος Gracè: Al-
 thea, Ebiscus, Ibiscus Latine dicitur. Officiū Bismalua-
 na, quæ ut plurimum barbaris vocibus gaudent, Maluanis
 Bismaluā, Maluaniscum, & simpliciter Euiscū ne-
 scius.

PLANTARVM HISTORIAE

mināt. Maluauisci autem vox corrupta est, ex malua nimirum & euisco composita, quasi dicat aliquis Maluae biscus, hoc nomine illam ab aliis maluis, quæ sanè multæ sunt, segregās. Gallicè Guimmaues. Althæa verò à multiplici remediorum potestate & usu, vel vt Plinius ait, ab excellentia effectus nominata est. Siquidem ἀλθαία Græcis idem valet, ac si à medendo medicam simpliciter dicas. Nam ἀλθαίειν illis mederi significat, ἀλθὸς verò remedium & medicinam.

Althæa
vnde dicitur
Althæa.

FORMA.

Syluestris Maluæ genus est, cui folia vt Cyclaminò rotunda, lanuginosa, flos rosaceus, caulis cubitorum binum, radix lenta viscosaq; intus candida.

LOCVS.

Locis humentibus, pinguibúsq; gaudet.

TEMPVS.

Radices, vt reliquarum ferè herbarum omnium inter autumnii initia, hoc est, in fine Augusti, & Septembris mensis principio, legenda. Folia verò & semen in æstate. Floret Iulio & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Folia & flores calidi & sicci primo excessu seu ordine. Radices verò in principio secundi.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix in aqua mulsæ aut vino cocta, aut per se pota, ad vulnera, parotidas, strumas, abscessus, mæmarum inflammationes, sedis contusiones, inflationes,

nes,

nes, nervorum distentiones, efficax est. Siquidē discutit & maturat, aut rumpit, & ad cicatricem perducit. Coctā quo dictum est modo, & cum adipē anserino aut suillo, vel terebinthina subacta ad vteri inflammationes & præclusiones vtiliter admo-
netur. Decoctū eius idē præstat, secundāq; à partu relictas educit. Decoctū radiciis cū vino potū, vrinæ difficultati, calculosorū cruditati, dysentericis, ischiadicis, tremulis, & ruptis succurrit. Dentium mitigat dolorem cum aceto decoctā, colluto inde ore. Semen autem viride siccūmq; tritum, cum aceto in stole perunctum alphas extergit. Cum aceto & oleo inunctū, à venenatorum morsibus præseruat. Valet ad dysenteriam, sanguinis reiectionē, & alui fluores. Seminis decoctum in posca aut vino contra omnes apum & minutarum ferarū ictus bibitur. Folia cum exiguo oleo, morsibus & ambustis illinuntur. Addensat aquam sub diuo radix trita & admixta.

EX GALENO.

Digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi coctū difficilia tubercula. Porro radix eius & semen cætera quidem pari herbe viridi modo agunt. verum tenuiorum partium, magisque exiccatoriam, adhæc magis extersoriam quam illa facultatem ostendunt, vt & alphas detergant, & semen renū calculos confringat. Radiciis autem decoctum dysenterię, alui proflauio,

& sanguinis reiectioni vtile est, nempe cum astringentem quandam facultatem possideat.

EX PLINIO.

Althae contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, precipuè scorpionum, vesparum, similiūque, & muris aranci. Quin & trita cum oleo, hac peruncti ante vel habentes eā, non feriuntur. Eius radix precipuè conuulsis ruptisque efficax est. Cocta in aqua aluum sistit. Ex vino albo strumas & parotidas, & mammarum inflammationes, & panos in vino folia decocta & illita tollunt. Eadem arida in lacte decocta, quamlibet perniciose tussi citissime medentur. Hippocrates vulneratis, sitientibusque defectu sanguinis, radice decoctæ succum bibendum dedit. Et eam vulneribus cum melle & resina, item conuulsis, luxatis, tumentibus, & musculis, nervis, articulis imposuit. Et asthmaticis ac dysentericis in vino bibendam dedit. Mirum, aquam radice ea addita addēsari sub dio, atque elātescere. Efficacior autem quò recentior.

EX THEOPHRASTO.

Vsus eius ad rupta, & tusses è vino dulci, & ad vlcera in oleo. Aliās si carnibus cōcoquas, in idem aggregare ac veluti conglutinare posse affirmant.

DE ANAGALLIDE. CAP. VI.

Anagallis utraq; in hortis frequēs, parvula, arboris tamen habitu, caule quadrato.

Mouron petit & quarre nobis dicitur.

NOMINA.

Aναγαλλίς Græcè, Anagallis Latine, officina-
 nis inusitata, Germanicè Gauchhey!, oder Gauch-
 Coimalkraut. (Gallicè Mouron) Hoc nominis hey! Ger-
 fortè à Germanis inditum est, quod Anagallis in li-
 mane vestibuli suspensa maleficiorum introitū pel-
 lere credita sit. Errāt qui Morsum gallina seu Pas-
 Anagallis
 serinam vulgò dictam herbam, Anagallida putāt, nō ē Mor-
 haud secus atque ij, qui Auriculā muris pro Ana-
 sus galli-
 gallide depictam ostendunt herbarij.

GENERA.

na, neque

Auricula

Duo duntaxat Anagallidis esse genera, veterum
 omnium testimonio constat, marem scilicet & femi-
 nam, quæ sanè nullo nisi florum discrimine distant.
 Mas enim puniceo, scemina verò cæruleo flore con-
 spicitur. Proinde hallucinari iuniores ac barbaros
 medicos euidentissimum est, qui plura duobus Ana-
 gallidis genera constituunt.

FORMA.

Frutices sunt Anagallides parui, in terra iacen-
 tes, folia in quadrangulis caulibus pusilla habētes,
 & modicè rotūda ad Helxines similitudinem. Se-
 men gerunt rotundum. Non quicquam sanè certius
 hac scriptorum pictura respondet: cū duplex sit
 in flore color, puniceus nimirum & cæruleus, qua-
 dranguli caules per terram sparsi, folia nō toto am-
 bitu rotunda, & semen coriandro non dissimile cir-
 cinatum. Non est tamen quod sic humi prostratos
 hos

PLANTARVM HISTORIAE

hos frutices intelligas, vt prorsus non suppullulent. Nam in altum etiam surgunt, non tamen altius, quàm ipsa tibi examusim pictura monstrat.

LOCVS.

Pedibus in aruis vineisq; vbiq; calcatur, neque quicquam nunc Anagallide despectius est, cum tamē in antiqua medicina multus eius fuerit vsus. Licet autem vbiq; ferè proveniat, in vliginosis tamen latior.

TEMPVS.

Per æstatem vtriusque prouentus maximus est, potissimum autem mense Augusto. Florent autem à Maio mense vsque in autumnum.

TEMPERAMENTVM.

Anagallidis vterque sexus calidam & siccam facultatem obtinet, quod scilicet extergere possint.

Error quæ Mulieres nanque quæ asperiorē & decolorem à natura cutē acceperunt, ad leuorem nitoremq; vultus harū succo vtūtur, vt hac ratione errare necesse sit, qui Anagallidas frigidas & humidas esse statuūt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtraque mitigandi facultatem habent, inflammationes arcent, surculos extrahunt, vlcera serpentina compefcunt. Succus earum gargariissatus pituitam capitis purgat. Per nares infusus dolorem dentium lenit, si in contrariam narem iniiciatur. Argema cum Attico nelle emendat, & oculorum caligines iuuat. Contra viperarum morsus, renum & iecinoris vitia, ex vino potus prodest. Tradunt nō-

nulli

nulli cam que cœruleū florem habet, prociduam sedem reprimere: quæ verò puniceum, illitu euocare.

EX GALENO.

Anagallis vtraque, tam ea quæ florem parit cœruleum, quam ea quæ puniceum, admodum extergendi facultatem obtinent. Quendam etiam calorem attractorium possident, ita vt impactos corpori refigant aculeos. Succus earū ex naribus purgat eadē de causa. Et vt summarim dicatur, exiccatoriā citra mordicationem facultatem habent, quāobrem vulnera glutināt, & putrida adiuvant.

EX PLINIO.

Vtriusque succus oculorum caliginem discutit cum melle, & ex ictu cruorem, & argema rubens, magis cum Attico melle inūctus. Pupillas dilatat, & ideo hoc inunguntur antè, quibus paracentesis sit, iumentorum quoque oculis medentur. Succus caput purgat per nares infusus, ita vt deinde vino colluatur. Bibitur & contra angues succi drachma in vino. Murum, quod fœminam pecora vitant. At si decepta similitudine (flore enim tantum distāt) degustauere, statim cam que Asyla vocatur, in remedio quærunt. Ea à nostris ferus oculus nuncupatur. Precipiunt aliqui effossuris, ante solis ortum, Superstipriusquam quicquid aliud loquantur, ter salutare tiosum, eam, tunc sublatam exprimere, ita præcipuas esse vires. Vrinā cient Anagallides. Iecinori mirè prosant. cohibent quas nomas vocant. Vtiles & recētibz

PLANTARVM HISTORIAE

tibus plagis, præcipuè senum corpori. Ad recentia quoque vulnera tanta traditur vis, ut sanicem ossibus extrahant. Anagallis cœrulea procidentia sedis retro agit, è diuerso rubens proritat.

DE ALSINE. CAP. VII.

Alsine omnis Mouron nobis dicitur, à baccarum similitudine cum solano.

NOMINA.

Morsus
gallinae.

AΛΣΙΝΗ Græcè, Auricula muris Latinè, Morsus gallinae vulgò appellatur. Pauerina Italianè, quod paueris, id est, iunioribus anseribus gratum pabulum sumministret. Auiculas caueis inclusas, cum fastidiunt escam, aucupes hac herba recreare solent. Gallicè Mouron, aliis Morgeline vocatur.

Alsine cur dicta. Alsine autem dicta est, quòd lucos, quæ Græci ἄλδις nominant, nemorosaq; , & umbrosa loca amet.

Auricula muris. Auricula verò muris, quòd musculorum auribus folia similia habeat.

GENERA.

Quamuis Dioscorides & alij vnâ tantum Alsinen faciunt, nos tamen tria eiusdem genera, licet plura adhuc inueniantur, damus. Primum genus Alsinen maiorem vocauimus, quod scilicet vera sit Alsine, & aliis maior, Gallicè Mouron nominatur. Alterius generis plantam Alsinen mediam appellauimus, Gallicè Moyen mouron. Hæc quod ad flores attinet, qui cœrulei sunt, à descriptione variat: eiusdem tamen cum priore facultatis,

tis. Tertij generis herbam. *Alsinen* minorem vocamus. Hæc, quidem, vt prima, pulchrè descriptio ni respondet. Gallicè *Petit mouron* nuncupatur.

F O R M A.

Cauliculis serpit rotundis, è quorū geniculis exiles ramuli profiliunt, foliis *Helxines* minoribus, minusque hirsutis, flore exiguo, candido, foris herbaceo. Hæc cum teritur cucumis odorem refert. Non autem illam *Peponis* maturi iucunditatem, sed herbaceum cucumeris odorem subolet. Porro cum *Dioscorides* *Helxine* similem esse *Alsinen* tradit, non de ea *Helxine* quæ vulgò *Parietaria*, sed ea potius quæ alio nomine *Cissampelos* dicitur, intelligi oportet: hæc enim folia *Hederæ* haud dissimilia obtinet. Adeò vt liquidò iam constet, *Alsinen* esse eam herbam quam passim hodie *Morsum gallinæ* appellant. Huc accedit quòd facultates, vt ex sequentibus patebit, quas vulgus *Morsui gallinæ* tribuit, ab *Alsines* viribus nihil varient.

Helxine
duplex.

L O C V S.

Nascitur in lucis, hortis, & maximè in parietibus, maceris, opacisque locis.

T E M P V S.

Incipit à media hyeme. Arescit autè æstate media. Cum prorepit, muscutorū aures imitatur foliis.

T E M P E R A M E N T V M.

Refrigeratē & humectatē haud secus quàm *Helxine* obtinet facultatē: est enim aquæ essentiæ frigidaq;

PLANTARVM HISTORIAE

frigidaq; quare & citra adstrictionem refrigerat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Alsine refrigerandi facultatem obtinet. Oculorū inflammationibus cum polēta illita conuenit. Succus eius aurium doloribus instillatus prodest. In vniuersum eadem quæ helxine potest.

EX GALENO.

Ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

EX PLINIO.

Vsus eius ad collectiones inflammationēsq; . Quin emendat omnia quæ Helxine, sed infirmius. Epiphoris peculiariter imponitur: item verēdis vlcerebūsq; cum farina hordeacea. Succus eius auribus infunditur.

APPENDIX.

Easdem facultates, herbis quas morsus gallinae vulgò nominant, nostri temporis herbarij tribuūt, quod scilicet ad feruentes inflammationes, ac erysipelata prosint. Omnes enim, vt dictum est, refrigerant atque humectant. Hinc est quod minorem aliqui Germanorum Fieberkraut vocent, quia scilicet febribus accommoda, & utilis sit.

DE ANTHEMIDE.

CAPVT VIII.

Chamæmelum leucanthemū nomen nobis retinet.

Chrysanthemū quod pingis: mihi quod sciam non est visum.

Eranthe-

Eráthemum quia vere floret in calcaris effigiem, in ambitu purpureum, cornueta nobis dicta pingitur, quæ tamen floret messibus.

NOMINA.

Aνθεμις, ἡ χαμαίμηλον Gracè, Anthemis, Chamæmelon Latinè, officinis corrupto nomine Camomilla dicitur, Germanicè Camillen. (Gallicè de la Camomille.) Chamæmelon quoniam odorem mâli, appellant, id quod de primo genere potissimum intelligendum venit.

Chamæmelon cur dictum.

GENERA.

Tria eius genera, floribus tantum distantia, inueniuntur. Hi enim & si intus aurei sint, tamen foris per ambitum illis adiacet folia aut candida, aut lutea, aut purpurea. Quæ foris in orbem candida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκάνθημον, & vulgò hodie Camomilla vocatur. Quæ verò luteis per ambitum foliis constat, ea haud dubiè est, quæ priuatim Dioscorides à suis floribus χρυσάνθημον nominat, Germani autem pulchrè ad Gracæ appellationem alludentes, Goldtblumen, Gelcamillen, Streichblumen, appellant. Tertia species chamæmeli, quæ nimirum purpurea per orbem folia habet, nulla alia est nisi ea quam hodie vulgus medicorum Consolidâ regale, Germani autem à similitudine calcaris, cui respondet flosculus eius herbe, & à colore lepidio regioq; qui affectari nunquam

Leucâthemou.

Chrysanthemon.

Eranthemou.

nunquam satis potest, Rittersporn vocant. Dioscorides peculiariter ῥόδανθον, eo quò vere flo-

Consolida reat, dici tradit. Tria itaque in vniuersum **Anthes** regalis est midis seu **Chamameli** genera sunt, quorū sanè pris-
tertia cha mum **Chamamelon** leucanthemon, alterum **Cha-**
mameli mamelon chrysanthemō, tertium **Chamamelon** erā-
species. themon Dioscoridi nominatur. De duobus primis generibus neminem dubitare, quin vera & legitima sint, arbitramur, quòd nihil in iis sit, quòd Dioscoridis descriptioni, quam mox subiiciemus, nō respōdeat. Tertium fortè nōnullis qui morosius omnia obseruāt, minimè genuinū **Chamameli** genus esse videbitur, ideoq; quibus simus argumentis & coniecturis impulsī, vt tertium **Anthemidis** esse genus credamus, necesse erit ostēdere. Potissimum autem quòd nos in hanc sententiā pertraxit, est, quòd singula in Dioscoridis descriptione illi congruant, rami scilicet palmum non excedentes, fruticosi, multas alas habentes, parui & exigui, capitula rotunda, aurea, foris purpureis foliis, magnitudine in nullo alio genere **Rutæ** foliis magis similibus circumdata. Deinde sententiam hanc nostram confirmauit antiquissimus codex manuscriptus, in quo pictura exquisitissimè Regalem dictā cōsolidam refert, quam iis sanè verbis describit: herba est quam quidam **Monachellam**, siue **Capucariam** vocant (à cucullo haud dubiè monachorum, quem flores illius & herbae referunt, nomen imponentes) Dioscorides **Eranthemno**

Eranthemon appellat, & est vna species *Anthemidis*, quæ folia instar *Camomillæ* habet, nigriora tamen florē autē violæ similem. Hæc ille. Quibus omnibus illud etiā accedit, nostrā de hac herba sententiā mirificè corroborans, quòd vulgus hodie medicorum *Consolidam* regalem calculosis, & oculis prodesse tradat, adeò vt illius etiā cōspectum multos ex oculis laborantes sanasse dicant. Atque hinc fit vt studiosi passim eam herbā in suis muscis suspensam habeant, oculis hac ratione cōsulere volentes. Has autem omnes facultates, vt ex sequētibz patebit, *Eranthemo* suo *Dioscorides* etiā adscribit. Quamobrem nihil certius est, quàm *Consolidā* regalem tertium esse *Anthemidis* genus, id quod argumenta nostra iam adducta palàm euincunt.

F O R M A.

Rami palmum non excedunt, fruticosi, frequentes alas habentes, parui, tennes & multi, capitulis rotundis. Flores intus aureos continent, foris verò per ambitum candidos, aut luteos, aut purpureos, foliorum *Rutæ* magnitudine.

L O C V S.

Nascuntur in aspero, sicco, macróque solo, & iuxta semitas atque itinera.

T E M P V S.

Colliguntur vere in calidis potissimū regionibus, in nostris inter æstatis initia, hoc est, Iunio mense.

T E M P E R A M E N T V M.

PLANTARVM HISTORIAE

Calefaciunt & desiccant in primo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vim habent radices, flores, & herba calfaciendi, extenuandiq; . Potu & in seſſione menſes, ſectus, calculos, & vrinam pellunt. Aduerſus inflationes, & tenuis inteſtini dolores bibuntur. Bile ſuffuſos expurgant, & iecinoroſis medentur. Decocto earum veſicæ vitia ſouentur. Efficacius ex omnibus generibus eſt, quod florem fert purpureum, cæteriſque maius exiſtit, idq; propriè Eranthemon vocatur. Quod verò Leucanthemon & Chryſanthemon cognominant, vehementius vrinam ciunt. Aegilopiis illitæ medetur. Commanducata oris vlcera ſanant. Nonnulli in clyſteribus ex oleo vtuntur, terentes iſſis ad pellendos februm circuitus. Folia & flores reponi debent, & ſeparatim contuſa in paſtillos cõformari. Radix quoque ſiccatur, & uſu poſcete interim partes duas herbæ, floris aut radicis modò vnã: interim contra floris duas, & herbæ vnã, alternis diebus duplicantes pondus, dare conuenit. Bibere autem oportet in vino diluto mulſo.

EX GALENO.

Tenuium eſt partium, quamobrem digerēdi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet. Eſt itaque Chamæmelon tenuitate Roſæ perſimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, animali familiares, & tēperatas. Quapropter laſitudinibus vt ſi quid aliud, cõfert, doloresq; mitigat. Præterea
tenſa

tensa remittit & laxat, quæq; mediocriter dura sunt, emollit, quæq; constipata condensatæve sunt, rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris alicuius inflammationem infestant, dissolvit, præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate consistunt. Qua de re & ab Aegyptiorum sapientissimis Soli consecrata est, febriumq; omnium remedium putatur. Verum hac quidem in re à veritate aberrant: solas enim quas diximus febres sanare potest, eâque quæ iam concoctæ sunt. Iuvat autem pulchrè reliquas etiam omnes quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex visceris inflammatione prognatæ: nam & harum remedium Chamæmelum vel strenuissimum est, ubi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondriis, ut si quid aliud, gratum existit.

EX PLINIO.

Medici vere folia tusa in pastillos digerunt, item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ unius pondere contra serpentum ictus. Pellit mortuos partus, item menstrua in potu, & urinam calculosque: inflationes, iecinorum vitia, bilem suffusam, ægilopia. Commanducata ulcerum manantes in ore eruptiones sanat. Ex omnibus iis generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius & foliorum, & fruticis amplitudo maiuscula est. Hanc propriè quidem *Eranthemum* vocant.

PLANTARVM HISTORIAE
DE ANETHO. CAP. IX.
NOMINA.

Aνηθον Græcè, Anethum Latinè appellatur. Nomen in officinis genuinum retinet, Germanicè Dyllē, & Hochkraut (Gallicè Anet) nominatur.

FORMA.

Anethum sesquicubitali proceritate assurgit, multicaule, ramosum, exilitate folij in staminis penè modum extenuata, luteolo flosculo, semine lato & quasi foliato, radice lignosa, neq; adeò prolixa, umbella fœniculi, cui cognatum quasi genus, propter similitudinem videri potest.

LOCVS.

In hortis feritur: interdum & sponte, fœniculi modo, provenit.

TEMPVS.

Floret in æstate, Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Anethum adeò calefacit, vt habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantium verò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Vstum autem tertij tum calfacientium, tum desiccantium ordinis fit.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Anethi aridi comæ seminisq; decoctum potũ lac euocat. Tormina & inflationes sedat. Aluum leuēſque vomitiones sistit. Vrinam cit. Singultus lexit. Oculos hebetat, & genituram asidue potum extinguit. Decoctũ eius mulieribus præfocatione vuluæ laboranti-

laborantibus ad insidendum vtile. Semen eiusdem vsum & illitum condylomata tollit.

EX GALENO.

Anethum in oleo decoctum digerit, sedat dolores, somnum conciliat, crudos & incoctos humores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies pus mouentibus, & maturantibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tū calidius, tum tenuiorum partium est, atque adco digerendi facultate præditum. Vsum vlceribus admodum humidis illitum prodest, potissimū iis quæ in pudendo consistunt. Quæ autem in præputio sunt inueterata, iis probè cicatricem inducit. Ceterum viride humidius est, & minus calidum, itaque magis concoquit sicco, & somnum conciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres coronis ex eo concinnatis in symposiis vñesse.

EX PLINIO.

Anethum ruetus mouet, & tormina sedat. Album sistit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua vel vino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptum ex aqua sedat cruditates. Cinis eius vnā in faucibus leuat, oculos & genituram hebetat.

EX SIMEONE SETHI.

Ad crassorum humorū inflationes prodest. Quidam sanè ipsum stomacho bonū esse, alij verò minime, dixerūt. Illi quidem ad eius caliditatem, & facultatem quæ humiditatem concoquit, & flatus

qui sunt in ventriculo discutit, respexerunt: ij verò ad substantiam eius, quæ crassarum est partiū, cōcoctū difficilis, & nauseosa. Oleo incoctū discutit, & somnū conciliat. Inunctū tumores crudos cōcoquit. Inflationes quoque quæ in ventriculo generantur, digerit. Corpus ex immodico labore defatigatum, curat. Renes verò, vt quidam aiunt, lædit.

DE AIZOO. CAP. X.

Sedum maius nobis Iouis barba, minus mas. Triquemadame, hortēse est acetariis expetitum: alia duo syluestria quorum posterius vermicularis nobis dicitur calida multum herba, non autem teneo aliud.

NOMINA.

Εἰζωv Græcè: Aixoon, Sedum, Sēperuium

A Latine nominatur. Postremum nomen officinae obtinuerunt. Vulgo Iouis barba, Gallicè

Iouis barba.

de la loubarbe dicitur, quòd scilicet nonnullis locis plebis animos iam pridem inuasit opinio, non feriri fulmine domum, in cuius tegulis vireat Sedum. Porrò Aixoon & Semperuium appellant, quòd perpetuò, tam æstate quàm hyeme vireat, nec ullis frigoribus, aut cœli inimia quantumvis frigida emoriatur.

GENERA.

Dioscoridē sequētes tria eius genera statuimus.

Aixoon
maius.

Primum Aixoon seu Sedum maius, quòd folia latiora habeat. Alterum Sedum minus, quod Græcis
etiam

etiam τριθαλὲς, quia ter floreat in anno, vocatur.
 Vulgò Vermicularis, à similitudine foliorum, quæ Vermicu-
 rotunda sunt, & figura oualis, vt vermiculos putes, laris.
 & Crassula minor nominatur. Huius iterum duo Crassula
 sunt genera: alterum enim mas est, quod nimirum minor.
 floribus luteis spectatur, & Gallis Triquemada. Aixoon
 me appellatur. Alterum foemina, quod pallidis seu minus.
 candidis conspicitur floribus. Tertium genus est Tertium
 quod Aixoon sylvestre, ab aliis Portulaca sylvestris genus
 aut Illecebra minus rectè & impropriè dicitur. Aixoi.
 Nam portulaca sylvestris diuersa ab hoc tertio Se-
 di genere herba est, vt suo dicemus loco. Illecebra
 autem nomen aliæ debetur herba, quæ Telephion
 vocatur, vt in eiusdem historia docebimus. Nomina
 verò hæc generi illi indiderunt, seducti errore eorū
 qui Portulacam sylvestrem cum tertio Aixoo apud
 Dioscoridem confuderunt, atque ad eò quæ debentur
 Portulacæ & Telephio nomina, Aixoo temere
 assignarunt. Vt enim viribus diuersa est Portulaca
 sylvestris ab hoc genere tertio Aixoi, ita etiam vo-
 mine & forma. Quare meritò reprehendendi sunt
 qui duo hæc capita sic sibi temere miscuerūt. Vul-
 gares herbarij Vermicularem minorem vocant.
 Galli Pain d'Oyseau.

FORMA.

Semperuiuū maius caules profert cubitales, in-
 terdum etiā maiores, pollicis crassitudine, pingues,
 egregiè virentes, incisuras Characiæ Tithymalli

Minus.

χλωρῆ.

instar habentes. Folia pingua, pollicis magnitudine, in cacumine lingua similis, alia in terram resupinata, alia in capite inuicem contracta, circulo oculi figuram circumscribunt. Minus Aixoon caules ab vna radice exeuntes multos habet, tenues, foliis plenos rotundis, pinguibus, paruis, in summo acuminatis. Emittere autem è medio caulem palmi altitudine, umbellam & flores pallidos luteosve sustinet. τε: χλωρῆ enim hoc loco, vt aliàs saepe, pro ὡχρῶ accipitur, id quod ex Serapione etiam abundè consistare potest, qui hūc Dioscoridis locū ita reddidit: Et habet virgam in medio longam, circa longitudinem palmi super quam est capitellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Eam autem Semperuiui minoris speciem quæ flosculis luteolis spectatur, dilucidioris doctrinæ gratia, marem appellauimus. Alteram verò quæ candidos obtinet flores, feminam. Tertium Semperuiui genus sylvestre dictum, foliola habet pinguiora, ad Portulacæ figuram accedentia, & hirsuta, breuioriq; cacumine. His verbis exquisitè admodum Dioscorides & Plinius tertium Aixoi genus, quod vermicularē minorem hodie appellant, delinearunt. Habet enim pingua admodū foliola, ad Portulacæ sylvestris formā nonnihil accedentia, hirsuta, & breuiori quàm in Aixoo minori cacumine. Reliqua quæ sequuntur in quibusdam Dioscoridis exemplaribus, manifestè adulterina sunt. Neque in plura habet Aldinum exemplar,

& alia quæ paulò sunt castigatiora.

LOCVS.

Maius nascitur in montanis & testeis. Nonnulli autem in tectis domorum conferunt. Minus Aixoon in muris & petris, maceriis vinearum, parietibusque provenit. Tertium in petrosis locis, sepulchris umbrosis, oppidorumque fossis.

TEMPVS.

Florèt Maio & Iunio mēsisbus maius & minus. Tertium autem genus in Maio tantum floribus ornatur luteis.

TEMPERAMENTVM.

Aixoon utrunque, tam maius quam minus, desiccāt modicè, vehemēter autem refrigerāt: sunt enim ex tertio ordine & recessu refrigerantiū. Tertium genus calidum esse, Dioscoridis & omnium veterū testimonio constat. Gustus etiam minimè reclamāt: si enim gustaueris, linguam vehementer vrit.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Maius vim obtinet refrigerandi & adstringēdi. Conferunt ad erysipelata, herpetas, nomas, oculorū inflammationes, ambusta, podagras, folia per se, & cum polenta illita. Succus verò cum polenta & rosaceo, capiti in doloribus infunditur. Datur à phalangio morsis in potu diarrhœa laborantibus, dysentericisq;. Teretes lumbricos cum vino potus excutit. Subditus in pessa, muliebres fluxiones sistit. Succus etiā lippientibus à sanguine vtiliter inungitur.

PLANTARVM HISTORIAE

gitur. Minoris folia antedicto eandem facultatem habent. Tertium genus calfaciendi vim habet, acré, & exulceratē. Cū axungia illitū, strumas discutit.

EX GALENO.

Semperuium vtrūque tam maius quàm minus desiccatur quidē modicè, quādoquidem & mediocriter adstringat, omnis alterius vehemētis qualitatis expers: quare in eo aquea essentia abundat. Refrigerat non mediocriter, ideoque ad erysipelata, herpetas, & à fluxione natas phlegmonas prodest.

EX PLINIO.

Vtriusque vis eadē, perfrigerare & adstringere. Medentur epiphoris folia imposita, vel succus inunctus. Purgant enim vlcera oculorū, explentq; & ad cicatricem perducūt. Palpebras deglutināt. Eadem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum ictibus: aconito verò maius Aixoum præcipuè. A scorpiionibus quoque feriri id habentem negant. Medentur & aurium dolori.

APPENDIX.

Errat non parum hodie magna medicorum pars, qui Sedi genus tertiū refrigerare, asserere haud verentur. Et mirum sanè cur ab eo errore illos Dioscorides non reuocet, qui disertè ait, hoc ipsum calefaciendi, & exulcerandi facultatem habere. Sed fortè non magnopere laborant, quid de hac planta Dioscorides tradat: debuisset tamen erroris huius admo-

admonuisse eos saltem germanica eius planta nomenclatura. Neque enim alia ratione Maurpfeffer nostris Germanis dicta est, nisi quod in muris proveniat, gustuque acris admodum sit.

DE ARNOGLOSSO. CAP. XI.

Plantago hæc triplex omnibus nota, & quæ speciatim præter has Arnoglossum dicitur, rotundioribus foliis, lanuginosis, sessilibus, usu frequentissimo officinarum celebris.

NOMINA.

AΡΥΩΛΩΣΟΝ Græcis: Arnoglossum, Plantago Latinis nominatur. Nomen latinum Plantaginis officina retinuerunt. Gallicè du Plantain, Germanicè Schaffzungē quod nomen Græco pulchrè respondet, dicitur. Arnoglossum, quod eius folia agnina lingua similima sint, appellarūt Græci. sum unde Latini autē Plantaginem, ducto à planta vocabu- dictum. lo, nuncuparūt. Sunt tamen qui à multitudine nervorum, quibus quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sunt, Polyneuron vocant.

Polynereon.

GENERA.

Duo Plantaginis sunt genera, veterum omnium sententia, maior & minor. Maior, quā peculiariter à septenis quæ in foliis apparēt, costis, Græcè ἑπτάκωλον, id est, Septinerviā vocant. Minor, eo quod eius folia fibris quinque tanquam nervis distincta sunt, πεντάκωλον, id est, Quinquenerviā dicitur.

PLANTARVM HISTORIAE

dicitur. Officinae, quoniam folium arctius desinit in acumen, & velut in lanceae mucronem fastigiatur, Lanceolatam, vulgus autem Lanceolam appellat, quia scilicet acuminatior & longior est.

FORMA.

- Minor.** Minor Plantago angustiora, minora, molliora, leniora, & tenuiora folia habet, caule anguloso, in terram inclinato: flores pallidos: semen in summis caulibus. Maior contra crassior vegetiorque, latiore folio, betaceo. Folia siquidem maioris Plantaginis betaceorum effigiem, non alterius oleris referunt, quod Dioscorides λαχανῶδες dixit. Nam apud Athenienses λάχανον pro Beta saepe sumi solet, à cuius foliis non multum Plantaginea videntur abhorrere. Non itaque olus intelligere potuit, cum in exprimenda similitudine speciatim loqui, non generatim conueniat. Huius caulis angulosus, subruber, altitudine cubitali, à medio sui ad verticem usque tenui semine circumdatus, flosculum in spica luteū, nonnunquā herbaccū ostētat. Radices subsunt illi tenerae, hirsutae, candidae, digitali crassitudine. Descriptiones hae Dioscoridis pulchrè picturae respondent. Antiquus etiam herbarius easdem pro maiori & minori Plantagine herbas exhibet.
- Μαίωρ.**
- λάχανον.**

LOCVS.

Maior in palustribus potissimū nascitur. Vtraque autem circū sepes, aggeres, prata, & lacunosa loca.

TEMPVS.

Herba

Herba & flores in æstatis initio, Maio & Iunio
^m ensibus, semen verò Augusto carpitur mense.

TEMPERAMENTVM.

Mixta est temperatura Plantago, habet enim
 quiddam aqueum frigidum: habet verò & auste-
 rum quiddā, id quod terreum est, siccum, frigidum.
 Itaque refrigerat simul & desiccāt, & in vtroque
 secundi recessus à mediis est.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Vim habent folia exiccatoriam & adstringen-
 tem, ideo ad omnia vlcera maligna, elephantica,
 quæ humore scatēt, & sordida, conferunt. Eruptio-
 nes sanguinis, nomas, carbunculos, herpetas, epiny-
 etidasq; cohibent. Vlcerā vetera & inæqualia ci-
 catrice obducunt. Medentur & iis quæ Chironia
 nuncupātur. Sinus glutināt. Morsibus canis, ambu-
 stis, inflammationibus, parotydi, panis, prosunt. Stru-
 mis & agilopis cum sale illita conferunt. Olus co-
 ctum cū aceto & sale dysentericis & celiacis sum-
 ptum subuenit. Datur & in locum Betæ cum len-
 ticula coctū. In leucophlegmatia post aridas epu-
 las in medio herba decocta datur. Comitibus &
 asthmaticis data proficit. Foliorum succus oris vl-
 cera continua collutione purgat. Cum creta cimos-
 lia & cerusa ignibus sacris medetur. Fistulas in-
 fusus sanat. Aurium doloribus & lippitudinibus
 succus instillatus, & collyriis additus prodest. Gin-
 givis sanguinolentis, & sanguinem reiiciētibus po-

PLANTARVM HISTORIAE

tus cōfert. Dysentericis subter per aluum iniicitur. Bibitur cōtratabē. Aduersus vteri strangulationes in lana apponitur: item vuluæ fluxiones. Semē cum vino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. Radix decocta collutione. & cōmanducata, dentiū dolores sedat. Eadē cū foliis in passo ad vesicæ renūq; vlcera præbetur. Ferūt tres radices cū tribus vini cyathis, & pari aquæ potas, tertianis auxiliari, & quatuor quartanis. Sunt qui radice è collo. suspensa ad strumas discutiendas vtātur.

EX GALENO.

Quæcunque medicamenta cum hoc quod refrigerant vnā etiā adstringūt, ea & ad vlcera maligna omnia, & ad fluxiones, & putredines prosunt atque adeo etiā ad dysenterias: nā & sanguinis eruptiones sistunt, & si quid aduratur refrigerant. Sinus quoq; glutināt, & alia vlcera recētia simul & vetera. In omnibus ferē id genus medicamentis primas tenet, aut certē nulli secūdum est Arnoglossum, idq; tēperaturæ symmetria. Nā siccitatem obstat morfus expertē, & frigiditatem quæ nōdum obstupefaciat. Semen eius & radix similis sunt facultatis, attamen siccioris, & minus frigida. Semē etiam subtiliū est partiū, radices autem crassiorū. Et huius herbæ folia exiccata, subtilioris & minus frigida facultatis sunt, nēpe diffolato ex eo ac digesto excremento aqueo. Hac ratione radicibus vtuntur ad dentiū dolores, tum manducātes, tum collutionis

collutionibus incoquentes. Præterea ad iecinoris & renum obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoq; & multò magis semen: hæc enim quædam abstergerendi in se facultatem habent, quam & in herba viridi inesse satis coniici potest, verum ab humiditatis copia vinci.

EX PLINIO.

Vis mira in siccando densandoq; corpore, cauterij vicem obtinens. Nulla res æquè sistit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocât. Stomachũ corroborat Plätago per se sumpta in cibo cum Lête aliæ causæ sorbitione. Strumis medetur. Semen eius in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, aut alica ex succo eius sumpta dysentericis datur. Lichenis fædo mala medetur trita. Vitia sedis & attritus celerimè sanat. Ex aqua mulsa duabus horis ante accessionem pota duabus drachmis, tertianas leniores facit, vel succus radicis madefactæ vel tussæ, vel ipsa radix trita in aqua ferro calefacta. Quidã ternas radices in tribus cyathis aquæ dederunt. Iidem in quartanis quaternas fecerunt. Hydropicos sanat in cibo cum prius panem siccũ comederint sine potu. Folia podagras refrigerant, & in primo impetu podagræ rubentis, hoc est, calidæ, conueniunt. Oris ulcera succus emendat, & folia radicesque cõmãdicata, vel si rheumatismo laboret os. Vitio reiectionis sanguinis idem medetur. Phthisim sanat si bibatur, & ipsa decocta in vino cũ sale & oleo à somno

matutino

matutino refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollāt folia trita, addito sale modico. Fistulis infusus succus auxilio est. Sanguinis profluvium sistit semen, si ore reiciatur, siue aluo fluat, siue fecundariū utero. Succus vomentibus sanguinem datur. Contusis, eversis omnib. modis ipsa sumitur. Medetur omnium generū ulceribus, peculiariter fecundarum, senum, & infantium, igne mollita, melior & cum cerato.

DE ALISMATE. CAP. XII.

NOMINA.

Aλισμα, ἢ δαμασκόβιον Græcè: Alisma, *Damaſonium* Latine nominatur. Sunt qui eā herbam esse putent, quàm herbarij & vulgus nominant *Barbā sylvanā*, & *Plantaginem aquaticam*: *Plantago aquatica*. nonnulli verò eam, quam multi *pastoralem fistulam* vocāt. Prior Germanis *Vuasser Vuegreich*, & *Froschloffel* (Gallicè *Plantain aquatique*) quòd scilicet in palustribus nascatur, ubi frequētes sunt ranae. Altera verò iisdem *Hirtenpfeiff* nominatur. *Plantaginem* autem *aquaticam*, ob natales & similitudinem quæ illi cum vera *Plātagine* est, dixerūt: quemadmodū *fistulā* *pastoralem*, quòd singulari scapo rudis *fistulæ* & longitudinem & cōfigiem quādam videatur imitari. Quæ verò nostra de iis sit sententia, paulò post indicabimus.

FORMA.

Alisma folia *Plātagini* similia habet, angustiora tamen & in terrā reflexa, demissaq;. Caulis illi

est tenuis, simplex, altitudine cubitum excedente, thyrso similis, capitula habes. Flores tenues, candidos & aliquatenus pallidos obtinet. Radices vt Elebori nigri tenues, odoratas, acres, modicęque pingues. Ex qua quidem delineatione satis constat, neutrā herbarū quarum picturas damus, esse Alisma. Nā herba quā hodie Plātaginē aquaticā vocant, nō per omnia historiae respōdet. Vt enim alia prae terea, radix eius neq; odorata, neq; acris est. Alterius autē, quā pastoralē fistulā nominauimus, etsi radix odorata sit, minimē tamen acris existit. Quicquid tamen sit, hac potius quā altera pro Alismate vtēdum esse censeo. Eius effigiem suo loco dabimus.

LOCVS.

Aquosa amat loca, in quibus passim nascitur.

TEMPVS.

In aestate colligi potest, tū enim floribus abundat.

TEMPERAMENTVM

Calidam esse hanc herbam satis monstrant radices, quas acres esse constat. Absterforiam etiam quandam in se facultatem obtinent.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix vnius aut alterius drachmæ pondere cū vino pota, his qui leporem marinum deuorauerunt, prodest, & quos rubeta rana mordiderit, quique opium hauserūt. Torminibus & dysenteriae per se, aut cum Dauco pari pondere pota censert. Cōuulsis itidem & vteri strāgulationibus. Herba sistit
d aluum,

aluum, menses ducit, & oedemata illita lenit.

EX GALENO.

Damasonium aut Alisma. De hac herba intertio libro tradit Dioscorides, quòd radix eius epota dysenterias sanet, & aluum sistat, atque oedemata mitiget. Nos verò ea experti non sumus. Quòd autem constitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit pota comminuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quòd abstersoriam quandam facultatem obtinet.

EX PLINIO.

Vsus in radice aduersus ranas & lepores marinos. Lepori marino aduersatur in vino potũ. Struemis imponitur ex aqua cœlesti folium tritũ, vel radix cum axungio tusa, ita vt imposita folio suo operiatur. Sic & ad omnes cervicis dolores, tumoresque quacunque in parte.

DE ARTEMISIA. CAP. XIII.

Artemisiã vulgaris nobis nomen retinet.

Tenuifoliam pingis quã matricariã vulgo vocamus. Monoclonũ verò Tanacetum seu Athanasiam vulgo dictã. Tagetẽ verò quẽ Oculum Indicum vocamus.

NOMINA.

Aρτεμισία Græcis, Artemisia Latinis, Germanis Beyfuß, Bucken. S. Iohans gurtel, Sonnenued gurtel, oder Großer reinfarn (Gallicè Armoise ou l'herbe de saint Iehã)
appellatur.

appellatur. Officinæ veterem appellationem retinent. Nomen herbæ inditum putant ab Artemisia Artemisia vxore Mausoli regis, quæ sibi hanc herbã adoptauit, unde diuinit, cū ante Parthenis, id est, virginalis, quòd virgo Æla. dea illi nomen dederit, vocaretur. Non desunt qui ab Artemide cognominatã arbitrentur, quòd priuatim sceminarum malis, quib. ἄρτεμις, hoc est, Diana præest, medcatur. Nomen Germanicum S. Iohans gurtel, quasi diui Ioānis zonam dicas, à superstitiosulis nonnullis monachis & mulierculis herbæ huic impositū est. Nā fuerūt qui nō coronas duntaxat, sed etiã zonas ex ista herba confecerūt, quas tandem in ignem, qui in die diuo Ioanni baptistæ sacro, in singulis plateis vrbiū succendebatur, nescio in quē euētum, proiecerunt, haud dubiè hac herba in deserto diuum Ioannem cinctū fuisse somniati.

G E N E R A.

Tres sunt, Dioscoride teste, Artemisias species quæ etiam hodie apud nos passim reperiuntur. Prima ὀλατύφυλλος, Latine Artemisia latifolia dici potest. Ea autem est quæ simpliciter hodie Artemisia latifolia vocatur. Huius iterum duo sunt genera colore duntaxat distantia: vnum caule & floribus rubēs, Germanis Rotbuckē, vel Rotbeyfus (sic dicitur: alterum cædicās caule, floribus verò flauis, Germanicè Vueiszbucken appellatur. Altera Gracè λεπτόφυλλος, Latine vero Tenuifolia nominatur: quòd tenuifolia quidem genus vulgus hodie Matricariā, Germani Matricaria dicitur.

Muterkrant & Mettram, (Gallicè de l'Espar-
goute) quod vteri quē matricē vocāt, morbis me-

Artemi- deatur. Tertia species Artemisia monoclonos dici-
sia mono- tur, Tanacetū corrupto nomine pro tagetem hodie
clonos. nominant, Germani Reinfarn, quod filicis ferè

Tanace- speciem reseat & in aquarū ripis nascatur: alio
tum. nomine Vurm kraut, quoniam lumbricos è ventre

Tagetes. pellat. Esse verò hanc herbā aliquā Artemisiæ spe-
ciem vel hinc etiā cōstare potest, quod primā spe-
ciem, vt diximus, nonnulli Germanicè Groffen
reinfarn vocant: hac enim nomenclatura manife-
stè docent, & eam quam Tagetem appellant Ar-
temisiæ esse cōgenerem, quod scilicet eandem ha-
beat appellationem. Huius haud dubiè generis est
herba quæ elegantissimos profert flores, garyophyl-
los Indos vocatos. nulla enim in re nisi floribus, qui
sunt elegantiores & longè maiores, ab hac nostra
distat: odore tamen nostrā hanc etiā vincit. Hinc
est quod Tagetem Indicam appellauerimus, Ger-
manicè autem Indianische negelen. His autem
herbis tribus conuenire Dioscoridis descriptiones fa-
cilè vnusquisque ex iis quæ paulò pòst dicemus co-
gnoscat. Esse autē Artemisiæ genera ex manuscrip-
to codice, quem ob vetustatem lubens cito, mani-
festè colligi potest. Is enim pictas ordine tres iam
commemoratas herbas ita ob oculos ponit, vt nemo
qui illas vel semel saltem viderit, nō agnoscat. Pis-
cturæ accedunt descriptiones, & nomēclaturæ ho-
die

die etiam vsitata. Primam enim Artemisiam, alteram Leptophyllon & Matricariam, tertiam vero Tagetem, quo nomine Apuleius vsus est, & Tanacetum appellat, ita vt nemo deinceps quin vera sint Artemisiae genera dubitare debeat, aut meritò possit.

FORMA.

Prima species quæ priuatim Artemisia dicitur, Artemisia fruticosa est herba, Absinthio similis, maiora tamē folia. & pinguiora folia habet, quæ supernè ex nigro vis rescunt, subter autem cādicant, crebrò etiā rescēta sunt. Flos illi tenuis, & semen rotundum. Altera, folia tenuiora obtinet, flores exiguos, tenues, albos, & grauiter olentes. Porro Sampsuchi odorem conficata eius folia & flores referūt. Quæ vtique descriptio ita Matricariam vulgò dictam herbā exprimit, vt nemo non, nisi talpa cecior sit, hanc esse alteram Artemisia speciem videat. Fruticosa enim herba est Matricaria, foliis quàm sit Artemisia propriè dicta gracilioribus, floribus tenuioribus, per ambitum albis, (intus enim lutei existunt) grauiter cum vniuersa herba olentibus. Hallucinantur itaque qui Scrapionis interpretem secuti, Dioscoridis Parthenium esse putant, vt suo loco abundè de Partheniōstrabimus. Tertia *μονόκλωνος*, hoc est, vnicaulis dicta, simplici caule consurgit, foliis minutim est Matricaria. Caulis in summo floribus luteis & tenuibus abundat. Hæc odoris iucūditate priorē vincit. Quæ sanè descriptio pulchrè herbam Tanacetum appellatam

PLANTARVM HISTORIAE

latam hodie, delineat, ita ut tertiam esse artemisiæ speciẽ nemo dubitare debeat, aut saltẽ iure queat, Tagetes Indica caule exurgit rubescente, ramulis multis brachiato, foliis tenuib. minutim scissis, & grauiter odoratis, florib. in summo caule luteis, & croci ferẽ colorem referentibus, elegantia nulli alteri cedentibus.

LOCVS.

Prima nascitur in aquosis, incultis, asperisque locis. Altera in hortis, locis siccis & lapidosis. Tertia in aquarum ripis, atque vinearum aggeribus passim provenit, unde Germanicẽ apposito vocabulo Reinfarn vocatur. Indica Tagetes non nisi sata provenit in Germania.

TEMPVS.

Singula genera tria æstate, potissimũ cum vna maturescit, tunc enim abundant floribus, colliguntur. Indica paulò tardius in nostra regione floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & modicẽ desiccant, & sunt, quod ad calefactionem attinet, ordinis secundi: quod verò ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sunt etiam modicẽ tenuium partium.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Excalfaciũt & extenuant. Feruefactæ prosunt ad infessus muliebres, ducendos menses, secundas & foetus. Vteri præclusionem atque inflammationẽ iuvant, lapides frangunt, & vrinæ suppressionem tollũt. Herba ipsa imo ventri illita copiosa menses mouet.

aet. Succus eius cū myrrha subactus & admotus, ex vtero elicit quaecunque, & infestio. Bibitur etiā coma trium drachmarum pondere eorundē ducendorum gratia. Si quis stomacho laborans Artemisiam leptophyllon contuderit probè cum oleo amygdalino, & veluti malagma confecerit, stomachoq; imposuerit, sanabitur. Nervorum quoque dolore si quis affectus fuerit, ac succum eius cum oleo rosa-ceo miscens inunxerit, curabitur.

EX GALENO.

Ad renum calculos mediocriter, & ad vteri fo-mentationes prosunt.

EX PLINIO.

Artemisia priuatim foeminarū malis medetur. Eandem quoque secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, bestiāve vllam, ne solē quidem. Bibitur & hæc ex vino aduersus opium. Al- ligata priuatim potens traditur, potāve aduersus ranas. Alligatam qui habet viator, negatur lassitudinem sentire.

APPENDIX.

Præter dictas facultates vsu compertum est, flores Tanacetii pueris ex vino vel lacte dados, mirifice ex ventre lumbricos pellere, ideoq; Germanis herba lumbricorum, vt paulò antè diximus, appellata est hæc Artemisiæ species.

DE APARINE. CAP. XIII.

Aparine Rebulus.

NOMINA.

Omphalocarpos. *παρίνη, ἢ ὀμφαλόκαρπος, ἢ φιλάνθρωπος*
α *πος* Græcè, Aparine, Latinè, Klehkraut
 Philanthropos. Germanicè. (Gallicè Grateron) nominatur.
 Omphalocarpos ab umbilici similitudine, quâ semen eius refert, rectè dicta est. Philanthropos autem vox humanitatis, amoris & comitatus illi imposita est, quod blanda, comis, & hospitalis herba sit, nec aliter pratercuntium vestes apprehendat, quàm solent amici & hospitaliores à se discedentes comprehensa veste retinere, aut si id nequeant, aliquandiu sequi. Quam appellationem pulchrè Germani exprimentes, Klebkraut nominant: est enim illis Kleben, quod Latinis tenaciter adherere. Officinæ & herbarij nonnulli Aspergulam hodie vocant: rectius tamen una detrita litera nominarent Asperulam, quod asperitate sua attingentium vestimentis pertinaciter hæreat.

Annotatio. Errant qui putant legendū esse ὀμφαλόκαρπος, nā Dioscoridis & Pauli exemplaria castigatiora omnia habent ὀμφαλόκαρπον. Cui sanè lectioni & ratio ipsa subscribit, cū sic nominata sit ab umbilici specie, quam fructus eius refert. Quare cū altera lectio ratione omni destituta sit, immeritò ab Orosio Hispano Hermolaus, Marcellus, & Ruelius Dioscoridis interpretes ὀμφαλόκαρπος legentes, taxantur.

FORMA.

Ramulos habet Aparine multos, exiguos, quadrangulos, & asperos. Folia per ambitum orbemve Rubiæ modo per interualla circumposita. Flores albos. Semen durum, candidum, rotundum, à medio, umbilici modo, leniter concauum. Ipsa herba vestibus adhærescit.

LOCVS.

Nascitur in frumentario agro, aut hortis circa sepes & maceries.

TEMPVS.

Colligitur æstate dum semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Aparine modicè extergit & desiccatur, habetque nonnihil tenuium partium: unde satis constat hanc aliquam etiam caloris in se portionem habere.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Aperines seminis, caulium & foliorum succus cū vino potus, phalangiorum & viperarum moribus auxiliatur. Infusus doloribus aurium medetur. Herba ipsa cum axūgia trita coacta, strumas discutit.

EX PLINIO.

Efficax Aparine contra serpentes, semine potus ex vino drachma: & contra phalangia. Sanguinis abundantiam ex vulneribus reprimunt folia imposita. Succus auribus infunditur.

DE ACANTHO. CAP. XV.

Acanthus branca vrsina.

Acanthus Germanica nobis non visa.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Aκανθος, ἡ ἄκανθα Græcis, *Acanthus* siue *Acantha* Latinis dicitur. Officinæ à similitudine, quam eius folia cum anterioribus *vrforū* pedibus habent, *Brancam* *vrfinam* vocant. Ad quam etiam similitudinem respiciētes Germani, *Bernklauu*, oder *Berntaiz*, nominant. Illud non prætereundum esse putavi, hanc herbam olim etiā Romanis *Marmorariam* esse dictam: quæ vox in omnibus *Dioscoridis* exemplaribus deprauata est, ac in *Mamolariam* detorta: quod eius folia columnarum maximè *Corinthiarum* capitulis insculpebantur, quarum identidem tam scapi quàm vertex marmore splendebant. Antiqui etiam *Acantho* pateras pingebant.

*Branca
vrfinam.*

*Marmora
ria.*

*Dioscori-
dis locus
emenda-
tus.*

GENERA.

Duo *Acanthi* genera damus. Primum quidem legitimam *Acanthum* nominauimus, quod scilicet descriptioni per omnia respondeat, Germanis dicitur *Vuelschbernklauu*. Alterum Germanicam, quod nimirum in Germania officinæ omnes pro *Acantho* hanc usurpent herbam. Germanis simpliciter *Bernklauu* vocatur.

FORMA.

Folia habet multò quàm *Lactuca* latiora, & longiora, *Eruca* modo incisuris diuisa, nigricantia, pingui, leuia. Caulem leuem, binum cubitorum, digitali crassitudine, ex intervallis sub ipsum usque verticem

verticem foliolis quibusdam oblongis veluti nucamentis, aculeatis, ex quibus cādidus promitur flos. Semen illi est oblongum, luteum, caput thyrſi ſpecie. Radices ſubſunt glutinoſæ, mucoſæ, rubentes, longæ. Hactenus Dioſcorides. Si autem veri Acanthi picturam diligenter ſpectare volueris, huic deſcriptioni prorsus quadrare videbis, ita vt nulla ſit nota quæ illi non adamuſſim reſpondeat. Neque impedit quòd Acantha ſpinam ſignificet, ſpinosa enim & hæc quidem herba eſt, ſed mollibus duntaxat ſpinis, ideòque à Vergilio mollis Acanthus dicitur. Germanicam tamen Acanthum ad Dioſcoridis picturam non penitus accedere, eſt euidentiſſimum. Poſteſt tamen in prioris inopia, huius etiam commodus eſſe uſus, vt ex ijs quæ paulò poſt dicemus, patebit.

LOCVS.

Nāſcitur vera in hortis, petroſis & humētibus locis. Germanica in hortis & pratis vndique.

TEMPVS.

Colligitur in æſtate dum floribus & ſemine abundat, Iunio præcipuè & Iulio menſibus.

TEMPERAMENTVM.

Folia Acanthi mediocriter digerentem facultatē obtinēt. At radix exiccatoria eſt, & leuiter inciſoria, & tenuium partium. Hanc vim Acantho etiam Germanico ineſſe, guſtus abundè monſtrat. Folia enim eius modicè amara, radix aut ſubacris eſt.

VIREs.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Acanthi radices vstis & luxatis illitæ profunt. Potæ urinam mouent, & aluum sistunt. Tabidis, ruptis, conuulsis, mirè vtilis sunt.

EX PLINIO.

Radices Acanthi vstis luxatisque mirè profunt. Item ruptis, conuulsis, & phthisin metuentibus in coctæ cibo, maximè ptisana. Podagris quoque illi nuntur tritæ & calefactæ calidis.

APPENDIX.

Et si nostra Brancæ vrsinæ facies picturæ Acanthi non vndiquaque respōdeat, tamen eius radicem eandem habere cum Acanthi veri radice facultatē est euidentissimum. Cum enim gustu subacris sit, necesse est vt exiccet, incīdat, & tenuium sit partiū. Errant itaque nostræ ætatis medici, qui neglecta prorsus radice, foliis tantum vtuntur, quæ quidem mediocriter discutere valent.

DE SPINA ALBA. CAP. XVI.

Spina alba hortensis carduus beatæ Mariæ, syluestris palatium leporis.

NOMINA.

Κανθα λευκή Græcè, Spina alba Latine,

A Officinæ Bedegarim seu Bedeguar Pæno nomine appellat, Germani Vueisdistel,

Bedeguar
Spina alba vnde dicta. oder Stechkraut. (Gallicè Chardon nostre dame, ou Chardon argentin, ou Artichaut sauuage.) Nomen herba hæc ab albis foliis seu lacteis

lacteis maculis, quibus folia conspersa sunt, accepit.

GENERA.

Quauis Dioscorides *Spinae albae* duntaxat vñ faciat genus, tamen cū plures inueniantur apud nos herbae quae descriptioni respōdent, plura etiam vt illius statuamus genera necesse est. Vnum itaque genus est, quod hodie vulgò *Carduus Mariae* dicitur, Germanis verò *Mariendistel*, oder *Frauentistel* nominatur. Nos spinam albam hortensem, quod nimirum in hortis tantum proueniat, appellauimus. Alterum genus sylvestre est, proximè ad Dioscoridis delineationem accedens, ideoque à Germanis *Vueiszuegdistel* vocatur. Cæterum vidimus herbam peregrinam siccam, quae sylvestri, quod ad formam attinet, per omnia respondebat, quae haud dubiè vera spina alba erat & descriptioni prorsus conueniebat. Picturam eius, quod videri destituebamur, dare non potuimus.

FORMA.

Folia albo *Chamaeleonti* similia habet, angustiora tamen & candidiora, subdēsa, subasperave, & aculeata caulem binos cubitos excedentem, digiti magni aut minoris crassitudine, subalbū, inius cacuum. In cacumine eius caput est aculeatum, *Echin*o marino nō absimile, minus tamen & oblongum. Flores purpureos, in quibus semen *Cnici* forma, sed rotundius. Quae descriptio in vniuersum quadrare videtur herbae quae vulgò *Carduus Mariae* appellatur.

PLANTARVM HISTORIAE

tur. Folia siquidem Chamæleonti nõ dissimilia, angustiora, candidioraque (albis enim maculis vndique conspersa, vnde tam Græcum quàm Latinum, adde etiam Germanicum nomen Vuciszdistel, vt diximus, illi impositum est) subdensa, subasperave, & minimè mollia, & mirum in modum aculeata sunt, ita vt contrectata immodicè pungant. Caulis eidem supra bina cubita altus, digiti maioris aut minoris crassitudine, et inanis. In summo vertice Echino marino haud dissimile caput aculeatum obtinet. Flores denique purpureos, in quibus semen Cnicum simile, sed rotundius habet, id quod ex vtriusque seminis collatione pulchrè deprehendes. His accedit, quod facultates quas alba spinæ Dioscorides tribuit, similes sint iis quæ Carduo Mariæ à nostris hodie herbariis assignantur, vt ex sequentibus innotescet clarius. Sylvestri sic quadrat descriptio vt nihil magis. Nam, vt cætera omittam, radix desiccatoria est, & modicè adstringens, atque adeo geminas Spinæ albae facultates obtinet.

LOCVS.

Nascitur in montibus & syluosis locis. Hodie in hortis passim etiam plantatur, vt alia quædam Carduorum genera. Sylvestre in locis incultis & ariosis provenit.

TEMPVS.

Colligenda est herba in æstate dum semine prægnans est. Floret autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Radix

Radix eius desiccatoria est, & modicè adstringēs. Semē verò tenuis essentia, et calidæ facultatis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix huius pota, sanguinem excreantibus, stomachicis & coeliacis prodest. Vrinam cit. Oedematis illinitur. Decocto eius dentes in dolore colluuntur. Semen potum conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Ferunt etiam quòd amuletum ex eo venenatas bestias abigat.

EX GALENO.

Radix coeliacis, & stomachicis succurrit. Sanguinis reiectiones cohibet, & oedemata illita contrahit, ac dentes dolētes inuat, si decocto eius colluuntur. Semen potum iis qui conuelluntur, prodest.

DE ASPARAGO. CAP. XVII.

NOMINA.

Aσπαργος Græcè, Asparagus Latine vocatur. Officinæ extrita priore litera Sparagū nomināt, Germani Spargen, (Galli Des asperges) Sic autem potissimū altilis sativusve, de quo nobis hic sermo est, nominatur, eò quòd cauliculos hos, qui prima germinatione prodeunt è terra, præcipuos habeat.

Asparagus unde dictus.

FORMA.

E radiculis thyrsus primum exilit, cacumine in torulos turbinato, quod tandem increfscens explicatur in prægrandes ramos, quibus insunt folia capillamenti modo, & vt feniculi tenuata, quæ per
vetustas

PLANTARVM HISTORIAE

vetustate occalescunt in spinulas. Florē fundit parvulum, quo decusso bacca dependent primum virides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus refertæ. Radices spongiosæ, longæ & rotundæ.

LOCVS.

In hortis seritur & plantatur, inq; nonnullis locis lapidosus sponte provenit.

TEMPVS.

Thyrso primum cum ver appetit emicante viret, spica tum cibus expetita. Recentes hos thyrsulos in voluptatem gulæ verterunt belluones. Hodie decoctus in iure Asparagus, aceto, sale, & oleo conspersus magno gulæ delectamento comeditur, & in principum deliciis est. Semen suo legitur tempore, nimirum æstate.

TEMPERAMENTVM.

Abstergendi facultatem habet Asparagus, idque citra manifestam aut caliditatē, aut frigiditatem.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Asparagi cauliculi cocti & comesti aluum molliunt, & vrinam mouent. Radicum verò decoctum, difficultati vrinæ, regio morbo correptis, nephriticis, ischiadicis: cum vino autem idem decoctum phalangiorum morsibus auxiliatur. Si decoctum super dente retineatur, eius dolori medetur. Facit ad eadem omnia semen etiam potum. Ferunt mori carnes decoctum eius bibentes.

EX GALENO.

Renes

Renes ac iecur infarctu liberat Asparagus, & maximè herbæ ipsius radices & semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam vel maximè dentes requirunt.

EX PLINIO.

Vtilissimus stomacho cibus, ut traditur, Asparagi. Cumino quidem addito inflammationes stomachi colique discutiunt. Idem oculis claritatem adferunt. Ventrem leniter molliunt. Pectoris & spinæ doloribus, intestinorumque vitiis prosunt. Vino concoquuntur addito, lumborum & renum dolores mitigant. Venerem stimulant. Vrinam cient vtilissimè, præterquam quod vesicam exulcerant. Radix quoque plurimorum prædicatione trita, & in vino albo pota, calculos exturbat. Quidam ad vuluæ, dolorem radicem cum vino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit. Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus negant.

EX SIMEONE SETHI.

Asparagus olerum omnium maximè nutrit. Proinde si quis dicat eius naturam positam esse mediã inter olera & carnes, non procul à vero aberrabit, propter nutriendi facultatem plantarũ & carniũ, quæ similiter se habet. Vrinam quoque cit, & obstructions iecoris & renũ aperit: id quod manifestũ ex eo, quod vrinæ odorem in suum transmutat, ut hunc qui aliquantulum eius cederint, sentiant.

Neque quispiã admiretur illum statim vrina suam qualitatem indere: nam & rubea tinctorum si manibus contineatur, vrinam in suum colorem transmutat: quod paradoxum etiam esse videtur, vt extrinsecus impositum vrinam tingat. Asparagi colicis & renum affectibus, qui à pituita proueniunt, auxiliantur: semen genitale augent, & celerius quàm reliqua olera in sanguinem mutantur. Menses ciunt. Cordis palpitationibus succurrunt: dentibus prosunt: sed nõ semper stomacho boni sunt, propterea garo & oleo conditis, cum mediocriter coctis sunt, iis vti oportet.

DE ANONE. CAP. XVIII.

Anonis, bubus grauis, & arresta bouis dicitur.
NOMINA.

ANONIS, ἄνωϊς Græcis: Anonis & Ononis Latinis appellatur. Vulgus herbariorum Remora Restam bouis, quod in opere arantes boues subinde stat, nominare solet. Nonnulli Remoram aratri, quod altis & duris radicibus in agris aratrum remoretur, appellant. Sunt qui Acutellã vocent, quod suis scilicet spinis ingredientium pedes pungat & offendat. Germanis Hauuhechel nuncupatur, & Ochsenbrech, quia crebris inter folia aculeis, haud secus ac instrumentum hoc quo mulieres linum carminant, & à crassiore purgant stuppa, horreat: vel quod ligone ad aculeatam hanc herbam eruendam & extirpandã cum in altum agitur,

tur, & sese propagat, opus sit. Equites Germani Stalkraut, eò quòd decoctũ eius meicre nequeũtia-
 tibus equis offeratur, vocant. Binominis autem an-
 tiquis est scriptoribus, vna tantum litera mutata.
 Sunt enim qui Ononim, vt Theophrastus & Ga-
 lenus: sunt etiã qui Anonim, veluti Dioscorides &
 Plinius, nominent. Anonis haud dubiè à non iuuan- Anonis
 do, quòd nullo iuuamine polleat, dicta est. Siquidẽ cur dicta.
 aratoribus inimica est, viuaxque nimis fruges op-
 primit, suisq; aculeis nocet. Ononis verò, quòd asi- Ononis
 nos, quos Græci οὐνός vocant, sese terentes ad illam vnde.
 scabentesq; iuuat. Complures quoque Graij herbam
 sic appellari prodiderunt, quòd in ea se volutantes,
 spinis eius dorsum libenter affricent & scabāt. Of-
 ficinis prorsus ignota & inusitata.

F O R M A.

Ramos habet palmares, aut maiores, fruticosos,
 frequẽtib; geniculis cinctos, cauis alarum multis,
 capitula rotũda. Folia exigua, tenuia ceu Lẽtis, ad
 Ruta, aut scenarij Loti figuram accedentia, subhirs-
 uta, odorata, nec iniucũdè olentia. Ramuli acutas
 spinas, spiculis acuminatis similes, solidasq; gerunt.
 Radice candida nititur. Theophrastus toto caule
 foliatam esse tradit, vt veluti coronam ex interval-
 lis tota species representet. Florem quoque illi esse
 minutulum, & in siliqua non vndique septũ scri-
 bit. Quæ sanè singula pulchrè picturæ respondent,
 & Anonim esse hanc herbam, quam Restam bouis
 e ij hodie

PLANTARVM HISTORIAE

hodie herbarij nominant, euidenter, nulla reclamatione nota, ostendunt. Nam hæc ramos spargit fruticosos, palmo longiores, frequentibus cinctos articulis à quibus ^{sa}la funditur. Capitula exerit orbiculata, folia Lentis parua, ad Ruta vel pratensis Loti figuram accedentia, hirsuta, iuxta odorem expirantia, inter quæ nocentiores, & mucronata cuspidis aculei quasi spicula subriguntur. Flos ferè Pisi dilutiore micat purpura, in siliqua non vndique septus. Radix in nigro candicans.

LOCVS.

Nascitur culto solo, pingui, & glutinoso, præcipuè autè in segetibus & aruis, inimica agricolis, vixq; supra modum. Cū enim altam letamve nata tellurè fuerit, protinus in altum agitur, & singulis annis, surculis in latus emissis, rursus anno postero deorsum versus acta pluribus ramis luxuriat, ideoq; runcanda & radicitus extirpanda venit.

TEMPVS.

Aestate germinare incipit, à frugibus perficitur, autumno sui incrementi finem faciens. Floret autem Iulio mense, & Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Ononis radix tertio quadatenus ordine excalfacit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Antequā spinosa fit sale conditur, & est cibus gratissima. Radix eius calefacit, & extenuat, cuius cortex cum vino potus vrinam ciet, calculos rumpit.

pit, crustasque abstergit. Decocta radix in posca dentium dolorem collutione mitigat. Huius decoctum potum, hemorrhoidas sanare creditur.

EX GALENO.

Radicis cortex maximè utilis est, habens quipiam abstersorium & incisorium. Proinde non tantum urinas ducit, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas confestim detrahit. Utuntur quoque ea ad dentium dolores in posca decoquētes, & collui decocto eius iubentes.

EX PLINIO.

Radix decoquitur in posca dolori dentium. Eadem cum melle pota, calculos pellit. Comitibus datur in oxymelite, decocta ad dimidias.

DE ANISO. CAP. XIX.

NOMINA.

AΝΙΣΟΝ Græcè, Anisum Latinè vocatur. Officinis nomen genuinum retinuit, Germanicè Anisz. (Gallicè de l'Anis) appellatur.

GENERA.

Anisum caule, folio, flore, Apio par esse videtur. Caulem nanque tenuiter striatum, rotundum, multisque ramulis brachiatum obtinet. Foliū ubi primū enascitur, rotundū, sed deinceps Apij modo dissectum. Florem candidum, muscarion fœniculi. Tota herba, haud aliter quàm semen odorata est.

LOCVS.

Ex Syria originem habet, iam autem passim
e iij satum

PLANTARVM HISTORIAE

fatum in Germania hortis prouenit.

TEMPVS.

Iunio ac Iulio mensibus floret, semineque praegnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Anisum in vniuersum calefacit, exiccat, & πνσπ rectius mea sententia interpretabitur pro eo quod est, facile spirare facit. Oris halitum iucundiores facit. Anodynum est, dolorēque leuat. Urinam cit. Diffundit. Hydropicis potum sitim arcet. Prodest ad venenata animalia, & inflationes. Aluum, & album foeminarum profluuium sistit. Lac ad mammas elicit, & Venerem stimulat. Suffitum naribus capitis dolorem sedat. Tritum, cumque rosaceo instillatum, aurium medetur rupturis.

EX GALENO.

Anisi semen maximè vtile est, acre & subamarū, ut propè ad vrētium accedat caliditatē. Proinde & urinam cit, & digerit, atque ventris inflationes sedat.

EX PLINIO.

Anisum aduersus scorpiones ex vino bibitur, à Pythagora inter pauca laudatum, siue crudum, siue decoctum. Item viride aridūque, omnibus quae condiuntur, quaeque intinguntur desideratum. Pannis etiam crustis inferioribus subditum. Saccis quoque additur. Cum amaris nucibus vina cōmendat.

Quin

Quin ipsum oris halitum iucundiorē facit, fœtorēq; tollit māducatum matutinis cū Smyrneo, & melle exiguo. Mox vino collutum, vultū iuniorem præstat. Insomnia leuat suspēsum in puluino, vt dormientes olfaciant. Appetentiam ciborum præstat. Dolores capitis leuat suffitum naribus. Epiphoris oculorum radicem eius tusam imponit Iollas: ipsum cum croco pari modo & vino, & per se tritū cum polenta, ad magnas fluxiones, extrahendaq; si qua in oculos inciderint. Narium quoque carcinōdes cōsumit illitū ex aqua. Sedat anginas cum melle & Hyssopo ex aceto gargarizatum. Auribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas purgat tostum, cum melle sumptum melius. Cum acetabulo Anisi nuces amaras quinquaginta purgatas tere in melle ad tuſsim. Præcipuum autem est ad ructus, ideo in flatationibus stomachi & intestinorum torminibus, & cœliacis medetur. Singultus & olfactum decoctum potūmq; inhibet. Potum somnum concitat. Calculos pellit. Vomitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorū vitiis, nervis quoque quibus succinctum est corpus, vtilissimum. Prodest etius & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud vtilius ventri & intestinis putant, ideo dysentericis & tenasmiis datur tostū. Daſion herbarius dedit bibendum cum anetho paraturientibus. Phreneticis quoque illinunt recens cum polenta. Sic & infantibus comitialē vitium

aut cōtractionem sentiētibus. Pythagoras quidem non corripit vitio comitali in manu habētes, idcōque quā plurimum domi serendum. Parere quoq; facilius olfactantes, Sosimenes cōtra omnes durities ex aceto vsus est. Semine eius poto, lassitudinis auxilium viatoribus spopōdit. Stragulationes vuluæ, si māducetur & linatur calidum, vel si bibatur cū castoreo in aceto & melle, sedat. Vertigines à partu cū semine cucumeris & lini pari mensura trinūm digitorum, vini ālbi tribus cyathis, discutit. Vrinam cict. Venerem stimulat. Cū vino sudorem leniter pręstat. Vestes quoque à tineis defendit.

EX SIMEONE SETHI.

Prodest ad vetustos ex frigore iecoris affectus, & ad spirādi difficultatem quæ ex pituita proficiscitur. Flatus qui in ventriculo sunt digerit. Obstructiones tollit, & lactis copiam facit.

DE ACTE. CAP. XX.

NOMINA.

AKTŪ Gracis, Latinis Sambucus nominatur. Reliqua nomina dicemus paulò pōst, vbi huius genera indicabimus. Sambucus porrò videtur ab authore appellata, cui nomen Sambyx fuit: vel à sabuca musico instrumento, quod alij pectida nominant, alij magadin. Atque hinc est quod Sambucus potius quā Sambucus, si Screnio Quinto credimus, scribendum sit.

GENERA.

Duo eius genera. Vnum arborescit, quod priuatim officinae Sambucum, Germani Holder à concavitate vocant. (Gallicè Du Sus, ou du Suin.)

Alterum Gracis χαμαιάκτῃ, quasi humilis, & χαμαῖα coactæ brevitatis Ἄκτῃ nominatur, Latinis Ebulus, κτῃ.

Germanis Attich, vel niderer holder. (Gallis Ebulus.

Hyeble.

FORMA.

Sambucus in arborem assurgit, virgis harūdinū Sambuci.
modo rotundis, subcauis, candicantibus, proceris.

Folia tria, aut quatuor, aut quinq; aut sex, aut septem per intervalla circa virgas obtinet, nucis inglandis similitudine, graueolentia, pluribus incisuris, in summis ramis siue caulibus umbellas rotūdas ferētia. Flores albos, fructū acinūmve. Terebinthi in nigro purpureū, racemosum, succosum, & vinosum. Ebulus humilis minorq; est, herbaceo generi Ebuli.
propius accedēs, quadrangulo caule, densis geniculis. Folia ex intervallis circa singulos geniculos Amygdalæ similia alæ instar expanduntur, per ambitum serrata, lōgiora, graueolentia. Umbellam in summo fert Sambuco similem, flores itidem & fructum. Radice nititur longa, digitali crassitudine.

LOCVS.

Vtrunque genus in opacis, asperisq; potissimum locis, & iuxta aquas emicat. Ebulus verò in agris etiam quibusdam provenit.

TEMPVS.

Parum ante Solstitium æstiuum floret Sambucus.

PLANTARVM HISTORIAE

cus. Tardius autē Ebulus, Iunio nimirum & Iulio mensibus. In Augusto verò baccas suas profert.

TEMPERAMENTVM.

Sambucus vterque calefaciendi ac desiccandi facultatem habet, id quod amaritudo, & adstric-
tio modica abundè monstrant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eadem vtrisque facultas, & par vsus exiccans
scilicet, aquam educens, stomacho nocēs. Folia ole-
rum modo decocta, pituitam & bilem purgant.
Quinetiam teneri caules in olla cocti, eadem prae-
stant. Radix in vino decocta & in cibis data hy-
dropicis auxiliatur. Eodem modo pota viperarum
morsibus subuenit. Vulvas emollit & aperit, &
quæ circa eas sunt affectiones, decocta cū aqua in-
fusione corrigit. Fructus cū vino potus eadem effi-
cit. Illitus capillos denigrat. Folia recentia ac tene-
ra cum polenta illita inflammationes mitigāt. Am-
bustis etiam, & canis morsibus illita succurrunt.
Profunda & quæ in cauernas dehiscunt vlcera
agglutinant. Podagricis, cum taurino hircinōve
adipe illita, auxiliantur.

EX GALENO.

Vtraque Sambucus, & arborescēs & herbacea,
exiccādi, conglutinandi, modicèq; digerendi facul-
tatem obtinent. Paulus Aegineta hæc adiicit: Pos-
sa & manducatae aquam per aluum educunt.

EX PLINIO.

Vtriusque

Vtriusque decoctum in vino veteri, foliorum, vel seminis, vel radice, ad cyathos binos potum stomacho inutile est, aluo detrahens aquam. Refrigerat etiam inflammationem, maxime recetis am- busti: & canis morsum cum polenta, molliſſimis fo- liorū illitis. Succus cerebri collectiones, priuatim que membranae quae circa cerebrum est, lenit infu- sus. Acini eius infirmiores quam reliqua: tingunt capillum: poti acetabuli mensura, vrinam mouent. Foliorum molliſſima ex oleo & sale eduntur ad pi- tuitam bilēque detrahendam. Ad omnia effica- cior quae minor. Radice eius in vina decoctae duo cyathi poti, hydropicos exinaniunt, vuluas emol- liunt foliorum decocto insidentium. Caules teneri minoris Sambuci in patinis cocti, aluum solunt. Resistant folia serpentum ictibus in vino pota. Pos- dagris cum seuo hircino vehementer prosunt cau- liculi illiti. Idēque in aqua macerantur, vt ea sparsa pulices necentur. Foliorum decocto si locus spargatur, muscae necantur. Boa appellatur mor- bus papularum, cum rubent corpora. Sambuci ra- mo verberatur. Cortex interior tritus, ex vino al- bo potus aluum soluit. Ebulli fumo fugantur serpē- tes. Tenerum cum foliis tritum, ex vino potum, cal- culos pellit. Impositum testes sanat.

DE AMMI. CAP. XXI.

Ammi in hortis Parisiorum sponte luxuriat.

NO.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Aμμι Græcis, Ammi Latinis, Ameos officinis corruptè, Germanis Amey appellari potest.

FORMA.

Ammi caule rotundo & herbaccho constat, surculis multis & exiguis: folio oblongo, angusto per ambitum incisuris diuiso: flore paruo, candido, umbella Anethi: semine exiliori multò quàm Cuminum, gustu origanum præ se ferente, acri & subamaro: radice candida & multifibra. Esse autè hæc Ammi verum Ammi, seminis in gustu sapor, qui subamarus & acris est, omnium maxime ostendit: talem enim in eo sapore Ga. requirit. Origanū etiā gustu referre videtur. Quibus accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, cuius pictura et descriptio satis docet, hæc herbā esse Ammi genuinum. Inter cetera enim semen Ammios piper gustu referre, ideoque à nonnullis piperculā dictam esse ait. Id quod certè verissimum esse comperies, si semen gustaueris: miram enim huic acrimoniam inesse senties.

Ammi verum.
rum.

LOCVS.

Nusquam in Germania sua sponte nascitur. Sæptum tamen facile & magna copia provenit, sic vt deinceps extirpari vix queat.

TEMPVS.

Augusto mense floret, ac deinceps vbi defloruit, semen abundè producit.

TEME

TEMPERAMENTVM.

Ammi semen in calefaciendo desiccandóque ex ordine tertio intenso existit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vis semini excalectoría, seruens & exiccās. Facit ad tormina, vrinæ difficultatē, venenatorū morfus cum vino potum. Menstrua ciet. Miscetur derodentib. ex cantharidibus confectis medicamentis, vt inde exortis vrinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle illitum tollit. Colorem potū & inunetum in pallorem mutat. Suffitum cum vua passa aut resina vuluas purgat.

EX GALENO.

Herbæ quam vocant Ammi, semen maximè est vtile. Facultatis est excalectoríæ & desiccatoriæ, tenuiumq; partium. Sed & gustu subamarum est, & acre. Et clarum est quod digerat, & urinā moueat.

EX PLINIO.

Inflationes & tormina discutit. Urinā & menstrua ciet. Sugillata & oculorū epiphoras mitigat. Cum lini semine scorpionum ictus in vino potum drachmis duabus: priuatimq; cerasiarum cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque bibentium similiter mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa, aut resina, vuluas purgat, Tradiunt facilius concipere eas, quæ odorentur id per coitum.

DE.

PLANTARVM HISTORIAE

DE ARO. CAP. XXII.

Arus canis priapus.

NOMINA.

Aρὸν, ἢ ἀρίσταρον Græcè, Arum & Aris Latine dicitur. Officina corrupto, ut solent, vocabulo, Iarum appellant. Quidam, quod folium effi-

Pes vituli gie bubuli vestigiis prodeat, Pedem vituli vocarunt.

Serpentaria minor. Alii, quod dracunculum amulatur, sola magnitudine discrepans, Serpētariam minorem appellant: neq; id sanè temere. Videtur enim Aron esse Dracunculus minor, cui Dioscorides folia μισσοειδῆ, hoc est, Hederae similia esse dicit, quæ prorsus Ari sunt, nisi quod paulò sint longiora. Plinius etiã Aro eas facultates tribuit, quas Dioscorides Dracunculo minori. Ut hinc coniicere liceat, Arum cū Dracunculo minori miscuisse veteres. Vulgus, quod pisillum promit exerti ferè genitalis effigie, Sacer-

Sacerdotis virile. dotis virile nominat. Id quod & germani nostri faciunt qui sua lingua Piaffenpin (Gallicè Vit de prebistre) nuncupāt. Aliàs Aron, & ob vehementē acrimoniã, teutichen Ingber (Gallicè Pied de Veau) vocant. **FORMA.**

Folia emittit Dracunculo similia, sed longiora & minus maculata, caulem dodrantalem, purpurascentem, pistilli figura, à quo croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo similis, quæ quod minore acrimonia est, cocta comeditur. Hæ utique delineationes ad amussim, nulla reclamante

te nota, nostro Aro conueniunt. Siquidem folia pro-
 mit Dracunculi, longiora, & paucioribus maculis
 respersa, caulem dodrantem altum, in purpurā leni-
 ter tendentem. Ante seminis partum, sagaci naturæ
 artificio dignum, erumpit inuolucrum & cucullū,
 quod mucronata in turbinem vaginula pistillū cō-
 plectitur, & suo fouet sinu. Verū ubi fructu præ-
 gnans fatiscit in hiatum, solida pistilli facies dilu-
 tiore purpura rutilans emergit, & anfractus peni-
 tus tandem patente, primum viridia, dein crocea
 spectantur semina, quæ in coronæ modum concinnè
 contexta, imam eius partem ambiunt. Radicem es-
 tiam obtinet albam, ad Dracunculi radicem ac-
 cedentem, vt pictura graphicè monstrat. Neque
 obstat quòd Galenus radicem Ari elixam mandi Obiectio
 scribat, nostri autem tam acris sit, vt vix gustari nis dissolu-
 ob miras & diutinas, quas in lingua ac palato ex- tio.
 citat puncturas, possit, tantū abest vt edendo esse
 queat. Siquidē Gal. lib. secundo de alimentorū fa-
 cultatibus teste, non parem in omnibus regionibus
 acrimoniam obtinet, sed in nonnullis minimam, vt
 Cyrenis. Et Plin. quoque lib. xix. cap. v. teste, in Aeg-
 ypto Aron nascitur radice mollioris naturæ, quæ
 etiā cruda editur. In quibusdam, vt Germania no-
 stra, maximam. Verba Gal. paulò pòst in faculta-
 tum commemoratione citabimus. Hinc discendum
 erit, multa nobis in scriptoribus rei herbariæ, primo
 statim obtutu pugnātia videri, quæ si ad cœli regio-
 numq;

nūmque diuersitatem respexerimus, nihil prorsus pugnantiae aut absurditatis habebunt. Quod nisi diligenter animaduertas, multas genuinas herbas pro adulterinis abiicias necesse erit. His accedit quòd Galenus non simpliciter dicat mandi Ari ra dicem, sed elixam. Non est autem mirum si acria etiam edendo fiant, si elixentur. Bis enim aut ter in aqua decocta, Galeno lib. 2. de aliment facul. cap. ultimo, teste, acrimonia spoliatur. Porro si ista scio lis quibusdam haud satisfecerint, dicendum planè erit Arū Germaniae nostrae esse Arisaron, quod gustu, Dioscoride & Galeno autoribus, acrius est. Quamuis ego cū Ruellio, diligentissimo earū rerū inquiretore, Arisaron ab Aro differre haud putem, quòd scilicet forma vtrisque eadem sit. Cuius etiam rei fidem facit ipsa nomēclatura, quae vtriusque retinuit appellationem: duobus tandem vocabulis in vnū coalescentibus, dici cœpit Arisaron. Apud veterrimos enim Aris primum: dein posterioribus, copulatis vnà nominibus, Arisaron cōfictum est nomen.

LOCVS.

Nascitur in syluis, locis vmbrosis, humidis & frigidis,

TEMPVS.

Folia statim in Martio, inter primas herbas veris exilunt, in Iunio dispereunt, ita vt haud facile hoc nomine herba ipsa reperiri queat. Semen Iulio & Augusto mensibus reperitur, primum, vt diximus, viride, mox croceum.

TEMPERAMENTVM.

Arum Galenus in calefaciendo & desiccando primi ordinis esse statuit. Et locutus est de Aro qui non vehementi acrimonia pollet. Nostri haud dubie in tertio ordine calidum & siccum est, ob multam, qua praeditum est, acrimoniam.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix, semē, & folia Ari casdē Dracunculo vires habent. Radix priuatim cum fimo bubulo illita prodagricis prodest. Dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam edēdo est.

EX GALENO.

Arum terrena essentia constat, sed calida: proinde extergendi facultatē possidet, verum non valentem, sicut Dracontiū. Radices eius maximē sunt utiles. Siquidem comesse crassitiem humorū mediciter incidunt, adeo ut excreationib. ex pectore idoneae sint: sed magis tamen aptum est Dracontiū. Et in libro secundo de alimentorū facultatibus sic de Aro scribit: Ari radix rapi modo mādatur. Quibusdam autē in regionibus acrior nascitur, ut Dracontio ferē similis sit. Dum rectē parare voles, prioris decoctionis aqua effusa, repente in alteram calidā iniicere oportet, ut in Brassica & Lēte dictum est. Cyrenis contrā quā in nostra regione plāta se habet: nam illic minimum medicamentoſi, minimi q̄ acrimoniae habet, adeo ut vel rapis utilior reputetur: idcirco radicem quoque in Italiam cernunt,

f vt

PLANTARVM HISTORIAE

ut quæ absque ut putrescat aut regerminet, longo tempore perdurare possit. Perspicuum verò est alendis corporibus hanc accommodatiorem esse. Si quis autem in thorace ac pulmone collectos crassos lentosque humores extusare studeat, acrior ac medicamentoſior magis conueniet. In aqua elixa estur cum sinapi aut aceto, ex oleo & garo. Quin etiam cum opsonijs, & sale, & iis quæ caseo constant, sumitur. Haud vero obscurum est, succū eius qui in iecur ac vniuersum corpus diffunditur, quo uno animal nutritur, crassiores esse, idque maximè quum radix, quemadmodum sunt quæ Cyrenis, aduehuntur, medica vi caruerit. Apud nos namque in Asia, pleræq; Ari radices acriores sunt, & medicamentoſam iam vim obtinent.

EX PLINIO.

Aron miris laudibus extulere Græci, primum in taliâs fœcibus† fœminarum præferentes, quoniam mas dulcior esset, & in coquendo lentior, pectorisque vitia expurgaret: aridum in potione inspersum, aut ecligmate, vrinam & menses cieret. Sic & in oxymelite potum, stomacho: interaneis exulceratis ex lacte ouillo bibendum, ad tuſſim in cinere coctum ex oleo dedere. Alij coxere in lacte, ut decoctum biberetur. Epiphoris elixum imposuere: item sugillatis, tonsillis. Ex oleo hæmorrhoidum vitio infudere, lētigines ex melle illinentes. Laudauit Cleophrantus & pro antidoto contra venena, pleuriticis, peripneumonicis

pneumonicis quoque & tuſſientibus. Semen intritum cum oleo aut roſaceo infundens, aurium dolori Dieuches. Cleophaſtus tuſſientibus aut ſuſpirioſis & orthopnoicis, & purulenta excreantibus, farina permixtū in pane cocto dedit. Diodotus phthiſicis è melle ecligmate, & pulmonis vitiis, oſibus etiam fractis impoſuit. Partus omnium animalium extrahit naturæ circumlitum. Succus radicis cum melle Attico, oculorum caligines, ac ſtomachi vitia diſcutit. Tuſſim decocti ius cum melle. Ulcera omnium generum ſiue phagedænæ ſint, ſiue carcinomata, ſiue ſerpant, ſiue polypi in naribus, ſuccus mire ſanat. Folia ambuſtis proſunt ex vino & oleo cocta. Aluum inaniunt ex ſale & aceto ſumpta. Etiam luxatis cocta cum melle proſunt. Item articulis podagricis cum ſale, recentia vel ſicca. Hippocrates ad collectiones cum melle impoſuit. Ad menſes trahendos ſeminis vel radicis drachmæ duæ in vini cyathis duobus ſufficiunt. Eadem potio ſi à partu non purgantur, & ſecundas trahit. Hippocrates & radicem ipſam appoſuit. Dicunt & in peſtilentia ſalutarem eſſe in cibis. Ebrietatem diſcutit. Serpentes nidore cum crematur, priuatimæ que aſpides fugat, aut inebriat, ita vt torpentes inueniantur. Perunctos quoque Aro vt laureo oleo fugiunt, ideo & contra icſtus dari potu in vino nigro putat utile. In foliis Ari caſeus optimè ſeruari traditur.

Recentior

res quas

facultates

Aro tri-

buant.

Posteriores medici Aron discutiendi, extenuandi, extergendique facultatem habere tradunt: idcircoque tumoribus aurium, sicubus, strumis, scirrhisque mederi, faciei deformitatem cutisque auferre, eius denique radicem in puluerem redactam supercreascentem in vulneribus carnem minuere scribunt. Id autem posse prestare, acrimonia ipsa vehemens quae gustu sese exerit, abunde monstrat. Dioscorides etiam Arisarō acrimonia haud exigua praedictum scribit, idcircoque illitum nomas sistere, collyriāque efficacissima ex eo contra fistulas fieri. Denique radicē cuiuscunque animalis pudendo impositam, id corrumpere tradit. Plinius quoque Arisarō vlceribus mederi manantibus, item combustis & fistulis scriptū reliquit. Præterea commixtum collyrio nomas sistere ait.

DE ARCIO.

CAP. XXIII.

Arcium seu Personatiz, Glouteion.

NOMINA.

Lappa

maior.

Personat-

ia vnde

dicta.

Aρκιον, ἢ προσώπιον, ἢ προσώπῳ Græcis, Personatia Latinis dicitur. Officinæ Lappam maiorem, vulgus Bardanā vocat, Germani Großkletten (Gallicè Gleteron ou Glouteion) Personatia hac quondā ad personas utebantur, quoties in theatris aliisve locis qui cognosci à populo nollent, egisse quidpiam volebant. Est enim foliorum eius tanta amplitudo, ut tota humana facies

cies iis tegi possit: atque hinc haud dubiè tã Græci quàm Latini, nomen illi Prosopii & Personatiae indiderunt.

FORMA.

Personatia folia Cucurbitae similia habet, maiora tamẽ, duriora, nigriora & hirsuta. Caulẽ subcãdidũ, interdũ nullũ. Radicem grandẽ, candidã intus, foris nigrã. Ex qua descriptione nemo nõ intelligit, Personatiam esse eam herbam quã hodie vulgus Bardana vocat, quæ folio constat omnium lapparum maximo, parte auersa herbido, aduersa ca- Bardana.
no, caule in purpureo albicante, grandibus lappis, quæ transcuntium vestibulis adheret, in quibus flos purpureus nascitur, non evidens, sed occultus, intra se germinãs, radice grãdi, intus cãdida, foris atra.

LOCVS.

Nascitur vbique, potissimũ circa margines praetorum, & agrorum.

TEMPVS.

Mense Iulio lappas cum floribus suis producit Personatia.

TEMPERAMENTVM.

Digerit simul et desiccat, sed & adstringit non nihil.

VIRE. EX DIOSCORIDE

Radix Personatiae drachmae pondere cum pincis nucibus pota, sanguinem & purulenta excreantibus auxiliatur. Articulorũ quoque dolores, qui ex
f iij mem

PLANTARVM HISTORIAE

membrorum fractionibus collisionibusve fiunt, trita & illita sedat. Quinetiam folia vetustis vlceribus vtiliter illinuntur.

EX GALENO.

Arcium, quod Prosopida vocant, cuiusque folia Cucurbitæ similima sunt, nisi quatenus tū maiora, tum duriora, discutit simul & desiccatur, sed & adstringit mediocriter: quamobrem folia eius veteribus vlceribus mederi possunt.

EX APVLEIO.

Personatiæ herba succus cum vino veteri in positionem datus, omnes morsus serpentium mirifice sanat. Eiusdem foliis cinges febricitatem, & statim febrem mitigat, caloremq; sanat. Vulnus, etiam si cancer crit, cum aqua decoctionis foliorum eius foeto: deinde ipsam cum nitro & axungia, cū acetotere, & in panno inducito & imposito. Ad canū rabidorum morsus radix cum modico sale trita imponitur morsui, & statim aeger liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, vrinam prouocat, & vesicæ dolorem tollit. Puluis seminis eius cū vino optimo per quadraginta dies datus, ischiadicis mirabiliter sanat. Folia trita cū albumine oui & imposita, ambusta mirifice curant.

EX L. COLVMELLA.

Venena viperæ pellit super scarificationē ferro factam herba Personatia trita & cum sale imposita. Plus etiam eiusdem radix contusa prodest cō-

tra

tra serpentes. Ex vino bibitur duum denariorum pondere. Strumis radix eius medetur: item cum axungia operitur folio suo imposita.

DE ASCYRO. CAP. XXIIII.

Ascyron androsæmum, Hypericum nomine postremo omnes vulgò appellatur.

NOMINA.

Aσκυρον ἢ ἀσκυροειδὲς Græcè, Ascyron Latine nominatur. Officinis ignotum. Germanicè Harthouu, id est, durum fœnum appellatur. Græci à contrario, huic herbæ nomē imposuisse videntur, σκύρος enim illis asperitatē significat. Pulchre dictū. chrè igitur ad Græcam appellationem Germanica alludere videtur.

FORMA.

Hyperici species est Ascyron, magnitudine differens, maioribus ramis, fruticosius, puniceo colore rubens. Flores fert luteos, semen Hyperico simile, odore resina, quod cum atteritur digitos ferè cruetat.

LOCVS.

In cultis & asperis locis provenit.

TEMPVS.

Aestate, potissimum verò Iulio & Augusto mensibus, floret.

TEMPERAMENTVM.

Essentia tenue est, ideoque calefacit & desiccant.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

f iij Semen

PLANTARVM HISTORIAE

Semen Ascyri potum in hydromelitis heminis duabus, ad ischiadicos prodest dolores: biliosa enim multa excrementa ducit. Sed assidue dari oportet donec conualecant. Præterea illitum ad ambusta conducit.

EX GALENO.

Semen eius purgatorium. Foliorum verò facultas modicè extergens & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Cæterum in vino austero decocta, vinum ipsum magnorum vulnerym glutinatorium efficiunt.

EX PLINIO.

Vsus seminis ad ischiadicos, potus duabus drachmis in hydromelitis sextario. Aluum soluit, bilem detrahit. Illinitur & ambustis.

DE ANDROSAEMO. CAP. XXV. NOMINA.

Aνδρῶσεμον Græcis, Androsæmon pariter Latinis dicitur. Officinis incognitum. Germanis Kunrath, quasi Græcè dicas Thrasibemon unde la nominatur. Dictum Androsæmon, quod aut dictum. coma, aut floribus eius tritis, hominis sanguinem referat.

FORMA.

Differt ab Hyperico & Ascyro Androsæmō. Frutex est prætenuib. ramis, surculosus, puniceo colore rubentibus virgis, foliis triplo quadruplōve maioribusquàm Ruta, quæ contrita sanguineū succum remittunt.

remittunt. Alarū causa habet plura, in summo alarum auium modo pennata expansāve, circa quas flosculi pusilli lutei. Semen in calyce, nigro papaueri simile, veluti punctis depictū distinctūve. Comma trita resinosum odorem reddit.

LOCVS.

Locis iisdem quibus Ascyron provenit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccāt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Androsēmi semen tritum, potūmq; duarum drachmarum pondere biliosa alui excrementa ducit. Ischiadicis autem potissimum medetur, sed à purgatione aquam sorbere oportet. Herba illita ambusta sanat, & sanguinem compescit.

EX GALENO.

Easdem cum Ascyro facultates obtinet.

EX PLINIO.

Vsus ad purgandam aluum tuse cum semine, potaq; matutino, vel à cœna duabus drachmis in aqua mulsa vel vino, vel aqua pura, totius potio-
nis sextario. Trahit bilem, prodest ischidiacis maxime. Sed postera die, capparis radicem resina permixtam deuorare oportet drachmæ pondere, iterūmq; quatridui intervallo idem facere. A purgatione autem ipsa robustiores vinum bibere, infirmiores

PLANTARVM HISTORIAE

miore aquam. Imponitur & podagris, & ambu-
stis, & vulneribus, cohibens sanguinem.

DE ARCEVTHO. CAP. XXVI. NOMINA.

Aρκευθος, ἢ ἄρκευθις Græcè, Juniperus Lati-
nè vocatur. Officinæ Latinam appellationē
retinuerunt. Germanicè Vuckholder, Kram-
tber (Gallicè Du Genefure) id est turdorū bac-
ca vocantur, quod fructibus eius turdi pinguescāt.

Juniperus Juniperus autem dici videtur, quod iuniores & no-
vnde di- uellos fructus pariat: sola enim ferè arborum foetus
sta. suos in biennium prorogat, qui ne maturescunt qui-
dem, nouis superuenientibus.

GENERA.

Juniperus Dioscoridi duplex est, maior & mi-
nor, sola arboris et seminis magnitudine inter se dif-
ferentes. Minor humilis est, scssilibus in terra ramu-
lis, baccis minoribus, radicibus summo cespite fusis.
Maior altius adolescit, & in iustā arboris magnitu-
dinē exurgit, caudice procero, cortice fragili, ligno
fuluo, odorato, latioribus ramulis, aculeorum acera-
uo stipatis, baccis alteri similibus, maioribus tamē.

FORMA.

Vtriusque facies horrida, coma virent perpe-
tua, spinæque potius quàm folio, sed herbacea ve-
stiuntur. Cortex illis membraneus, fragilis, nec dif-
ficulter fatiscens, materies fulua, quæ si ignibus di-
catur, non inuicundum fumum expirat, qui odoris
suauitate

sua uitate grassantia pestilentia contagia depellit. Ex ea etiam, ut recentiores Græci tradunt, æstiuis temporibus lachryma thuris odorem atque colorem emulans sudat, quæ caloris officio durata, coeat in gummi. Arabum familia, non sine magna confusione nominum, Sandaracham appellat.

Officina verò Vernicem vocant. Baccas ferunt prius virētes, deinde per maturitatem nigras, quæ biennio antequam maturecant in ramis pendent.

Hinc sunt qui baccas in iis esse ternas eodem tempore dicant, anni proximè exacti nondum maturas, & tertij ante presentem iam maturas, tertias novas & recentes. Cæterum non desunt qui nostram Iuniperum non geminam putent, quod bacca eius ad Dioscoridis magnitudinem, quæ nucis est ponticæ aut fabæ, non accedant.

Sed cogitent locum in causa esse cur minores producantur: ut plurimum enim omnia quæ in Germania proueniunt, iis quæ in Græcia nascuntur minora sunt. Nobis etiam Iuniperi grana aliunde allata visa sunt, quæ nucis auellanae quantitatem æquabant: ob id ut magnitudinem ac formam eorundem etiam exprimeret pictor, curauimus.

LOCVS.

Amant Iuniperi montes, & maritima loca, in planisque & cultis nasci recusant.

TEMPVS.

Autumno fructus Iuniperorum decerpuntur, sed ad bimatum prorogati.

TEM

Sandaracha

Arachum.

Vernix.

Obiectio
nis dissolu
tio.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPERAMENTVM.

Iuniperus calida & sicca, vtrinque tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed nõ similiter siccus. verum in hoc primi fuerit ordinis. Vernix calefacit & exiecat secundo recessu.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Acris vtraque est, calefacit, & vrinã mouet. In cense suffitu serpentes fugãt. Earũ fructus, hic quidem faba, alius verò nucis põtica magnitudine inuenitur, rotundus, odoratus, in mandendo dulcis, & subamarus, Modicè calefacit & adstringit, stomacho utilis. Potus ad vitia thoracis, tusses, inflationes, tormina, & venenata, prodest. Vrinam cit. Cõnulsis, ruptis, & vuluæ strangulationibus confert. Folia acria obtinet *Iuniperus*, ideoque tam ipsa quàm eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini & bibi prodest. Cortex patrerea crematus & cum aqua illitus, lepras eximit. Ramentũ verò ligni deuoratum, interficit.

EX GALENO.

Iuniperi fructus iecur renesq; expurgat, nimirũ crassos & glutinosos humores extenuando, eaq; de causa salubribus medicamētis immiscetur. Per exiguum corpori humano alimētum ex eo apponitur. Affatim sumptus hic fructus stomachũ mordicat, capũque calefacit: ex quo illud quandoq; implens, dolore diuexat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit. Vrinam ciet mediocriter.

EX PLINIO.

Vtraque excalfacit & extenuat. Accensa serpentes fugat. Semen stomachi, pectoris, laterisque doloribus vtile. Inflationes languoresq; discutit, tussis concoquit & duritias. Illitum tumores sistit: item aluum, baccis ex vino nigro potis: item ventris tumores illitis. Miscetur & antidotis oxyporis. Vrinæ cit. Illinitur & oculis in epiphoris. Datur convulsis, ruptis, torminibus, vuluis, ischiadicis cū vino albo potum pilulis quaternis, aut decoctis viginti in vino. Sunt & qui perungant corpus è semine eius in serpentum metu.

VERNICIS VIRES EX RECENTIORIBVS GRAECIS.

Profluentem è naribus sanguinem sistit, si ex cādidō oui liquore trita temporibus & fronti illinatur. Eadem vomitionem ex polline thuris & oui albo excepta supprimit. Item profluentem aluum cū eisdem illita firmat. Stomachum in biliosos vomitus effusum, deuorata in ovo forbili polenta eius cohibet, cruentamque alui proluuiem retinet. Destillationes suspendit suffitæ nidor, arcetque ne præcipientes ad ima decumbant. Pituitam quæ in stomacho aut intestinis coit, digerit. Humorem etiam coercet, qui pernix à cerebro deuoluitur. Tænias et cætera ventris animalia necat. Vliginosos fistulariū sinus indita resiccat. Mēstruos continet fluxus. Grauedini suffitus eius auxiliatur. Hiātibus manuum

PLANTARVM HISTORIAE

& pedum rimis illitu succurrit. Et in summa, Succini pollet viribus, sed paulò efficacioribus : quæ si desit, duplo pondere in vicem substituitur.

DE ALCEA. CAP. XXVII.

Alcea ruri frequēs, Monoclonos ferè est, non maluæ modo fruticosa & sarmentosa flore althææ.

NOMINA.

Simeonis
herba.

Aλκέα Græcis, Alcea Latinis vocatur. Officinis ignota. Vulgares herbarij et Empirici Simeonis herbam, Germani nostri Sigmars, kraut, oder Sigmūd fzuurtz, & Hochleuchtē (Gallicè Guimaue sauvage ou rustique) appellant.

FORMA.

Sylvestris maluæ species est Alcea, folia verbenacæ modo secta habens, caules ternos aut quaternos, corticem Canabi similem obtinentes. Florem exiguū Rosæ similem. Radices albas, latas quinque aut sex cubitales.

LOCVS.

Nascitur in pingui loco, nec sicco.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Ex emplasticorum medicamentorū numero esse Alceā, & folia, quæ glutinosum quid ac lentore quendum præ se ferunt, & radix ipsa quæ glutinosa, dulcis, & modicè adstringens apparet gustantibus,

ribus, abunde monstrant. Hinc satis constat Alceam extra omnem insignem tum caliditatem, tum frigiditatem siccare, ac planè emplasticorum consistentiam obtinere. Vide Galenum lib. iij de simpl. medic. facult. cap. iij & sequenti.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Alceæ radices in vino aut aqua potæ, dysentericis & ruptis medentur.

EX PAVLO.

Alcea sylvestris malvæ genus est. In vino potæ dysentericæ & rupturis medetur, potissimum ipsius radix.

EX PLINIO.

Vfus radicis Alceæ ex vino vel ex aqua, dysentericis, aluo citæ, ruptis & convulsis.

APPENDIX.

Celebratur ad caliginem oculorū ab Empiricis, ita ut non desint qui credant radicem Alceæ è collo suspensam, aciem oculorū supra modum acuerè, & tueri posse.

DE ADIANTO. CAP. XXVIII.

Adiantum duplex Theophrasto, triplex Dioscoridi nobis quadruplex.

NOMINA.

A δίαντρον, ἢ πολύτριχον, ἢ καλλιτριχον, ἢ ἑβενότριχον Græcè. Adiantū, Polytrichum, Callitrichū, Cinnamalis, Terræ capillus, et Supercilium terræ, Latine appellatur. Officinæ hodie Capillus pilum

Veneris. pillum Veneris vocant, quo etiam nomine appellatur
Adiātum ri Latinis Apuleius testatur. Germani Frauen-
vnde di- har, vel lunck, frauuenhar. Adiantū nomen ab
ctum. euentu accepit, quòd folium eius persusum aqua &
 Διὰ ἴκετο, id est, non madeat, sicco semper simile
 vt author est Theophrastus libro septimo de plan-
 tarum historia, cap. xiiij. Id quòd minimè intelligē-
 dum erit de mersione longiore in aqua: nam diu-
 tius mersum ac irrigatum, aquè ac aliæ herbæ ma-
 descit. Quare rectius de imbre descendere è cælo,
 cuius stillicidium foliis eius nō insidet, vt testis est
 in Theriacis Nicander, accipiendū venit. Vel quòd
 magis aridet, ab interioribus puteorū parietibus,
 & fontium marginibus quas coronat, dictum est
 Adiātum, quòd nimirum quasi sitiēs illorū aquas,
Polytri- quas tamen odit & respuit, querat. Polytrichō au-
chon. tem quasi multicomū, quòd capillos multos ac den-
Callitri- sos faciat, eiusq; deflunia expleat. Callitrichon ve-
chon. rò quasi pulchricomum, quòd capillos tingat, pul-
 chrioresq; reddat. Nec alia ratione capillus Vene-
Capillus ris hæc herba dicta est, quàm à speciosis reddēdis
Veneris capillis: nec alio noīe Veneris vox adiecta est, quàm
cur dicta. quòd hæc pulchricoma pingatur. Hinc patet ma-
Pharma- ximus pharmacopolarum nostri tēporis error, qui
copolarū sub trib. nominibus, vnā & eandē duntaxat herbā
error. significātibus, tres diuersas herbas designatas esse
 putat. Aliam enim Polytrichū, aliam Callitrichū,
 quam tamen corrupto vocabulo Gallitrichum vo-
 cant:

cant: aliam etiam Capillum Veneris esse herbam existimant. Quales autem herbæ sint, Polytrichū, & Gallitrichū illis nominatæ, suis locis ostēdemus.

FORMA.

Folia albicantia Coriandro similia habet, in summo incisuris diuisa. Caules ex quibus nascūtur producuntur, nigros admodum, tenues, dodrantaes, nitentesq;. Neque florem, neque semen creat. Foliis vero Coriandri iam quidem erumpentis, vel paulò antea enati, necdum caulescentis, quæ quidem in infima eius parte quodammodo lata sunt, & in extremitatibus incisa, constare Adiantum sciendum erit. Ex qua nimirum descriptione manifestissimū est, eam herbam qua ferè omnes Officinæ pro Capillo Veneris vtūtur, & quam nos à muris in quibus puenit, Germanicè Murrattē, & Steinrau Ruta murten vocamus, non esse verū Capillum Veneris, aut raria non Adiantum: caules siquidem eius non sunt nigri, sed est Adiantum virides: neque admodū tenues, sed pro herbæ quantitate crassi: neque splendētes. In summa, neque figura, neque magnitudo, neque color, nec natales etiam respondent, quia in siccis & soli expositis muris nascitur, in humidis contrà Adiantum.

LOCVS.

Locis opacis, palustribusque, & humentibus muris, & prope fontes nascitur. In Germania tamen nostra, quod sciam, non prouenit: copiose autem in Narbonensi Gallia, & Italia.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Aestate viret, bruma non marcescit.

TEMPERAMENTVM.

Adiantum in caliditate quidem & frigidityte symmetrum est, verum desiccatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius herbae potum, asthmaticis, difficultate spirandi laborantibus, ictericis, lienosis, & vrinae difficultatibus auxiliatur. Calculos coterit, & aluum cohibet. Venenatorum morsibus, & stomachi fluxionibus cum vino potum prodest. Menses cit & secundas. Sanguinis reiectionem sistit. Cruda herba ad venenatorum morsus illinitur. Alopecias capillis explet. Strumas discit. Furfures & achorres cum lixiuo exterit. Cum ladano, myrthino & susino, aut hyssopo & vino, capillos defluentes continet. Decoctum eius cum lixiuo & vino abstergit. Gallinaceos & coturnices cibis eorum additum pugnaciores facit. Seritur & magna vtilitate circa omilia.

EX GALENO.

Extenuat Adiantum & discit. Alopecias capillis vestit, strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum. Viscosorum crassorumque ex thorace pulmonequae excreationibus non mediocriter confert, & ventris fluxiones sistit.

EX PLINIO.

Vide infra caput de Trichomane.

DE VITE VINIFERA.

CAP. XXIX.

NOMINA.

Aμπελος οἰνοφόρος καὶ ἡμερος Græcè, *Vitis vinifera* & *sativa*, seu *culta* Latinè appellatur. Germanicè *Vueinreb*. (Gallicè *vne vine cultiuée*.) *Vitis* autem, quòd inuitetur ad *Vitis vine* *de dicta* *vuas* pariendas, dicta esse primò videtur.

GENERA.

Innumera vitium reperiuntur genera, quæ singula persequi superuacaneum esse videtur. Si quis tamen illa disquirere desiderat, rei rusticæ scriptores, Pliniumq; libro xliii. naturalis historici, qui diligentissimè de iis scripsit, legat.

FORMA.

Vitis caduca est, & nisi sit fulta, fertur ad terrã. A radice eius caudex vnus cõtortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multiplicicortice cingitur, rimoso, flagellis longè latèque vagantibus, quibus se quasi suis manibus erigit, & quicquid nata est complectitur. Sarmentis, foliis latis, & in extremitatibus incisis, lasciuientibus. Floribus fructum ambientibus lanugineis. *Vua* compluribus acinis acernata, qui interdum purpureo, nonnunquam roseo, aliquando viridi colore fulgent. Semina tunicâ clausis.

LOCVS.

Passim & in multis Germaniæ nostræ regionibus

PLANTARVM HISTORIAE

bus nascitur: & vix hortum inuenies in quo non proueniat. TEMPVS.

Floret solstitio vitis, autumnno autem vuas maturas profert.

TEMPERAMENTVM.

Omnium partium vitis temperamentum & facultatum enarratione pateſcet. Vuæ tamen immatura & acerbæ, frigida & sicca sunt: matura vero calida & humida in primo gradu, autore quidem Simeone Sethi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vitis vinifera folia capreoliq; trita & illita capitis dolores, stomachique inflammationes & ardorẽ cum polenta mitigũt. Folia etiã per se imposita, vt Folia & Capreoli. pote quæ refrigerant & adstringũt. Succus ex ipsis potus dysentericis, sanguinẽ expuẽtibus, stomachicis & citra laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua capreoli & poti eadem efficiunt. Lachry= Lachryma verò eius quæ veluti gummi in caudibus concreſcit, pota cum vino calculos pellit. Illita lichenas, scabies & lepras sanat. Oportet tamẽ locum antea nitro conficasse. Eadem cum oleo frequenter inuncta, pilos denudat: potissimum ichor, aquosusve humor, qui ex incensis viridibus sarmentis exudat. Hic etiam myrmecias inunctus cicit. Cinis sarmentorum & vinaceorum circa sedẽ quæ antea ablata amputatãve sunt condylomata & thymia, cum aceto illitus sanat. Cõfert luxatis & vipercarum

*viperarum morsibus . Lienis inflammationibus cū
 rosacco & Ruta, & aceto illitus. Vua recens quæ Vua.
 uis aluum turbat, & stomachum inflat. Minus ho-
 rum particeps quæ aliquandiu decerpta pependit,
 quòd in ea copia humoris exaruerit. Stomacho ac-
 cōmodata est, appetentiamq; cibi excitat, & imbe-
 cillis conuenit. Quæ autem in vinaceis, aut è vina- Vide Ga-
 rio vase seruata sum, ori & stomacho grata sunt. lenū li. 2.
 Aluum sistunt, vesicam tamen & caput tentant. de alimē-
 Prosunt sanguinem excreantibus . Similes iis sunt torū facu.
 quæ in mustum coniectæ sunt. Quæ verò sapa aut triplicem
 musto conditæ, stomachū magis infestant. Reponunt hunc ser-
 tur & cœlesti cū aqua prius passæ factæ, minusq; uādarum
 vinosæ sunt, siticulosi, ardentibus & longis febris- vuarū mo-
 bus vtiles. Vinacei earum reconditi, inflammati, dū expli-
 duris, turgentibusq; mammis cum sale illinuntur. cantem.
 Vinaceorū decoctū dysentericis, cœliacis, & fluxui
 muliebri infusum confert. Ad insecssiones quoque ac
 clysteres assumitur. Nuclei acinorum adstringunt,
 stomacho grati. Tosti autē, & triti & pro farina il-
 liti, dysentericis, cœliacis et stomacho resolutis pro-
 sunt. Vua autem passa alba magis † extenuat. Ca- † Serapiō
 ro illarum comesta, arteriæ, tussi, renibus ac vesicæ legit, ad-
 confert. Esur in dysenteria per se cum nucleis. Ad- stringit.
 mixta milij & hordei farine & ouo, ac cum mel-
 le fixa, & per se etiam sumpta, atque cum pipere
 commanducata, ad capitis pituitam purgandā va-
 let . Testium inflammationes sedat, cum fabarum*

& cumini farina illita. Epinyctidas, carbunculos, fauos, & in articulis putredines & gangrenas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita, sanat. Podagrae cum opopanace illita auxiliatur. Mobiles vngues illita celeriter adimit. Vini facultates tu ipse ex Dioscoride, Galeno, & Plinio pete: supervacuum enim, imò tædio plenum esset, eas in vniuersum omnes commemorare.

EX GALENO.

Vitis sativæ & cultæ adsimilis facultas est sylvestri, sed ad omnia imbecillior. Vitis verò sylvestris racemi, extergendi vim obtinent, ut ephelis & neuos, & id genus quæcunque in cutis superficie fiunt, curare possint. Habet verò & astringentem quandam ipsi, & extremæ germina, quæ & sale cõdiri assolent. Plura de viis habet idem Galenus libro secundo de Aliment. facult. cap. de viis.

EX SIMEONE SETHI.

Vitæ plus nutriunt reliquis oporis, minus tamen ficis: neq; mali succi sunt, si maturæ fuerint exquisitè. Tamen his non robusta, nec densa, sed laxa & flaccida caro gignitur. Maximum quidem harum bonum, ait Galenus, quòd celeriter subeunt, atq; ideo si retineantur, lædunt: nec enim tunc probè concoquantur, sed crudum gignunt humorem, qui nõ facile in sanguinem transmutetur. Nucleorum natura, sicca & quodammodo adstringens est. Pertranscunt igitur omnia intestina, non alterati. Pensiles verò vitæ,

vuæ, neque sistunt ventrem, neq; proritant, cæteris autem facilius concoquuntur. Neque vuarū parua est in dulcedine, & austeritate, & aciditate differentia. Dulces quidē calidiorem habent succū, austeræ verò & acidæ frigidū. Alium subducūt dulces, et maximē quādo humidæ fuerint. Omnium itaque tutissimus vsus est, quādo carnosæ fuerint & maturæ, & mediocriter quis ipsas assumat. Vuæ quæ albæ sunt, magis subducunt alium quā nigræ. Omnes verò ciborum appetentiam excitāt, & vncorem. Conuenit cum eduntur membranam & nucleos expuere, quòd difficulter conficiātur. Quæ immaturæ sunt, ventrem sistunt, & stomacho bonæ. Caliditatem à flaua bile ortam sedant. Minus verò nutriunt. Oportet autem non solum vuas, sed etiam omnes fructus molli cortice præditos humidos, antea reliquos cibos apponere.

DE ACONITO. CAP. XXX.

Aconitum Pardalianches quadrifolium, quod quidā putauerunt Asters rectè pinguis in syluis frequens.

NOMINA.

Aκόνιτον Græcis, Aconitum Latinis dicitur. Aconitū Sic autem Theophrasto lib. ix. de Plantarū unde di-
 historia teste, non ἀπὸ τῶν ἀκονῶν, id est, à cau-
 tibus, sed ab Aconis Periadynorum pago, ad He-
 racliam Pontifto, vocatum est. Alij quod vis ea-
 dem in mortem esset, quæ cotibus ad ferri acie de-
 g iij trahendam,

PLANTARVM HISTORIAE

trahendam, statimq; admota velocitas sentiretur. Sunt qui aliam ob causam, quã referre minimè necessarium duco, sic nominatum fuisse existiment.

GENERA.

Pardaliã Duo Aconiti sunt genera: vnum Græcis Pardaliches. lianches dictum, quòd pardi eo necentur. Vocatur Scorpiũ. etiam Scorpionum, quòd radicem Scorpionum similem Vuã ver= habeat. Vulgus herbariorum Vuã versam, & vulsa. pinam, Germani Vuolfsbeer, & Doluurtz nominant. Alterum Lycostonon Græcis dicitur, quoniam deuoratum lupos confestim interficit. Vulgus Luparia. Lupariam, Germani Voulfssuurtz appellant.

FORMA.

Pardaliã Pardaliches folia habet tria aut quatuor Cyclamini speciei. Caulem palmi altitudine, & radicem incuruam, scorpionum caudæ similem, alabastrique modo splendentem. Quibus etiam accedit quòd manuscriptus & vetustissimus herbarius planissimè eam herbam quam hîc damus pro Aconito pingat. Germanica etiam nomenclatura satis indicat hanc herbam ob suam facultatem perniciosam

giosam esse Aconiti speciem. Lycostonon Platani Lycostos
 folia habet, magis tamen incisa diuisaue, longiora non.
 & nigriora. Caulem veluti Filix, cubiti altitudi-
 ne, aut maiorem: pediculum glabrum. Semen in si-
 liquis aliquatenus longis. Radices cirris marina-
 rum squillarum similes, nigras. Vnde iterum con-
 stat Lupariam vulgò appellatam, esse alterã Aco-
 niti speciem: ea enim folia Platani, quæ Cici aut
 Vitis foliis similia sunt, multas habetia diuisuras,
 obtinet. Caulem Filici similem, pediculum glabrũ.
 Florem oblongum, luteum, post quem longæ proue-
 niunt siliquæ, in quibus est semen. Radices etiam
 nigras, vt nemo subinde quin verum sit Aconitum,
 dubitare possit.

Luparia.

LOCVS.

Primum Aconiti genus passim in nemoribus &
 collibus quibusdam nascitur: alterũ autem in mon-
 tium vallibus altissimis. Magna autem illius copia
 est circa mōtem haud vltra vnum lapidem à Tu-
 binga situm, quem Germanica voce Farrenberg
 nominant.

TEMPVS.

Aconiti primum genus Maio mense potissimum
 erumpit. Alterum autē æstate, Iunio & Iulio men-
 sibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Erosione & putrefactione enecāt Aconita, ideo
 toto genere letalia sunt.

VIREs.

homine commoriuntur, vt homo supersit. Imò verò lo, & an-
 etiam ferarum remedia antiqui prodiderunt, de- tiquo in-
 monstrando quomodo venenata quoque ipsa sana- terprete
 rentur. Torpescūt scorpiones Aconiti tactu, stupent- Latino.
 que pallentes, & vinci se consitentur. Auxiliatur
 eis elleborum album, tactu resolvente: ceditq; aco-
 nitum duobus malis, suo & omnium. Tangunt car-
 nes aconito, necantque gustatu earum pantheras,
 ob id quidam Pardalianches appellauere.

DE ARISTOLOCHIA.

CAP. XXXI.

Aristolochia longa videtur quam pro ro-
 tunda pingis, quòd folio sit rotundo, sed
 radice etiam rotunda esse debet Diosco-
 ridi. Pistolochia autem tua radice rotun-
 da est, foliis autem altè incis. is.

NOMINA.

Aριστολόχια Græcis, Aristolochia Latinis, bar-
 baris & officinis corrupta voce Aristologia,
 quemadmodum etiam Germanis Holuurtz, &
 Osterlucëy. (Gallicè de la sarrasine) nomina-
 tur. Dicta autem est Aristolochia, quod ἀρίστη
 τοῦς λοχοῖς, id est, optima puerperis sit, vtpote
 quæ remoratos menses, hærentes secundas, & reli-
 quias omnes à partu expellat.

Aristolos-
 chia vnde
 dicta.

GENERA.

Aristolochiæ Dioscorides & alij Græci tria esse
 genera statuūt. Vna est quæ rotunda et femina di-
 citur.

PLANTARVM HISTORIAE

Germania citur. Altera lōga & mascula. Tertia Clematidis, *nia* officii quasi dicas sarmētaria, appellatur. Harū certē nul-
na solā lō lā prāter lōgā officinae Germania nostrae agnoscūt.
gā *Aristo* Nam qua sub Aristolochiae rotūda nomine vtūtur
lochia a= herba, minimē genuina est, vt paulō pōst euidentiss-
gnoscunt. mis argumentis ostēdemus. Plinius tribus iis gene-
Pistolo= ribus addit quartum, ac Pistolochiam vocat, quae
chia quae. certē ea est quā nostrae officinae Aristolochiā rotun-
 dam, & Germani Runde Holuurtz falso ap-
 pellāt, vt in eius descriptione fusius docebimus.

FORMA.

Aristolo= Aristolochia rotunda folia Hederae similia ha-
chia rotū= bet, cum acrimonia odorata, subrotunda, tenera, cū
da. multis in vna radice germinibus: sarmenta illi sunt
 oblonga, flores candidi, pileolis similes, in quibus
 quod rubet grauiter odoratum est. Radix illius ro-
 tunda, rapo similis. Ex iis quidē verbis sole clarius
 fit, Aristolochiam rotundam officinarum, & qua
 cōmuniter omnes vtuntur, non esse eam quam Dio-
 scorides atque alij veteres pingunt. Haec enim non
 Hederae folia, sed Ruta potius, maiora tamen ha-
 bere deprehēditur. Neque etiā odorata, neque sub-
 rotunda sunt. Grauis etiam qui ex floribus exha-
 lat odor, in nostrae Aristolochiae floribus nusquam
 apparet. Radix denique etsi rotunda sit, tamen
 quia concava est, globique formam obtinet, rapo,
 quod solidum est & oblongum, similis dici nō po-
 test. Nō latet tamen interdum etiam reperiri eius
 generis

generis radices prorsus rotundas ac solidas, ut altera
 pictura monstrat: verum cum reliquæ Dioscori-
 dis notæ absint, legitima Aristolochia esse haud po-
 test. His accedit, quod manuscripti herbarum pictu-
 ra planè hanc Aristolochiam Hederae folia habe-
 re doceat, ut hinc etiam evidentissimum sit nostram
 non esse genuinam. Aristolochia longa, folia quæ Aristolos-
 rotunda longiora habet. Ramulos tenues, altitudi- chia longa,
 ne dodrantes. Florem purpureum, grauitèr odo-
 ratum, qui cum defloruerit pyro similis sit. Radicem
 digiti crassitudine dodrantalem, aut longiorem. Tam
 huius verò quàm prioris radix colore buxæ, gustu
 amara, & odore viroso est. Hæc sanè descriptio non
 abhorret à nostra Aristolochia, quæ Hederae etiam
 foliis constat, ramulisque tenuibus. Neque obstat Obiectio
 quod hæc non purpureos, sed luteos potius flores ha- nis dissolu-
 beat: nam ut in Symphyto magno vberius dicere- tio.
 mus, non vbiq; terrarum, earundem etiam her- Earundem
 barum flores similes esse, evidentissimum fit in Bo- etiam her-
 ragine, & Consolida maiore hodie nominatis her- barum flo-
 ribus. Quamuis autem lutei sint, grauitèr tamẽ odo- res non vbi-
 ratos esse constat. Dein vbi flos nostræ etiam Ari- que terra-
 stolochiæ defloruerit, tum pyro similis sit, ut pictu- rum esse si-
 ra etiam pulchrè monstrat. Sed hic obtrudet nobis miles.
 quispiam Dioscoridem, qui Gentianæ radicem A= Obiectio
 ristolochiæ longæ similem, crassamque esse scribit: nis dissolu-
 huius autem nostræ nedum digiti crassitudinẽ ob- tio.
 tinet, tantum abest, ut quantitate Gentianæ radi-
 ci

ci similis esse queat. Respondeo, hæc quidem vera esse, sed nihil mirum esse si apud nos minor reperiatur: variatur enim in vna etiam & eadem herba iuxta regiones diuersas radicum magnitudo. Sic visa est nobis radix Aristolochiæ rotunda multò, quàm sit maximus digitus, maior & crassior. Hæc tamen in Italia prouenerat. Neque dubium est quin nostræ etiam radix maior futura sit, ubi cultus, & terra apta admodum accesserit. Nā vt Theophrastus lib. I. de hist. Plāt. ca. 5. autor est, quædā ob culturā diuersa efficiuntur, atque à sua natura discedunt. Sic Malua in altum se attollit, & arborescit, atque in longitudine & crassitudine instar hastæ grandescit. Quid multa? cum nostra maxima etiā prædita sit amaritudine, tutò illa pro vera & genuina, nihil obstātibus floribus luteis, & radice minima, vti licebit. Clematidis ramulos habet tenues, foliis subrotundis, minori Sēperuino similibus, plenos flores Rutæ haud dissimiles. Radices longiores, tenues, corticem crassum habentes, & odoratum. Pistolochia à Plinio lib. xxv. cap. viij. iis pingitur verbis: Est & quæ Pistolochia vocatur, quarti generis, tenuior quàm tertia, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrhizon cognominant. Ex iis autem verbis nemo non intelligit, Aristolochiam rotundam vulgò vocatam, esse Pistolochiam: hæc enim supra modum tenuis, vel vt

Clematidis.

Pistolochia.

Aristolochia.

da est Pi

stolochia.

apertius

apertius dicam, tenera herba est. Radix etiā multus capillamentis vestita, crassioris etiam iunci magnitudine, atque adeò concava, ut pictura monstrat. His accedit, quòd hæc quæ rotunda vocatur, canis ulceribus proffit, quam etiam facultatem Pistolochiæ, ut paulò pòst patebit, Plinius tribuit. Et quid multis opus est verbis? nomen ipsum abundè docet esse Pistolochiam: creditur enim, quāuis reuera non sit, esse Aristolochia hodie quoque, haud secus quàm Pliniū temporibus. Hæc ut totam eius faciem teneas, caulem habet rotundum, leuem, folia Rutæ hortensis, latiora tamen, flores ferè Eranthemni, purpureos: illa candidos, ut pictura quæ utrosq; unà complectitur, pulchrè monstrat, quibus abeuntibus, siliquas profert refertas semine atro, lentibus haud dissimili: radices, ut ostesum est, hæc rotundam & cavam, illa verò rotundam. at omni tempore solidam obtinet, colore subcroceam.

LOCVS.

Vera rotunda, quòd sciam, nusquā in Germania nostra nascitur. Lōga passim in vineis, ac hortis aliis provenit. Pistolochia in sylvis & locis vmbrosis.

TEMPVS.

Longa Iunio & Iulio mensibus floret. Pistolochia in Martio & Aprili, quo præterito statim etiam disperit.

TEMPERAMENTVM.

Cum supra modū amara & subacres sint Aristolochiæ,

PLANTARVM HISTORIAE

lochiae, calidas & siccas esse in secundo, vel, quod magis credibile est, in tertio ordine rectè statuemus.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Rotunda contra alia venena valet. Longa verò drachmæ unius pondere cum vino pota & illita, aduersus serpentes & letalia. Menses, secundas & foetus omnes in utero consistentes cum myrrha & pipere pota pellit. In pessa subdita eadem potest. Rotunda ad eadem omnia ad quæ prædicta conducit: ampliusq; asthmatis, singultui, rigori, lieni, ruptis, conuulsis, laterisq; doloribus ex frigida aqua pota auxiliatur. surculos & spicula extrahit. Squamas ossium illita educit. Putrescentia excarificat, & sordida vlcera expurgat. Cava cum Iride & melle explet. Exterit gingiuas & dentes. Creditur & Clematitis ad eadem prodesse, efficacia tamen prædictis minor inferiorque est.

EX GALENO.

Aristolochiae radix ad medicationes utilissima est, amara & subacris. Sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Aliarum verò duarum Clematitis vocata magis odorata est: itaq; ea ad vnguenta vtuntur vnguentarii: sed ad sanationes infirmior. Longa verò minus quidem tenuis est quam rotunda, sed nec ipsa inefficax, verum abstergeredi & calefaciendi facultatē possidet, minus tamen quam rotunda abstergit atq; digerit: sed non minus calefacit, imò fortassis etiam plus. Itaq; in quibus vsus est

vsus est mediocriter abstergere, cōmodior est lōga, quēadmodū in carnis exulcerationibus, & in vteri fomētationibus. In quibus autem crassū humorē validius extenuare oportet, illic vsus est rotunda. Quapropter dolores ab obstructione aut crassitie crudorum flatuum natos, magis curat rotunda, & surculos extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera repurgat, ac dentes gingiuāsque candidas efficit. Auxilio est asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiam conuulsisq; vt si quod aliud medicamentum, idonea est.

EX PLINIO.

Valent radice tantum. Rotunda contra serpentes. Oblōga in summa tamen gloria est etiā modō. A conceptu admota vuluis in carne bubula, mares figurat, vt traditur. Quæ Pistolochi & Polyrhizos cognominatur, conuulsis, contusis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua, vtilissima esse traditur. Semine pleuriticos & nervos confirmare, excalfacere. Putrida vlcera exest, sordida expurgat, vermesque extrahit Aristolochia. Clauos in vlceribus natos, & infixā corporis omnia, præcipuē sagittas, & ossa fracta, cum resina. Cava vlcera explet per se, & cum Iride: recentia vulnera ex aceto.

APPENDIX.

Et si nostrā Aristolochiā rotundā non genuinam esse dixerimus, tamen ob id in medico vsu nō repudianda erit. Quum enim habeat & in foliis & in

h

radice

PLANTARVM HISTORIAE

radice acrimoniam, eamque non leuem quidem, si genuina desit, sine omni discrimine illa uti licebit ad omnia ea ad quæ vera usurpatur.

DE AMPELO LEVCE.

CAP XXXII.

Bryonia nobis colubrina, quod sub huius umbra densiori stabulare ament colubri, aliis Ignis ardens dicitur à caustica vitæ baccarum rubentium.

NOMINA.

Aμπελος λευκή, ἢ βρυονία, ἢ ψιλωθρον
Græcè: Vitis alba, Psilothrum Latine appel-
latur. Officinis & herbariis Bryonia. Vulgus Viti-
cellam nominat. Germanicè Stickuurtz, Schie-
fzuurtz, Raszuurtzel, Hunds kurbisz, Romi-
schrub, Vuilder zituan, Teufelskirsz. (Gal-
licè De la couleuree, aliis du feu ardent.) voc-
Vitis al- catur. *Vitis alba verò dicta, non quod vitis sit,*
ba cur di sed quod viti similis existat. Sic etiam Viticella,
sta. *Psilothrum, quod ex eius acinis coria depilari ac*
Psilothrū confici possint. Bryonia verò à βρύω fortè, quod
unde. est pullulo atque adeò extollo, & exalto, eò quod
Bryonia. in adjacentes sibi frutices scandens se exaltet atque
 late pullulet.

FORMA.

Sarmēta, folia, capreoli, satius viti similia sunt, hirsutiora tamen omnia. Propinquis fruticibus se implicat capreolis apprehendens. Fructum habet racemo-

racemosum, rubentem, quo coria depilant. Radix alba, crassa & magna.

LOCVS.

Passim in sepibus & senticetis nascitur, eosque quos prope se nanciscitur frutices scandit, vt eleganter in carmine suo Columella cecinit, dicens:

*Quæq; tuas audax imitatur Nysie viteis,
Nec meluit senteis: nã vepribus improba surgēs
Achrados, indomitas bryonias alligat vltimos.*

TEMPVS.

Floret tota æstate in bonam vsque partem autumni, in quo fructum producit, qui primum viridis est, dein vbi maturitatem consecutus fuerit, rufus esse incipit.

TEMPERAMENTVM.

Prima germina subamaram & modicè acrem adstrictionem habent. Radix autem desiccata & moderatè calefacit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Bryoniæ in prima germinatione asparagi elixi manduntur, urinã & aluum cientes. Folia, fructus & radix, acrem vim habent: capropter chironiis, gägranicis, phagedenicis, & tibiis putrefacientibus vlceribus cum sale illita auxiliantur. Radix abstergit corpus & erugat. Vitia faciei, varos, lētiginēs, & cicatrices nigras, cum eruo, terra chia, & fænograceo emendat. Ad eadē prodest decocta in oleo vsquedū lique scat. Sugillata toll. t. & digitorū
h ij pterygia

pterygia compescit. Cum vino illita inflammatio-
 nes discutit, & abscessus rumpit. Ossa extrahit,
 trita & illita. Miscetur aptè medicamentis quæ
 exedendo sunt. Bibitur comitialibus drachmæ pon-
 dere quotidie per annum. Attonitis & vertigine
 laborantibus consimiliter assumpta prodest. Con-
 tra viperarum ictus pota drachmis duabus pro-
 dest. Fœtus necat. Mentem aliquando subvertit.
 Cit urinā pota. Eclegma ex ea fit cum melle, quod
 præfocatione oppressis, tussientibus, latera dolentibus,
 & ruptis datur. Apposita utero, fœtus & se-
 cundas trahit. Lienem trium obolorum pondere ex
 aceto triginta diebus pota consumit. Illinitur uti-
 liter cum fico ad eadem. Ad incessus decoquitur:
 vulvas siquidem purgat, & abortum facit. Vere
 ex radice eius exprimitur succus, bibiturque cum
 aqua mulsa ad eadem, pituitam ducens. Fructus
 eius ad psoras & lepras illitus & inunctus facit.
 Lactis abundantiam efficit succus eius fructus, si
 cum tritico decocto sorbeatur.

EX GALENO.

Vitis albæ, quam etiam Bryonia vocant, prima
 quidem germina ab omnibus pro more per ver e-
 duntur, utpote edulium stomacho eò quòd adstrin-
 gat gratū. Habent etiā amarā & modicè acrē ad-
 strictionem, quare urinam moderate mouent. Ra-
 dix autem abstergentem nonnullam, desiccantem
 & tenuium partium, ac moderatè calidam vim
 obtrinet.

obtinet. quamobrem & lienes induratos liquefacit, tum epota, tum foris cū ficibus imposita. Psoriam etiam ac lepram sanat. Racemosus eius fructus pelles tingentibus utilis est.

EX PLINIO.

Bryonia asparagi decocti in cibo alui & urinā ciet. Folia & caules exulcerant corpus: utiq; ulcerum phagedenis, & gāgrenis, tibiārumq; radio cum sale illinuntur. Semen in vuararis acinis depēdet, succo rubente postea croci. Nouere id qui coria perficiunt: illo enim vtuntur. Psoris & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit coctum cum tritico, potūmq; . Radix numerosis utilitatibus nobilis: contra serpentium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie, varosque & lentigines, & sugillata emendat, & cicatrices. Eademq; præstat decocta in oleo. Datur & comitialibus potus. Item mēte commotis, & vertigine laborantibus, drachmæ pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquāto, purgat sensus. Illa vis præclara, quod ossa infracta extrahit in aqua imposita, ut Bryonia: quare quidam hanc albā Bryoniam vocant. Suppurationes incipientes discutit, veteres maturat & purgat. Cit menses & urinā. Eclegma ex ea fit suspiriosis, & contra lateris dolores, vulsis, ruptis. Splenē ternis obolis pota triginta dieb^o cōsumit. Illinitur eadē cū fico & pterygiis digitorū. Ex vino secundas scēminarū apposita tra-

PLANTARVM HISTORIAE

bit: & pituitā, drachma pota ex aqua mulsa. *Sucus* radicis colligi debet ante seminis maturitatē: qui illitus per se & cum eruo, latiore quodam colore & cutis teneritate mangonizat corpora: serpentes fugat. Tunditur ipsa radix cum pinguisfco, erugātque corpus, si statim bina stadia ambulentur. Aliās vrit, nisi frigida abluatur.

DE AMPELO MELAENA.

CAP. XXXIII.

Tua vitis nigra videtur esse viburnū, etiā vulgò Gallorum cum Virgilio dictum.

NOMINA.

AΜΠΕΛΟΣ ΜΕΛΑΝΑ Gracis, Vitis nigra Latinis nominatur. Officinis incognita. Germanis Vualdreben. oder Lynen, oder Lenen, (Gallicè Espece de Couleuree, ayant les racines & sementz noirs.) vocatur. Nigra vero vitis dicta est à radice nigra, & quòd vitis similitudinem obtineat.

Vitis nigra unde dicta.

FORMA.

Folia Hederae similia habet, magis tamen ad Smilacis folia accedētia, cui & caules similes ob-
tinet: maiora tamē eius folia quàm illius sunt. Clauiculis hæc etiam arbores amplectitur. Semen racemosum, initio herbaceum, cum maturuit deinde nigrum. Radicem foris nigram, intus buxci coloris. Ex qua delineatione omnibus constat herbam hanc cuius picturam exhibemus, esse vitem nigram.

gram. Folii enim Hedera, maioribus tamen, Smilaci proximioribus, caulibus quoque cognatis. Clauiculis suis arbores perinde atque adminicula comprehendit. Semen racematim cohaeret, inter principia virens, post maturitatem nigrescens. Radix foris atra, intus buxeo colore nitet. Flores eius, quod omisit Dioscorides, sunt candidi, & odorati, quibus decidetibus semen subnascitur plumis quasi vestitum, aut barbae canae effigiem praebens.

LOCVS.

In frutetis & dumetis potissimum nascitur.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, Augusto verò semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod vitis alba temperamentum habet.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius caules in prima germinatione olerum modo manduntur, vrinae & mensibus ducendis vtilis. Idem lienes minuunt. Comitibus, vertiginosis, & resolutis accommodati sunt. Radix eadem praestat quae vitis alba, minus efficax tamen. Folia cum vino illita ad iumentorum cervices exulceratas conducunt. Quinetiam luxatis eodem modo imponuntur.

EX GALENO.

Viti albae ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

EX PLINIO.

Asparagi eius in cibo vrinae ciēda, lien q; minūdo vtilis. Radix ossa infraeta efficacius extrahit
h iij quān

quã suprà dicta. Ceterùm eidẽ peculiare est, quòd iumentorum ceruicibus vnice medetur. Aiunt si quis eam in villa extruxerit, fugere accipitres, tuasque fieri aues villaticas. Aliter eadem in iumentis hominẽque phlegma aut sanguinem qui screeatur, talos circumligata sanat.

DE AMARANTO. CAP. XXXIII.

Amarantus luteus in Santonia, & Gallia Narbonensi frequens est, in officinis propè omnibus stœchadii citree nomine, Amarantus purpureus nobis Passe velours, quòd immortali colore etiam villutum purpureum vincat.

NOMINA.

Aμαραντος Græcis, Amarantus Latinis dicitur. Medicis & herbariis nostræ ætatis ex amore & anthos dictionem componi credentibus, Flos amoris vocatur. Hanc appellationem vsurpantes Germani Floramor nominant, aliàs Samatblum & Taufentschon (Gallicè Du passevelours) appellatur. Amarantus autem non alio nomine dici cœpit, quàm quòd flos eius nunquã marcescat. Hinc est quòd puellæ hyemales sibi corollas ex eo conficiant: id quod Erfordiæ, vbi non solum æstate, verum etiam hyeme gestant coronas, fieri potissimum solet.

GENERA.

Duplex est Amarantus: vnus luteus, qui Dioscoridi ἐλίχρυσον, Galeno Amarantus, officinis & imperitis Stichas citrina, vel vt ipsi loquuntur, Stichados

Amarantus unde dictus.

Stichas citrina.

calos citrinum, Germanis Rheinblumen quòd in regionibus quæ Rheno adiacent, potissimum verò quæ intra Spiram & Vuormaciam sunt, proueniat: oder Mottenblum oder lungling ap= Helichrypellatur. Helichryson dictum, quòd ad solis reper= son unde cussum comantibus in orbem florum foliis, fulgorè dictum. auri præ se ferat. Alter purpureus, qui hodie Flos Flos amoris vulgò, & Germanis Floramor oder Sa= ris. matblū vocatur, vt paulò antè à nobis dictū est.

FORMA.

Amarantus luteus qui Helichryson alio nomine Amaran= dicitur, virgam habet tenuem, virentem, rectā, so= tus luteus. lidámque. Folia angusta ex interuallis. Abrotono similia. Comam orbicularem, auri modo fulgentē. Umbellam rotundam, veluti corymbos arescentes. Radicem tenuem. Ex qua descriptione planum fit eam herbam quam hodie officinæ solæcisimo vten= tes, Stichada citrinam nomināt, esse Helichryson. Est enim herba surculosa, exilibus ramulis, folio vt Hyssopus angusto, gustu amaro, et instar Abrotoni albicante: coma orbiculari, auri modo splendente: umbella rotunda veluti corymbos arescentes: radice gracili. Et vt paucis dicam, non est nota quæ illi non aptissimè quadret. Purpureus verò pedali altitudine surgit, caule purpurascēte, foliis Ocymo si= Amaran= milibus, maioribus tamē & longioribus, spica pur= tus purpurea, verius quàm flore, inodora, qua nihil gra= reus. tius aspectu cernitur.

LOCVS.

Nascitur

PLANTARVM HISTORIAE

Nascitur in asperis, sabulosis, siccis & cōvallib.
locis luteus. Alter autē in hortis & fictilib. seritur.

TEMPVS.

Helichrysum Iunio & Iulio mensibus floret. Amarantus verò purpureus aestate, potissimum autē Augusto mense.

TEMPERAMENTVM.

Luteus calidus & siccus haud dubiè est, id quod Amaritudo in gustu & facultates eius abundè demonstrant. Purpureus autem recentiorum herbariorum sententia, frigidus est & siccus.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Coma Helichrysi cum vino pota difficultatibus vrinae, serpentium ictibus, coxendicum doloribus, & ruptis auxiliatur. Menses ducit, & sanguinis grumos in vesica aut alio cum oxymelite puta liquefacit. Destillationem trium obolorum pondere cum vino diluto albo ieiuno data compescit. Reponitur etiam cum vestibus, quas ab erosione integras seruat. Vnde iterum colligere licebit, herbam quā Rheinblumen vocant, esse Helichrysum, quòd illam hac facultate vt vestes à tineis tueatur pràditam esse, omnibus in confesso est.

EX GALENO.

Amarantus, luteus nēpe, facultatis est incidentis & extenuantis. Quapropter coma eius cū vino pota menses educit, & sanguinis grumos liquare creditur, non solum in vētre, sed & in vesica. Sed tūc potius

potius illam cum mulso bibere conuenit. Omnes verò simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho tamen aduersa. EX PLINIO.

Heliochrysum ciet vrinas è vino pota, & menses. Duritias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur. Contra serpentium ictus & lumborum vitia bibitur. Sanguinè concretum ventris ac vesicæ absumit cum mulso. Folia eius trium obolorum pondere sistunt profluvia mulierum in vino albo. Vestes tuetur odore non ineleganti.

APPENDIX.

Recentiores purpureum Amaratum vehementer siccare tradunt, ideoque cum vino sumptum alui fluxiones sistere scribunt: sed, vt aiunt, stomacho aduersatur. Lutei floribus in vino decoctis, ad lumbricos educendos vtuntur: & ad pediculos enecandos in lixiuio coctis.

DE AQUILEGIA. CAP. XXXV.

Aquilegia aliis angelica ancolie vulgo Galorum, florum omnium pulcherrimus præsertim qui duplus est.

NOMINA.

Quæ Aquilegia vulgò ab omnibus appellatur herba, ea Germanis Ackeley Agley & Aquilegia Ageley nominatur. Quo verò nomine Græcè non est Aecis aut Latinis medicis vocata sit, nobis nondum constat. gilops. re potuit. Non esse enim Græcorum Aegilopa, vt non Aegilops solum vulgares herbarii, verumetiā magni nominis quid.

PLANTARVM HISTORIAE

nis medici putant, notius est quàm vt demonstrari à me debeat. Nam nihil in vniuersa Aegilops, quæ alterum Auenæ genus est, historia reperitur, quod ad Aquilegiam referri queat. Neque enim tam ab anguilla cæcer, quàm Aegilops ab Aquilegia distinet: vt hoc nomine errare toto cælo euidentissimū sit, qui Aegylopa esse Aquilegiam arbitrantur.

FORMA.

Folia Chelidonij maioris habet, sed paulò rotundiora, ac molliora. Caulem cubitalem, & interdum proceriorem, in cuius summo flores purpurei sunt, ex caudis quibusdam veluti muliebres oculi propendentes. His decidentibus capitula subnascuntur, haud secus atque in melanthio, in quibus semē atrum est. Radix eius crassa.

LOCVS.

Nascitur passim in hortis, & pinguibus quibusdam pratis. Inuenitur etiam in montibus syluosis, & interdum in petris & muris.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

In gustu dulcedinem quandam præ se ferre videtur, vt hoc nomine mediocriter calidam esse, ac modicè digerendi vim habere verisimile sit.

VIREs. EX RECENTIORIBVS.

Recentiores omnes, tum herbarii, tum medici, Aquilegiæ omnes Aegilops facultates tribuunt, at
quàm

quàm rectè, ipsi viderint. Neq; enim verisimile est herba quæ subacris nō est, tātam discutiendi inesse facultatem posse. Quum verò modicè digerat & exiccet, scabiei & fistulis, potissimum si illi farina commisceatur triticea, conferre potest.

DE ALLIARIA. CAP. XXXVI.

Alliaria vulgo scordotis ab odore allii herba qua sunt hæctenus male vsi Pharmacopæi loco scordii nunc notissimi.

NOMINA.

Nondū constat quo nomine veteribus Græcis & Latinis herba hæc appellata sit. Vulgò Alliaria tamē, eò quòd trita eius folia ingratū ac planè al- unde di-
liaceum odorem redolent, Alliaris & Alliaria no- eta.
minatur. Germanicè Knoblochkraut oder Leu-
chel oder Saßkraut. Pandectarum Autor Pedē Pes asie-
asininum vocat. FORM A. ninus.

Folia eius cū primū emicant subrotūda sunt, Violæ similitudine, aliquantulum tamen maiora. Adulta autem in angulos exeunt. Herba ipsa bicu-
bitali proceritate consurgit, caule tereti, foliis Vrti-
cæ, nisi quod leniora sunt, parcius fimbriata, & à
pediculo latiora. Alii odoratū cum teruntur, flore
lacteo albōve, exili in siliquis semine, atro colore, ra-
dice oblonga, eiusdem cum foliis odoris.

LOCVS.

Passim propter sepes & agrorum margines pro-
uenit.

TEMPVS.

Folia

PLANTARVM HISTORIAE

Folia statim primo vere, atque adeò Martio ipso erumpunt. Floret autem aestate, atque deinceps semen profert.

TEMPERAMENTVM..

Quum prorsus suboleat Allium, necesse est vt temperamento eodẽ prædita sit. Calefacit igitur haud dubiè & desiccatur, non tamen perinde atque Alliũ in excessu quarto. VIRE S.

Easde propè Allii facultates habere vel hinc cõiici potest, quòd nonnulli in iuribus tortiuusq; succis pro Allio substituant. Proinde corpus calefacere, crassos humores in eo extenuare, glutinosos incidere potest: omnia tamen hæc minori quàm Alliũ efficacia. Semen eius cum aceto emplastris modo mulieribus strangulatu vteri laborantibus impositum, & vuluæ admotum prodest, ac easdem excitat. Et summatim, omnia quæ Nasturtii semen, sed minori efficacia, potest.

DE ACALYPHE. CAP. XXXVII.

Vrtica Romana nobis mas dicitur, semine in globulis ceu Lai sed minori. Maior in sepibus hortorũ, minor agria nobis dicitur Ortie griæce.

NOMINA.

Aκαλύφη, ἡ κνίδη Græcis, Vrtica Latinis nũcupatur. Officinæ Latino nomine vtuntur,

Acalyphe Germanis Neßel (Gallicè Ortie) appellatur. unde dicitur Acalyphe verò dicta est, Athenæo authore, quòd iniucundo.

iniucundo sit tactu, & pruriginem cieat. Cnide au- *Et a.*
tem, quod vellicet, pungat ac suo morsu sensum la- *Cnide.*
cessat, à verbo *κνίζειν*, quod pungere & vellicare *Vrtica.*
significat. Vrtica ab vrendo, quod pruritum pustu-
lasq; igni similes excitet.

Vrticaroma.
mana.

GENERA.

Dioscorides duo facit genera. Vnam asperam,
quam hodie Romanā vocant: & est ea quam pi-
etam damus. Huius quidē semine in officinis uten-
dum, nō alterius quæ passim in sepibus ac dumetis
nascitur. Germanicè Vuelschnessel (Gallicè Or-
tie griesche) appellatur. Alterā minus asperam,
quā ob id mollem nominant. Hanc nondum videre
potuimus. In Germania nostra præter hæc genera,
alia duo inueniuntur. Vnū maius, quod Germanicè
Heyterneffel nomināt: alterū minus, Germanicè *Vrtica no*
Brennessel vel Haberneffel quod nimirū in a- *stramaior*
vena nascatur, appellari solet. Harū etiā picturas *Vrtica mi*
adiicere placuit, quod nō prorsus inefficaces esse pu- *nor.*
temus, quandoquidem haud secus atque Romana
pungere videantur. FORM A.

Romana caule est rotundo & aspero, syluestrior
etiam & asperior, latior & nigrior foliis, semine
haud dissimili in globulis quibusdam semine lini,
sed minore. Altera priori similis est, nisi quod non
similiter aspera est, tenuiusq; semen habet.

LOCVS.

Romana apud nos non nisi sata prouenit, non se- *Romana*
cus

PLANTARVM HISTORIAE

*cus atque mollis vocata vrtica. Vulgares passim in
dumetis ac sepibus gignuntur.*

TEMPVS.

Semen messibus colligi oportet.

TEMPERAMENTVM.

*Subtilium est partium, & temperatura sicca, nõ
tamen tantum habet caliditatis vt iam mordicet.*

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

*Vtriusque folia cum sale illita canis morsibus,
gangrænis, malignis vlceribus, cancris, sordidisq; lu
xatis, tuberculis, parotidibus, phygetlis, & absces
sibus medentur. Lienosis cum cerato imponuntur.
Profluvia sanguinis ex naribus cum succo trita &
imposita sistunt. Cum myrrha trita & imposita
menses mouent. Recentia admota vteri prociden
tias emendant. Semen cum passo potum vencrem
stimulat, & vulvas aperit. Cum melle linctum or
thopnoeas, pleuritidas, & peripneumoniam inuat.
Ea quæ in thorace sunt educit. Misceatur & excedẽ
tibus medicamentis. Folia cum conchulis decocta
aluum molliunt, vrinasq; mouet. Cum ptisana deco
cta ea quæ in thorace sunt educunt. Decoctum fo
liorum cum exiguo myrrhæ potum menses elicit.
Succus gargarissatus, vuam inflammata reprimit.*

EX GALENO.

*Herbæ semen & folia, nam hæc potissimum in
vsum adhibentur, digerentis sunt facultatis, adeo
vt tubercula & parotidas sanent. Sed & quiddã
flatuosum*

flatuosum obtinēt, quo & venerem extimulāt, maxime vbi cum passō semen bibitur. Porro quod non vehementer calefaciat, sed admodum tenuium sit partium, testatur crassorum viscosorumque humorum ex thorace & pulmone eductio, tū quod partes quas contigerit, pruriant. Ceterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta est, dum cōcoquitur, nascitur: nō enim actu flatuosa est, sed potentia. Vētem autem mediocriter subducit ipsa dūtaxat abstersione, ac veluti titillatione, non purgatione. Cāgruosa & cancrofa, & in totum quæ exiccari citra mordacitatem postulant, ea cōuenienter sanat.

EX PLINIO.

Vrtica plurimis sciatet remediis. Semen eius Cicutæ contrarium esse Nicander affirmat. Itē fungis, & argento viuo. Apollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Item aduersari Hyoscyamo, & serpentibus, & scorpionibus. Quin illa ipsa amaritudo mordax, vnas in ore, procidentesq; vuluas, & infantium sedes, tactu resilire cogit. Lethargicos expergisci tactis cruribus, magisq; fronte. Eadem canis morsibus addito sale medetur. Sanguinem trita naribus indita sistit, & magis radice. Carcinomata & sordida vlcera, sale ammixto: itē luxata. Sanat & panos, parotidas, carnesq; ab ossibus recedentes. Semen potum cum Sapa, vuluas stragulantes aperit, & profluvia narium sistit impositum. Vomitiones in aqua mulsa sumptum à cœ-

PLANTARVM HISTORIAE

na, faciles præstat, duobus obolis. Vno autem in vino potum, lassitudines recreat. Vuluæ vitiis tostum, acetabuli mensura. Potum in sapa, resistit stomachi inflationibus. Orthopnoicis prodest cum melle, & thoracem purgat eodem ecligmate. Et lateri medetur cum semine lini: addunt Hyssopum & piperis aliquid. Illinitur lieni. Difficilem ventrem tostum cibo emollit. Hippocrates vuluam purgari potum eo pronunciat. Dolore lenari tosto acetabuli mensura dulci potum, & imposito cum succo maluæ. Intestinorum animalia pelli cum Hydromelite & sale. Defluxia capitis, semine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia cum ursino adipe trita imponunt. Ad eadem radix trita cum aceto, non minus utilis. Item lieni. Et cocta in vino discutit panos, cum axungia vetere salsa. Eadem psilothrum exiccat. Condidit laudes eius Phanius physicus, utilissimam cibis coctam conditamve professus arteriam, tussim, ventris destillationem, stomacho, panis, parotidibus, perinonibus: cum oleo sudorem, coctam cum cochulis ciere aluum, cum ptisana pectus purgare, mulierumque menses cum sale, vlcera quæ serpunt cohibere. Succus quoque in usu est. Expressus illiusque frontis sanguinem narium sistit, potus urinam ciet, calculus rumpit. Vnam gargarissatus reprimit. Si quadripedes foetum non admittant, urtica naturam fricandam monstrant.

DE APHACE. CAP. XXXVIII.

Aphace vbique hic frequens.

NOMINA.

Aφάκη Græcis, Aphace Latinis, vulgò Syluestris vitia, & Os mundi, Germanis Vuild-uicken, oder. S. Christoffelzkraut (Gallicè Vesse sauage) vocatur. Alia est ab Aphaca Theophrasti, quæ syluestrium olerum genus est, de qua suo loco plura dicemus.

FORMA.

Exiguus frutex est, lenticula altior, tenuiorib. foliis. Quæ nascuntur in ea siliquæ lēte maiores, terna aut quaterna semina nigriora & minora cōtinent.

LOCVS.

In aruis sponte nascitur.

TEMPVS.

Maio mense floret, & subinde semen in siliquis producit. TEMPERAMENTVM.

Moderati caloris est, valentius autem desiccatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semina adstringendi vim habent, quapropter stomachi & alui fluxiones tosta, fracta, & decocta lentis instar sistunt.

EX GALENO.

Aphace facultatem obtinet adstrictoriam, sicut & ipsa lenticula. Sed & similiter vt lenticula edi solet: ceterum agrius quàm illa concoquitur. Aliuò retinet.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO.

Natura ei ad spissandum efficacior quàm lenti.
Reliquo vsu eosdem effectus habet. Stomachi alui-
que fluxiones sistit semen decoctum.

DE ANDRACHNE. CAP. XXXIX.

Portulaca vtraque nobis cum sereno pul-
læ pes, Poulle pied, corruptè Pourpier di-
citur. NOMINA.

Portulaca: **A** VOÏ ^g XVII Græcis, Portulaca Latinis et Offi-
cinis, Germanis Burtzelkaut (Gallicè Du
pourpier, ou de la Pourceline,) dicitur, corrup-
pta tamen voce, cū efferendū esset Portzelkraut,
ac si porcellorum herbam dicerent. Aliàs Sauubō
iisdem appellatur.

GENERA.

Portulaca: Portulaca in duas distribuitur species: vnā hor-
tensis. tenscm, & alteram syluestrem, quæ non est tertium.
Sylvestris: Aixoi genus, vt aliqui seducti mēdosis Dioscoridis
exemplaribus credunt. Nam quòd plerique nomi-
na harū duarum plantarum confuderint, factum
subinde est vt multa adulterina, quæ scilicet tertij
generis Aixoo debentur, capiti de Portulaca sylue-
stri inserta sint, quæ omnia prorsus expungenda ve-
niunt, vt paulò pòst clarius monstrabimus. Hortē-
sem Germani simpliciter Burtzelkraut. sylvestrē
verò Vuil oder ackerburtzel vocant.

FORMA.

Hortēsi caules habet crassos, pingues, teretes, in
altum

altum erectos, lentè vergentes in puniceū, folia pingua, à tergo candida, flores exiguos luteos, semina nigra in herbaceis calycibus cōtenta Syluestris folia oleæ obtinet, minora tamen multò, numerosiora & tenera, rubentes cauliculos ab vna radice multos in terra sessiles, qui commanducati succo abundant, glutinosiq; & sapore salsi sunt. Hæc est genuina apud Dioscoridem Portulacæ declinatio, reliqua verò omnia sunt adulterina, & ab imperito aliquo rerum ex capite de tertio Aixoo excerpta, & huic sine omni iudicio inserta.

LOCVS.

Provenit in hortorum areolis, vineis, & aliis cultis locis, hortensis. Cæterū syluestris in petrosis & incultis etiam nascitur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus carpēda folia & flores: semen verò sequentibus.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat vtraque quidem, in tertio ordine à temperatis ac mediis, humectat verò in secundo. Quare viribus etiā non distant: hinc quæ in Dioscoride leguntur non sunt propriae, sed Aixoi tertij generis, & à sciolo aliquo temere Portulacæ syluestri attributæ.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Portulaca vim habet adstrictoriam. Cū polenta illita, capitis doloribus, oculorū inflammationibus,

PLANTARVM HISTORIAE

& aliarum partium, stomachi ardoribus, erysipelatis. & vesicæ dolorib. auxiliatur. Commāducata dentium stuporem, stomachi & intestinorū aestuationē fluxionesq; sedat. Renes erosos & vesicā adiuvat. Veneris impetus exoluit. Pari effectu et succus eius prodest potus, & in febribus etiam valēs. Contra rotundos lumbricos, sanguinis excreationē, dysenterias, hæmorrhoidas, pfluvia sanguinis percocta efficax. Contra Sepis morsus. Ocularib. medicamentis vtiliter commiscetur. Intestinis fluxione laborantibus, aut vulua erosionē affecta infunditur. Contra dolores capitis ex vstione cum rosaceo, aut oleo ex alto destillatur. Exanthemata in capite cum vino exterit. Vulneribus ad syderationem spectantibus ex polenta illinitur.

EX GALENO.

Portulaca frigida & aquea tēperamento est, pauca cuiusdā austeritatis particeps. Proinde fluxiones reprimit, maximē biliosas & calidas, cum eo quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Hac ratione & aestuantes, vt si quid aliud, adiuvat, tū vētris osculo imposita. tum totis hypochondriis, potissimū in hecticis febribus. Præterea dentium stuporem sanat, nepe quæ ab acidorū contactu asperè exiccata fuerant, leniens atque replens, vtpote cū viscosam habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaq; non foris modò impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanē

Et toti herbae comesae accidit. Quoniam autē adstringit, vtiliter dysentericis editur, & in muliebri profluio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hanc multò quidem efficacior est herbae succus.

EX PLINIO.

Portulacae memorabiles vsus traduntur. Sagittarum venena & serpentium haemorrhoidum & praesterum restringit, pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Itē hyoscyamo potō, è passōq; expresso succo. Cum ipsa nō est, semen eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum vitis, capitis dolori, vlcerebusq; in vino tusa & imposita. Reliqua vlcera cū melle cōmanducata sanat. Sic & infantium cerebro imponitur, vmbilicoq; prociduo. In epiphorīs verò oīm, fronte tēporibusq; cū polēta. Sed ipsis oculis, è lacte & melle. Eadē, si procident, prodest, foliis tritis cū corticibus fabae. Pustulis cū polenta & sale, & aceto ac cera. Et vlcera oris tumoremq; gingivarū cōmanducata cruda sedat. Itē dentium dolores: Tonsillarum vlcera succus decoctae. Mobiles dentes stabilit cōmanducata. Cruditates sedat, vocemq; firmat, & sitim arcet. Cervicis dolores cū Galla & Lini semine pari mēsurā sedat. Mammarum vitia cum melle aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachū in acetariis sumpta corroborat. Ardentibus febrib. imponitur cum polenta. Et aliās manducata refrigerat etiam intestina. Vomitiones sistit. Dysenteriae

PLANTARVM HISTORIAE

& vomitis datur ex aceto, vel bibitur cū Cumino.
 Tenasmi autē cocta, & comitialib. cibo vel potu
 prodest. Purgationib. mulierum, acetabuli mensura
 in sapa. Podagris calidis, cū sale illita, et sacro igni.
 Succus eius potus renes inuat & vesicas. Ventris
 animalia pellit. Ad vulnerū dolores, ex oleo cū po-
 lenta imponitur. Nervorū duritias emollit. Venerē
 inhibet, Venerisq; somnia. Prætorij viri pater est,
 Hispaniæ princeps, quem scio propter impatibiles
 vna morbos, radicem eius filo suspensam è collo ge-
 rere, præterquam in balneis, & ita liberatum in-
 commodo omni. Quinetiam inueni apud autores, ca-
 put inde litum destillationem toto anno non senti-
 re. Oculos tamen hebetare putatur.

DE ASPHODELO. CAP. XL.

Asphodelus mas Dioscoridi scriptus, no-
 bis est frequens folio porraceo, radicibus
 glandium magnarū effigie multis simul
 agnatis, porcorū cibus. NOMINA.

Affodillus Ἀσφόδελος Græcis, Asphodelus Latinis, Of-
 ficinis corrupta voce Affodillus, Germanis
 Golduurtz (gallicè Haste Royale) nominatur.

GENERA.

Duo Asphodeli genera. Duo esse Asphodeli genera, utcumque vno cōten-
 tus sit Dioscorides, testatur Plinius libro xxi. cap.
 xvij. marem nimirum & fœminam. Mas propriè
Albucus. Albucus nominatur, fœmina verò Hastula regia,
 quod scilicet dum floret, prorsus regij sceptri effigie
 referat.

referat, Germanicè Golduurtz. Marem depingit
 Dioscoride., Radicem eius acrem atque adeo ci-
 bo inutilem esse tradit. Fœminæ Theophrastus lib.
 vij. de historia plantarū cap. xij. & Hesiodus men Hesiodus
 tionem facere videntur, quandoquidem eius vsum fœminæ
 in cibo quotidianum fuisse scribant. Hoc enim de mentionē
 mare dici haud posse, radicis mirifica acrimonia fecisse vi-
 facit. Galenus etiam lib. secundo de aliment. facul. datur.
 Asphodelon fœminam cognouisse videtur, dum scri-
 bit, Asphodeli radicem Scyllæ radici, magnitudi-
 ne, figura & amaritudine quadantenus similē esse.
 Hæc enim de Dioscoridis Asphodelo verè dici non
 possunt, cuius quidem radix nō Scyllæ, sed Pæoniæ
 potius similis est. Denique non est vt fœminæ ama-
 ra, sed acris. Neq; obstat quòd nostra Hastula re-
 gia tantā amaritudinē, quantā ei Galenus tribuit,
 nō habeat. Nā neque ea quā Hesiodus suo carmine
 tātopere celebravit, tanta prædita fuit amaritudi-
 ne: aliās enim citra cocturā multam, cuius tamen
 ille non meminit, cibo quotidiano idonea esse nō po-
 tuisset. Et certè vt Aron non in omnibus regionibus
 parē acrimoniam obtinet, ita nec Hastula regia pa-
 rē amaritudinem omnib. in locis sortitur. Adcò vt
 dubiū non sit Hesiodum de nostra Asphodelo, quæ
 fœmina est, loquutum esse. De fœmina autē loquu-
 tum esse Hesiodum, confirmat quòd alibi tradat in
 syluis nasci Asphodelū. Quod certè de ea quā fœmi-
 nam fecimus, rectè dici potest, quando raro alibi
 quàm

PLANTARVM HISTORIAE

quàm in syluis nascatur. Sententiã nostram firmas-
re videtur Apuleius ille, qui in libro suo de herbis
inscripto, seorsim & Asphodelum, & hastulã re-
giam describit. F O R M A.

Asphode- Asphodelus mas folia habet Porro maiori simi-
lus mas. lia. Caulem leuem in summo florem ferentem An-
thericum vocatum. Radices sublongas, rotundas,
glandibus similes, gustu acres. Nos marem hac vice
Fœmina. habere non potuimus. Fœmina folia habet oblõga,
angusta, leuiter lenta, Plantagini minori non dissim-
ilia: caulem leuem, in summo non vnum, sed plu-
res flores pingues retrorsum incuruos, plenos puni-
ceis maculis, radicem itidem bulbosam, capillis Al-
lij instar multis sub bulbo enascentibus, comatam,
gustũque glutinosam.

L O C V S.

Mas nõ provenit in Germania, nisi in hortis cul-
ta & plantata Fœmina verò in montibus & syl-
uis sua sponte ac copiosè nascitur.

T E M P V S.

Iunio mense florent.

T E M P E R A M E N T V M.

Maris radix calida & sicca est. Fœminæ folia
cũ amara nonnihil sint & acria, itidẽ calida &
sicca esse, quemadmodum etiam radicem, constat.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Radices Albuci vim calefaciendi obtinēt, vrinas
& menses potè mouent. Lateris doloribus, tussibus,

conuul-

convulsionibus, ruptionibus, drachmæ pondere ex vino potæ medentur. Commanducata astragali mē sura vomitiones adiuvat. A serpēte demorsis datur vtiliter trium drachmarum pondere. Illinire autē oportet morsus foliis, radice, & floribus cum vino. Item vlcera sordida, & depascentia. Mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula & furunculos, decocta in vini facie radice: ad recētes autē inflāmationes cū polenta. Radicis succus, adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquā vtile fit oculis medicamentū. Ad purulentas aures per se, & cum thure, melle, vino, & myrrha tepesactus prodest. In contrariā aurē per se infusus dentiū dolorē mitigat. Cinis è radice cremata illitus, alopecias capillis explet. Oleū in excavatis radicibus igni decoctum, illitum exulceratis pernionibus, & ambustis igni conducit. Dolori aurīū instillatus auxiliatur. Cādidā vitiliginē linteo antea perfrictā in sole, illita radix emendat. Semē & flores in vino poti, scolopendræ & scorpionum venenis egregiē aduersantur. Aliū quoq; deiiciūt.

EX GALENO.

Asphodeli radix utilis est, perinde atque Ari, Asævi & Dracontii. Extergentis siquidem & discutiētis facultatis. Vstæ tamen cinis calidior, & exiccantior, magis tenuium partium, & ad discutiendū potētior efficitur, propterea & alopecias sanat. Inest itaq; ei extenuandi facultas, atque obstructa demoliendi,

PLANTARVM HISTORIAE

demoliendi, veluti etiam Dracontio. Ideoq; ipsius
cauliculus arquatis tanquam summum præse-
dium exhibetur. EX PLINIO.

Defectis corporib. & phthisicis constat bulbos
eius cum ptisana decoctos aptissimè mederi, panēq;
ex his cum farina subactum saluberrimū esse. Ni-
cander & contra serpentes & scorpiones, vel caulē
vel semē, vel bulbos dedit in vino tribus drachmis:
substrauitq; somno contra hos metus. Datur & cō-
tra venenata marina, & contra scolopendras ter-
restres. Folia quoque illinuntur, venenatorum vul-
neribus ex vino. Bulbi neruis articulisq; cum polen-
ta tusi illinuntur. Prodest & concisis ex aceto liche-
nas fricare. Item vlcerib. putrescentibus ex aqua
imponere. Mammarū quoque & testium inflāma-
tionib. Decocti in facie vini, oculorū epiphoris sup-
posito linteolo medentur. Folijs in quocūq; morbo de-
coctis magis medici vtuntur. Itē ad tetra tibiarum
vlcera, rimasq; corporū quacūque in parte, farina
arefactorū. Succus quoque ex tuis expressus, aut
decoctus, utilis fit corporis dolori cum melle. Idem
odorem corporis incundū affectatibus, cū Iri arida
& sale exiguo. Folia etiā supradictis medentur, &
strumis, panis, vlceribus in facie, decocta cū vino.
Cinis è radice alopecias emendat, & rimas pedū.
Decoctæ radicis in oleo succus, permiones & ambu-
sta. Et ad gravitatem aurīū infunditur. A cōtraria
aure in dolore dentium. Prodest & vrine pota mo-
dicè

dicè radix, & menſtruis, & lateris doloribus. Item ruptis, conuulſis, tuſſibus drachmæ pondere in vino pota. Eadem & vomitiones adiuvat cõmanducata Semine ſumpto turbatur venter. Chryſermus & Parotidas in vino decocta radice curauit. Itẽ ſtrumas admixta cachry ex vino. Quidam aiunt, ſi impoſita radice pars eius in fumo ſuspendatur, & quarta die ſoluatur, vnà cum radice areſcere ſtrumã. Sophocles ad podagras vtroq; modo, cocta crudaq; vſus eſt. Ad perniones decoctã ex oleo dedit, et ſuffuſis felle in vino, & hydropicis. Venerẽ quoque concitari cũ vino & melle perunttis, aut bibentib. tradiderunt. Xenocrates & lichenas & pſoras, radice in aceto cocta tolli dicit. Itẽ ſi cocta ſit cũ hyoſcyamo & pice liquida, alarũ quoque & feminũ vitia. Et capillũ criſpiorem fieri, raſo prius capite, ſi radice ea fricetur. Lapides renũ in vino decocta atque pota eximit. Hippocrates ſemẽ eius ad impetus lienis dari cenſet. Iumentorum quoque vlcera ac ſcabie, radix illita, aut decocta ſuccus ad pilum reducit. APPENDIX.

Animaduertendum facultates à Dioſcoride & Galeno commemoratas, Albuco ſeu Aſphodelo mari conuenire, huius enim radix gultu acris eſt. Quæ verò à Plinio recensentur, hæ partim mari, partim ſceminæ debentur. Fœminæ, cuius radix & folia glutinoſa & amara ſunt, vlcera glutinandi, ſcabie, rimãſque corporum, & ſi quæ ſimiles ſunt facult.

facultates conueniunt, quas periti methodi simplicium medicamentorum faciliè discernent. Experientia etiam quotidiana testatur, huius vsum esse in vlceribus malignis salutarem. Quæ autem mari sint tribuendæ, ex Dioscoride, Galeno, & gustu quiuis deprehendere poterit. Nos in transcurso tantum parum attentos monere volumus, ne indiscriminatim & promiscuè vtrique generi has facultates inesse putarent.

DE ATRAPHAXI. CAP. xli.

Atriplex nomen retinet, aliis Bonne dame, & Preudefemme dicitur.

NOMINA.

Aτράφαξις, ἢ χρυσολάχανον Græcis, Atriplex Latinis et Off. cinis, Germanis Miltē, oder Miltē. (Gallis Des Arroches, ou Des bonnes dames) nominatur. Atraphaxis Atticis dicitur int mutare frequenter amantibus, dicta est, quod ἄδρωσ ἄυξει, id est, statim in amplitudinem adole scat. Siquidem octauo à satu die profilit, cō festimq; incremento proficere videtur. Fidem celeris augmenti facit creptum in consinio ceteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eā nasci quicquam tradunt, nisi languidum. Chrysolachanon verò, id est, aureum olus dixerunt, à lutco quem profert flore.

GENERA.

Duo Atriplicis sunt genera, satina seu hortensis,

Atraphaxis quare dicta.

Chrysolachanon.

& sylueſtris. Satiuam ſimpliciter Germani Molten, ſylueſtrẽ verò cum adiectione aliqua, Vuild molten oder Ackermolten, oder Kleinſcheiſzmilten nominant.

FORMA.

Hortenſis caulem fundit quadratum, ramis brachiatum, quibus primum flores lutei exigui, dein foliatum ſemen & obductum cortice promitur. Radicem vnã habet in altum deſcendentem, nõ glabram, ſed fibris quibuſdam capillatam. Sylueſtris tam luxurioſa proceritate prodiit, vt quaternos ſæpe cubitos excedat: caule vt hortenſis anguloſo, ramoſo, & purpuraſcente: folio hortenſi non admodum diſſimili, potiſſimum quòd ad colorem attingit: flore luteo exiguo, ſemine racematim congeſto, radice ſimplici in altum deſcendẽte, ex qua ſe multa promunt. LOCVS.

Atriplex hortenſis.

Sylueſtris

Hortenſis non niſi ſata prouenit. Sylueſtris ſua ſponte naſcitur. Vtraque autem aſſiduo humore ſatiari amat. TEMPVS.

Vtraque Iunio & Iulio menſibus floret, deinde ſemen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Atriplex humida in ſecundo ordine, frigida autem in primo. Hortenſis tamen ſylueſtri humidior frigidiorque exiſtit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eſtur olerum modo elixum. Aluum mollit. Crudum

PLANTARVM HISTORIAE

dum vel coctum illitum panos discutit. Semen eius potum cum aqua mulsa morbum regium sanat.

EX GALENO.

Atriplex celeriter, ob lubricitatem, ventrē permeat. Parum autem omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatem. Phlegmonis & phlegthlis quidem incipientibus, crescentibus, & mollibus adhuc, ac veluti feruentibus, hortensis: vigentibus verò, declinantibus, & indurescentibus commodior est sylvestris. Semen eius abstergentis est facultatis, proinde ad morbum regium ex iccoris obstructione prognatum utilis est.

EX PLINIO.

Coquitur difficillimè. Addidere Dionysius & Diocles, plurimos gigni ex eo morbos, nec nisi mutata sepius aqua coquendum: stomacho contrarium esse, tētigines & papulas gignere. Hippocrates vularum vitiis id infundi cum Beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendum dedit. Panos, furunculos incipiētes, duritias omnes, vel cocto vel crado illini utiliter putant. Item ignem sacrum, cum melle, aceto, nitroque. Similiter podagris. Ungues scabros detrahare dicitur sine vlcere. Sunt qui morbo regio dēt semen eius cū melle, arterias et tonsillas nitro addito perfricent, aluum moueant, cocto aut per se, aut cum malua, aut lenticula concitantes vomitiones. Sylvestri capillos tingunt, & ad supradicta vtuntur medicina.

EX

EX SIMEONE SETHI.

Ventrem quidem cit, prodest ad caliditatem ic-
coris, ac ictericis, & calidam temperaturam habē-
tibus succurrit. Cōmodissima autem biliosis. Cum
malua illita inflammationes sedat.

DE ATRACTYLIDE.

CAPVT XLII.

Atractylus mitior frequens in viis flore
Cnici, sed pallidiore. Atractylis hirsutior car-
duus benedictus, nobis hodie duplex.

NOMINA.

Aτρεκτυλῖς, ἢ κνίνος ἀγρία Græcis: Atractylis, Cnicus sylvester Latinis dicitur. Atractylis unde
Etylis autem ideo dicta, quod ea antiquæ mulieres dicta Syl-
pro fuso utebantur: ἀτρεκτος enim fusus est Græ-
cis. Sylvestris verò Cnicus, quia Cnico urbano si-
milis est. Cnicus.

GENERA.

Sylvestris Cnici seu Atractylidis, Plinio lib. xxi.
cap. xv. & Theophrasto libro vi. cap. iij. autori-
bus, duæ sunt species. Vna mitior, & Cnico satiuo Atractylis
similior. Hanc propriè Græci Atractylida, Latini Atractylis propriè
verò fustum agrestem, aut colum rusticam, quod e-
ius caule rigido admodum & exili, veteres mu-
lieres pro colo, ut dictum est, utebantur, nomina-
bant. Sunt qui Cartamū sylvestrē appellant. Ger Cartamane
manicè itaque vocetur Vuilderfeldsaffran (Gal mus syl-
licè Vne espece de Chardon ayant la feuille
jaune, ou du saffran batard,) ut hac ratioe di-
scernatur

Carduus benedictus. scernatur à Cnico, quē aliqui Cartamum, & Crocū hortensem nominant. Altera hirsutior, caules & folia Soncho non aspera similia habens, quæ Officinis omnibus & vulgò Carduus benedictus nuncupatur. Germanicè Cardobenedict Bornuurtz, oder Gefegneter distel vocatur.

FORMA.

Atractylis propria dicta. Spina est Cnico similis, in summo autem virgularum folia multò longiora habens, caulem magna ex parte nudum, asperumque, quo etiam mulieres pro fuso vtuntur. Capitula in cacumine aculeata, florem pallidum, radicem tenuem, inutilem. Ex qua sanè descriptione omnibus perspicuum esse putamus, spinam quam pictam exhibemus esse Atractylida, quod Cnico sativo similis admodum sit, & in cacumine virgularum folia quàm Cnicus longior habeat, caulem denique magna ex parte nudum, autumnipotissimum tempore, quo folia sua sponte decidunt, & minimè leuem, sed asperum striatumque obtineat. Idem etiam rigidus & exilis est, vt fusi vsum præbere queat. Summitati quoque eius capitula insident spinosa, flos illi pallidus, radix tenuis: & in summa, nulla est nota quæ huic non respondeat. Carduum autem benedictum vulgò nominatum esse alteram Atractylidis speciem, ex Theophrasti & Plinij verbis ostendi potest: hirsutus enim est, caulibus Soncheis, humani ferè reptantibus: propter sui enim mollitiem
veluti

Carduus benedictus.

veluti sessilis caducusq; solo procumbit, semine minuto, frequenti, amaro, & pilis barbato, quod molli lanugine operitur. Flos ei pallidus luteusve.

LOCVS.

Mitior Atractylis in aruis & montibus, hirsutior autem in hortis iam passim prouenit.

TEMPVS.

Prior Augusto mense apparet, eius tamen semē ante autumnum non maturescit. Posterior citius nascitur, eius tamen semen serò etiam ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Gustu cum amara sint spinae hae, euidentissimum est calido & sicco temperamento esse praeditas, id quod ex earundem etiā facultatibus colligi potest.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Atractylidis folia, coma & semen trita cum pipere vinoque pota, cōtra scorpionum ictus prosunt. Sunt qui dicant à scorpionibus percussos, quamdiu teneant eam herbam, non sentire dolorem, deposita verò, dolore affici.

EX GALENO.

Atractylis aut Cnicus sylvestris. Haec planta ex spinarum est genere. Facultatem habet desiccandi, & modicè digerendi.

APPENDIX.

Prima spina in sanādis vlcerib. & fistulis diuturnis efficacissima est. Altera quā Carduū bene-

k ij dictum.

dictum vocant, obstructions internorum viscerū tollit, urinam mouet, calculum frangit, vlcera, potissimum pulmonis, sanat. Percussis à feris venenatis medetur. Negant etiā pestis experiri contagia, qui aut cum cibo, vel potu præsumpserit. Iā quoque correptis magno fore remedio sibi vulgus persuasit. Ex quibus etiam omnibus fit perspicuum, easdem quæ veteres Atractyli tribuerunt, utraque spinā habere facultates. Item herbam quam Carduum benedictum vocant, contra serpentum & scorpionum morsus valere omnibus in confesso est: quā sanè facultatē cum Atractyli etiam assignet Dioscorides, consequitur ab eadem diuersam non esse. Recentiores Carduum benedictum contra capitis vehementissimos dolores, vertiginem, memoriā amissam, in cibo aut potu sumptum valere tradunt. Itē ad putrescentia vlcera, mammarum potissimum, si in puluerem reductus inspergatur.

DE ANGELICA. CAP. XLIII.

Angelica satua Parisiis frequens, sylvestris desideratur. NOMINA.

Angelica
non est
Smyrniō,
neque Silphion.

NUnquid veteribus cognita fuerit hæc herba, & quo nomine appellata sit, nondū scire licuit. Neque enim Smyrnon est, quod scilicet vmbellam Anethi & semen rotundum, aliāque multa que descriptio requirit, nō habeat. Silphion etiam esse haud poterit, quod folia Apii habere minimè deprehēdatur. Recentiores autē vno ore omnes Angelicam

gelicam, & sancti spiritus radicem, à suauissimo Sancti spi-
eius radiceis odore, quem spirat aut ab immensa cõ- ritus ra-
tra venena facultate, appellant. Germanis Ange- dix cur
lick oder des Heiligen geyst vurtz, oder dicta.
Brustuurtz (Gallicè Angelic) vocatur.

G E N E R A.

Duo eius herbe inueniuntur genera. Vna enim Hortēsis.
mitior est, cuius quidē radix valde odorata, à Ger- Sylvestris.
manis Zam Angelick nominatur. Altera sylue-
stris, eius radix suauis odore destituitur, & à Germa-
nis vilde Angelick nominatur.

F O R M A.

Caulem profert duūm cubitorum, concuum: fo-
lia oblonga, per ambitum serrata, subnigra: flores
in purpura candidos, semen latum, foliaceum: radi-
cem crassam & multam, foris nigricantem, intus
candidam.

L O C V S.

Mitior in hortis plantata prouenit, & in mōtosis
etiam nonnullis locis, perinde atque sylvestris.

T E M P V S.

Iulio & Augusto mensibus floret.

T E M P E R A M E N T V M.

Calefacientem & desiccatoriam vim in tertio
ordine ei assignant herbarii recentiores.

V I R E S.

Aperit, extenuat, discutit, vt recentiores perhi-
bent Vnicè venenis aduersatur. Pestilentie popu-
latim senientis arcet contagia. Corpora à lue pe-
k iij sifera:

PLANTARVM HISTORIAE

stifera vindicat, si tātūm, vt affirmāt, in ore teneatur. Per hyemē ciceris magnitudinē cum vino, per aestatem ex stillatio rosarum liquore sumpsisse satis est. Nec sensurum eo die contagionem pollicentur, quo quis deuorarit: nā vrina & sudore venenū abigit. Lentitiā pituitæ digerit, quapropter tussi, quā figus attulerit, medetur. Crassa quæ in thorace coierint, discutit. Herba ipsa in vino & aqua cocta, vulnera interna glutinat. Concretum sanguinem resoluit, stomachum esu corroborat. Cor recreat. Pituitam ventriculi deiicit, fastidia ciborū discutit, & elanguescentem inuitat appetentiam. Rabiosi canis morsu, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum ruta & melle folia indantur, dein cocta in vino bibantur. Libidinem extinguit ore ieiuno sumpta. Lassitudines reficit, thoracem expurgat. Supra febricitantis caput imposita, fertur ad se feruorem elicere. Valere cōtra fascinationes adfirmant, si quis eam secum gestarit.

DE AER A. CAP. XLIIII.

Lolium tuum est Githago & Nigella vulgaris, aliis iurea Gallis dicta.

NOMINA.

Officinae
vñ error.

Aieg, ἡ θύαρος, ἡ ζιζάνιον Græcis: Lolium Latinis dicitur. Officinae nonnullæ, non sine magno errore, pro Melanthio seu Nigella vtuntur, vt non temere etiam Pseudomelanthion dici queat. Germanis Ratten, oder Kornnegele (Gallicè yuraie,

yuraie, ou Gasse,) apellatur.

F O R M A.

Folio constat angusto, Theophrasto lib. viij. de Plantarum historia, cap. vij. teste, pingui & piloso, flore subpurpurco, semine exili in siliqua hispida, vel vt Plinius ait, in cortice aculeato. Ex qua siquidē descriptione satis perspicuum fit omnibus, Pseudomelanthion hoc esse Lolium, folia nanque Pseudo-Porri habet, oblonga, hirsuta, florem purpureum, melanthio semen in pilosa, longa, angulata, ac per intervalla est Loliū. striata siliqua. Et vt paucis singula complectar, hordeo, cuius vt reliquarum frugum pestis & vitium est, tota effigie non dissimile est.

L O C V S.

Non solum in triticea & hordeacea, sed in omni ferè alia segete per se prouenit. Frugum acerba pestis, idcōque à Vergilio infelix appellatum.

T E M P V S.

Iunio mense floret, & subinde semen profert.

T E M P E R A M E N T V M.

Desiccat & calfacit efficaciter, vt propinquum sit acribus magis quàm Iris: sed nō est perinde vt illa tenuiū partium, verū multum abest. Secūdu hoc ponat ipsum quisspiā in principio tertii ordinis excalefacientium, in fine verò secundi exiccantiū.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Lolium molitum nomas, putredines, & gangrenas cum raphanis & sale illitum compescit. Feras

PLANTARVM HISTORIAE

impetigines, & lepras cū sulphure viuo & aceto sanat. Strumas quoq; cum fimo columbino & lini semine in vino decoctum discutit. Quæ agrè matiorantur rumpit. Decoctum ex aqua mulsâ & illitū, ischiadicis prodest. cum polenta, aut myrrha, aut croco, aut thure suffitum, conceptiones adiuvat.

EX PLINIO.

Lolium molitum ex aceto coctum impositumq; sanat impetigines, celerius quo sæpius mutatū est. Medetur & podagris, aliisq; doloribus cum oxymelite. Curatio hæc à cæteris differt. Aceti sextario vno dilui mellis uncias duas iustum est: ita temperatis sextariis tribus, decocta farina Lolij sextariis duobus vsque ad crassitudinem, calidūque ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa fracta. Magis etiam cæteris purgat vlcera vetera, & gangrenas. Cū raphano & sale & aceto lichenas. Lepras cum sulphure viuo. Et capitis dolores cum adipe anserino imposita fronti. Strumas & panos cōcoquit cum fimo colūbino, & lini semine decocta in vino.

APPENDIX.

Iam commemoratas facultates huic etiam herbe, quam Germani Ratten nominant, recentiores tribuunt. Mirificè enim hanc in sanandis impetiginibus, aliisque scabiei generibus commendant. Itē in vulneribus glutinandis, ac fistulis curandis, compescendōque sanguine, eius esse vsum tradunt, ut
hinc

hinc etiam liqueat hanc ipsam à Lolio non esse diuersam.

EX SIMEONE SETHI.

Vim æqualem Iridi obtinet.

DE ASCLEPIADE. CAP. XLV.

Asclepias in syluis frequens.

NOMINA.

Aσκληπιάς Græcis, Asclepias Latinis, her- Asclepias
baris Hirundinaria, Officinis Vincetoxicū, unde di-
Germanis Schuualbēuurtz appellatur. Asclepias etā Hirū
autem ab Aesculapia antiquo medicinae autore no dinaria.
minata est. Hirūdinaria verò à siliquis quas pro Vinceto-
ducit, quæ dehiscences plumosum semen ostendūt, xicum.
atq; adeò hirundinis effigiem referunt. Vincetoxi-
cū, vel rectius *ἡν Γεῖκόρ* haud dubiè dicta est,
quòd illi insignis aduersus venena vis sit, vt paulò
pòst fusius docebimus.

FORMA.

Ramulos profert longos, in quibus folia longa
Hederae similia. Radices numerosas, tennes, odora-
tas. Flores grauitè olentes. Semen Securidacæ seu
Hedysari. Ex qua delincatione nemini non perspi-
cium sit Vincetoxicum appellatam herbam, esse
Asclepiada. Fruticosa siquidem herba est, caulem
obtinens rotundum, leuem, tenuem, ac ferè iuncē,
ramulis longis, folio hederaceo, sed oblongiori, in vi-
ridi nigricante, floribus exiguis, candidis, aut ve-
rins

PLANTARVM HISTORIAE

rius in albo pallescentibus, grauiter odoratis, ex quibus siliquæ oblongæ sunt, quæ dehiscentes semē plumosum Securidacæ simile, hoc est, rufum & latum ostendunt, radicibus multis, exiguis, tenuibus, & odoratis, adeo ut nulla sit prorsus nota quæ illi non respondeat aptissimè. His accedunt locus natalis & facultates, quæ singula cū Asclepiade illi communia sunt, quemadmodum ex iis quæ statim subiiciemus manifestissimum fiet.

LOCVS.

Prouenit in mōtibus asperis, altis ac arenosis. Copiosissimè autem nascitur in monte haud procul à Tubinga sito, in quo olim arx posita fuisse fertur.

TEMPVS.

Augusto mense floribus abundat, ac subinde semina in folliculis oblongis, formam hirundinis cū dehiscent referentibus profert.

TEMPERAMENTVM.

Asclepias, Paulo teste, calida, sicca, & tenuis substantiæ est. Quo sanè temperamento Hirundinaria etiam prædita existit: amara siquidem & parum glutinosa eius est radix, folia verò aliquā præ se ferunt adstrictiencem: ut iterum euidenter appareat, Hirundinariam esse Asclepiada.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radices cum vino potæ, torminibus, & venenatorum morsibus subueniunt. Folia verò illita maleficiis in mammis & utero vitiis opitulantur.

Ex paulo.

EX PAVLO.

Torminibus in vino pota competit. Illita verò venenatorum morfibus, & malignis mammarum & vteri vitiis succurrit.

EX PLINIO.

Radices torminibus medentur, & cōtra serpentium ictus non solum pota, sed etiā illita prosunt.

APPENDIX.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mēsum prouocationem vtuntur, & ad rabidi canis morsum, venenisq; potenter resistere affirmant, unde etiam haud temere Viatrix toxici ab iisdē apellata est. Viatrix
Hydropicis etiam radicē in vino mace-
ratam & subinde coctā, mirificè auxiliari tradūt. toxic.
Flores præterea foliaq; siccata, mox trita, vulneribus utiliter inspergi aiunt. Sordida etiam vlcera purgare, & ad cicatricē perducere, genitaliūque vitiis & rupturis egregiè mēderi docent. Quæ in vniuersum omnes facultates cū iis quas Asclepias obtinet pulchrè quadrāt, vt eandē esse Hirundinariā vocatā herbā, nullus deinceps dubitare debeat.

DE APIO. CAP. XLVI.

NOMINA.

Aπιος, ἢ ἰχας, ἢ χαμουβοάλευος Græcis: Apios, Raphanus sylvestris Latinis dicitur. Officinis icognita. Germanis Erdnusz, Erckelē, Erdfeigē, & Erdmandel, (Gallicè Vne Raue sauuage, ou vne rayfort sauuage) appellatur.
Apion

Apios cur *Apion* verò dixerunt Græci, quod radicis extremū dicta. in pyri formam turbinatur. Eadem etiam ratione *Ischas*. *ischas* & *chamebalanos* ab iisdem nominata est, *Chamæ* quod in ficus, vel glandis effigiem radicis extremū *balanos*. turbinetur. Quapropter non ineptè Latinis etiam *glans* aut *ficus*, seu *carica sylvestris* nominabitur.

FORMA.

Ramulos duos aut tres iunceos, tenues, rubentēsq̃ que profert, qui supra terram parum se attollunt, Folia rutæ similia, longiora tamen, & virentia. Semen exiguum. Radicem *Asphodelo* similem, & ad pyri figuram accedentem, rotundiorē tamen, & liquore plenam, intus candidam, foris nigro cortice tectam. Hæc *Dioscorides*. Alij adiiciunt *Apio* habere tenues capreolos, florem *Piso* non dissimilem, sed longè minorem. Quæ singula satis declarant herbam cuius picturā exhibemus, esse *Apion*: ramulos enim magnā ex parte duos, vel ternos, imò vt *Theophrastus* ait, quaternos, & interdum plures emittit, iunceos, tenuēsq̃, & infima parte rubentes, qui supra terram parum se extollunt. Folia quoque Rutæ habet, at longiora & virentia. Semen etiam exiguum. Radicem denique *Asphodelo* mari similem, & ad pyri effigiem accedentē: quod tamen non de tota radice, quæ longissima est & tenuis, intelligendum venit, sed de extremis eiusdem, hoc est, nucibus seu glandibus ab ea dependentibus, pyri aut ficus formam habentibus, quolibus

libus etiā *Paeonia* fœminæ radix assimilatur. Sue
cosa quoq; radix est, intusq; candida. Quibus omni-
bus accedunt flores *Piso* similes, & mirificè odora-
ti, minores tamen: necnon capreoli tenues. Conue-
niunt etiam vires, vt ex sequentibus patebit. ita vt
prorsus nulla sit nota quæ reclamare videatur.

LOCVS.

Prouenit in frumentaceis agris, hordeaceis po-
tissimum, tritici & *zea*, quos interdum sues, ductæ
cupiditate eius radices, seu rectius nucum ex radi-
ce dependentium, prorsus euertunt. Atque hinc est
quòd panis porcineus à quibusdam nominatur.

Panis por-
cineus cur
dictus.

TEMPVS.

Floribus abundat odoratis admodū Iunio mēse.

TEMPERAMENTVM.

Apios temperatura calida est & sicca mediocri-
ter, id quod ex gustu facilè deprehenditur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Pars radices superior sumpta, vomitione bilem
pituitamque extrahit. Inferior per aluum. Tota
verò vtrinq; purgationes mouet. Succus eius ses-
quioboli pondere haustus, vtraque parte, hoc est,
suprà & infrà purgat. Cùm verò liquorem colligi-
gere volueris, tundito radices, coniectisque in cra-
terem aqua plenum misceto, tum penna collectum
qui supernabit liquorem siccato.

EX PLINIO.

Succus purgat vtraque parte sesquiobolo in a-
qua

PLANTARVM HISTORIAE

aqua mulsa. Sic & hydropicis datur acetabuli mensura.

APPENDIX.

Experientia testatur nuces has nauseam atque adeò vomitionem ciere, si quis illis vescatur.

DE ASTERE ATTICO.

CAP. XLVII.

Aster Atticus tuus hic non cognitus.

NOMINA.

Aστὴρ ἁττικὸς, βεβώνιον Græcis: Aster Atticus, Inguinalis Latinis dicitur. Officinis ignota herba. Germanis Sternkraut, (Gallicè Du petit Muguet) commodè appellari potest. Asteris autē nomē, nō à foliorū in caulibus, sed in floribus potius figura & situ, accepit. Siquidem foliorū in huius herbæ flore numerus & forma, stellā præ se ferunt, vel ut Plinius ait, capitula per ambitū diuisa foliis pusillis, stellæ modo radiata sunt. Errant itaq; qui singula folia in caulibus stellæ formam repræsentare putant. Buboniū & Inguinalis, quod inguinum præsentaneum sit remedium, dicta est.

Inguinalis.

Aster vn= de dicta.

Inguinalis quare appellata

FORMA.

Cauliculus lignosus, purpureum & luteum in summo florem habens, veluti Chamæmeli capitulum, vndique per orbem incisuris diuisum, foliolis stellæ similibus. Quæ verò circa caulem sunt folia, oblonga & densa hirsutave. Ex qua quidem delineatione omnibus perspicuum sit, herbam cuius præterit

etiam

*fluram exhibemus, esse Aſtera atticum. Nam cau-
lis eius lignoſus eſt, foliis veſtitus oblongis & den-
ſis, in cacumine flos illi purpureus & luteus, ſtellæ
modo radiatus, qui ſubinde in pappos abit: radix
fibris multis capillata.*

LOCVS.

Nascitur in collibus, montibus altis, & ſyluis.

TEMPVS.

*Auguſto menſe vt plurimum floret, durantq; in
magnam autumnii partem eius flores.*

TEMPERAMENTVM.

*Mixta eſt potentia, vti roſa: refrigerat enim, nō
tamen vehementer, & digerit atq; exiccat, quōd
ſcilicet illi amara inſit qualitas.*

VIRE. EX DIOSCORIDE.

*Aeſtuanti ſtomacho illita cōfert. Succurrit etiā
oculorum inflāmationibus, bubonibus, & proci-
denti ſedi. Tradunt partem in flore purpuream, ſi
bibatur ex aqua, angina correptis, & puerorū co-
mitialibus opitulari. Recens inguinū inflāmatio-
nibus illita prodeſt. Sicca ſiniſtra manu dolētis de-
cerpta, inguini adalligata doloribus liberat.*

EX GALENO.

*Non tantūm illitum, ſed etiam ſuſpenſum bubo-
nas ſanare creditur. Habet verò quiddam etiā di-
gerēs, vt miſtæ ſit facultatis, verūm id nō aſtrigit.*

EX PLINIO.

*Bibitur aduerſus ſerpentes. Sed ad inguinū me-
dicinam*

dicinā sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cin-
ctus alligari. Prodest & coxendicis dolori adallig-
gata.

DE AGROSTI. CAP. XLVIII.
NOMINA.

Aγρωσις Græcis, Gramen Latinis, Germanis
Grasz, (Gallicè Dent de Chien) appella-
tur. Gramen verò dictum est, quòd geniculatis in-
ternodiis mirificè serpat, à gradiendo, vel à gignen-
di fecunditate: siquidem crebrò ab iis novas spar-
git radices.

Gramen
vnde di-
ctum.

FORMA.

Geniculatis per terram serpit ramulis, & ab iis
dulces geniculatasq; radices spargit. Folia eius acu-
minata, dura, & vt parua arundinis lata, quæ in-
menta bouesque pascunt. Ex quibus verbis planum
fit omnibus, plantam hæc, cuius picturam damus,
esse veri graminis genus: geniculatis enim ramulis
per terram serpit, & ab iis dulces, geniculatas, &
exiguas admodum ac tenues radices spargit. E do-
drantalibus etiam ramulis circa vnumquenque ge-
niculum bina folia acuminata, dura ac lata emit-
tit. Floribus denique ad gramen Parnasi accedere
videtur, cædtdi enim sunt, & quinis distincti foliis,
& his ipsis dissectis: quibus decidentibus folliculi
rotundi lini instar, semine pleni exiguo, vt Parnasi
gramen, prodeunt. Adcò vt nemo sit qui nō videat
illi per omnia graminis respondere notas. Quare re-
prehens-

prehensione digni sunt, qui Euphrasiam esse putāt. Error quorundā scriptorū.

LOCVS.

Passim nascitur in vmbrosis locis, & dumetis. plasiario-
rum.

TEMPVS.

In fine ferè Aprilis floribus suis cādidis & elegantibus ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Radix graminis mediocriter frigida & sicca est, mordacitatem quandam exignam, & partium tenuitatem obtinens. Herba verò ipsa in primo quidem excessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate moderata. Semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso verò desiccatorium, & tenuiū partium & subacerbum.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Graminis radix trita & illita vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, & vrinæ difficultatibus. Calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit.

EX GALENO.

Radix cruenta vlcera glutinat. Caterum mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen frangere lapides asolet, si quis ipsam decoquens bibat. Semen autē alterius quidē imbecillum est, eius verò quod in Parnaso nascitur, vrinam eiet, & fluxus vētris & stomachi resiccat.

EX PAVLO.

PLANTARVM HISTORIAE

Gramen Parnasi maximè vtile est, siccatur, mo-
dicè refrigerat, tenuium partium, & subacerbum,
eoque vulnera cruenta glutinat, & decoctum eius
vesicæ calculos confringit.

EX PLINIO.

Decoctum gramen vulnera conglutinat, quod
& ipsa herba tusa præstat: tueturq; & ab inflam-
mationibus placat. Decocto adiicitur vinum ac mel:
ab aliquibus & thuris, & piperis, & myrrhæ ter-
tiæ portiones. Rursusque coquitur in æreo vase ad
dentium dolores & epiphoras. Radix decocta in
vino, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus,
ulceribusq; vesicæ. Calculos frangit. Semen vhe-
mentius urinam impellit. Aluum vomitionesq; si-
stis. Priuatim autem draconum moribus auxilia-
tur. Sunt qui genicula nouem vel unius, vel è dua-
bus tribusve herbis, ad hunc articulorum numerum
inuolui lana succida nigra iubeant, ad remedia stru-
mæ panorumve. Ieiunio debere esse qui colligat. Ita
ire in domum absentis cui medeatur, superuenien-
tiq; ter dicere, Ieiunio ieiunum medicamentum
dare, atque ita alligare, triduoq; id facere. Quod è
graminum genere septem internodia habet, effica-
cissimè capiti contra dolores adalligatur. Quidam
propter vesicæ cruciatus decoctum ex vino gramē
ad dimidias è balneis bibi iubent.

DE ALOE. CAP. XLIX.

Aloe in domibus frequens, Perroquet vul-
gò

Supersti-
tiosum.

gò dicitur, quod foliorum habitu & colore pſittacum viridem referat.

NOMINA.

Aλοή Græcis, Aloe Latinis appellatur. Officinæ veterem appellationem retinuerunt. Germani deſtituti peculiari nomenclatura, pariter Latinis Aloen vocant. Sunt qui hanc à craſſis foliis, & ſimilitudine quam cum Semperuino habet, Sēperuium marinum nominent.

Semper-
uinū ma-
rinum.

FORMA.

Scyllæ folium habet Aloe, craſſum, pingue, modicè latum, rotundum, repandūque. Folia vtrinq; gerunt ex obliquis aculeos raros, & breues. Caulē proferit Antherico ſimilem, florem album, ſemen Aſphodelo ſimile. Graui eſt tota herba odore, & guſtu amariſſima. Radice vna, pali in terram adaſti ſpecie. Noſtra pictura non niſi radicem & folia ob oculos ponit, reliqua hoc tempore habere nō potuimus. Dabimus autem operam, modò Deo ſic viſum fuerit, vt aliquando integræ plantæ picturam ſtudioſis exhibere liceat.

LOCVS.

Nāſcitur copioſiſſima in India, præpinguiſq; vna de ſuccus quoque deſertur. Prouenit etiam in Arabia Aſiaq; & in maritimis aliquot locis & inſulis, vt in Andro. Nunc in aliquot hortis germaniæ noſtræ plantatur,

TEMPVS.

l ij

Neque

PLANTARVM HISTORIAE.

Neque florem neque semen in stirpe nobis videre cōtigit, quare de iis quo nimirum proueniāt tempore, nihil certi monstrare possumus.

TEMPERAMENTVM.

Aloe calefacientium est primi ordinis intensi, aut secundi remissi, tertij autem exiccantium.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Duo sunt succi concreti genera. Vnum arenosum, quod sedimētum purissimæ Aloes videtur (hoc officinis Caballinum vocatur.) Alterū iecinoris modo coactum (Succotrinum barbari appellant.) Eligito puram quæ nihil doli sensit, sine calculis, splendentem, subruffam, friabilem, iecinoris modo cōcretam, facile liquefcētem, eximiæ amaritudinis. Reprobato autem nigram, & fractu contumacē. Est aloe vis adstringere, somnum conciliare, exiccare, corpora densare, aluum soluere, & stomachum purgare. Pondere cochlearium duorum aqua frigida, aut tepida pota, sanguinis excreationes sistit. Regiū morbum purgat trib. obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cū aqua, aut cocto melle excepta, aluum soluit. Triū drachmarum pondere perfectē purgat. Mixta aliis purgatoriis medicamentis, stomacho minus noxia eareddat. Siccata & insparfa, vulnera glutinat, et ulcera ad cicatricem perducit, compescitq;. Priuazim autē exulceratis genitalibus medetur, & rupta infantium præputia agglutinat. Condylomata,

rimasq;

rimasq; sedis cum passo mixta sanat. Sanguinis eruptiones ex hamorrhoidibus factas compescit. Digtorum redunias ad cicatricem perducit. Lioures et sugillata cum melle delet. Palpebrarum scabries, angulorūque prurigines lenit. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inuncta. Capillos fluentes cum vino compescit. Tōsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, ex melle & vino prodest. Torretur oculorum medicamentis in testa pura & cādente, rudiculāque subinde versatur donec equaliter torreatur. Lauatur vt quod est arenosissimum subsidat, tanquam inutile, & leue & pinguisissimum assumatur.

EX GALENO.

Hæc herba non admodum apud nos provenit: & quæ in magna nascitur Syria aquosior est, & facultatis imbecillioris: attamen vsque adeò desiccare potest, vt vulnere conglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Coelesyria & Arabia multo est melior. Optima verò Indici, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentum cognominatum Aloe, ad plurimas res propter siccitatem mordicationis expertem vtile. Est autem non simplicis naturæ, sed, vt indicio est gustus, adstringit simul & amara est. Adstringit quidē mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit & vētrem, vtputa ex numero medicamentorū quæ Græci ab excernendo stercore vocāt ἔκκοπρωτικά. Verūm

Et ipsius facultatis misturam attestantur particu-
laria eius opera: nam Et gratum stomacho est me-
dicamen, vt si quid aliud, Et sinus glutinat. Sanat
• Et vlcera quæ agrè ad cicatricē duci possunt, Et
maximè quæ in ano sunt Et pudendo. Iunat etiam
eorum inflammationes aqua liquata, Et vulnera
ad eūdem modū glutinat. Congruit similiter vtens
ti Et ad inflammationes in ore, naribus Et oculis.
In summa repellere Et discutere simul potest, cum
hoc vt paulum extergeat, quantum videlicet vlce-
ribus puris non sit molestum.

EX PLINIO.

Natura Aloes spissare, densare, Et leuiter calfa-
cere. Vsus in multis et principalis, aliuū soluere, cū
penè sit sola medicamentorum quæ per se id præ-
stant. Cōfirmat etiā stomachum adeò vt nō infestet
vlla vis contraria. Bibitur drachma. Ad stomachi
verò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ
vel frigidæ, cochlearis mensura, bis tēve in die ex
interuallis, vt res exigat. Purgationis etiam causa
plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea su-
matur cibus. Capillum fluētē continet cum vino
austero, capite in sole contra capillū peruncto. Do-
lorem capitis sedat, temporibus Et frōti imposita,
ex aceto Et rosaceo. Dilutiorq; infusa, oculorum vi-
tia omnia sanari ea conuenit. Priuatim prurigines
Et scabiē genarum, itē insignita ac liuida, illita cū
melle, maximè Pōtico: tonsillas, gingiuas, et omnia
oris

oris vlcera. Sanguinis excreationes, si modicae sint, drachma pōdere ex aqua, si minus, ex aceto pota. Vulnecrum quoq; sanguinem, & vndecunque fluētem sistit per se, vel ex aceto. Aliās etiā est vulnecrib. vtilissima, ad cicatricē perducens. Eadē inspergitur exulceratis genitalibus, virorū condylomatibus, rimisq; sedis, aliās ex vino, aliās ex passo, aliās sicca per se, vt exigit mitigāda curatio, aut coercēda. Hæmorrhoidū quoq; abundātiā leniter sistit. Dysenteria infunditur. Et si difficilius concoquantur cibi, bibitur à cœna modico intervallo. Et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur pilule cum mellis decocto, aut resina terebinthina, ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, vt quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa, pennāque subinde versatur, vt possit equaliter torreri.

DE BECHIO. CAP. I.

Tussilago vngula Caballina & passus asini vulgò dicitur.

NOMINA.

Bήχιον Græcis, Latinis Tussilago aut Farsa-Bechiō vngula dicitur. Sic vocata quòd βήχας, hoc est, de dictū. tusses iuuare credita sit. Herbariis & officinis hoc Vngula die vngula caballina appellatur. Germanis Ros. Caballischub, oder Brandlattich, Gallicè Patte à che na. ual) quòd scilicet equina vngula persimilis sit, & ambustis medeatur.

Folia hederæ habet, sed maiora, sex aut septē à radice prodeūtia, supernè virētia, inferiore autem sui parte albida, plures angulos habētia. Caulē pal-
 Bechiō nō mūm altū. Florem vere prodeuntē pallidum, quem nascitur unā cum caule confestim abiicit. Inde nonnulli exi-
 sine flore. stimauerunt sine caule hanc herbā nasci. Radix il-
 li tenuis est, quæ minimè inutilis esse potest, quan-
 doquidem illius, vt ex sequentibus patebit, in rum-
 pendis thoracis abscessibus, & ciiciendo ex vtero
 emortuo foetu vsus sit. Subesse itaq; errorem in Dio-
 Dioscori = scoride manifestissimum est, vbi radicem Tusilā-
 dis locus ginis & χρῆσον esse inquit, quē tamen nemo inter-
 emēdatus pretum, quòd sciā, animaduertit. Hoc etiā adiciē-
 dum duxi pro confirmanda Dioscoridis descriptio-
 ne, & confutanda erronea quorundam sentētia, flo-
 res Tusilaginīs esse fugacissimos: iis enim enatis
 breui vigor vitæque durat, longissimāq; mora tri-
 duum aut quatrduum, post quod illico tēpus flac-
 cescentes in pappos euanescent, & caduci marcent,
 ita vt non nisi vere sese forte fortuna ferant obuiā,
 quo potissimum tēpore flos & caulis sine foliis vi-
 dentur. Quapropter qui herbam ipsam hoc tempo-
 re non conspexerunt, & tam subitam floris & cau-
 lis iacturam haud animaduenterunt, sine vtrisque
 nasci crediderunt. Nos tamen & florem & caulem
 sæpius oculis contemplati sumus, ideóque vt vtrius-
 que pictura accederet diligenter curauimus.

LOCVS.

Nascitur prope fontes, & in aquosis locis.

TEMPVS.

Flores vere, & in Aprili colliguntur: ab hoc enim tempore, vt paulò antè diximus, nusquam apparent. Folia & radix tota æstate durant.

TEMPERAMENTVM.

Folia Tusilaginis virentia aqueæ substantiæ admistionē habēt, vt hac ratione frigida et humida dici possint. Sicca verò acriora sunt, ideoq; calida. VIRES. EX DIOSCORIDE.

Tusilaginis folia trita cum melle illita, ignibus sacris, & inflammationibus cunctis medentur. Eadem sicca incensa, eos qui sicca tussi & orthopnoæ infestantur, quum fumum per infundibulum hiāti suscipiunt ore, sanant. Abscessus thoracis rumpunt. Eadem radix suffita potest, foetumq; emortuum in aqua mulsa coctum & potum eiicit.

EX GALENO.

Bechium ideo nuncupatum est, quòd βήχας, id est, tusses & orthopnoæas inuare creditū sit, si quis videlicet folia arida aut radicem in prunis accendens, ascendentem inde fuliginem inspiratus attrahat. Est autem modicè acris, vt sine molestia noxæ ve omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sane folia viridia partes cruda inflammatione obsesas illitu extrinsecus adiuvāt, propter aqueæ humiditatis admistionē, qua omnia virentia tenera, alia
plus.

PLANTARVM HISTORIAE

plus, alia minus participant. Nam sicca Bechij folia acriora sunt, quam vt inflammatione laborantibus partibus conueniant.

EX PLINIO.

Tussilaginis arida cū radice fumus per arūdinē haustus aut deuoratus, veterem sanare dicitur tussim: sed & in singulos haustus passum gustādū est.

DE BUGLOSSO. CAP. LI.

Buglossum Borrago.

NOMINA.

Bούλωσος Græcis: Buglossum, Bubula lingua, Bovis lingua Latinis, quod scilicet eius folia bubulae linguae similia sint: officinis & herbariis Borrago, Germanis Burretsch (Gallicè baurrache, ou Bourroche) dicitur. Alia verò herba est quæ hodie Buglossa vulgò nominatur, (Buglose) vt suo loco indicabimus.

FORMA.

Buglossum Verbasco simile est, folium habēs in terram depressum, asperū, nigrius, bubulae linguae nō dissimile. Florem cœruleum, speciosum. Quæ nimirum descriptio ita hodie vocatæ Borragini herbae quadrat, vt nemo non, nisi talpa cæcior sit, veterum esse Buglossum videat. Qui tamen eius rei plura argumenta desiderat, ea quæ lib. primo, cap. xxxiij. nostrorum Paradoxorum produximus, legat, & nihil puto deinceps dubitabit.

LOCVS.

Nascitur in plantis & sabulosis locis. Passim etiam hodie in hortis feritur, ob id olitoribus optimè cognitum.

TEMPVS.

Carpitur Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Buglossum calidi humidique temperamenti est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folium Buglossi in vinum deiectum animi latitiam efficere creditur. Aiunt quæ tres caules emitat, si cum radicibus & semine tota teratur, & in potu detur, contra tertianos rigores prodesse: ad quartanas verò quæ quatuor. Horum autem decoctio in vino fiat. Herba abscessibus etiam vtilem esse ferunt.

EX GALENO.

Buglossum vinis iniectum latitiæ et hilaritatis causa esse creditum est. Sed & iis qui ob faucium asperitatem tussiuunt, in melicrato coctum conuenit.

EX PLINIO.

Buglossum præcipuum quod in vinum deiecta animi voluptates auget, & vocatur Euphrosynum. Buglossum inarescente, si quis medullam ex caule eximat, dicatque ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt à febre liberari.

EX SIMEONE SETHI.

Buglossum urinam cit, & sitim sedat. Caules eius cocti

cocti & crudi comesti iccoris affectibus prosunt. A viatoribus ex eo conficitur xulapion, & est utile.

DE BUPHTHALMO. CAP. LII.

NOMINA.

Bούφθαλμον Græcè, Buphthalmum Latinè. *Cotula* nō *Hodie oculus bonis, aut vaccae, & Cotula foetida.* non foetida herbariis vocatur. Germanis Rind-Buphthal saug oder Kueaug (Gallicè Oeil de Boeuf, ou mum cur pisse en liç) Buphthalmū autem non alia ratio dictum. ne dixerūt veteres, quā quòd eius flores oculi imitentur formam, & boum potissimum oculis similes Anethum sint. Germanicè etiam Kudill hoc est, vaccinum vaccinū. anethum dicitur, quod scilicet verum Anethum eius folia referre videantur.

FORMA.

Buphthalmum caulem tenerū emittit, folia fœniculo similia, flores luteos Anthemide maiores, oculorum figura, vnde & nomen traxit. Hæ siquidem notæ adamussim conueniunt herbæ quam vulgus herbariorum Cotulam non foetidam vocant: caules siquidem eius teneri, folia fœniculo similia. Nec te moueat quod à Dioscoride Buphthalmo lutei floristri buuntur. Cotulæ autem non foetidæ albi sint: ad discū enim mediūve Diosc. respexit, quod luteū est, non ad ambitū, in quo folia radiata candida, vt in Chamæmelo, existunt. Quod dicimus, cōfirmant quæ Galenus lib. vi. de simpl. med. facul. in hunc modum scribit: Buphthalmi, inquit, flo-

res

Obiectio-
nis solus
tio.

res colore Anthemidis floribus similimi sunt, sed multò maiores. Serapion quoque florem eius magis luteum flore Chamæmeli esse ait. Si itaque Anthemidis floribus similimi sunt, nec nisi sola magnitudine differunt, & Anthemidis propriè dictæ flores in medio lutei, & per ambitum candidi existunt, necesse est, ut Buphthalmi etiam flores tales sint, ut scilicet candida illorum folia, luteum medium cingant. Quid multa? Buphthalmi flores ab Anthemidis floribus non nisi sola magnitudine differunt: grandiores enim Buphthalmi flores quàm Anthemidis conspiciuntur, reliqua facie quam similimi. Quòd igitur ad colorē attinet, in nullo variat. Iā dictis accedit, quòd Serapionis interpretes sub Cotulæ nomine Buphthalmum delineat. Denique congerem esse planè herbam Buphthalmum cū Anthemide Dioscoridis tractandi ordo abundè docet, quum constet illum tres herbas sibi admodum similes, Chamæmelum nempe, Parthenium, & Buphthalmum, vno in loco describere. Vnde iterum planum fit Buphthalmum esse Cotulam non foetidam, quòd scilicet Chamæmelo prorsus similis sit, excepto duntaxat flore, qui in illa maior est.

LOCVS.

In campis & circa oppida nascitur.

TEMPVS.

Carpitur Iulio. Augustoq; mensibus, & durat etiam vsque ad Autumni medium.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPERAMENTVM.

Flores Buphthalmi acriores sunt Chamemeli floribus, ob id illis sunt calidiores.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Buphthalmi flores cum cerato triti, ædemata & durities discutiunt. Ferunt post exitum à balneo potam, regio morbo correptis coloris bonitatem tractu temporis reddere. EX GALENO.

Buphthalmi flores Anthemidis floribus vehementius discutiunt, adeò vt & durities ex cerato mixti sanent. EX PLINIO.

Buphthalmos cum cera scirromata discutit.

DE BELLIDE. CAP. LIII.

Bellides nobis Margarite & Pasquetes quòd ad pascha ferè flores hi incipiant Bellis maior consolida media vulgò.

NOMINA.

Bellis neque à Dioscoride, neque à Galeno, nec aliis etiam Græcis, quod sciam, descripta est, ideòque Græco nomine destituitur. Latinam itaque duntaxat appellationem habet, & Bellis siue Bellius, auctore Plinio, nominatur.

GENERA.

Duorum est generum, maioris & minoris discriminis. Consolidam mine insignis. Minor bellis est ea quam officinae Cōminor. solidam minorem appellant. Hæc iterum duum est generum. Quadam enim hortensis & domestica est Bellis, hanc Germani Monatblumle, oder rote blumle

blumle (Gallicè Des marguerites, ou des Pas-
quettes) nomināt. Altera syluestris, quam vulgus
herbariorum Primulā veris, quòd scilicet vere in- Primula
choante mox erumpat, Germani autem Maslie- veris.
ble, & Kleinzeitlosle (Gallicè Petite confyre) Consolida
nuncupant. Maiorem officina nonnullæ Cōsolidam media.
mediam quòd credatur vulnera glutinare, Germa
ni Gensblum (Gallicè De la confyre) vocant.
Nos aliam Consolidā mediam infrā describemus.

FORMA.

Minor hortensis, syluestri, præter florem qui ru- Minor.
bicundus est, per omnia similis est, Constant verò
flores ii interdum simplici, interdum multiplici fo-
liorum contextu, vt pictura affabrè ostendit. Sylue
stris, Plinio lib. xxvi. cap. v. teste, flore constat al- Plinii lo-
bo, aliquatenus rubente, quinquagenis ternis, inter- cus expli-
dum etiam quinquagenis quinis barbulis circinato, catur.
folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblon-
go, leuissimè serrato. Neque obstat quòd Plinius
lib. xxi. cap. viii. Bellio luteum esse florem tradat,
quia non ad ambitum, sed ad discum mediūm ve
floris, quod sanè luteum est, respexit. Hinc est quòd
à quibusdam Plinii locus ita legatur. Luteum & Maior.
Bellio, vt subaudiatur semen. Maior Bellis proce-
rior assurgit, folio non admodum diuerso, altioribus
dūtaxat crenaturis laciniato, cauliculis tenuibus,
furculosis, cubitum altis, flore priori non dissimili,
maiore, pauciorib. tātūm barbulis, & in vniversum
candidis,

PLANTARVM HISTORIAE

candidis, medium luteum in orbem concinnè cingentibus. LOCVS.

Passim in pratis vterque nascitur Bellius. Iā & in hortis seritur, sed flore multiplici, barbularū stipatū densiore. TEMPVS.

Minor primo statim vere apparet, & tota ferè æstate durat. Maior autē in Maio mense floret, quo etiam tempore carpi debet.

TEMPERAMENTVM.

Bellius vterque calidus & siccus est, id quod ex Plinio colligi potest, qui illorū ad discutiendas strumas vsū esse scribit. Acetosus tamē sapor quē in gustu minor præ se fert, aliquam frigiditatis in ea portionē esse monstrat. Quicquid tamen sit, exicare Bellios euidentissimum est.

VIRE S.

Quotquot hodie viuunt vulnerariam herbā Bellium esse nouerunt, valētque potissimum in capitis fractura admota. Succus etiā herbæ vtiliter vulneratis bibitur. Laudatur etiā herba ad membrorū resolutionem, quam Græci paralysin vocant: itemq; ad podagras, ischiada, & aduersus strumas.

DE BRATHY. CAP. LIIII.

NOMINA.

Bραθύς & Βράθυρον Græcis, Sabina vel Sani-na Romanis, Seuenaum Germanis (Gallice Sauinier) dicitur. Officinæ nomen vetus retinuerunt. GENERA.

Duūm

Duum est generum Sabina . Vnum quod hic pictum exhibemus: alterum Tamaricis folia habens.

FORMA.

Primi generis Sabina foliis Cupresso similis est, spinosior tamen, graui odore, acris & feruens. Arbor breuis & in latitudinem magis se fundens & explicās. Topiarius itaque frutex est, immortalis co-
ma virens, patulo fastigio, iuniperi similitudine.

LOCVS.

Passim in hortis nascitur.

TEMPVS.

Quouis tempore colligi potest, potissimum autem autumnno, dum semine pragnans est.

TEMPERAMENTVM.

Tertii est ordinis excalescentium & desiccantium, & ex numero eorum quæ vel maximè terminum sunt partium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Prioris foliis nonnulli pro suffitu vtuntur. Vtriusque folia nomas sistunt. Inflammationes illita mitigant. Cum melle illita nigritias repurgant, itemq; sordes & carbunculos abstergunt. Cum vino pota sanguinem per vrinam ducunt, foetumq; excutiunt. Idem apposita & suffita præstant. Miscentur vnguentis excalescentibus, priuatim Glencino.

EX GALENO.

Sabina ex numero est fortiter exiccantium, idq; secundum tres qualitates quas in gustu præ se fert
m similiter

similiter Cupresso, nisi quòd ea acrior est, & ut sic dicam, magis aromatica, seu odoratior. Igitur huius quam modò dixi qualitatis est particeps, nempe acrimoniae consistentis in calido temperamento, praeterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris quàm in Cupresso. Siquidem quanto magis acrimonia superat, tanto etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam utriusque illi tantum inest, ut etiam tendat, & inflammationem afferat. At putredinibus similiter Cupresso accommodari potest, maximè iis quae maligniores fuerint, & diuturniores. Nam haec citra noxam medicamento vehementiam perferunt. Quin & quae atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item soluit. Porro ob essentiae partiumve tenuitatē menses quoque pronocat, ut si quid aliud. Et sanguinē per urinas mouet. Fectum etiam viuētem interficit, & mortuum elicit. Unguentis inditur, & potissimum Glencino, & in multas antidotos iniicitur. Quidā verò etiam Cinnamomi vice duplū eius adiiciunt: est enim extenuandi & digerendi facultatis, si posita fuerit.

EX PLINIO.

Sabina à multis in suffitus pro thure assumitur. In medicamentis vero duplicato pōdere eosdem effectus habere quos cinnamomum traditur. Collectiones minuit, & nomas compefcit. Illita ulcera purgat. Partus emortuos apposita extrahit & suffitu.

fitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle
& vino pota, regio morbo medetur. Gallinacci ge-
neris pituitas fumo eius herbæ sanari tradunt.

DE BATO.

CAP. LV.

Rubus ronce.

NOMINA.

Bάτος Græcis, Rubus aut sentes Latinis voca-
tur. Aliquibus Mora vaticana, corrupta voce,
eius fructus dicuntur, cum dicendum esset mora
vacinia. Nam in hodiernum vsque dicm Græci
mora illa à βάτῃ, βάτινῃ & βατίνα. cognomi-
nant. testis Galenus libro sexto, de compos. medic.
secundum locos: capite primo. Vergilius in Bucol-
licis vnus literæ inmutatione vacinia vocauit,
inquiens: Alba ligustra cadunt, vacinia nigra le-
guntur. Eclog. ii. A nostræ ætatis medicis barbaris
& Herbariis mora bacci appellantur, cum illis di-
cendum esset mora bati. Theophrasto libro tertio
de plantarum historia, capite xviij. Chamæba-
tos, quasi dicas humilis rubus, appellatur. Germani-
cè Bromber (Gallicè Ronce.)

FORMA.

Rubum omnes nouerunt, vbique enim vestibus
prætereuntium sese affigit, remorâmq; viatori-
bus iniicit. Caulem habet minacibus ac pungen-
tibus spinis & aculeis vestitum. Folia incisuris di-
uisa, nigricantia ab vno latere, altero candentia.
Florem, initio rubescentem, dein cædudum profert,

m. ij. quo

PLANTARVM HISTORIAE

quo abeunte fructus exit, qui cùm maturuerit mo-
ro persimilis fit nigrescens, auibus gratus, nec homi-
nibus insuauis cibus. Inest illi succus sanguineus, &
veluti cruore atro manus inficiens.

LOCVS.

Pasim in dumis prouenit Rubus, qui protinus
quàm paulò accreuit, retro vergit in terram, atq;
ita radicatur, iterùmque ex se nascitur.

TEMPVS.

Diuersis temporibus folia, flores & fructus Ru-
bi colliguntur. Folia nanque in vere: flores æstatis
initio, Iunio nimirum & Iulio mensibus: fructus
autem vbi iam maturuerit per messes & extrema
æstate decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Rubi folia, germina, flores, fructus et radix qua-
litate adstringente participant, eaque non obscu-
ra. Sed hoc inter se differant, quòd folia potissimū
& recēs nata plurimum in se habeant aqueæ sub-
stantiæ, parum vero adstringant. Eadem ratione
& germina. Est itaque eorum temperies ex terrea
frigida essentia, & aquea tepida. Fructus autem,
si quidem maturus fuerit, non parum habet succi
temperati calidi, qui dulcis est. Proinde eam ob
rem, & propter modicam adstrictionem, esui non
insuauis est. At immaturus à frigida terrea sub-
stantia vincitur, ac proinde acerbus est, & exicca-
torius. Vterque autem siccatus reconditur, validius
quàm

quàm recens desiccans.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Rubus adstringit & desiccatur. Capillos tingit. Ramorum eius decoctum potum aluum sistit, & fœminarum profluvia cohibet. Præteris morsui utile. Gingivas firmat. Oris vlceribus folia comman-
ducata medetur. Cohibent herpetas, & in capite
achoras, oculosq; procidentes, condylomata & hæ-
morrhoidas, illita folia sanant. Cardiacis & stoma-
chi doloribus trita & imposita subueniunt. Succus
ex caulibus, foliisq; eius expressus, & in sole coac-
tus efficacius omnibus iã dictis medetur. Fructus
eius optimè maturi succus, ad oris medicamentum cõ-
uenit. Sistit & aluum in media maturitate come-
stus. Flos quoque eius in vino potus aluum sistit.

EX GALENO.

Folia & germina Rubi si mandantur, aphthas
& alia oris vlcera sanant. Quin & alia vulnera
glutinare valent. Flos eius eandem fructui immaturo
facultatem possidet: vtraq; ad dysenterias, &
vêtris profluvia, eiusq; robur deperditum, & sanguis-
nis expuitiones, idonea remedia. Radix præter ad-
strictionem nõ paucam in se habet substantiam te-
nuem, propter quam etiam in renibus lapides com-
minuit.

EX PLINIO.

Nec Rubos ad maleficia tantum genuit natura,
ideoq; ex eis mora vel hominibus cibos dedit. Vini
habent siccandi, adstringendique, gingivis, tonsilis,
in iij lis,

PLANTARVM HISTORIAE

lis, genitalibus accommodatissimi. Aduersantur serpentium sceleratissimis, hæmorrhoidi & præsteri, flos & mora. Scorpionum vulnera sine collectionis periculo iungunt. Vrinam ciunt. Caules eorum tunduntur teneri, exprimiturque succus, mox sole cogitur in crassitudinem mellis, singulari remedio contra mala oris, oculorumque; sanguine excreantes, anginas, vulnus, sedes, coeliacos, potus aut illitus. Oris quidem vitis etiam folia commanducata prosunt, & ulceribus manantibus, aut quibuscunque in capite illinuntur. Cardiacis vel sic per se imponuntur à mamma sinistra. Item stomachi doloribus, oculisque; procidentibus. Instillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosaceo cerato. Calculorum ex vino decoctum præsentaneum est remedium. Item per se in cibo sumpti cymæ modo, aut decocti in vino austero, labantes dentes firmant. Alium sistunt & profluvia sanguinis. Dysentericis prosunt. Siccantur in umbra, ut cinis crematorum vnam reprimat. Folia quoque arefacta & contusa, iumentorum ulceribus utilia traduntur. Mora quæ in iis nascuntur, vel efficaciorē stomatice præbuere quàm sativæ morus. Eademque compositione, vel cum hypocistidis tantum & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra araneos. Inter medicamenta quæ styptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in vino ad tertias partes, ut colantur eo oris ulcera, & sedis foveantur. tantaque

vis est vt spongiæ lapidescant.

DE BALLOTE. CAP. LVI.

Ballote marrubium foetidum.

NOMINA.

Bαλλωτή, ἢ μέλαν πρᾶσιον Græcis, ballote Latinis, Officinis Marrubium nigrum, aut Marrubiastrum, aut Prassium foetidum dicitur. Germanis schuuartz Andorn, oder Andorn Vueible (Gallicè Du marrubin noir.) Marrubium à similitudine foliorum, nigrum à caulis colore, qui niger est Marrubij respectu, dicta Ballote est. Marrubiū dictum.

FORMA.

Caules ex se mittit Ballote quadrangulos, nigris cantes, subhirsutas, ab vna radice complures. Folia Marrubio similia, maiora tamen, subrotunda, pilosa, per æternalla in caule disposita, Apiastro similia, graucolentia, vnde aliqui Apiastrum eā vocarūt. Flores in rotæ speciem caules circumiacent. Theophrastus etiam lib. vi. cap. ij. de historia plantarū, Ballotē folio herbido, serrationi, incisurisq; profundioribus & cōspectioribus discreto cōstare scribit. Vnde liquidò constat hāc quā pictā damus esse verā Balloten, quod illa sit herba fruticosa, quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis ferè, folio Marrubij sed maiore, piloso, cingente per intercapedines caule, odore graui, orbiculato florū purpurearū ambitu, qui scapos verticillatim obducunt.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur propter vias, domos, scpes, cæmiteria,
& aliis vmbrosis in locis.

TEMPVS.

Floret in fine Iunij mensis, & initio Iulij, quo sæ-
nè tempore carpi commodè potest.

TEMPERAMENTVM.

Amara & acris est, idcòque calefacit in secun-
do ordine iam còpleto, aut tertio remisso : desiccatur
autem in tertio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius folia cum sale illita, canis morsibus me-
dentur. Feruenti cinere flaccescentia, condylomata
reprimunt, sordidàque vlcera cum melle purgant.

EX PAVLO.

Ballote, quod alij Marrubium nigrum dicunt, a-
cris est & abstersoria facultatis. Illitum cum sale
canis morsibus medetur.

EX PLINIO.

Vix eius, efficax aduersus canis morsus, ex sale
foliis tritis imposita. Item ad condylomata, coctis
cinere, in folio oleris. Purgat & sordida vlcera cū
melle.

DE BATRACHIO.

CAP. LVII.

Ranunculi omnia hæc genera Gallis sunt
frequētissima in vineis, syluis, paludosis
locis.

NOMINA.

Βατραχία

Bατράχιον Græcis, Batrachium & Ranunculus Latinis dicitur. Apuleius Sceleratam nominat. Vulgus medicorum perperam Pedem corui vocat. Sunt etiam qui Flammulam, ab vrendi faccultate, appellant. Germani Hanenfusz. Batrachion autem siue Ranunculus dicta est haud du diè, quòd limitibus humidis opacisq; marginibus ranarum more letetur: aut quòd aquis ubi ranæ degunt potissimum, gandeat, aut quia inter eius frutices rana frequenter inueniantur. Agreste vero Apium seu Apiastrum, quòd foliis apium amuletur. Scelerata, eo quòd comesta noxia sit: vel, quòd magis arridet, quia validi sceleratq; mendicantes si bi crura & lacertos hac ipsa dilaniât, quòd possint impudentius stipem extorquere, atque hac impostura pecuniolam aucupari.

GENERA.

Plura sunt Ranunculi genera, Dioscorides verò & Galenus quatuor potissimum esse tradunt. Primum duplex est: huius enim generis Ranunculus quidam sylvestris est: & hic iterum duabus discriminatur differentiis. Vnus enim luteos flores profert, & Germanis Vveißler Hanenfusz dicitur. Alter vero purpureos, qui mihi, quòd sciam, nondum visus est. Quidam autem hortensis, qui nisi cultura accedat provenire haud solet. Hic itidè duplex est. Vnus qui simplici florum textura constat, Germanicè Vngefulker garten hanenfusz. Alter

Sylvestris
ranunculus.

Hortensis

Alter multiplicem foliorū in floribus compagem obtinet, ideoq; Germanis gefülter garten hanēfusz dictus est. Alterum quod à foliorū similitudine quam cum Apij foliis obtinet, à nonnullis σελινόριον ἄγριον, id est, Apiū sylvestre, vel Apiū risus cognominatur, Germani Vuaslerhanenfusz vocant. Tertiū genus exiguum est, ob id etiā Germanis Kleiner Hanenfusz nominatur. Quartum etiā minimū, germanicè Vualdthenle appositissima voce appellatur: est enim iter reliquas herbas quæ germanicè Pedes galli vocantur, & minima, & nō nisi in syluis vt plurimum prouenit, adeoq; composita voce rectissimè Vualdhenle nominatur, quasi dicas minima inter pedes Galli, & in syluis prognata. Estq; duūm generum: vnum quidem lacteo flore, alterum luteo, vt pictura docet. Primum autem quod lacteo flore ornatur, est id quod à Dioscoride pigitur, germanicè vocatur Vueisz Vualdhenle. Alterum, das gelb Vualdhenle.

FORMA.

Primum
genus.

Primum Ranunculi genus folia Coriandro similia habet, latiora, vel vt Plinius ait, ad malua latitudinem accedentia, subalbida & pinguia. Florē luteum, interdum purpureum. Caulem non crassum cubitali altitudine. Radicē paruam, albam, amaram, adnascantias Ellebori modo habentem. Ceterum effecit cultura, vt qui in limitibus simplici foliorum cōpage flores oriantur, gemino quodam

dam densoq; ac multiplici foliorum stipatu nūc in
hortis collucescāt, quemadmodum pictura affabrè
monstrat. Alterum genus lanuginosius, vel vt Plin^{ius} Alterum.
nius inquit foliosius, altiore caule, pluribus foliorū
incisuris, copiosissimum in Sardinia, acerrimumq;
quod iam Apium sylvestre nominant. Tertium ge^{us} Tertium.
nus valde paruum, graui odore, flore qui auri spe-
ciem refert. Quartum huic simile, flore autem la- Quartū.
eteo aut luteo, radice longiore, & modo quodam
nodosa, gustu acri.

LOCVS.

Primum genus Ranunculi sylvestris lutei sine
cultura circa fluentia, & in limitibus pratisq; hu-
midis & vliginosis provenit. Hortensis verò adhi-
bita cultura in hortis nascitur. Alterum genus se-
cus aquas & fontes gignitur, & apud Sardos co-
piosissimū. Ea si comedatur, vescentibus neruos cō-
trahit, rictuq; ora diducit, vt qui mortem oppetūt,
velut ridentium facie intereant. Ob id Sardoni-
us in prouerbiū cessit. Etsi autem nostra non us risus.
perinde efficax sit atque ea quæ in Sardinia na-
scitur, tamen hanc vehementissima etiam eroden-
di facultate esse præditam, gustus ostendit. Tertiū
genus in pratis & campestribus passim provenit.
Quartum, vt Germanicum nomen palàm demon-
strat, syluis familiare est. Luteum vero in valle su-
pra & infra Bebemhusum monasterium iuxta a-
quas copiosissimè nascitur.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Primum genus hortēsis Ranunculi lutei, statim inter initia Aprilis floret: Maio autem mēse disparet, & nusquam subinde conspicitur. Secundum & tertium genus itidem tota aestate inueniri possunt. Quartum in vere, Aprili nimirum mense, tantum apparet, quo sanè tempore hoc ipso sylua, luci & nemora scatent, floribusq; eius candicant.

TEMPERAMENTVM.

Omnium tum radix, tum vniuersa herba vehementer calida & sicca est. Primi tamē generis syluestris lutei, non perinde ac reliquorum acris admodum est facultas.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium folia & caules teneri si illinantur, exulcerandi, & crustas cum dolore creandi vim habent. Proinde scabros vngues & scabiem tollunt, & stigmata delēt, myrmecias, acrochordonas & alopecias modico tempore illitu sanant. Tepido eorundem decocto perniones fonentur. Radix sicca tritāque, sternutamenta naribus admota ciet. Dentium dolores adhibita lenit, eos tamen conterit.

EX GALENO.

Quatuor habet speciatim Ranunculus differentias. Omnes verò vehementer acrem facultatē possident, adeò vt cum dolore exulcerent. Hac itaque ratione si moderatè vtare, psoras & lepras excoriant, & vngues leprosos dinellunt, ac stigmata discutunt,

cutiunt, & acrochordonas & myrmecias detraxunt. Quin & alopecias iuuant pauco tēpore admodum. Nam si diutius inhereant, non excoriatur solum cutis, sed & in crustam vritur. Atque igitur hæc omnia caulis & foliorum sunt opera, si illinātur viridia. Porro radix arefacta sternutatorium est medicamentum similiter aliis quæ valēter desiccant. Sed & dentiū dolores iuuat, vt & eos, vehementer scilicet exiccando, frangat.

EX PLINIO.

Omniſus vis caustica, si cruda folia imponantur, pustulasq; vt ignis faciunt. Ideo ad lepras & psoras vtuntur, & ad tollenda stigmata, causticis quæ omniſus miscent. Alopeciis imponunt, celeriter remouentes. Radix in dolore cōmāducata diutius, rumpit dentes. Eadem sicca concisa, sternutamentū facit. Nostri herbarij strumeam vocant, quoniam medetur strumis, & panis, parte in fumo suspensa.

DE BRYO. CAP. LVIII.

NOMINA.

Bryon Græcis recentioribus, Lupus salictarius Lupulus. Latinis, Lupulus officinis, vulgò Humulus vocatur. Aliquot Italiae rura, ad Græcam appellationem alludentes, Brusculam, quasi Bryon scan-
file nominant. Germani Hopffen, (Gallicè Du houblon.) Græci autem Bryon à Bryonia similitudine haud dubiè nominarunt. Lupus verò salic-
tarius, quia subit scanditque salices, & arbuta lictarius.

omnia

PLANTARVM HISTORIAE

omnia circūuoluēdo se circūplectitur, appellat^o est.

Lupus reptitius. Hinc quoq; *Lupus reptitius* nonnullis nominatur.
ptitius.

FORMA.

Caules habet aculeatos, longissimósq;. Folia vitis albæ, hispida, & nigriora. Flores cinereos seu candicantes, ac multis exilibus folliculis squamatis compactiles. Radicem subnigram, longam.

LOCVS.

Passim & copiose in Germania nostra iuxta uetres & salicta prouenit, ex eaque ceruissiam potū, quo uini vice utuntur, Germani conficiunt. Ideoq; in hunc usum in hortis plantatur.

TEMPVS.

Augusto mense floret & Septembri.

TEMPERAMENTVM.

Sunt qui refrigerare Lupulum dicant, alij temperamento medium esse putant. At utriusque, mea quidem sententia, falluntur: flores enim quorū potissimum usus est, calidos & siccos esse, odoris & grauitas, & immodica amaritudo testantur. Antiquus etiam herbarius calidum & siccum in secundo ordine esse tradit. Denique constat radices quoque eius calidas esse.

VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Bilem utranque detrahit. Abscessus discutit. Pituitam in aqua inter cutem per aluum ducit. Succus eius crudus haustus ventrem magis subducit, minus verò obstructions aufert. Coctus verò magis ab

gis ab obstructionibus liberat, minusq; ventrē subducit. Auribus instillatus eas à putredine vīdicat, & à fetore liberat. Radices obstructiones tollunt, lienis potissimum & iecoris.

DE VERONICA. CAP. LIX.

Veronica vtraque hic vsu rarissima.

NOMINA.

Veteribus Græcis & Latinis cognita fuerit nec ne hæc herba, nondum constat, Vulgus autem herbariorum hodie Veronicam, Germani Veronica. Erenbreisz oder Grundheyl, ob mirificam sanandi vlcera & vulnera facultatem, nominant.

GENERA.

Duūm est generum Veronica: vna mas, altera verò fœmina. Discrimina earū ex descriptionibus patebunt.

FORMA.

Veronica mas herba est per terram serpens, cauliculo dodrantali & nonnunquam etiam longiore, rubescente & lanuginoso, foliis oblongis, nigris, hirsutis & serratis, floribus in cacumine purpureis, semen in vasculis loculi speciem habentibus, radice tenui. Fœmina itidem per terram serpit caule lanuginoso, foliis rotundis instar herbe quæ Cætummorbia & Nummularia hodie vocatur, minime in ambitu incis, paulò quàm maris viridioribus, floribus in luteo purpureis, semine in vasculis rotundis,

PLANTARVM HISTORIAE

rotundis, radice, vt mas, tenui.

LOCVS.

Nascitur incultis & sylvestribus locis.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudinem quandam & vehementem adstrictionem in gustu præ se fert, vt hinc calidam & siccam esse coniicere liceat. VIRE S.

Mirificè ad cruenta ac vetera vulnera & vlcera sananda confert. Scabiei denique & omnibus cutis vitiis medetur. Ferunt quondam huius herbe adiuumento Regem Gallie elephantia morbo correptum, à quodam venatore sanatum esse, cum is ceruum à lupo vulneratum eius herbe comestione, & assidua in illa volutatione, curasse seipsum animaduertisset. Tumores etiam, in quacunque corporis parte fuerint, potissimum autem in cervice, discutere potest. Recentiores huius vsum vnicè commendant in febribus pestilentialibus, iecoris & lienis obstructionibus, potissimum vero pulmonis exulcerationibus.

DE BVLBO SYLVESTRI.

CAP. LX.

Bulbus sylvestris hinc videtur esse quod leucoium Theophrasto pingitur & nobis iam in hortis frequentius ad natalē Christianum floret.

NOMINA.

ὄλβος ἄγριος Græcis, Bulbus sylvestris Cēpa syl-

B Latinis. Sunt quibus Cēpa sylvestris ap- ustris.
pellatur. Germanicè Feld, Vuild oder

acker zuuibel. (Gallicè vn porrion.) Bulbos au Bulbi-

tem nominant radices suis membranis tunicatas,
sue pluribus capitulis coagmententur, vno follicu-
lo omnes ambiente, sine quadantenus distinctæ se-
parentur.

FORMA.

Herba est caule dodrātali, cauo, foliis porraceis,
floribus lilij sinuati cmicantibus, speciosis, sex fo-
liis è calathò stellatim radiatis, ex viridi in luteū
tendentibus, capillo intus croceo, capitulo floribus
decidentibus triangulari, seminibus pleno, radice
bulbosa cēu Allium, citra odorem glutinosa.

LOCVS.

In locis vmbrosis, circaq; margines quorundam
pratorum copiosè prouenit. Quare in vallibus non
procul à Tubinga iuxta monasterium Becbēhusen-
se sitis, & radice montis Austriaci ad pratum te-
nue vocatum, Bulbus plurimus nascitur.

TEMPVS.

Per initia veris, Martio & Aprilimēsis. erum-
pit, ac statim subinde euanescit. Semen non tantum
in caulibus, verumetiam iuxta radicem profert.

TEMPERAMENTVM.

Amara austerāque qualitate præditos inueniet;
non hunc, sed & alios bulbos, qui gustū exactè con-
n. suluerit.

PLANTARVM HISTORIAE

soluerit. Proinde hos abstergere simul & glutinare, & nimirum etiam exiccare posse, nemini nō notum est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnes bulbi acres sunt et calefaciunt, venerē meque stimulant. Lingua & tonsillas exasperāt. Multum nutriunt. Carnes procreant, flatusq; faciunt. Ad luxata, collisa, surculos, articulorumq; dolores illiti conducunt. Gangranis & podagris cū melle, & per se, hydropicorumque tumoribus & canum moribus prosunt. Cum melle pariter & pipere trito illiti, sudores cohibent, & stomachi dolores sedāt. Furfures & achoras cum nitro tosto exterunt. Sugillata & varos per se, aut oui luteo purgant, & lentigines cum melle aut aceto. Fractis auribus cū polenta, & contusis vnguibus prosunt. Ficos in calidis cineribus tosti, & cum menarum capitibus crematis appositi, tollunt. Combusti verò & Alcyonio permisti vitia cutis in facie, & nigras cicatrices in sole illiti emendant. Cum aceto cixi & in cibo sumpti ad rupta faciunt. Cauere verò eorum in cibo copiam oportet, quoniā nervosas partes tētant.

EX GALENO.

Bulbi amarā austeramq; vim manifestam obtinent, quamobrem elanguescētis stomachi aliquatenus auiditatem excitant. At verò neq; iis inutiles sunt, quibus è thorace & pulmone pus expuendum erit, quāquam crassiore ac glutinosiore sit corporis substantia:

substantia : etiam amaritudo crassitudini aduersatur, lēta crassaq; nata incidere. Quapropter bis elixi vberius quidem alūt, sed excreare volētib. relictabuntur, utpote omni amaritudine exuti. Tū verò ex aceto, oleo garoq; mistis, esitare satius fuerit: nam ita magis oblectabūt ac nutrient, minusq; inflabunt, & facilius concoquentur. Quidam horum cibo abundē & immodice vsi, plane seminis auctā copiam, inq; venerem se esse promptiores senserunt. Hos quoque homines variè apparant. Non enim solum aqua elixos, verumetiam patinas ex ipsis variè conditas instruunt. Alij quidē in sartagine frīgunt, multi in craticula assant: Verūm hi multam coctionem haud sustinent, admodum pauca contenti. Sunt qui nihil prorsus præcoquant: delectat nāque eos amaritudo ipsa ac austeritas integra, quippe qui amplius ab ea ad cibum alliciantur: quamquam ad huiusmodi illecebrā duo aut tres plus satis facient. Si verò liberalius sic apparati sumātur, præsertim, ubi ut mos est, crudiores ingeruntur, amplius cruditatem generabunt. Quidam etiam non probè cocti, inflationes & tormina pariūt. Qui ad hunc modum esitantur, alimentū minimè boni succi procreant. At plurimum decoctorum, aut bis etiam, succus crassior quidem ille erit, cætera verò melior ac alibilior reddetur.

EX PLINIO.

Bulbi ex aceto et sulphure vulncrib. in facie me-
n ij dentur

PLANTARVM HISTORIAE

dentur: per se verò tritineruorum contractionem,
 & ex vino porriginem. Succū cum melle canū mor-
 sibus. Erasistrato placet cum pice. Sanguinē idem
 eos sistere tradit illitos cum melle. Alij si è naribus
 fluat, Coriandrum & farinam adiiciunt. Theodo-
 rus & lichenas ex aceto bulbis curat, & erūpen-
 tia in capite cum vino austero aut ouo. Et bulbos
 epiphoris idem illinit, & sic lippitudini medetur.
 Aequè vitia quæ sunt in facie, eorum rubentes ma-
 ximè in sole illitis, cū melle et nitro emendant. Len-
 tiginem cum vino, aut cum cumino coctis. Vulne-
 ribus quoque mirè prosunt per se, aut, vt Damion,
 ex mulso, si quinto die soluantur. Isdem & auricu-
 las fractas curat, & testium pituitas. In articulo-
 rum doloribus miscent farinam. In vino cocti illis-
 ti ventri, duritiem præcordiorum emolliunt. Dys-
 entericis in vino ex aqua cœlesti tēperato dantur.
 Ad cōmulsā intus cum Silphio pilulis fabæ magni-
 tudine. Ad sudorem tusi illinuntur. Nervis vtilis.
 Ideo & paralyticis dantur iuxtā in pedibus. Qui
 sunt ruffi ex his, citissimè sanant cum melle & sa-
 le. Vencrem stimulant. Syluestres interaneorū plas-
 gas & vitia cū Silphio pilulis deuoratis sedant. Et
 satiuorum semen cōtra phalangia bibitur in vino.
 Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentii ictus. Se-
 men antiqui bibendum insanientibus dabant. Flos
 bulborum tritus crurū maculas varietatesq; igne
 factas emēdat. Elixes aspis minus vtilis adiiciunt
 esse,

esse, & difficile cōcoqui ex vi vniuscuiusq; naturæ.

APPENDIX.

Hic quem pictū damus Bulbus facultatē emolliēdi & discutiendi durostumores habet. Humidis denique & depascentibus vlceribus tostus calido cinere, & cum melle tritus atque admotus prodest.

DE BICIO. CAP. LXI,

NOMINA.

inloq Græcè, Vicia Latinè nominatur.

B Officina non sine maximo errore ea pro Officina Orobo vtuntur. Germani alludentes ad rñ error.

Græcam appellationem, Vuicken simpliciter, vel cū adiectione zam Vuicken (Gallicè De la vesce) vocant. Vicia autem, vt Varroni placet, dicta Vicia vñ est à vinciēdo, quòd itē vt vitis capreolos habeat, de dicta. quibus sursum versus serpit.

FORMA.

Cubitali altitudine surgit, foliis Aphaces, angustioribus tamen, flore Pisi, minutis, nigricantibusq; in siliquis seminibus, quorum quidem figura non rotunda est, sed, similiter lenti, latiuscula.

LOCVS.

Sicca loca maximè amat, inter autem segetes copiose prouenit.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Medium tenet caliditatis & siccitatis, validius tamen siccatur, in secundo nimirum ordine.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX GALENO.

Semina hæc non solum insuauia, sed concoctus etiam difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est, quum huiusmodi naturam obtineant, alimoniam quoque quæ ex ipsis in corpus permanat, improbi crassiq; succi esse, idoneam ad humoris melancholici generationem.

DE BLITO. CAP. LXII.

Blitum iam in hortis frequens, viride, album, frequentius rubrum.

NOMINA.

Officina =
r. i error.

Blitū vno
de dictū.

βλίτοι.

Bλίτοι Græcis, Blitum siue Blitus Latinis vocatur. Officina hanc herbam cum Beta confundunt non sine magno errore. Germanis Maier (Gallicè De la blette, ou espinars) dicitur. Blitum nomen inde traxit quod iners & fatuum olus esset, sine sapore aut acrimonia vlla. Nam βλίτος stolidos & ignauos Græci dixerunt. Sic hodie Græca imitatione socordes, & nullius momenti homines, bliteos appellamus. Ita Plautus in Truculento bliteam meretricem nominauit.

FORMA.

Blitum non pingitur à Dioscoride, sed ab Her-
molao Barbaro, homine non minus docto quàm di-
ligente, in suo Corollario iis verbis describitur: Bli-
tum erumpit ocysimè, foliis betaceis, sine acrimo-
nia fatuis & insipidis, semine vt Beta corticeo, co-
pioso, racemoso, vt Atriplex, radice non vna, non in
rectum

rectum tendente, sed multiplici, obliqua, & proli-
xa. Ex quibus utique verbis omnibus perspicuum
fit, herbam quam depictam damus esse Blitū. Hac
siquidem ocysimè erūpit, atque in altum tollitur,
foliaq; Betacea prorsus habet. Insipida denique &
sine acrimonia. Semen eius ut Betæ corticeum, co-
piosum, racematim singulis ramis insidens. Radice
non vna nititur, sed multiplici ac longa, non in re-
ctum, sed obliquum tendente. Rectiorem tamē &
magis descriptioni respondentem si quispiam pro-
tulerit, non grauabimur nostram mutare sententiā,
ut qui probè perspectum habeamus in iis herbis
quæ à Dioscoride non descriptæ sunt, facilimè ali-
quem in tanta rerum penè omnium caligine aberra-
rare posse.

LOCVS.

Etsi sponte sua interdum herba hac proueniat,
tamen ut de Blito etiā tradunt, si culto solo semel
nata fuerit, ipsa se per multa sæcula seminis deie-
ctione reparat, ut etiā si velis vix possit aboleri, sic
semel nata plurib. annis restibili fertilitate proue-
nit.

TEMPVS.

Floret æstate & autumnno, semineq; prægnās est.

TEMPERAMENTVM.

Blitum frigidū & humidum in secundo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Blitum oleris vice in cibum venit. Alio vtile est,
nullam tamen medicamentosam vim obtinet.

PLANTARVM HISTORIÆ

EX GALENO.

Aquosum est olus, ac vti quis non absurdè dixerit, qualitatis expers, & insipidum: quapropter nō ex solo oleo garōq; sed addito aceto sæpius meliùsq; assumitur. Nonnihil etiam ad lenigandā aluū momenti affert, verū id ipsum perquam exiguū est, quoniā nulla ipsis acris nitrosæve adest qualitas, quæ aluum ad excretionem irritare possit. Liquet etiam quod minima ab ipso alimonia in corpus di-
manet.

EX PLINIO.

Blitum iners videtur ac sine sapore aut acrimonia vlla. Vnde cōviciū fœminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile est. Ventrē adeo turbat, vt cholera faciat aliquibus. Dicitur tamen aduersus scorpiones potum è vino prodesse, et clavis pedum illini. Item licni & temporū dolori ex oleo. Hippocrates menstrua sisti eo cibo putat.

DE BUNIADE. CAP. LXIII.

Napus bunias satius nobis Nauet, & eius sēmen Nauette.

NOMINA.

οὐνιάς Græcis, Romanis Napus, Germanis

Bunias Steckrub (Gallicè Nauet, ou Nauetu) appellatur. Buniadis autē appella-

Napus
Bunias
quare di-
ctus.
Bouci.
tionē à tumēte figura quā præ se fert, Græci deduxerūt. Nanq; radix Napi buniadis in amplitudinē excrescit, & in rotundum extuberat. Clinos siquidem; colles, verrucosaq; loca βῆρυς nominant.

G E N E R A.

Napi buniadis, quē *Galenus* & alij veteres in *Napus* *Raporum* sensum reponunt, duo sunt genera. Vnum *Bunias* sativum, quod forma proximè ad *Brassicam* tertiæ tius. speciei accedit, radicemq; oblongiorem obtinet, Germani huius generis *Napos*, *Trucken steckruben* nominant: Alterum sylvestre, quod foliis suis *Eruca* *Sylvestris* non dissimile est, radice ampliore, & rotundiore. Germanicè *Nasz steckruben* appellantur eius generis *Napi*.

F O R M A.

Folia habet *Rapi*, leuiora, *Eruca* modo laciniosa, caulem cubitalem, interdum altiore, rotundum, flores luteos, *Brassica* proximos, semen in siliquis, radicem oblongam.

L O C V S.

Bunias gaudet frigidis locis.

T E M P E R A M E N T V M.

Cum easdē quas *Rapum* vires habeat *Bunias*, necesse est idem etiam ut obtineat temperamentū. Est itaque *Napus bunias* in secundo ordine calidus, & in primo humidus.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Radix *Buniadis* elixa, flatus creat, minus tamē quā *Rapum* nutrit. Semen eius potum letalia venena inefficacia reddit. Miscetur antidotis. Radix etiam eius sale conditur.

E X G A L E N O.

Easdem

PLANTARVM HISTORIAE

Easdem quas Rapa vires obtinent. Vide itaque caput de rapis.

DE BOTRY. CAP. LXIIII.

Botrys herba hic frequēs diuersa à frutice quē Piment vocamus. Blattaria & vua crispa nobis ignotæ.

NOMINA.

Botrys Græcis, Botrys Latinis appellatur. Officinis & vulgaribus herbariis incognita. Germanis haud ineptè Traubenkraut (Gallicè Du Botrys vn Pymment) nominabitur. Botrys verò dicta est à se de dicta. minc, quòd racematim ramulis adnascitur.

FORMA.

Herba tota est lutea, fruticosa, sparsa, multaq; alarum caua habens. Semen totis ramulis adnascitur. Folia Cichorio similia obtinet, totaq; valde odorata est, ideoq; vestibus apponitur. Ex qua quidē descriptione omnibus manifestum fit, herbā cuius pieturam exhibemus esse legitimam Botryn: vniuersa enim herba ad luteum colorem vergit, fruticosa est, & multis stolonibus fusa, foliis Cichorii, odoratis, semine circa ramulos totos in racemos collecto nascente. Quid multa? nulla est prorsus nota, quæ illi non appositissimè quadret.

LOCVS.

Nascitur circa profluentes aquas & torrētes. In Germania tamen, quod equidem sciam, non nisi satā prouenit.

TEMPVS.

Augusto.

Augusto et Septēbri ad maturitatē maximē peruenit: quibus etiā mensibus, vt Ruellius annotauit, venalis herba per Parisiēsiū urbē defertur. Odo-
ris enim gratia Galli vestimentis, pānis, & linteis curiosē interponūt. Apud Germanos tamē eius herba nulla est gratia, quōd illis hactenus ignota fuerit.

TEMPERAMENTVM.

Calidā & siccā esse Botryn amaritudo eius quæ gustui occurrit, facilē monstrat. Itē vis eius inciden-
di, quæ illi propter calorem, tenuitatemq; inest.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

In vino pota orthopnceas lenit.

EX PAVLO.

Planta est admodū odorata, quæ cum vino pota non nisi recta ceruice spirantibus auxiliatur.

EX PLINIO.

Medetur orthopnoicis.

DE BARBA CAPRI. CAP. LXV.

NOMINA.

Quo nomine veteribus Græcis et Latinis hæc Hæc herba vocata sit, nobis nondum compertum hæc non est
est. Neque enim Pycnocomon est, quōd Pycnoco-
a descriptione illius prorsus abhorreat. Quare Bar- mon.
bam caprinam interea donec certius nomen nacti Barba ca-
fuerimus, nūcupabimus, a florum nimirum figura, pri cur di-
quæ caprinam barbam referre videtur. Germanicē cta.
Vuald geiszbart, vt eam segregaremus ab alte-
ra eiusdem nominis, quæ non in syluis, vt hæc ipsa,
nascitur,

PLANTARVM HISTORIAE

nascitur, sed in pratis & senticetis, appellare nobis placuit.

FORMA.

Caulcm habet tricubitalē, angulosum, folia Castaneæ aut Corylo similia, in ambitu serrata, flores candidos, exiguos, racematim cōpactos, instar barbe canæ dependentes, radicem nigram, lignosam, intus candidam. Flores eius in inulos abeunt.

LOCVS.

Prouenit in obscuris syluis, & vallibus nonnumquam minus apricis.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse hanc herbam faciliè ex gustu deprehenditur: miram enim amaritudinem, in radice potissimum, gustata exhibet.

VIRE S.

Abstergit haud dubiè expurgátque, & quæ in venis est, crassitiem incîdit. Quamobrem menses ducit, educendóque, ex thorace & pulmone, puri auxiliatur. Et in summa, siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam continetur eiusmodi, expurgat. Hac utique ratione & morbo comitiali cōpetit. Extrinsecus illita & imposita, tumores ex pituita ortos discutit.

DE BLATTARIA. CAP. LXVI.

NOMINA.

NVM Græcis authoribus cognita hæc herba fuerit, nondum compertum habeo. Plinius certè libro xxij. cap. ix. Blattariam nominat. Inue- Blattaria nit autem nomen hoc Latinum, à colligendis in se vnde dis blattis. Ideoq; conuenientissimo nomine Germanis Etas. appellabitur Schabekraut (Gallicè Herbe ver- mineuse semblable à Boillon blanc.)

FORMA.

Plinius loco iã citato Blattariã sic pingit: Blate- taria est similis Verbasco herba, quæ sæpe fallit- pro ea capta foliis minus cãdidis, cauliculis plurib- bus, flore luteo. Ex qua pictura satis constat, herbã cuius picturã damus esse Blattariã: sic enim Ver- bascum mentitur, vt pro eo sæpius ab imperitis decerpatur. Et sunt nō pauci herbarij, qui hac simili- tudine decepti, cã inter Verbasci genera connume- rent. Folia tamẽ, quæ minimè sunt hirsuta & can- dida, sed potius viridia, facilè ab hoc errore paulò attentiores reuocare possunt. Plures deniq; caulicu- los habet, flores item luteos, ad Verbasci flores pro- ximè accedẽtes. Folliculos quoq; lini instar, in qui- bus semen cõtinetur.

LOCVS.

Nascitur iuxta aquas, & fluminum ripas.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Vebemens amaritudo eius satis docet esse cali- dam & siccam.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX PLINIO.

Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Roma Blattariam vocant.

APPENDIX.

Non plura de huius herba facultatibus apud probatos autores inuenio, sed haud dubiè si quis ea uti voluerit, eadem quæ alia amara, in corpore nostro efficere potest. Quæ qualia sint, ex capite præcedente facile intelliges.

DE BROMO. CAP. LXVII.

NOMINA.

Bρῶμος Græcè, Avena latinis ac Officinis, Germanis **Habern** (Gallicè **Auoyne**) dicitur.

FORMA.

Foliis & culmo Tritico similis, geniculis interfecto. In summo verò fructum habet veluti locustas duplici crure diuicatas, in quo semen includitur. Radicem copiosam.

LOCVS.

Passim in Germaniæ agris nascitur, ac iumentorum potius quàm hominum pabulum existit.

TEMPVS.

Scratur Martio mense, metitur autem Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Avena vt medicamentum refrigerat, Galieno auctore: vt alimentum verò, eodem teste, calefacit sufficienter. Vtroque verò modo exiccat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen

Semen eius haud secus quàm hordeum ad cataplasmata vtile. Plus etiam ex ea sit cohibendæ aluo accommodata. Succus eius in sorbitione acceptus, tussientibus prodest.

EX GALENO.

Auena vt medicamentum similem hordeo vim obtinet. Nam illitum desiccatur, & digerit mediocriter, & sine morfu. Nonnihil etiam adstrictionis obtinet, vt ventris profluvia iuuat.

EX PLINIO.

Semen vtile ad cataplasmata atque hordeum & similia. Prodest tussientibus succus. Avena farina in aceto tollit neuos.

DE VVA CRISPA. CAP. LXVIII.
NOMINA.

Veteribusne Græcis & Latinis frutex ille cognitus fuerit, me ignorare adhuc ingenuè fateor. Quare cum nomen aliud quo hunc appellaremus in promptu non esset, vulgarem & qua omnes hodie herbarij vtuntur nomenclaturam vsurpare volumus. Vnam autem crispam fruticem hunc *Vua crispa* dixerunt ab intortis ferèque in circulū versis (*crispa* aliij vocant) foliis, & acinis quos producit. Quò *Etia.* etiam respicientes Germani nostri, *Kruszbeer*, oder *Kruselbeer* vocant. Latinius fortè *vua* intorta nuncuparetur.

FORMA.

Frutex est ramulis multis, aculeatus, rectoq; spinarum

PLANTARVM HISTORIAE

Hierosoly Padani Balsaminam vocant, Hierosolymitanū po-
mitanum mum Hetruria, Mirabile Gallia, vulgus Italorum
pomum. Charantiam, quoniam septi modo in hortis fene-
Charan- strisq; per cancellos opere topiario facile digeratur.
tia. Alteram, quam fœminam nominauimus, Itali neu-
Alter a tro genere Balsaminum appellant, priori quidem
Balsamic. quod ad fructū attinet similis, nisi quod minor est,
Balsami- in aliis dissimilis: neque enim foliis, neq; etiam flo-
num. ribus respondet. Vtraque planta visu pulcherrima
 est, vt hoc saltē nomine pingi meruerint. Etsi præ-
 stet etiam harum habere picturas, vt de iis plura
 inuestigandi posteris occasio aliqua sit.

FORMA.

Prima. Prima tenuibus prælongisq; flagellis vltro citrō-
 que reptantibus euagatur, foliis Vitis albæ seu Bryo-
 niæ, articulatiorebus, exilibus pampinis ex alarum
 sinu prodeuntibus quibus illigantes sese cancellatim
 vicinis implicant pergulis: flore cucumeris ex albo
 in luteum languescente, turbinato vtriusque fructū,
 carnosâ cute, & per versus verrucosa, ac rigidiori-
 bus bullis intumescente, cucumeris syluestris pusilli-
 ti similitudine, puniceus maturo color, chartilago
 intus punicea vel lutea, sanguineusque succus. Po-
 mum maturitate dissilit, inanitasq; confracto pa-
 tet, semina intus pomi formam referentia continēs.

Alterius Altera caulem habet crassissimū, Portulacæ assi-
 milem, in herbaceo colore rubescentem, Folia Salis-
 cis, in ambitu incis, flores magnos, fupureos, in-
 star

star Consolida hodie regalis vocata herba caudatos, fructum prior non dissimilem, primo herbaceū, dem pallidum luteūmve, pilosum, qui maturitate dissilit, inanitāsque confraeto apparet, semina intus aliquot lenticulae ferè figura continentem.

LOCVS.

Non nisi sata in Germania proueniunt. Sed iam in multorum hortis plantata nascuntur.

TEMPVS.

Floribus & fructibus prægnautes sunt Augusto & Septembri mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod Telephium temperamentum, potissimum alteram, obtinere arbitror. Quare in secundo ordine intenso, aut certè principio tertij exiccare, nec insigniter calefacere, primo nimirum ordine, est verisimile.

VIRE S.

Ex primi generis Balsamines seminibus oleū exprimitur, ad vulnera, quod in Corollario suo annotauit doctissimus Hermolaus, præcipuum. Nonnulli pomum oleo prius imbutum aliquot dies insolant, deinde vel fimo, vel terra tantisper obruunt, dum prorsus intabuerit, sic Balsami vires glutinadis vulneribus adsciscere pollicentur, inde tractum Balsamina vocabulū. Quid multa? in vulneribus sanāne vox vnde Telephio non inferiores esse coniicio, hincq; Balsaminae appellatas. Nos tamen de iis peculiarem

PLANTARVM HISTORIAE

experientiam nullam habemus. Poterunt itaque alij, si lubet, earundem virium facere periculum.

DE GLYCYRRHIZA. CAP. LXX.

Glycyrrhiza Gallis partibus transpositis
Rhiza glyceia, Riglice.

NOMINA.

ota
Liquiritia. **I** Λικυρρίζα Græcis, Dulcis radix Latinis, Licquiritia officinis, Germanis Sufzholtz (Gallicè Erculisse, ou rigolisse) dicitur. Nomen tum Glycyrrhiza apud Græcos, tum etiam Latinos à dulcedine, quæ rhiza vnde radix eius prædita est, inuenisse notius est, quam de dicta. vt dici debeat. Theophrastus nono de plantarum Scythica historia libro, Scythicam nominauit radicem, quod radix. in Scythia circa Maotim paludem plurimum proveniat. Sunt etiam qui ὄδι-φορ vocitent, quod sitim retenta in ore arceat.

FORMA.

Brevis frutex est, ramos binum cubitorum altitudine spargens, in quibus folia densa, Lentisco similia, pinguis, tactuq; glutinosa, Florem fert Hyacintho similem. Fructum pilularum Platani magnitudine, asperiores tamen, siliquas Lentis modo rubescentes, breuesq; habentem. Radices illi sunt longæ, colore buxæ vt Gentianæ, subacerbæ, sed dulces, quæ Licij modo in succum coguntur & densantur. Hæc delineatio ita Liquiritiæ hodie vocatæ quadrat, vt nulla penitus sit nota quæ in illa non reperiatur. Fruticosa enim est, ramos, bicubitales emittens,

*mittens, foliis lentiscinis, densis, pinguibus, tactuq;
sequaci lentore glutinosi. Flore Hyacinthi, fructu
pilularum Platani crassamento, sed asperiore, sili-
quas Lentis figura, & breues habente. Radicibus
prælongis, buxæo colore, & dulcibus.*

LOCVS.

*Plurima & optima in Capadocia ac Pontona= Pabenber
scitur. Multa præterea nec ignaua aliquot Germa gensis æ
niæ nostræ locis, Pabēbergēsi præsertim agro, IOA= ger Gly=
CHIMI nostri Camerarij viri doctissimi patria, cyrrhiza
producitur. Et hodie nusquā ferè non seritur in hor fœcūdus.
tis. His quæ semel comprehenderit, tam pertinaci Ioach. Ca
fertilitate coheret, vt vix vnquā possit radicitus merarius.
extirpari, tam restibili fœcunditate regerminat.*

TEMPVS.

*Carpitur Septēbre mense, quando semine præ-
gnans est, aut vergiliarum occasu. Flores suos Iu-
lio mense profert.*

TEMPERAMENTVM.

*Natura eius nostræ temperatura familiaris est:
nam tale monstratum est esse id quod dulce est. Sed
quum adstrictio quadam adiuncta sit, vniuersum
eius temperamentum quantum ex caliditate &
adstrictione est, tepida potissimum caliditatis fœ-
rit, quamproximè ad symmetrum temperatūmve
accedens. Porro quum etiam dulcis sit, humida
quoque sit oportet.*

VIRE. EX DIOSCORIDE.

PLANTARVM HISTORIAE

Succus radicis ad arteriae exasperationes utilis est. Oportet autē vt linguae subditus cliquescat. Ardori stomachi, & ad iecinoris thoracisque vitia prodest. Vesicae scabiem, & renum vitia cum passo potus emendat. Idem cliquatus sitim restinguit. Vulneribus prodest circumlitus. Cōmāducatus stomacho succurrit. Radicum recētium decoctum ad eadem conuenit. Radix verò sicca in puluerem trita, pterygiis commodissimè inspargitur.

EX GALENO.

Huius fruticis radicū succus in primis utilis est, similiter vt eius radices dulcis, simulq; modicè adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nō solum in arteria, verumetiam scabra vesica, idq; temperaturae mediocritate. Quoniā autem temperie quodque humidum est quod modicè dulcè est, iure sanè sitim arcens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & natura humana frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum illitu idoneum esse remedium.

EX THEOPHRASTO.

Dulcis & Scythica radix utilis ad suspiria, & tussim siccam, atque in totum thoracis laborantis medicamēto commoda redditur. Quin & ex melle vlceribus mederi potest. Sitim quoque extinguit, si teneatur in ore. Qua de causa tum ea, tum Hippace, Scythas decem & duodecim dies degere, & vitam prorogare affirmant.

EX PLINIO.

Radiciſ uſus in ſubditis decocta ad tertias, cætero ad mellis craſſitudinem, aliquando & tuſa. E quo genere & vulneribus imponitur, & faucium vitii omnibus. Itē voci vtiliſſimo ſucco, ſicut ſpiſſatus eſt linguæ ſubdito: itē thoraci & iecinori. In ore habētes ſitim non ſentiūt: ob id quidā Adipſon Adipſon. appellauerūt eam, & hydropicis dedere ne ſitirēt. Nō parum auxilii conſert iis qui perpetua ſiti excruciantur: ideo commanducata & ſtomatice eſt, & ulceribus oris inſpergitur, ſæpe & pterygiis. Sanat veſicæ ſcabiem, renum dolores, condylomata, vlcera genitaliū. Dedere eam quidam potui in quartanis drachmarum duarum pondere, & pipere, hēmina aquæ. Commanducata ſanguinem ſiſtit ex vulnere. Sunt qui & calculos ea pelli tradiderunt.

DE GALEOPSI. CAP. lxxi.

Galeopſis tibi pingitur noſtra cataria.

NOMINA.

Γαλιόψις, ἢ γαλεόψιδον Græcè: Galeopſis, Vrtica iabeo Latine, vulgò & officinis Scrophularia maior, Ficaria, Millemorbia & Caſtranguſa dicitur. Germanicè Kraunuuriz, Sauuriz groſz feiguuart Zenkrant. Appoſitè autem Galeopſis appellatur, nomine ex græco & latino cōpoſito, quod eius flores prorſus galeæ aſpectū referāt. Aut ſi græca cum latinis componi haud poſſunt, γαλιόψις cum Η & νō Ι, vt habent multa exēplaria,

Scrophularia maior.

Galeopſis cur dicta.

PLANTARVM HISTORIAE

ria, scribendum erit, ut idem valeat ac *mustela* a spectum referens: flores enim non dissimiles esse capiti illius animalis videntur. Et ita legendum esse Plinius etiam testatur, qui *Galeopsin* hanc nominat herbam. *Scrophulariam* autem à curādis struomis, quas *scrophulas* vocant recentiores, dixerunt.

FORMA.

Totus cum suo caule & foliis frutex *Vrtica* similis est, leuiora tamen habet folia, & cum tenuetur grauiter odorata. Flores illi tennes, & purpurascetes. Huius delineationis notæ in vniuersum omnes, nulla prorsus reclamante, herbae quam vulgus *Scrophulariam* maiorem nominat, conueniunt. Frutex enim est qui ad humani corporis ferè longitudinem interdum assurgit, foliaq; *Vrtica* habet, sed leuiora, & quæ trita grauem fundunt odorem. Flores tennes, atque purpurascetes. Respondet etiā locus natalis, ut ex sequentibus patebit. Esse autē veterum *Galeopsin* vulgi *Scrophulariam* maiore, præter ea quæ iam diximus, manuscriptus quoque codex euidenter ostendit, in quo pictura ita *Scrophulariā* refert, ut nemo sit qui eam non agnoscat. Huc accedit quod in descriptione, quam ex Dioscoride desumpsit, aperte testatur *Scrophulariam* maiorem alio nomine dictam esse *Galeopsin* & *Galeobdolon*. Neque facultates discrepant, sed vtrarūque similes sunt, adeo ut haud dubiè veterū *Galeopsis*, recentiorum herbariorum sit *Scrophularia* maior.

maior.

LOCVS.

Nascitur circa sepes, semitasq; & in areis adificiorum passim. TEMPVS.

Colligitur Iunio & Iulio mensibus, tum enim potissimum floret.

TEMPERAMENTVM.

Desiccatur, extenuatur, & discutitur, adeoq; partium est tenuium, id quod amaritudo quā in gustu praese fert, satis indicat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia, succus, caulis & semen, duritias, carcinomata, strumas, parotidas & panos dissipant. Oportet autem bidie cum aceto tepidum cataplasma imponere. Fouentur & decocto eius vtiliter. Ad nomas, gangranas, & putrescentia cum sale illita profunt.

EX PAVLO.

Galeopsis, quam alii Galeobdolon appellant, vritica similis herba est, maiorem tamen leuorem habet, & odorem grauem. Scirrhosos tumores dissipat & emollit. Item ad nomas cataplasmatibus modo illita confert.

EX PLINIO.

Galeopsis folia caulesq; duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos & parotidas discutunt. Ex vsu est & decocto succo fouere. Putrescentia quoq; & gangranas sanant.

APPENDIX.

Recentiores etiam Scrophularia tribuunt facultatem sanandi vlcera putrescentia, & mariscas. Suc-

cum

PLANTARVM HISTORIAE

cum eius mederi deformitati faciei iam ferè elephantica tradūt, vt inde satis constet à Galeopsi nō diuersam esse. Semen in expellendis & enecandis lumbricis esse efficax adiiciunt, id quod ab eius amaritudine non abhorret.

DE GALLIO. CAP. LXXII.

Gallium à florum pallidorum & odororū copia, florastre dicitur, aliis aspergula minor, quòd aspergilli formam habeat.

NOMINA.

Gallion
vnde dicitur
etū.

Γάλλον, ἡ γαλλέριον, ἡ γαλάτιον Græcis, Gallion Latinis. Officinis, vt multæ aliæ optimæ herbae, neglecta et incognita est. Germanis Vnser liebē frauē Vueg, oder Vual, oder betstro (Gallicè Petit muguet) dicitur. Nomen inuenit ex eo quod vim coagulandi, ac spissandi lactis habeat.

FORMA.

Ramulos rectos, & folia Aparinae similima habet. Florem in summo luteum, tenuem, frequētem, valde odoratum. **LOCVS.**

Nascitur in aruis et humidis palustribusve locis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gallium siccum est & subacre.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Flos eius ambustis illinitur, & sanguinis profusio cohibet. Idē cerato rosaceo miscetur, insolatūque

que

que donec albescat, & sic lassitudines recreat. Ra-
dix venerem stimulat.

EX GALENO.

Galliū inde adeò nomen sortitum est suum, quòd
lac coagulet. Facultatem obtinet exiccatoriam &
subacrem. Flos eius sanguinis profluuiis competere
videtur, & ambustis mederi. Est autem boni or-
doris, & coloris lutei.

DE GLECHONE. CAP. LXXIII.

Pulegiū in syluis & locis æditis luxuriat.

NOMINA.

ῥήχων, ἢ βλήχων Græcè, Pulegiū Latī-

ne vocatur, Officina latinū nomē retinet.

Germanicè Poley (Gallicè du Pouliot) Blechon.

Blechona autem appellarunt, quòd gustatum à pe-
core cū floret, balatū concitet. Id quod Plin. li. xx.
capite xiiij. autore, de sylvestri verè dicitur. Pule-
gium verò, quòd eius flos recens incensus pulices
interficiat.

GENERA.

Plinius & Apuleius duo Pulegii faciunt genera,
alterum fœminam, alterum marem: nec alia ratio-
ne differre scribunt, nisi quod mas cædidū, fœmina
verò purpureum florem habeat. Dioscorides Pule- Satium
gium masculum, quod satium alio nomine in Di- Pulegiū.
ctamni descriptione vocat, duntaxat depingit.
Sylvestre autem secundam Calaminthæ speciē fa- Sylvestre.
cit, quam latini propriè Nepetam nominant, ut
suo loco dicemus.

PLANTARVM HISTORIAE FORMA.

Pulegium mas seu satium, cuius picturam damus, fruticosum assurgit, & ad cubiti altitudinem increfcit, maximè si fit quo sustētetur: foliis Samopsychi, surculis hirsutis, rubicantibus, & per intervalla purpureo flore orbiculatim coronatis.

LOCVS.

Prouenit locis cultis & aquosis: semelq; satum diutina durat etate. TEMPVS.

Carpitur dum floribus pręgnās est, id quod Iulio & Augusto mensibus accidit.

TEMPERAMENTVM.

Pulegium quum acre & subamarum sit, valde tum excalefacit, tum extenuat, ideoque in tertio ordine calidum & siccum esse statuunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Extenuat, calefacit, & concoquit. Potum menses, secundas, & foetus trahit. Cum melle & aloe potum, ea quę circa pulmonem sunt, educit, & conuulsis auxiliatur. Nauseas stomachique morsus cum posca potum lenit. Atram bilem per aluum educit. Cum vino potum venenatorum morsibus succurrit. Defectos animo cum aceto naribus obiectum recreat. Siccatum & in puluerem tritum crematumque gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflammationes omnes mitigat. Podagris per se confert vsquedum rubescat cutis. Cum cerato varos tollit. Lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctio

eius prurigines si eo lauantur sedat. Inflationes, duritias, & conuersiones vuluæ in defensionib. inuat.

EX GALENO.

Pulegium calefacere abundè magnum est testimonium, quòd illitum rubrificat, & quòd, si quis diutius toleret, exulceret. Extenuare verò satis indicat quum humida, crassa & lenta ex thorace et pulmone excreatu facilia faciat, mensesq; moueat.

EX PLINIO.

Magna societas cum Mentha, ad recreandos defectos animo, Pulegio cum surculis suis in ampullas vitreas aceti vtrisque deiectis. Qua de causa dignior è Pulegio corona vertigini quàm è rosis, cubiculis nostris pronunciata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur leuare. Quin & olfactu capita tueri contra frigorum æstusq; iniuriam, et à siti traditur: neque æstuar eos qui duos è Pulegio surculos impositos auribus in sole habeant. Illinitur etiam in doloribus cum polenta & aceto. Nauseas cum sale & polenta in frigida aqua pota inhibet. Sic et pectoris ac ventris dolorem. Stomachi autè ex aqua item rosiones sistit, et vomitiones cum aceto et polenta. Intestinorum vitia melle decocta & nitro sanat. Vrinam pellit ex vino, et si aminæum sit, & calculos, et interiores omnes dolores, ex melle et aceto sedat. Menstrua & secundas, vuluas cõuersas corrigit, defunctos partus eiicit. Comitialesbus in aceto cyathi mensura datur. Si aqua insalubres

PLANTARVM HISTORIAE

bres bibendæ sunt, tritum inspergitur. Salstitudines corporis si cum vino tradatur minuit. Nervorū causa & in contractione, cum sale, aceto & melle conficitur opisthotono. Bibitur ad serpentium ictus decoctum. Ad scorpionum, in vino tritum, maxime quod in siccis nascitur. Ad oris exulcerationes, ad tussim efficax habetur. Flos recentis incōsus, pulices necat odore. Xenocrates Pulegii ramum lana inuolutum, in tertianis ante accessionem olfactandum dari, aut stragulis subiici, & ita collocari ægrum, inter remedia tradit.

EX SIMEONE SETHI.

Pulegiū attenuat & calfacit vehementer, quapropter humida & crassa in thorace, & in pulmone humida & glutinosa iuuat, & vt excreentur efficit. Cum vino albo coctum & potum, calidumq; syncerū menses prouocat. Extrinsecus illitū ischiadicis, & aliis partibus frigore affectis auxiliatur.

DE GENTIANA. CAP. lxxiiii.

Gentiana ex monte Iura huc cōuehitur.

NOMINA.

ΕΥΤΙΛΛΗ, græcè Gētiana latinè appellatur.

¶ Nomen apud oēs officinas retinet. Germanicè Entzian, oder Bitteruurtz (Galli

Gentiana cè Gētiane) nominatur. Sic à Gentio Illyriorū rege, qui in bello primus eius vires reperit, dicta est.

FORMA.

Folia Gentianæ iuxta radicē crumpunt iuglandi

di aut Plantagini similia, subrubētia: sed quæ à medio caule, præsertim autem cacumine prodeunt, brevioribus incisuris secta sunt. Caulis illi inanis, levis, digiti crassitudine, binum cubitorum altitudine, geniculis intersectus, ex maioribus intervallis folia proferens. Flores eius lutei primum calycibus conclusi, postea intumescētes explicantur. Semen in calycibus obtinet iatus, leue, glumosum, ad Spondilij semen accedens. Radicem mittit longam, similem Aristolochiæ longæ, crassam, & amaram.

LOCVS.

Nascitur in altissimis montium cacuminibus, vmbrosis locis & aquosis. Plurima verò & copiosissima sub Alpinis montibus in Illyrio, & in mōte Farnberg haud procul à Tubinga sito.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimum mense, dein Iulio semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudo immensa satis monstrat radicem eius esse calidam & siccam.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Gentiana radix calefactoriam & adstringentē vim habet. Venenatorū morsibus succurrit duarū drachmarū pondere cū pipere, ruta & vino pota. Succī drachma, laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis et cōuulsis opitulatur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix colligij moda

de subdita foetus eiicit. Vulneraria est, imposita ut
lycium, vulneribusq; sinuatim depascentibus, potissimum
succus, medetur. Oculis inflammatione laborantibus
illinitur. Pro meconio collyriis acribus miscetur
succus. Radix alphas abstergit. Contusa radix
diebus quinque aqua maceratur, postea in eadem
decoquitur, dum aquae radices superstant emineant:
ve: deinde ubi refrixerit aqua lintecolo percollatur,
iterumque decoquitur, dum mellis crassitiem con-
trahat: demum in vase testaceo reconditur.

EX GALENO.

Radix Gentiana herbae admodum efficax est quum
opus est extenuatione, purgatione, abstersione, obstru-
ctionis liberatione. Nec mirum si haec possit, quum
impense amara sit. EX PLINIO.

Vsus in radice & succo. Radicis natura est ex-
calfactoria, sed praegnantibus non bibenda. Praeci-
pue aduersus angues duabus drachmis cum pipere
& ruta, vini cyathis sex, siue viridis siue sicca pota
prodest. Tanta huic vis est, ut iumentis etiam non
tuscentibus modo, sed ilia quoque trahentibus au-
xilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua po-
ta. Farina eius ex aqua tepida fabae magnitudine
pota, interancorum vitiis occurrit. Radix trita vel
decocta, a ruptis, conuulsis, et ex alto deiectis po-
tatur. DE GLYCYSIDA. CAP. LXXV.

Paeonia mas & foemina nobis frequens, so-
lam pingis foeminam.

NOMINA.

IΛΥΚΥΣΙΔΙ, ἢ ΠΑΛΟΥΙΑ Græcis, Pæonia & Casta herba Latinis dicitur. Nomen Pæonia in officinis seruat. Germanis Peō szblum, Konigszblum Gichtuuriz, Benignenrosz, Venedischrosz, Benedictenrosz, Pfingstrosz. (Gallicè Piuoine) vocatur. Glycysida porro dicta est quòd Glycysida grana mali punici acinis similia habere videatur. vnde dicitur Nā sidia mali punici grana à Bæotis nominantur. Et a. Pæonia ab eius inuētore medicinae peritissimo, Pæone appellata est. Pæonia cur dicta.

GENERA.

Duo eius genera sunt, mas & femina. Mas in vulgaribus herbariis Niniucnuuriz, femina verò Peonienblum, aliisq; nominibus Germanicis paulò antè cōmemoratis nuncupatur. Idē, magno errore Pæoniam à Pionia differre putant, atq; adeo diuersis etiam capitibus, imò & viribus disiungūt. Ferēdus tamen is error esset, nisi vtrique etiam her Error herbarum. bæ, hoc est, Pæoniae & Pionia, duplex genus assignarent, marem nimirum & feminam, cū tamē sub vna Pæonia nomenclatura, vtrunq; genus Dioscorides & alij veteres complexi sint.

FORMA.

Caulis duorum ferè dōdrantum altitudine nascitur, multas propagines habens. Mas Iuglandi nucifolia similia obtinet: femina verò smyrnæ modo diuisa. Summo caule siliquas quasdam Amygdalis

p^{ri}mae similes

similes profert, in quib. quum aperiuntur, grana rubra, multa, exigua, punici mali acinis similia inueniuntur, ī medio nigra, purpurea, quinque aut sex. Radix maris digiti crassitudine, dodrā tali vero longitudine, gustu adstringens, alba. Fœmina propagines sobolē seu glandes septem aut octo, ut Asphodelus habet. Ex qua siquidem descriptione abundè liquet, Pœoniam quæ passim in hortis nascitur, & cuius hęc picturam damus esse fœminā, quod eius folia Smyrni modo sint laciniata, & quod radix septem aut octo veluti glādibus constet. Reliquæ notæ, potissimum quod in siliquis grana alia rubetia, alia nigra sint, utrique generi communes existunt.

LOCVS.

Nascitur in altissimis montibus, & passim hodie, fœmina potissimum in hortis prouenit.

TEMPVS.

Maio floret mense.

TEMPERAMENTVM.

Pœonia radicem habet leuiter adstringentem cū quadam dulcedine. Si verò plusculum dentib. mādas, acrimoniam item quampiam subamarā subesse percipies, id quod in radice etiā nostratis Pœoniæ, quam fœminam esse diximus, deprehendes. Pœoniæ verò in vniuersum temperamentum tenuium est partium, exiccatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulò calidius.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Datur radix mulieribus à partu non purgatis. Cit menses Amygdalæ magnitudine pota. Ventris doloribus cum vino pota auxiliatur. Regio morbo correptis prodest, renum ac vesicæ doloribus. Decocta in vino & pota, alui sistit. Seminis grana rubra decem aut duodecim pota in vino austero, nigro, rubentem fluxionem sistit. Stomachicis & erosionibus comesta prosunt. A pueris pota et comesta, initia calculorum eximunt. Grana nigra nocturnis suppressionibus, ephialtas nominant, vulvæ strangulationibus, & uteri doloribus in aqua mulsa aut vino quindecim pota, opitulantur.

EX GALENO.

Radix Pæoniæ menses cit ex mulsa Amygdalæ quantitate pota. Sanè tundere eam oportet ac cribrare, & sic inspergere. Expurgat etiã iecur obstru-
ctum & renes. Sed hæc efficere nata est quâ acris & subamara est, quâ verò quiddam etiam adstrictiorum obtinet, fluxiones ventris sistit. Oportet autem tunc in austeriorum vinorum quopiam eã decoctam bibere. Est omnino resiccatoria vehementer, ut nō desperauerim eam ex collo pueris suspensam, meritò comitiale morbum sanare. Equidem vidi Historia.
puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, ex eo quo gestabat radicem tempore. Vbi autem forte fortuna quod à collo suspensum erat decidisset, protinus morbo
p q correctus

corruptus est: rursusq; suspensio in illius locum alio, inculpate postea se habuit. Visum verò est mihi satius esse denuò id certioris experiētiae gratia detrāhere, id quum fecissem, ac puer iterum esset cōuulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea cōuulsus. Rationabile itaque erat aut partes quāspiam à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, ita affectos locos curare, aut aerem à radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam phlegmone affectam iuuat, & Nigella frigida pulam destillationes & grauedines desiccant, si quis eam in calidum linteam rarum liget, assidueque calore ex ea per inspirationem quæ per nares fit, attrahat. Quinetiam si compluribus linis, maxime marinæ purpuræ, collo viperæ inieceris, illis viperam præfocaueris, eaque postea cuiuspiā collo obuinxeris, mirifice profuerit tum tonsillis, tum omnibus iis quæ in collo expullulant.

EX P L I N I O.

Pæonia medetur Fannorum in quiete ludibriis. Rubra grana rubentes menses sistunt quindecim ferè pota in vino nigro. Nigra granavuluis medetur, ex passo aut vino totidem pota. Radix omnes ventris dolores sedat in vino, aluumque purgat. Sanat op. Rhotonum, morbum regium, renes, vesicam. Matricem autē et stomachum decocta in vino, aluumq; sistit.

sistit. Estur etiam contra malum mentis, sed in me-
dēdo quatuor drachmæ satis sunt. Grana nigra au-
xiliantur & suppressionibus nocturnis in vino po-
ta quo dictum est numero. Stomacho verò & ero-
sionibus, et esse ea et illinire prodest. Suppurationes
quoque discutiuntur recentes nigro semine, veteres
rubro. Vtrunque auxiliatur à serpente percussis, et
pueris contra calculos incipiente stranguria.

DE GERANIO. CAP. LXXVI.

Gerania omnia hîc frequentia.

NOMINA.

Tερρανιον Græcè, Geranium Latine, vulgò & Rostrum
herbariis Rostrum ciconia appellatur. Gera- ciconia.
nium autem à gruini capitis imagine, quæ summo Geraniū
eius plantæ capitulo inest, Græcis aptissima simi- unde di-
litudine dictum est. Sic recentioribus à ciconia etum.
rostri effigie, Rostrum ciconia nominatum est.

GENERA.

Duo Geraniū Dioscorides tradit genera. Primum Primum
quod longioribus rostris, & in mucronem acumina genus.
tis constat. Hoc hodie officinis & herbariis Acus
pastoris & Muscata, Germanis verò Storcken-
schnabel dicitur. Alterum quod maluæ folia ha- Secundū.
bet, Pes columbinus vulgò nominatur. Sūt qui tur-
piter aberrantes, Amomum esse existimant. Ger- Amomū
manicè Taubenfusz, oder Schattenkraut ap- non est Pes
pellatur. Præter hæc duo alia adieccimus genera, colūbinus.
inter quæ id quod tertium ordine est, foliis Arte- Tertium.

PLANTARVM HISTORIAE

misia tenuifolia vel Charephylo simile existit,

Robertia= herba Roberti & Robertiana à nonnullis, haud du-
na. biè à superstitione aliqua Diui, qua superior ætas

Quartū. mirificè imbuta fuit, appellatur, Germanicè Ru-
prechtskraut.. Quartū folia obtinēs laciniata,

Quintū. Germanicè p certiori discrimine Kranich halsz
vocari potest. Quintum, quod folia Ranunculi

Sextum. habet, gratia dei nominatur, Germanicè Gottes
gnad, ab insigni in sanādis vulnerib. effectū. Sex-
tum, quod forma quarto generi similitimum est, nec
ferè ab illo nisi sola magnitudine foliorum, florum
& radicis distat, Germanicè Blutuertztz, à rubro co-
lore aut mirifica in sistendo sanguinis profluvio fa-
cultate vocatur.

FORMA.

Primi. Geranium primū caules habet à radice rubētes,
lanuginosos, folia Anemonēs, diuisuris incisa, flores
purpureos, & in cacumine caulium fastigia capis-
tulis ciconie aut gruum cum rostellis longitudine
acus emicantia. Radicem oblōgam & subrotundā

Secundi. dulcemq;. Alterum vt præcedens caules tenues,
rubētes à radice statim, lanuginososq; obtinet, folia
maluæ similia, candidiora, flosculos subpurpureos,
capitella gruini capitis modo rostrata, radicē tenuē

Tertij. & oblongam. Tertium caules habet à radice ru-
bescentes, lanuginosos, geniculatos, saporis & odo-
ris iniucundi, folia Charephylo aut Artemisiæ te-
nuifolia similia, flores purpureos, capitella gruini
capitis modo rostrata, radicem intus viridem, &

adstring

adstringentē. Quartum cauliculos itidem vt re- Quarti.
 liqua rubentē, lanuginosum, folia laciniata admo-
 dum, flores purpureos, ex quibus capitella gruini ca-
 pitis instar rostrata, & in iis semina quinque na-
 scuntur: radicem intus candidam, extrā sublutā.

Quintum reliqua omnia magnitudine excedit, Quinti.
 caules emittit oblongos, rotundos, modicē lanugino-
 sos, à radice statim rubentes, folia Ranunculo simi-
 lia, flores ferē cæruleos, capitella præcedenti Gera-
 nio similia, radicem crassam & longam, multis
 exiguis radiculis veluti capillamentis quibusdam
 fibratam. Sextū ramos habet tenues, lanuginosos, Sexti.

folia laciniata, tenuia, flores in summo purpureos
 ex quibus, vt in quarto, capitella gruini capituli for-
 mam referentia proueniunt. Radicem extrā & in-
 tus rufam.

LOCVS.

Omnia Geraniū genera in incultis proueniūt. Pri-
 mum passim in campestribus, & nonnunquā inter
 segetes nascitur. Alterum in colliculis. Tertium in
 vmbrosis locis & dumetis. Quartum in agrorum li-
 mitibus, & iuxta sepes. Quintum in pratis. Sextū
 in locis montosis & saxosis.

TEMPVS.

Primum statim inter initia veris Aprili mēse flo-
 res suos ostendit, & subinde per integram æstatem.
 Alterum, tertium, & quartum, Maio mense florēt.
 Quintum Iunio & Iulio mensibus, quemadmodum
 etiam sextum.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPERAMENTVM.

Omnium folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis est quodammodo, atque adco discutienti vi prædita, adstrigunt ac siccant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Geranij primi in vino drachmæ pondere pota, vteri inflationes discutit. Secundum nullū habet in medicina vsum.

EX PAULO.

Geranium quod foliis respōdet Anemones, radicem habet esulentam, quæ cum vino drachmæ vnius pondere sumpta, vteri inflationes dissolvit. Altera Geranij species in re medica inutilis est.

EX PLINIO.

Primæ Geranij speciei radix, reficientibus se ab imbecillitate utilissima. Bibitur contra phthisin drachma in vini cyathis trib. bis die. Itē contra inflationes, quæ & cruda idē præstat. Succus radicis auribus medetur. Opisthotonicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrhapotum.

APPENDIX.

Et si secundū Geraniū genus à Dioscoride alijsq; nonnullis, tanquā nullius in medicina vsus damnatum sit, tamen posterior ætas quotidiana experientia in sanandis vulneribus & fistulis, eius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit: proinde eas herbas his ipsis in potu mirificè conferre tradunt. Et certè nō mirum est earūdem vires olim fuisse

fuisse ignoratas, cum & aliarum multarum plantarum facultates, quas constat esse hodie notissimas, veteribus fuisse incognitas, notius sit quàm ut destrari debeat. Antiquus quoque herbarius, præd. Etor. Geraniorum folia magnam vim obtinere in glutinandis vulneribus, & articulorum doloribus lenitèdis tradit. Primi autem radicem mouendi urinam facultatem habere ait, ideoque calculosis, stranguræ & difficultati urinæ prodesse. Tertium genus ad oris, mammillarum, pudendorumque ulcera sananda vnicè conducit. Reliqua similiter ad glutinanda ulcera mirificè prosunt. Nullum verò ad sanguinem undecunque emanantem compescendum præstātius sexto est: unde etiam Germani, ut comprehensum est, Blutwuriz hoc est, sanguinariā radicem appellare voluerunt.

DE GONGYLE. CAP. LXXVII.

Rapum satium Auberuillianum Parisiis commendant radice tuberosa multum & terra extāte. Rapum syluestre nobis cum Dioscoride Rapontium dicitur.

NOMINA.

Γογγύλη ἢ γογγυλὶς Græcis, Rapum Latinis Gongyle & Officinis, germanis Ruben (Gallicè Naqueau rōd) appellatur. Græci autem à figura eius, quæ plerumque rotunda esse solet, vocabulū detorsērunt. Nanque quòd in rotunditatem coactum est, vel in orbem circumagitur, γογγύλιον dixerunt. γογγύλιον Rapa λιον.

PLANTARVM HISTORIAE

Rapa vne Rapa verò, quòd ex terræ rure, quasi ruapa, Varo
de. rone teste nominata est.

GENERA.

Rapi duo sunt genera. Vnum satium, quod simpliciter Germani Ruben vocant. Estq; id iterum duum generum. Vnum candidum, quod Germani etiam Vucisruben vocant: & alterum rubrum,

Rapunculus. Rot ruben iidem appellant. Alterum sylvestre, quod vulgus Rapunculum, quasi paruum rapum, Germani Rapuntzeln nominant.

FORMA.

Sylvestre rapum. Rapum satium caule & foliis raphano simile est: floribus verò & siliquis, in quibus semen profert, Napis aut Brassicis. Sylvestre frutex est cubitali altitudine, ramosum, in summo leue, folia nimium leuia habens digitali latitudine, aut maiora. Semen in calyculatis fert siliquis: dehiscentibus verò seminum inuolucris, alia intus capitum specie est siliqua, in qua semina parua nigra sunt, sed quæ fracta intus albicent. Flos eius in purpureum vergit colore. Radix digitalis ferè est. Quæ delineatio prorsus alludit ad hanc herbam quam vulgus Rapunculum nominat: siquidem cubitalis est, fruticosa, ramosa, folio digitali, nigro in siliquis semine, quod cùm frangitur album intus apparet. Flos etiã purpurei coloris est, radixq; digiti magna ex parte magnitudine constat.

LOCVS.

Satium

Satiuum solum putre & solutum desiderat. Syluestre in aruis nascitur passim.

TEMPVS.

Satiuum rapum floret æstate, ac siliquatur subinde. Syluestre autem verno quidē tempore priusquam in caulem attollitur, acetariis frequenter inseri solet, erutum radicitus cum foliis suis iam recens enatis, quo sanè tempore à pueris etiam agnoscitur. Deinceps verò exit in caulē & adolescit, ac Iunio mense flores, ac subinde semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Rapa calida sunt in secundo ordine, & humida in primo.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Satiui rapi elixa radix nutrit, inflat, carnem flaccidam generat, vencrem stimulat. Decocto eius podagræ ac perniones fouentur. Ipsa etiam radix trita illita prodest. Si verò quisspiam in excava ta radice rosaceum ceratum feruenti cinere liquefecerit, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti eduntur ciendæ urinae accommodi. Semen in antidota & theriaca, præsertim quæ dolores mitigare possunt, aptè additur. Potum venenis aduersatur. Venerē concitat. Muria conditū, comestum minus nutrit, sed appetentiam excitat. Syluestre rapum miscetur medicamentis quæ ad detergendam faciem reliquumq; corpus, ex lupinorum, aut tritici, aut lolii, aut erui farina conficiuntur.

PLANTARVM HISTORIAE
EX GALENO.

Rapi semen vencrem excitat, vtpote spiritũ flatusosum procreans. Sic & radix concoctu difficilis est, inflátque & semen generat. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: ideoque si quis vltra modum esitauerit, & maximè si perfectè conficere eam nequeat, crudum succum in venis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quando bene fuerit percocta, vt quæ longam elixationem requirat, optimaq; sit bis decoctionem perpeffa. Sin crudior ingeratur, concoctioni pertinacius resistet, pariet inflationes, & stomachum infestabit, nona nunquam etiam mordere illum non verebitur.

EX PLINIO.

Rapo vis medica inest. Perniones feruens impositum sanat. Item frigus pellit è pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum tusum cum sale cuicunque vitio pedum. Semen illitum & potum in vino, cõtra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis vero antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ipsum abdicauit in cibis propter inflationes. Diocles magnis laudibus extulit, etiam venerè stimulari ab eo professus. Item Dionysius: magisq; si eruca condiretur. Tosta quoque articulorum dolori cum adipe prodest. Syluestri ad lenigandam albicandamve cutem in faciet totòque corpore, vtũ-

tur mixta, vrina pari mensura . Eius succus circa mensem exceptus, oculos purgat, medetur caliginī admixto lacte mulierum.

EX SIMEONE SETHI.

Admodum nutriunt rapa, vrinam ciunt, inflāt, genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illorum vsus crassum humorē generat, et obstructions iccoris parit. Ventrē nec sistūt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum & haustū magna copia, venerem suscitāt. Fertur quòd si quis hoc ipsū semen cum Calamintha & Lemnia terra commixtū sumat, eo die neque veneno, neq; morsu venenati animalis ledi. Appensum inguinū morbis peculiari quapiam proprietate medetur.

DE GINGIDIO. CAP. LXXVIII.

NOMINA.

Gγγίδιον Grecè, Gingidium Latine, officinis Cherefolium, germanicè Kerbelkraut (Gallicè Du cerfueil) dicitur. Cherefolium autē, Graeca voce & Latina coalescentibus in vnum nomen, ob id dictum est, quòd foliis luxuriēt. Ne tamē vocabulorum vicinitas aliquam pariat confusionem, imperitòque lectori nomēclationum similitudo imponat, sciendum est officinarum Cherefolium diuersum esse à Cherefolio Plinii.

Cherefolium.

Cherefolium vnde dictum.

FORMA.

Herba est syluestri Pastinaca similis, tenuior tās-
tūm;

PLANTARVM HISTORIAE

tum & amarior. Radicula subcandida, amaricante. Vnde satis liquet herbam quam hodie Chærefolium nominant, esse Gingidium. Nam erratica Pastinacæ folium æmulatur, aliquanto tenuius, radícula subalba, amaricante, floribus candidis, semine in siliquis exiguis oblongo, angusto & acuminato.

LOCVS.

Pasim hodie in hortis colitur.

TEMPVS.

Maior mense floret, & subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Sicut gustu amaritudinem & adstrictionem præfert, sic temperamento quoque ipso caliditatem & frigiditatem. Secundum verò vtranque qualitatem desiccatorium in secundo ordine est: vnde iterum colligi potest, Chærefolium esse Gingidium, quod ipsum gustui amarorem & adstrictionem euidentissime representet.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Crudum & coctum olerum modo esui idoneum est. Editur etiam sale conditum seruatumve. Stomacho vtile. Vrinam ciet. Decoctum eius cum vino potum, vesicæ accommodum est.

EX GALENO.

Estur Scandicis modo. Stomacho mirè vtile siue crudum, siue elixum libeat sumere. Longioris decoctionis impatiens est. Nonnulli ipsum ex garo olcòque esitant. Alii vinum aut acetum adiiciunt, ac multo

multo sic magis stomacho cōducit. Cū aceto assumptum, fastidiosos ad cibum inuitat. Perspicuum verò est hanc herbam medicamentū magis esse quàm cibum, quippe quæ & adstrictionis & amaritudinis non obscuræ nec exiguæ particeps est.

EX PLINIO.

Coctum crudūque stomachi magna utilitate estur. Siccat enim ex alto omnes humores eius.

APPENDIX.

Facultates iam commemoratas etiam Chareso suo tribuunt recentiores: scribunt enim mirificè conferre ventriculo, ciendisq; mensibus, & vrinæ in vino decoctum, vt iterum hinc constet à Ginegidio non esse diuersum.

DE GENISTA. CAP. LXXIX.

NOMINA.

GENISTA latinis rei rusticæ scriptoribus & Plinio nominatur. Officinis & barbaram sectantibus medicinam, Genesta & Genestra. Germanis Ginst vel Genist (Gallicè Du Genet) apud Genista pellatur. Genistam autem vocant haud dubiè quòd vnde diu genū modo flexilis ad nexus sit: vel, vt aliis placet, etia. quia genibus medeatur dolentibus. Alia autem est Genista à Sparto, quòd hoc virgas habeat longas sine fo- nō est ea- liis, vt suo dicemus loco, illa autem minutis foliis dem cum scatet.

FORMA.

Sparto.

Genista fruticat ramis herbaecis, scabris, foliis mi-
nutis

PLANTARVM HISTORIAE

nutris scatentibus, flore luteo, apibusq; gratissimo, semine lenticulis haud absimili, quod siliquis innascitur, radice sublutca.

LOCVS.

Per arida loca amat, ideoq; in syluis & iuxta syluas nascitur. TEMPVS.

Floret Maio et Iunio mense, ac subinde in siliquis hirsutis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur in altero ordine, id quod amaritudo quam gustata refert, & eius facultates abundè docent.

VIRES. EX PLINIO.

Semen Genistæ purgat Ellebori vice, drachma & dimidia pota in aquæ mulsæ cyathis quatuor ieiunis. Ramis similiter cum fronte in aceto maceratis pluribus diebus & tussis, succum dant ischiadicis utilem, cyathi vnius potus. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere clystere. Perunguntur eodem succo ischiadici, addito oleo. Quidam ad straguriam vtuntur semine. Genista tusa cum axungia, genua dolentia sanat.

APPENDIX.

Ex iam commemoratis verbis perspicuum omnibus fit, Sparto & Genistæ, non obstare quòd forma non nihil distet eandem inesse facultatem: ut enim Spartum pituitam per superna & inferna purgare potest, sic etiam Genista. Hinc adeò fit ut eius seminis hodierno

hodierno tempore contra podagram magnus sit vsus. Vrinā etiam amaritudinis ratione mouet, & quia incidendi & extenuandi facultatem habet, lapidē tum in renibus, tum in vesica cōfringere, vt etiam recentiores tradunt, potest. Strumas denique atque alios tumores discutere posse iidem scribunt.

DE GENISTELLA. CAP. lxxx.

Genistella nobis frequens.

NOMINA.

PRiori non admodum dissimilem herbam nō Genistella nulli Genistellam vocant, quōd scilicet Genista exilior et humilior sit. Germanicē appellari potest, die stechende Ginſt. Alii vocant Erdpfryinē, oder klein streichblumen (Gallicē petit Genet) Sunt qui non sine magno errore pro Genista vtantur, quum facultatibus diuersis prædita sit. Rosmari. Sunt qui rosmarinum aculeatum nominent, quōd nūc aculeatus. eius folia Rosmarino ferē similia sint.

FORMA.

Frutex est Libanotidis coronaria, quā Rosmarinum vocant, penē folio, sed rigido ac pungente, flore luteo, pīso non dissimili. semine in exiguis filiis rufis, radice sublutea.

LOCVS.

Nascitur in arcnosis locis, secus vias.

TEMPVS.

Maio mense flores luteos producit, quibus paste apes improbum mel conficiunt.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatē pos-
sidet, ac proinde valenter, simulq; citra mordicita-
tem exiccantem. VIRE S.

Semen eius serpentibus aduersari tradunt. De-
coctum foliorum, pro fluxuum mēstruorum sistit.
Idem etiam potum ventris fluori succurrit. Et vt
rem in pauca contraham, idē Genistella, quod Hip-
puris seu Cauda equina potest.

DE GNAPHALIO. CAP. lxxxii. NOMINA.

Cētūculū. Γναφάλιον græcis, Centunculum aut Centun-
Centuncu- **T**ularis herba latinis nominatur. Officinis iga-
laris her- nota. Germanis R hurkraut appellatur. Gnapha-
ba. lium verò vocata est hæc herba, Galeno autore, à
candidis mollibúsque eius foliis, quibus αὐτὶ γνο-
Gnapha- φάλων hoc est, pro tomētis vtuntur. Gnaphalion
lium qua- itaque dicitur, quasi tomentitia. Centunculum au-
re dictū. tem dixerunt, quòd cētonibus cum tomento maxi-
Centuncu ma sit cognatio. Germanicam nomenclaturam ab
ius, cur vo eius facultate aduersus dysenteriam illi inditam.
satis. esse nemini non notum est.

GENERA.

Duūm esse videtur generum: vnum enim paulò
latioribus ac candidioribus foliis constat: alterum
verò tenuioribus & minus candidis, quòdque flo-
res in summitate ac cacumine tantum profert. Ve-
rūm cum forma parum admodum, facultatibus
verò

verò nihil distent, nos vna pictura genus vtrun-
que complexi sumus. FORM A.

Candida & mollia Gnaphalium obtinet folia,
atque adco tomentitia, florisque luteos, radicem
vero capillatam ac tenuem, vt pictura ipsa mon-
strat. LOCVS.

Vulgaris herba vbique scatens Gnaphalium, in
locis siccis potissimum, interdum etiam pinguibus
proueniens. TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Adstringit atque adco exiccat Gnaphalium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Gnaphalii foliis aliqui pro tomento vuntur. Ta-
men faciunt hæc ipsa in austero vino pota ad dys-
enteriam.

EX GALENO.

Folia Gnaphalii mediocriter adstringunt, ac
proinde quidam id exhibent ex austeriorum vino-
rum quopiam dysentericis.

EX PLINIO.

Datur in vino austero ad dysenteriam, ventris so-
lutiones, mensesq; mulierum sistit. Infunditur au-
tem tenasmo. Illinitur & putrescentibus vlcerum.

DE DIPSAKO. CAP. LXXXII.

Dipsacus satiuus & erraticus nobis est.

NOMINA.

q. ij Διψακος

PLANTARVM HISTORIAE

Virga pa-
storis.



Ἰξανος Græcis, Labrum veneris, Carduus
veneris Latinis, Virga pastoris officinis, &

Cardo fullonũ dicitur. Germanis Kartendistel
Bubenstrel, Vueberkarten (Gallicè Chardon
à carder, Alüs Verge à Bergier, ou Chardon
à Foullon) Dipsaci autem nomen à contrario in-

Dipsacus
vnde di-
cta.

uenit, quoniam concavo alarum sinu rorem vel im-
brem recipiat, quo velut ad abigēdas sitis iniurias
abutitur. Labri veneris nomenclationem à carina-

Labrũ ve-
neris.

to foliorum habitu contraxit, quæ se anfractuosa
sinuantia ambage, peluis vel lauacri speciem con-
stituunt. & intra se humorem nunquam non reti-

Virga pa-
storis.

nent. Virga pastoris haud dubiè dicta est, ob lon-
gas virgas, quibus cardui ad poliendos pannos uti-
les insident, quas pastores fortè sumunt, & ea par-
te qua possit manu capi aculeis nudat, reliqua au-

Carduus
fullonius.

tem aculeata parte gregem ducunt. Carduus verò
fullonius cepit appellari, quòd ea rudes pannos ve-
lut echino quadam expoliunt, detractisq; floccis

Serapiõis
interpret
perstringi
tur.

concinna. Errat mirum in modum Serapionis in-
terpres, qui sub Virgæ pastoris nomine, Polygonon
Dioscoridis delineat. G E N E R A.

Duũ est generum. Vnum quod à fullonibus in
hortis plātatur, alterũ quod sua sponte passim pro-
uenit. Differunt inter se hac quidem ratione, quòd
primum folia latiora & profundius in ambitu in-
cisa, flores candidos, echinataq; capitula magis a-
culeata habeat: alterum contrà angustiora & mi-

nus laciniata folia, flores purpureos, capitulaq; minus aculeata obtinet. Nos discriminis illius rationē habentes, primi generis appellauimus *Dipsacum album*, alterius verò *Dipsacum purpureum*, ad flosrum nimirum respicientes diuersitatem.

FORMA.

Aculeatarum generis est hæc herba. Caulem habet altum, spinis horrentem, folia caulem amplectentia, lactuæ similia, in singulis geniculis bina, oblonga, aculeis armata, quæ in dorso medio veluti bullas intus & extrâ spinosas habent, concauo quo se in geniculis cōiungūt sinu, quo aquæ, rores, et imbres asseruātur, vnde *Dipsaci* quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singulis surculis capitulum vnum echino simile inest, oblongum, aculeatum, quod postquam exaruerit candidum apparet. Dissectum per mediam medullam caput, vermiculos habet. Quod si itaque contempleris eam quā herbariū hodie *Virgam pastoris* & *Carduum fulgonum* nominant herbam, offendes omnes huic notas respondere. Siquidem hæc pastoria virga profert caulem binū cubitorum, imò qui sæpiusculè supra hominis altitudinem increseat, spinis horridum, geniculatum, folia lactuæ, in singulis geniculis bina, prælonga, aculeata, quorum toruli bullantibus turgent spinis, dorsoq; nocentibus aculeis rigent, carinato alarum sinu, qui peluis vel labri modo roris & imbris pluuii capax sit. Gnaræ la-

q. iij. tics.

PLANTARVM HISTORIAE

ticis huius auiculae, cum solis ardentissimus opprimat aestus, huc appellantur ad satianda sitis desideria, illis facta bibendi potestate anfractus liberalem potum ministrante. Scaporum fastigia echinato minatur vertice, resupina hamulorum flexura, mucronibusq; leniter vncinatis, quibus rude lanificium aspero ductu lenigatur. Singuli echini è rotundo in oblongum quod antenus turbinantur, inter quorum spicula candicans aut purpureus emicat flos. His dissectis in medullo vermiculos idētidem nobis in au-

Vermiculus tumno quum exiccari incipit, licet inuenire. Vermiculus in echinus autem albus est, qui per cavitatem echini dinis Dipsa mouetur, & in caudicem transit. Hyeme etiā cum cūnienti. dem videre licebit antequā prae frigore moriatur, Imò etiā veris initio in quibusdam vermiculi à nobis reperti sunt, partim viui, partim mortui.

LOCVS.

Nascitur humectis locis, iuxta riuos aquarum & fontes: quapropter nonnulli Dipsacon à Græcis nominatum esse arbitrantur.

TEMPVS.

Carpitur in æstate, Iunio & Iulio potissimum mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Dipsaci spina radix ex secundo ordine exiccantium est, habetq; nonnihil abstersorium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius radix cum vino decocta & tusa vsq; dū ceratū

cerati crassitudine accipiat, imposita rimas fistulasq; sedis sanat. Oportet autem medicamentum hoc ærea pixide recondere. Ferunt præterea formicis & verrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi & collo aut brachio appesi, quartanas sanare produntur. EX PLINIO.

Sanat rimas sedis, item fistulas decocta in vino radice usq; dum sit crassitudo cereæ, ut possit in fistulam mitti. Item verrucas omnium generum. Quidam & alarum, quas modo diximus, succum iis illinunt.

APPENDIX.

Aliæ facultates quæ à Serapionis interprete & aliis recentioribus illi conceduntur, non sunt genuinæ, sed spurie, & Polygono adscribendæ.

DE DAPHNOIDE. CAP. LXXXIII.

NOMINA.

ΔΑΦΝΟΙΔΗΣ græcè, Daphnoides latinè nominatur, officinis & nostræ ætatis herbariis, græcam imitantibus vocem, Laureola. Germanis *Laurcola*. zeilant, & zeidelpast (Gallicè de la Laureolle) nuncupatur. Dapnoides autem & Laureola, à *Daphnoides* unde dicta. *Lauri* forma & specie, quam in foliis & fructu refert, dicta est.

FORMA.

Frutex est cubitalis, ramos complures habes lori instar flexiles, à medio sursum versus foliosos. Cortex ramos vestiens admodum glutinosus lentusve est. Folia Lauro similia, molliora tamen, tenuiora, nec facie

PLANTARVM HISTORIAE

lè fragilia, os & fauces erodentia, incendentiâque. Flores candidi. Fructus ubi ematuruerit subniger. Radix inutilis. Quæ in vniuersum omnes notæ Laurcolæ hodie dictæ conveniunt. Nec obstat quòd Obiectio = Dioscorides suæ Daphnoidi candidos tribuat floris dissolutes, cùm Laurcola purpurascens potius habeat: tio. solet enim color secundum diuersas regiones in caedè sepe herba mutari, vt fusius in Symphyto maiore dicemus. Et certè nihil incommodi erit si etiam Laureolæ flores quispiam candidos dixerit, cùm albi coloris non minor quàm purpurei in iis portio reluceat. Verisimile quoque est Dioscoridem ab extremo potius colore, quàm medio flores appellare voluisse.

LOCVS.

Nascitur in montanis & sylvestribus locis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere antequàm folia erumpunt. Fructum autem autumno profert.

TEMPERAMENTVM.

Calida est admodum & sicca.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Ducit per inferna pituitosa siccum aut recens Daphnoidis folium. Vomitus & menses cit. Commanducatum capitis pituitas elicit. Sternutamenta itidem mouet. Purgant etiam seminis eius pota grana quindecim.

EX PLINIO.

Daphnoia.

Daphnoides sine syluestris laurus aluū soluit, & centi folio vel arido drachmis tribus cum sale & hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus. Stomacho inutile. Sic & bacca quinae denave purgationis causa sumuntur.

APPENDIX.

Animaduertendum hoc loco mirum in modum Officinae errare officinas, propterea quod foliis Daphnoidis r̄ error. pro Mexcreon, quæ tamen Græcorum est Chamælea diuersa admodum à Daphnoide, vtantur: & eius fructu pro cocco cnidio, quod fructum Thymelææ esse notius est quàm vt demonstrari debeat. Sic in manifestissimis cæcutire solent officinae, pulchrè interim ad eos errores conuiuentibus medicis, non minus quàm illi, rei herbariæ imperitis. Thymelæan verò nō esse laureolam hodie appellatam læa nō est herbā, ex eo colligi potest, quod hæc ipsa, Dioscoride autore, linum nonnullis nominata sit, non alia quidem ratione, quàm quod satini lini similitudinem referat, cui quàm dissimilis laureola sit, nemo non nouit. Sunt etiam qui ad hanc similitudinem respicientes, in hodiernum vsque diem linum syluestre appellant.

DE DRYI. CAP. LXXXIIII.

NOMINA.

Δρῦς Græcis, Quercus Latinis & officinis, Germanis Eychenbaum (Gallicè Vng Chêne) appellatur.

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Notissima est arbor *Quercus*, procera, crassiore & asperiore caudice, ramosa, foliis profunde laciniatis. Glandes producit optimas, & gradissimas, gallas item & viscum. Radix eius latissime circumiacentem terram amplectitur.

LOCVS.

Passim in syluis aliisque locis nascitur.

TEMPVS.

Vere quidem germinat, sed tardius multis aliis arboribus.

TEMPERAMENTVM.

Desiccatur, adstringit & excalfacit paulo infra media, in genere scilicet eorum quae tepida sunt.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Quercus omnis adstrictoriam facultatem habet, praesertim id quod inter corticem & caudicem membranae simile clauditur: quinetiam membrana putamini glandis subiecta, Decoctum ex iis datur dysentericis & sanguinem excreantibus, & in pestis tritum contra fluxiones mulierum apponitur. Glandes idem possunt. Vrinam ciunt, capitis dolorem, & flatus comestae pariunt. Resistent escitatae venenatorum ictibus. Decoctum corticis cum lacte bubulo potum, contra toxica prodest. Cruda autem trita & illita inflammationes leniunt. Ad malignas duritias, & malefica ulcera cum adipe suillo salso conueniunt. Galla fructus est *quercus*. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, praeseferens formam

in digitis articularum, solida, nullo foramine per-
 uia. Altera levis, plana, perforata. Eligi debet om-
 phacitis quæ efficacior est. Vtraque vehementer
 adstringit. Carnium excrescentias trita, fluxiones
 gingivarum & columellæ, atque in ore aphthas re-
 primunt. Nucleus earum cauernis dētium inditus,
 dolores sedat. Cremata carbonibus donec igne fla-
 grent, & vino aut aceto, aut oxalme extinctæ, san-
 guinem reprimunt. Decoctum earū ad infessus uti-
 le, contra vuluæ procidētias, fluxionesque. Capillos
 denigrant aceto aut aqua macerata. Cœliacis, dys-
 entericis, cum vino aut aqua trita cōuenienter illi-
 nuntur aut bibuntur. Vtiles & obsoniis mixta, aut
 integræ in aqua præcoctæ, in qua aliquid coquenda-
 dum sit quod ipsis conferat. In summa Galla uten-
 dum quoties opus est adstrictione & exiccatione.

EX GALENO.

Quercus oēs partes adstrictoriæ facultatis par-
 ticipes sunt: Sed plus tamen quæ in trunci cortice
 membrana subest, tum quæ sub glandis putamine,
 ea videlicet quæ fructus carnem conuestit. Quam-
 obrem ad fluxum muliebrem, sanguinis expuitio-
 nes, ventrisq; diurnos fluxus, commodā esse cre-
 dunt. Maximè verò ea vtuntur decocta. Siquidem
 ego quandoque glutinasse me vulnus memini secu-
 ri inflictum, quum nullum ad manū esset medica-
 mētum præter ipsius Quercus folia. Terebam ve-
 rò in leui saxo, & vulnus cum circumiacētibus loa-
 cis

cis illinebam. Eandem foliis vim habet & fructus Quercus, eoque medici nonnulli ad incipientes, & crescentes phlegmonas vtuntur. Nam quæ iam vehementes sunt, adstringentibus haud indigent. Gal- la quæ omphacitis nuncupatur, admodum acerbū est medicamentum, plurimum terrena & frigida substantiæ particeps, per quā desiccatur & reprimit fluxiones: adhæc constringit contrahitque partes laxas ac lāguidas, omnibūsq; fluxionum affectibus strenuē resistit. Esto verò tertij in desiccando, secun- di autem in refrigerando ordinis. Altera autē gal- la, flaua, laxa, & magna, exiccat quidē etiā ipsa, sed tanto, quanto acerbæ qualitatē minus est parti- ceps. Coctā itaque ipsa per se, ac deinde trita, cata- plasma nō instrenuum est sedis phlegmonarum, ac procidentiarum. Porro coquenda est in aqua, si mo- dica opus sit adstrictione: sin vehemētiore, in vino. Et si augere insuper adstrictionē sit opus, vino etiā vtare austeriore. Denique galla combusta sangui- nis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirū

Vsta acris etiam calorem & acrimoniā ex vstione assumunt, moniā as- suntq; iis quæ ignem non expertæ fuerint, tum sub- sumunt. tiliorum partium, tum maiore desiccādi potestate.

Ceterū quum ad sanguinis suppressionē prapa- rare eas voles, carbonibus impositas dū vndequaq; candeant, aceto aut vino extinguere oportebit.

EX SIMEONE SETHI.


Glādes difficilis sunt coctionis, & valde nutriūt, tardius

tardius descendunt, crudósque humores generant, proptereaq; illarum vsum deuitari præcipimus.

DE DAUÇO. CAP. LXXXV.

Dauci primum genus nobis tantum frequens.

NOMINA.

 *Αὔκος* Græcè, *Daucus* Latine nominatur. Officinæ aliis & adulterinis herbis sub hoc nomine vtuntur. Germanicas appellationes in generum explicatione indicabimus.

GENERA.

Dioscorides tria Dauci cõmemorat genera. Primum Creticũ daucũ vocat. Germanis Beruurtz, (Gallicè Carotte sauvage, ou panet sauvage) propter capillatam radicem, aut quia vteri dorore, Beruurtz, qui iisdem Bermuter appellatur, sanat. Alterum cur dicta. nomine peculiari caret, foliis Laserpitio simile, Germanis Vuel'z Hirtzuurtz dicitur. Tertium genus itidem nomine destituitur proprio, Germanis autem nonnullis schuuartze Hirtzuurtz (Gallicè Ces deux autres, les herbiers appellent asiniani daucum) nominatur.

FORMA.

Creticus daucus folia Fœniculo similia habet, Creticus minora tamen & tenuiora. Caulẽ dodrantalem, daucus. umbellam Coriandro similem. Flores candidos, & post hos semen acre, candidum, hirsutum, & in cõmanducando odoratum. Radicẽ crassitudine digitali,

PLANTARVM HISTORIAE

gitali, & longitudine dodrā tali. Omnes huius descriptionis notæ, herbæ quam Beruurtz Germani vocant conuenire ad vnguem videntur, vna duntaxat excepta: siquidē semen non est hirsutum. Sed quum omnia alia, atque adeo facultates etiam ipsæ respondant, non est cur vna hæc nota nos impediat, cur minus Creticum daucum credamus, aut saltem Germanicum qui Cretico per omnia respondeat. Vel si prorsus alicui non satisfaciunt, quæ diximus, dicat planè hanc herbam esse Seseli Creticum, cuius etiam herbæ notæ omnes huic nostræ conueniunt, neque etiā facultates quas similes Dauco cretico habet, discrepant. Alterum Apio sylvestri, vel, vt antea diximus, Lasepitio simile est: ac rematum modo odoratum, acre, gustanti odoratum & feruens. Tertium foliis Coriandro assimilatur, flore candido, capite & semine Anethi, in quo umbella erratica Pastinacæ similis est, semine oblongo plenum, sapore vt Cuminum acri.

LOCVS.

Primum in petrosis & apricis locis nascitur, nusquam verò in Germania copiosius quàm in Martiane syluæ quibusdam pratis prouenit. Reliqua duo genera in altis montibus gignuntur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent.

TEMPERAMENTVM.

Semen Dauici admodum calefacit & exiccat.

Idem

Idem etiam, sed minori efficacia, facit herba.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Omniū Daucorum semen calefaciēdi vim obtinet. Potum menses, foetus, & vrinas mouet. Torminibus liberat. Tusses diutinas lenit. Succurrit phalāgiorum morſibus cum vino potum. Oedemata illitum discutit. Ex aliis seminis tātum vsus est, ex Cretico radicis etiam, quæ cum vino præsertim, ad venenata bibitur.

EX GALENO.

Dausi semen efficax admodum tum mouendæ vrinæ medicamentum, tum prouocandis mensibus. Multum etiam discutere foris impositum valet. Ipsa etiam herba eandem vim obtinet, semine tamen inferiorem, nimirum ob aqueæ humiditatis misturam.

EX PLINIO.

Vehementer vrinam impellit. Creticum magis contra serpētes pollet. Bibitur è vino drachma vna, datur & quadrupedibus percussis, aduersatur phalangio, capitis dolori medetur, tussi subuenit, stranguriæ medetur drachma seminis. Eius radix in vino pota, dysenteriam sistit. Contusis & euersis potū duobus obolis in mulsi cyathis tribus subuenit, aut si febris adsit, in aqua mulsa. Menses & secundas potum facili mē pellit. Calculos eicit. Folia omnia tela infixæ corpori extrahunt.

DE DRACONTIO. MAGNO.

PLANTARVM HISTORIAE

CAPVT LXXXVI.

Dracunculus serpentaria vulgò.

NOMINA.



ΡΑΚΟΥΤΙΑ ΜΕΓΑΛΗ, ἢ ΔΡΑΚΟΥΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ

Græci, Dracunculus maior Latinus, nonnul-

Serpentaria maior dicitur. Officinis ignota her-
ria maior ha. Germani Schlangenkraut (Galli Serpen-

Dracuncu- tait, ou Serpentine) vocant. Nomen autem à fi-
lus vnde gura sumpsit: caulis enim glaber, purpureisque re-
dicta. spersus lituris, versicolori facie, corpus anguinum

repræsentat & æquat longitudine. Vertex quoque
sinuoso oris hiatu linguam exerens cruentam, ca-
put exprimit. Atque hinc est quòd veteribus etiã

Colubri- Rom inis Colubrina ac Serpentaria nuncupata sit:
na. vel sic dicta, Plinio autere, quòd è terra ad pri-

mas serpentium vernationes exeat, rursusq; cum
iisdem se in terram recondat, nec omnino occultata
ea appareat serpens.

FORMA.

Caulcm habet glabrum lauumq; rectum, bicu-
bitalem, baculi crassitudine, versicolorem, vt angui
similis videatur, purpureis etiam maculis abūdat.

Folia fert Rumicis inflexa, & plicata. Fructum
in summo caule racemosum, coloris inter initia ci-
neracei, postea quàm maturuit crocei & punicei.

Radicem grandem, rotundam, candidam, tenui
cortice vestitã. Ex qua delineatione omnibus per-
spicuum fit, plantam eam cuius picturam exhibe-

mus,

mus, esse *Dracunculum maiorem*. Simplici enim caule attollitur, binum cubitum alto, leui glabrò ve, recto, baculi crassitudine, versicoloribus anguillæ maculis variegato, purpureis etiã intercurrentibus lituris, ita vt planè serpentis habitum coloremq; metiri videatur. In vertice comofo folia prodeunt sena septenave, crassiore pediculo digitorum modo propendentia, puniceis respersa notis, Rumicis primi generis figura. E foliato scapi fastigio, vagina quadã foris herbacea profilit, in mucronem sensim turbidat, velut erupturi partus involucrium, quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento distenta dissilit in rimam, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensque perit relicto cornu. Cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis primo virentibus, dein croceo & puniceo colore rutillantibus. Radix denique magna, rotunda, alba, tenuique cortice vestita. Et in summa, nulla est prorsus nota, quæ reclamare videatur.

LOCVS.

Nascitur in opacis sepibus.

TEMPVS.

Carpitur semen cum maturitate nigrescit. Radix per messem effoditur, hoc est, Iulio mense, aut initio Augusti.

TEMPERAMENTVM.

Dracunculus acris & amarus est, leuiculusque
r quãdam

PLANTARVM HISTORIAE

quandam adstrictionem habet, vt calidam & siccam esse nullus dubitare possit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix calefaciendi vim obtinet. Tosta & elixacum melle delicta orthopnoicis, ruptis, cōuulsis, tussibus, & destillationibus prodest. Pota cum vino venerem stimulat. Concisa & ex melle illita, vlcera maligna atque phagedenica expurgat, praesertim cum vite alba. Ex ea & melle collyria ad fistulas, & foetus euocandos componuntur. Ad vitilignes cum melle efficaciter illinitur. Polypos & carcinomata absumit. Succus eius ad oculorū medicamenta, item contra nubeculas, albugines, caliginemq; utilis est. Odor herbae radicisq; recens conceptos abortu vitiat. Idem praestant triginta grana eius in posca pota. Sunt qui eius succum cum oleo aurium doloribus infundere. Quinetiam folia eius, vtpote adstringentia, vulneribus recentibus imponere, in vino autem cocta perionibus. Ferunt non feriri à vipera eos qui folia manibus affricuerint, aut radicem gestauerint.

EX GALENO.

Dracuntium quiddam Aro persimile habet, tum foliis, tum radice. Acre etiam est & amarum, tenuiumq; partium. Obtinet quoque leuem quādam adstrictionem, quae quandoquidem cum praedictis duabus qualitatibus, acris scilicet & amara, cōiuncta est, medicamentum factum est, utique maximè
efficax.

efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimū & lētos humores extenuās. Optimūq; remedium est cōtumacium vlcerum. Expurgat ex-
tergetq; strenuē tum alia quæ extersionem deside-
rāt, tum alphos cum aceto. Folia quoque, vtpote si-
milem facultatē habentia, vlceribus, vulneribusq;
recens inflictis accommoda sunt, & quanto minus
fuerint sicca, tanto magis conglutinant: nam quæ
sicciora sunt, viribus sunt acrioribus quàm vt vul-
neribus cōueniant. Creditum est caseum humidum
si illis foris tectus reponatur, ob tēperatura illorum
siccitatem, à putredine cōseruari. Fructus valētior
est, non foliis tantum, sed & radice: proinde & cā-
cros, & polypodas eliquare creditus est. Succus quo
que eius vitia oculorū expurgat. Dracōtū radicem
bis tēre elixā, quo omnem exuat medicamētosam
vim, in cibo interdum Ari modo exhibemus, quum
crassi ac glutinosi thoracem pulmonemq; infestantes
humores fortiore vi expellendi veniunt.

EX PLINIO.

Omnino habentem Dracunculū serpentes fugiunt. Ideo percussis prodesse in potu maiore aiūt:
vt & menses, si ferro non attingatur, sistat. Succus
eius & aurium dolori prodest. Reliquas facultates
in Ari descriptione offendes. Videntur enim veteres
Arum cum Dracunculo minori miscuisse.

APPENDIX.

Hæc est vera Serpentaria quo officinis vtēdum
r q̄ erit.

PLANTARVM HISTORIAE


erit, & minimè ea quam alio nomine Bistortam vocant. Nam viribus planè ab ea quæ genuina est disidet, vt suo etiam loco monuimus. Quare non est cur deinceps eandem medicamentis quæ thoraci expurgando adhibentur admisceant medici, sed hæc potius, cuius picturam oculis subiicimus.

DE DAPHNE ALEXANDRINA.

CAP. LXXXVII.

Laurus Alexandrina bislingua & bonifacia, mihi ex Germania delata visa est qualis hic pingitur.

NOMINA.

 Ἀφνὴ Ἀλεξάνδρεια, ἢ Ἰδαία græcis: Laurus Alexandrina, aut Ideā latinis, officinis

Vuularia Vuularia, nonnullis Bonifacia, multis etiā Pagana. Epiphyl- lingua, Germanis zapflinkraut, haucklatt, & locarpos. auffenblatt dicitur. Theophrastus appellat Ἰδαία. Alexan- φυλλόκλαρον, quod fructum super foliis ferat. drina lau Alexandrinam autem laurum dictam putamus, rus cur di quod Alexander victor ea vsus fuerit. Hinc est eta. quod Apuleius hanc victorialam nominet, quod Victoriae nimirum victores ea pro Lauro in triumphis & vis la. Ideā. etoriae signum vterentur: quanquam in eo capite Daphnoidu cum Victoriala confundat. Ideā verò ab Ida monte, quo in loco speciosior & copiosior nascatur.

FORMA.

Folia Rusco seu Myrto sylvestri similia habet, maiora.

maiora tamen molliora & candidiora. Fructum in medijs folijs fert rubentem, Ciceris magnitudine. Ramos spargit à terra dodrantes, & aliquando ampliores. Radicem Rusco similem, maiorem tamen, odoratam: & molliorem. Ex qua sanè delineatione satis perspicuum fit, eam herbam cuius perituram damus, esse Laurum Alexandrinam. Folio siquidem Myrti sylvestris, sed vt Plinius lib. xv. cap. xxx. ait, acutiore, molliore, & candidiore, fructu inter folia rubro, magnitudine Ciceris, ramulis à terra sparsis dodrantalibus, radice sylvestri, Myrto proxima, odorata & molli.

LOCVS.

Nascitur in locis montanis, & in Ida monte, vt comprehensum est, speciosissima. Nunc adfertur ex inferiore Pannonia, atque in nonnullis hortis plantata prouenit.

TEMPVS.

Fructum in aestate in medio folij, in geniculo alterius folij quod maiori supernascitur profert.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod gustus euidenter monstrat. Siquidem gustatibus acris simul & subamara est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix eius pota pondere senum drachmarum cum dulci vino, difficulter parientibus, & stillicidio vrinae laborantibus succurrit. Sanguinem quoque menstruum elicit.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Potatum urinas, tum menses prolicit.

EX PLINIO.

Celeres partus facit, radice pota trium denariorum pondere, in vini dulci cyathis tribus. Secundas etiam pellit mensesq; eodem modo pota.

APPENDIX.

Recentiores in faucium vlceribus, & humecta supra modum columella vtuntur. Hinc est quod nonnulli appendant hanc herbam pueris, vt nimia illorum humiditas exiccetur.

DE EPHEMERO NON LETALI.

CAP. LXXXVIII.

Ephemerum non lethale quod nonnulli Hemerocalles, alij Liliū cōuallium, alij grand Muguet dicunt.

NOMINA.

Eφμεροσ, ἢ ἱρίς ἀγρία Græcis, Ephemeron, Iris syluestris Latinis dicitur. Cū autem Galenus, Paulo, & Dioscoride testibus, duo sint Ephemerum duo gemerū genera, alterum, quod Colchicon à natali solo dicitur, interficiens, de quo suo loco plura: alterum quod non letale est, & præcipuo nomine Ephemerum dicitur, hic de secundo, nempe non interficiente, nobis sermo duntaxat erit. Ephemerum autem nunc nominatum est, non quod eadem die iugulet (nulla enim ei vis mortifera inest) sed quod flos illius confestim marcescat, nec longius vno & altero die cōsistat.

moretur. *Vulgus & officina Liliū conuallium, Liliū con-*
quod in opacis & lucis nascatur, appellant. Ger= uallium.
mani May enblumle (Gallicè du Muguet.)

FORMA.

Caulem & folia Lilio similia habet, tenuiora
tamen. Flores candidos amarosque. Fructum mole
lem. Radicem vnā digitali crassitudine, longam,
adstringentem, odoratam. Quæ siquidem delinea-
tio ita herbæ illi quam vulgus Liliū conuallium
nominat, conuenit, vt nulla prorsus in ea sit nota,
quæ ei non respondeat. Caulem enim & folia Lilij
habet, sed tenuiora. Flores candidos & suauiter o-
lentes, gustu amaro. Fructum mollem, colore puni-
ceum, asparagi fructui non dissimilem. Radicem
singularem digiti minimi crassitudine, longam, ad-
stringentem & odoratam. Nec obstat quod nūquā Obiectio
aut rarissimè apud nos reperiatur radix quæ mi= diluitur.
nimi digiti crassitudinem æquet. Dioscorides enim
cū alicui herbæ aut radici mensuram tribuit, id
facit vt maiori parti indiuiduorum illius speciei
quadret, nec ad eò statam mensuram assignat, quin
quandoque infra aut supra hanc esse possit. Cui
hoc etiam accedit, quod magnitudo secundum di-
uersas regiones in vna eadēque herbā sæpe va-
riatur, ita vt nihil mirum sit radices nostri Ephes-
meri, paulò quàm illius quas Dioscorides vidit,
minores esse.

LOCVS.

r iij

Nascitur

PLANTARVM HISTORIAE

Nascitur in syluis & vmbrosis locis.

TEMPVS.

In Maio mense flores illius magna copia erumpunt, ac mox iterum euanescent atque decidunt. Deinde Iulio mense fructus profertur Asparago haud dissimilis, vt dictum est.

TEMPERAMENTVM.

Mista est temperatura, Galeno teste, nempe repellentis & discutientis, quia scilicet radix adstringit, floresque amari sunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius radix in dentium doloribus remedio est, si decocto eius colluuntur. Folia in vino decocta & illita, cedemata & tubercula, quæ nihil adhuc puris contraxerunt, discutiunt. $\tau\upsilon\upsilon\upsilon$ enim & non $\upsilon\pi\upsilon\upsilon$ legendum, vt ex Galeno liquet.

EX GALENO.

Ephemerum nõ illud letale, quod etiam Colchicum nominat, sed alterum, quod & Irin agrestem vocat, folia & caulem Lilio similem obtinet, radicem oblongam, non rotundam ceu Colchicum: digiti autem potissimum crassitudine est, adstringens & boni odoris. Ex quibus palam fit quod mista sit facultatis, nempe repellentis, & halitu digerentis. Testificantur verò id quæ particulatim addit opera. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Folia tuberculorum tum augmẽto, tum vigori cõgruunt. Oportet autem in via

no decocta prius quàm pus moueas illinere.

EX PLINIO.

Radice[m] vnam digiti crassitudine obtinet, dens
tibus precipuam concisam in aceto, decoctamque
vt tepido colluantur. Et ipsa etiam radix mobiles
sistit, canis & exesis imprimitur.

APPENDIX.

Recentiores roborare cor, iecur, cerebrumq; tra-
dūt. Hinc est quòd eius succum aut decoctum syn-
copa, vertigine, morboq; comitiali correptis, attoni-
tis, & phreneticis exhibeant. Caterum incipienti
elephantia, ne latius serpat, & altius radices agat,
viam praecludere scribunt. Ocularij medici ad ocul-
lorum caligines discutiendas eo etiam vtuntur.

DE ELENIO. CAP. LXXXIX.

Elenium vulgo cum Latinis Enula Cam-
pana.

NOMINA.

EΛένιον græcis, Elenium & Inula latinis, offi-
cinis Enula, rusticis Campana, vulgo iunctis Enula cā-
vtrisque vocabulis Enula Campana dicitur. Ger-
manis Alant. Elenium autem ab Helena lachry-
mis, è quibus natum fabulatur, quidam dictum es-
se volunt. Alij quoniam contra serpentes ex eo pri-
mum ab Helena remedium inuentum sit.

FORMA.

Caule[m] ex se mittit Elenium crassum, hirsutū,
cubitalem, & aliquando maiorem (interdum enim
iustam

PLANTARVM HISTORIAE

iustam hominis staturā altitudine equat) angulosumq; Huic supernè lutei flores insident, & in his semen Verbasco simile, tactu pruritus excitās. Folia angustifolio Verbasco similia obtinet, lanuginosiora tantum & oblonga. Radicem subruffam, odoratam, magnam, subacrem, ex qua ad consitionem Liliorum aut Ari instar, pingues propagines appendicēve auferuntur. Hæ siquidem nota Enula cāpana vulgo dicta pulchrè quadrant, neque obstat quòd non in cūctis Græcis exemplaribus omnes illa habeātur, cum in nonnullis, iisque probatissimis Marcellus saltem legantur. Sic Marcellus Virgilius Florentinus in suis quos adidit in Dioscoridem commentariis testatur, sibi visum esse antiquissimum ac probatissimum codicem, in quo adhuc omnes seruētur. Et certè nihil absurdi commitemus, si nonnullas Dioscoridem notas subticuisse dicamus, cum euidentissimum sit Inulam non passim vna forma præditam nasci, quando, eodem Dioscoride teste, in quibusdam locis caulem haud emittat: in irriguis denique procerior & elegantior, quàm in siccioribus proueniat. Huc accedit quòd aliàs sæpe notas etiā admodum necessarias prætermittat.

LOCVS.

Nascitur montanis, vmbrosis, & siccis locis. In hortis etiam passim hodie plantatur.

TEMPVS.

Radix astate effoditur, & concisa siccatur. Flores

ret

ret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Elenij radix non primo statim occurſu excaleſcit, ac proinde non dicenda eſt calida & ſicca exa-
ctè, ceu mel & piper album, ſed cum recrementi-
tio humore.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Radiciſ Elenij decoctum potum, vrinā & men-
ſes ducit. Ipſa deniq; in eclegmate cum melle ſum-
pta, tuſſi, orthopnœa, rupturis, conuulſionibus, in-
flationibus, venenatorum morſibus prodeſt, caleſa-
ciendi vi quam in vniuerſum habet. Folia eius in
vino cocta iſchiadicis vtiliter illinuntur. Radix e-
tiam Elenij in paſſo cōdita, ſtomacho vtilis eſt. Si
quidem ſalgamarij paululum ſiccata eam, mox
decoctam, frigida aqua demergunt, poſtremo in de-
ſutum coniectam ad vſum recondunt. Ea trita &
pota ſanguinem excreantibus auxiliatur.

EX GALENO.

Elenij radix maximè vtilis eſt. Eclegmatis quæ
faciunt ad educendos lentos & craſſos qui ſunt in
thorace & pulmone humores commodè miſcetur.
Rubriſcant quoque ea partes frigidis & diuturnis
vexatas affectibus, cuiuſmodi ſunt nonnullæ coxa-
rum paſſiones iſchiadas vocant, & exigue aſſi-
duaq; quorundam articulorum præ humiditate
luxationes.

EX PLINIO.

Inula

Supersti-
tiosum.

Inula à ieiunis commanducata dentes cōfirmat, si vt eruta est, terram non attingat. Cōdita tuſſim emendat. Radicis verò decoctæ succus tineas pel- lit. Siccata autem in vmbra farina tuſa, & con- uulſis, & inflationibus, & arteriis medetur. Vene- natorum morſus abigit. Folia ex vino lumborum dolori illinuntur.

DE EUPATORIO. CAP. XC.

Eupatorum Agrimonia.

NOMINA.

Agrimo-
nia.

Eupato-
rium cur
dictum.

Hepato-
rium.

Eὐπωτόριον, ἢ ἡπωτόριον Græcè, Eupato-
riū & Hepatorium latinè, officinis Agrimos-
nia dicitur. Germanis Odermenig, Bruchuurtz
(Gallicè de l'Empatoire, ou aigremoine.) Eu-
patoriū ab Eupatore rege, qui illā primus inuenit,
nominatā eſſe volunt. Hepatoriū verò quoniā ieco-
ri præcipuè medcatur. FORMA.

Fruticosa eſt herba, vnum, interdum alterum et-
iam ſcapum efferens, tenuem, lignoſum, rectum, ni-
grum, hirsutum, cubitale, aut etiam maiorem. Fo-
lia per interualla partibus potiſſimū incifa quin-
que, & aliquando p'uribus, Quinquefolii vel Cā-
nabis potius foliis ſimilia, nigricantia, & ſerræ mo-
do in extremitatibus incifa. Semen à medio caule
eſcit, deorſum inclinatum, hirsutum, adeò vt
ſiccatum veſtibus hæreat. Hæ delineationes ada-
muſſim, nulla reclamāte nota, herbe quam vulgus
& officinæ vocant Agrimoniam, cōueniunt. Qua-
propter

propter hanc verum & genuinum esse Eupator Agrimonium facile deprehendet, qui singulas descriptionis nra est partes diligenter expendet. Siquidem Agrimonia rum Eupatoriosa est herba, scapum vnum aut alterum obpatoriū tinens, lignosum, tenuem, rectum, nigricantem, hirsutum, cubitalem vel maiusculum. Folia ex intervallo Cannabina aut Quinquefolio similia, quinquepartita vel plurifariam incisa, per ambitum ferrata. E medio caule semen erumpit deorsum spectans, subhirsutum, vt resiccatum vestibus adhærescat. Proinde præfracta quadam ac immedicabili cecitate captos esse eos iudico, qui hoc ipsum herbarie nō animaduertunt.

LOCVS.

Nascitur passim locus montosis, campestribus etiam, pratis nempe, & circa sepes.

TEMPVS.

Carpitur in æstate, dum floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Eupatorium herba tenuium partium, incidendi, extergendiq; facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Inest ei & adstrictio modica.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Contrita huius folia & cum veteri suillo adipe imposita, vlceribus difficile cicatricem contrahentibus medentur. Semen aut herba in vino pota, dysentericis, iecinorosis, & serpentium moribus auxiliatur.

EX. GALENO.

Obstrue

PLANTARVM HISTORIAE

Obstructiones iccoris expurgat, & robur huic visceri addit. EX PLINIO.

Semē dysētericis in vino potū auxiliatur vnicē.

DE EUPHRASIA. CAP. XCI.

NOMINA.

Ὀφροσύ
vñ cur di-
eta.

Ophthal-
mica.

HAud dubiè Euphrasie herbæ nomen à Græcè lingua imperitis pharmacopolis deprauatum est, cūm olim Ὀφροσύvñ dicta sit, quod nimis mirum oculos, quorum caliginem discutit, delectet. Ad quod nomen Germani nostri pulchrè alludētes Augentrost hoc est, oculorum solatium appellāt. Nonnulli hac quoque ratione moti ophthalmicam & oculariam nominant. Officinæ, vt ferè in omnibus aliis herbis, corruptam vocem retinentes, Euphrasiam vocant. Etsi autem herba hæc Græco & eleganti nomine donata sit, nihil tamen de ea, quod sciam, apud veteres græcos & latinos, nempe Dioscoridem, Plinium, Galenum, adde etiam recentiores, Aetium, Paulum, & Actuarius scriptum reperitur. Cūm verò appellatio ipsa Græcam testetur originem, videtur sanè à Buglossō veterum mutuata & desumpta esse. Vt enim hoc in vinū coniectum animi leticiam parit, atque ad cō Ὀφροσύvov dictum est, ita etiam illa quia oculos iuuat & delectat, Ὀφροσύvñ appellari cœpit. Quā subinde vocem imperiti linguae, vt diximus, deprauantes, in Euphrasiam verterunt.

FORMA.

Herba

Herba est parua, palmæ vnus longitudine, Hys-
sopo similis, cauliculis purpureis, foliis exiguis, per
ambitum serratis, flosculis albicantibus, radice exi-
gua & inutili. Nec obstat quòd Hermolæus, immè Hermo-
sæ eruditionis vir, libro tertio, capite decimo octauo laus bar-
sui Corollarii, luteolos esse dicit: is enim ad partem barus.
duntaxat florum respexit, quæ lutea esse euidenter
apparet. Certè si flores Euphrasie exquisitè consi-
deres, neque prorsus luteos, neque in vniuersum es-
tiam candidos esse deprehendes: tribus enim colo-
ribus, nempe purpureo, cādido & luteo, vt pictura
ipsa ostendit, maculati sunt. Quum verò potior flo-
rum pars candido colore constet, factum est vt fer-
mè omnes herbam hanc depingentes, albos illi as-
signarint flores, nobis autem hos candicantes dice-
re placuit.

LOCVS.

Nascitur in apricis collibus, et pratis ferè oībus.

TEMPVS.

Inter autumnii initia magna copia erumpit.

TEMPERAMENTVM.

Quas particulatim facultates obtinet, abūdè do-
cent calidam & siccam esse herbam.

VIRE S.

Vtuntur ea ad oculorum caligines & suffusio-
nes vel per se imposita, vel ex vino decocta. Memo-
riam etiam oculorūque aciem redacta in pulue-
rem, & in vino albo pota, mirificè roborat, amif-
samque reparat.

PLANTARVM HISTORIAE
DE ELELISPHACO. CAP. XCII.
Saluia minor franca nobis dicitur.

NOMINA.

Eλελίσφακον Græcis, Salvia Romanis & of-
ficinis, Germanis Salbey appellatur. Porro cū
ipsa herba semper retorrida & exucca videatur,
factum est, vt Græcis Elelisphton, quasi in tabē
redacta, vel in syderationem flaccescens dicta sit,
ἐλελίθειν & σφαίκος vocibus in vnā coalescen-
tibus appellationem. Est autem σφαίκος, seu potius
σφαίκελος, malum in plantis quum per æstatem
& ardentissimum canis æstum vi solis altius pe-
netrante, humorēque quo nutriuntur deficiente, læ-
guent & arescunt. Latini syderationē nomināt. Sal-
uia autem dicta latinis, quòd ad multa, præsertim
ad fœcunditatem, salutaris sit.

Elelisphta
con vnde
dicta.

σφαίκε-
λος.

Saluiacur
vocata.

GENERA.

Duo sunt Salviae genera, quemadmodum etiam
plebei abundè nouerunt. Vnum quod priuatim Ele-
lisphton dicitur, squalidius folio & scabrius, la-
cunosa facie præasperum, multo latius, quasi cultū
sensèrit, adeò vt domestica aut hortensis Salvia di-
ci possit. Nos euidentiori distinctione vsi, Saluiam
maiolem nominauimus. Germanis etiam groß-
oder breyt Salbey (Gallicè de la Sauge) voca-
tur. Alterum folio lenius & contractius, quasi syl-
uestrem ob id referat figuram, syluestris Salvia ap-
pellari potest, minus etiam squalore obsitū est. Nos
Saluiam

Salvia
maior.

Saluiã minorem diximus. Germani creutz Sal- Saluia mi
bey oder klein Salbey, oder ſpitz Salbey, e- nor.
del Salbey (Gallicè De la faulge franche) no-
minant. Dioscorides vtrunque genus sub vno Ele-
lisphaci nomine complexus est, quod ſcilicet facul-
tate nihil diſtent, ſed idem prorsus efficiant.

FORMA.

Frutex eſt oblongus, ramosus quadrangulus &
 candidas virgas habēs. Folia mali Cotonei effigie,
 oblongiora tamen, aſperiora, & craſſiora, quæ ſen-
 ſim attritarum veſtium modo hirsuta, ſubalbida,
 vehementer odorata, ſed viroſa ſunt. Semē in ſum-
 mis caulibus ſylueſtri Ormino ſimile gerit. Hæc de-
 ſcriptio, nulla prorsus reclamante nota, cum herba
 quam *Saluiam* vulgò vocant quadrat: nanque
 ea fruticoſa eſt, rugoſis foliis, extritarum latenter
 veſtium aſperitatem ſcabritiã ſc referētibus, in-
 canis, vehementer odoratis, purpureo in ſpica flore,
 in aquilini roſtri ſpeciem falcatò, ſemine ſylueſtris
 Ormini, vt pictura graphicè monſtrat.

LOCVS.

Nascitur in locis aſperis, & vtrunque genus ho-
 die paſſim in hortis inuenitur.

TEMPVS.

Carpitur in Iunio & Iulio menſibus, quãdo ni-
 mirum floribus & ſemine prægnans eſt.

TEMPERAMENTVM.

Elelisphacos euidenter exca'facit, ac leniter ad-
 ſtringit.

PLANTARVM HISTORIAE

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Foliorum ramorumq; decoctum potū vrinā cit, menses fetusq; extrahit. Pastinaca marina iētibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulncribus herba utilis est, sanguinemq; compeſcit. Ferina tetrāve vl cera purgat. Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum cum vino, ſi eo abluantur, ſedat.

EX AETIO.

Tradunt quidam ſuffitam Saluiam menses immoderatè fluentes, & omnino muliebri profluuiū compeſcere. Agrippa ſacram herbam vocauit, quā pręgnantes mulieres, ſi fluida laxaq; fuerint, vtiſſimè comedunt: continet enim conceptum vitalemq; reddit, ac ſi ſucci huius heminam cum modico ſale quarto à ſecubitu die mulier potauerit, deinceps in le viro miſceatur, proculdubio concipiet. Aiunt in quodam Aegypti loco poſt ſeueras peſtilentias ab his qui ſuperſunt, ad eum ſuccum bibendum mulieres cogi, plurimosq; inde produci fetus. Dato, inquit Orpheus, ſanguinem expuentibus ſucci Saluię cyathos duos, ieiunis cum melle bibendos, & ſanguis ilico cohibetur. Tabidis pilulę in hunc modum parantur. Spicę nardi, Zingiberis ſingul. drach. ij. ſeminis Saluię aſſati triti & cribrati drach. viij. Piperis longi drach. xij. cum ſucco Saluię pilulas conficito, & mane ieiunis drachmam vnā exhibeto, eodemq; modo in veſpere, ac poſtea aqua purę quippiam propinato.

EX PLINIO.

Menses Salvia cit & urinas. Pastinaca marinæ
ictus sanat. Torporem autem inducit percusso loco.
Bibitur cum Absinthio ad dysenteriam. Cum vino
eadem commorantes menses trahit. Abundantes si
stet decocto eius poto. Per se imposita vulnerū san-
guinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si
in vino decoquatur, pruritus testium sedat. Partus
emortuos apposita extrahit, item vermes aurium.
Ad tuſsim laterisq; dolores bibitur. Contra scorpia-
nes eadem & dracones marinos efficax. Contra ser-
pentes quoque ex oleo perungi ea prodest.

DE SERPYLLO. CAP. XCIII.

Serpyllum nobis Serpolet.

NOMINA.

Ἐρπυλλον Græcè, Serpyllum Latine. Offici-

E na latinum nomen retinuerunt. Germanicè

Quendel, Kinlin, Hunerkol (Gallicè

Du Serpolet) appellatur. Serpyllū autē, ut autor Serpyllū
est Varro, ab eo quod serpat tā Græcis quā latinis unde di-
ctū est, quoniā si qua eius particula terrā at- etum.
tingit, inibi radices demittit. Est enī ut Theophras-
tus libro sexto de plantarum historia, capite septi-
mo ait, proprium quoddam eius ramulorum incre-
mentū, quippe cū possit in quantā voluerit quise-
piam longitudinem trahi, adiecto illi pedamento
aliquo, aut si prope sepes plātetur, aut ex altiore lo-
co aliquo deorsum demittatur: sic enim in longum

s ū pretra-

PLANTARVM HISTORIAE

protrahuntur: & ab hac planta in ramulis eius natura, quòd in longum serpit, græci & latini peculiariter Serpyllum nominauerunt.

GENERA.

Serpyllū Duo eius genera. Hortense, quod Germanicè hey, hortense. mischer Quendel dicitur. Syluestre, quod priuā Syluestre tim Zygis vocatur, quod fortè eo iugarentur vites. Zuyēiv. Zuyēiv enim Græcis interdū idem quòd Latinis ligare & vincere significat. Germanicè simpliciter, Quendel dicitur. Nos sylvestris tantum Serpylli picturam damus. **FORMA.**

Hortense. Hortense non dissimile est Origano, potissimum quòd ad folia & ramulos ipsos attinet, quos candidiores tantum habet, odore tamen prorsus Sampsychum representat. Repit humi, & in rectum non attollitur. Syluestre contra humi non serpit, sed rectum exilibus ramulis & lignosis attollitur, Rutæ foliis plenis, angustioribus tamen. Flosculos habet subpurpureos, gustu acres, odore iucundo, radicem multifidam. Plinius secus quam Dioscorides hortense serpyllum nequaquam, syluestre verò humi serpere asserit, adeo ut subesse in hoc mendam verisimile sit: res enim ipsa & vinarum herbarum imagines satis testatur, Dioscoridis sententiam esse veriorē. Dioscoridi subscribit Aetius. Neque mirum est magis humi reptare cultum, quòd infirmius humoris copia est, atque adeò ramis inuvalidioribus stare nequit, quam syluestre, quod illo rigidius ac lignosius existit. **LOCVS.** Hor-

Hortense non nisi satum prouenit, & Columella teste, neque pinguem, neque stercoratū, sed apri- cum locum desiderat, vt quod macerrimo solo nascatur. Syluestre autem in petris, collibus, & montibus plerisq; copiosissimè nascitur, ita vt eo quasi vestiri videantur. TEMPVS.

Syluestre tota astate floret, hortense autē Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Serpyllum gustu acre est, ob id calidum valde, ita vt menses & vrinam moueat.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Syluestre efficacius & maiori calefaciendi vī quā hortense, atque ad vsum medicina aptius. Menses trahit, & vrinam cit potum. Torminibus, ruptis, conuulsis, iecinoris inflammationibus auxiliatur. Aduersus reptilia potum & illitum. Capitis dolores sedat coctum adiecto rosaceo, & aceto madefactum. Maximè verò lethargo & phrenitidi cōuenit. Sanguinis vomitum sedat succus eius quatuor drachmis cum aceto potus.

EX AETIO.

Serpyllum ita calefacit vt menses & vrinā ducat. Huius genus duplex. Syluestre efficacius calidiusq; hortensi, atque omnino vsus eius in medicina præfertur. Prodest torminibus, conuulsionibus, rupturis, inflammationibus iecinoris, reptilibusq;. Potum ac illitum capitis dolores sedat. Madefactum

s. iij autem

PLANTARVM HISTORIAE

autem aceto ac decoctū admixto rosacco lethargicis, & diutinā phrenitim patientibus summopere cōgruit. Præterea drachmæ vnius pondere ex aceto bibitum, sanguinis eiectiones compescit.

EX PLINIO.

Aduersus serpentes efficax, maximè Cenchrin & Scolopendras terrestres ac marinas & scorpiones, decoctis in vinoramis foliisq; . Fugat & odore cominus si vratur, & contra marinorum venena præcipuè valet. Capitis doloribus decoctum in aceto illinitur temporibus, ac fronti cum rosaceo. Item phreneticis, lethargicis, contra tormina & iccinorū dolores. Folia obolis quatuor dantur ad lienem ex aceto. Ad cruentas excreationes teritur in cyathis duobus aceti & mellis.

EX PLINIO VALERIANO.

Serpyllum calidū, simul nobis vtile medicina vsus ostendit. Capitis dolores coctū ex aceto & rosaceo tēpori ac fronti illitum mitigat. Serpentes & omnia animalia venenata adustum nidore repellit, ideo & messoribus in cibo miscetur, vt si fatigatos fortè somnus oppresserit, tutè quiescant contra animalia quæ hoc tempore venenatis hausibus sæuire cōsuenerunt. Cōtus puluis ex scrupulis xij. in aqua datus tormina emendat, vrinæ difficultates resoluit, lienis quoq; iniuriæ idē puluis ex aceto mixtus occurrit. Nec minus cruentis excreationibus subuenit, ex duobus cyathis mellis & aceto tēperatur.

DE ELYMO. CAP. XCIIII.

Panicum nomen retinet.

NOMINA.

Eλυμος Græcis, Panicum Latinis, Germanis Heydelpfenich, oder Fenich (Gallicè du Panir semblable au Millet) dicitur. Panicum autem à paniculis in quibus semen est, Latini appellauerunt. Panicum unde dictum.

FORMA.

Miliū similitudine profilit, denis ut plurimū foliis luxurians, culmo penè in surculum extenuato, nutante, rubido panicularum fastigio, prædensis ac ceruato granis, aliàs purpureis, aliàs rufis, nigris aliàs, item & candidis.

LOCVS.

Satum facîle quouis serè loco prouenit, leuem autè & solutam terrā potissimum desiderat. Nec in sabuloso duntaxat solo, sed in arena quoque nascitur, modo humidum cælum, vel riguum solū sortiatur.

TEMPVS.

Quadragesimo die postquā satum est absolui, ut omnia aestiua, inter omnes conuenit. Quocunq; igitur tempore satum fuerit, ubi semine prægnans erit, tum carpendum venit.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat et exiccat, præsertim si foris illinatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Miliū similitudinem refert, eodemq; modo in panes defingitur, & ad idem accommodatum est, minus

s. iij tamen

PLANTARVM HISTORIAE

tamen quàm milium nutrit & adstringit.

EX GALENO.

Panicum facultate pauci nutrimēti, & exiccatoria. Sistit quoq; nōnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam Milium. Panis itaque eius exigui est alimēti & refrigerans. Constat insuper præaridū & instar arenae aut cineris friabilem esse: caret enim penitus pinguedine & lentore. Iure igitur alium humentē desiccāt, Agricola farina huius cocta admisto adipe suillo & oleo vescūtur. Panicum in omnibus Milio cedit insuauius esu, concoctū difficilius, vētrēque magis coercescit, minusq; nutrit. Huius farinam interdum cum lacte coctam, rustici veluti triticā esitāt. Clarumq; est id edullij tanto quàm illud per se solum assumptū melius esse, quanto lac huius seminis natura ad boni succi procreationem, aliāque omnia eminētius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoq; ipsam in edendo suauitatem & voluptatem. Hoc nāque semen nulla gratia aut incunditate commendatur.

EX PLINIO.

Panicum Diocles medicus mel frugum appellauit. Effectus habet quos Milium. In vino petū prodest dysentericis. Similiter iis quæ vaporanda sunt excalsfactum imponitur. Sistit aluū in lacte capri no decoctum, & bis die haustum. Sic prodest et ad tormina.

DE ERICA. GAP. XCV.

Erica Bruiere.

NOMINA.

Eρίκη Græcis, Erica Latinis, Heyd Germanis
(Gallicè Briere) dicitur. Officinis inusitata.

FORMA.

Erica fruticosa arbor est, Tamarici similis, multo tamen breuior. Eius flore vtentes apes, reprobum mel conficiunt. Plinius lib. xxiii. cap. ix. fruticem esse scribit non multum à Tamarice differentem, colore Rorismarini, & penè folio. Id quod verè de ea Erica, cuius nos picturam damus, dicitur. Theophrastus etiam Rosmarino similem Ericam facit. Habet flores in candido purpureos.

LOCVS.

In montibus & syluis locisq; arenosis nascitur.

TEMPVS.

Autumno floret sola ferè in syluis.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est Erica, id quod in gustu amaritudo satis docet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Erica coma & flores illita serpentium morsibus medentur.

EX GALENO.

Discutiendi facultate prædita est Erica: flore eius potissimum & foliis vtendum.

EX PLINIO.

Ericen

PLANTARVM HISTORIAE

Ericen aduersari serpentibus tradunt.

APPENDIX.

Recentiores herbarij præter iam commemoratas, alias facultates addūt, nimirum florum decoctum lumborum ac ventris dolores lenire posse. Succum ex foliis floribusq; elicītū, oculis imbecilibus guttatim instillatum, aut foris inunctum conferre.

DE ERYSIMO. CAP. XCVI.

Erysimum in fossis huius partis urbis luxuriat prope solum. NOMINA.

Eρύσιμον Græcè, Irion Latinè vocatur. Officinis nostris incognita. Vulgares herbarij non inceptè Sinapin sylvestrem, nonnulli etiam Rapistrū, Germani Hederich & Vuilden ienff (Gallicè Velar, ou de la Tortelle) appellāt. Sūt qui perperam, eo quòd gustu Erucam imitatur, sylvestrem Erucam nominant. Alia enim est Eruca sylvestris

Rapistrū ab ea quam Rapistrum nominant herba, ut suo loco dicemus. Erysimon quidam ἀπὸ τοῦ ἑρίσιμου nostris Erysimon nomen mutuatum esse credunt, id est, à multiplici foliorum sectione: nam Erucæ modo laciniata conspiciuntur. Alij ab oleris præstantia dictum vident, unde dicunt, quasi ἐρίτιμον, quod est preciosum & nobile. Mihi ἀπὸ ἑρύσιμῳ potius dictum esse videtur, Irion quare quòd ob suam caliditatem maxima trahendi faccultate prædita sit. Latini autem Irionē ab irruendo dixerunt, quòd ignea vi, & feruido sapore irruat in gustum.

FORMA.

Folia habet syluestri Erucae similia, caules lori modo flexiles, flores luteos. In cacumine siliquas corniculorū figura, vt Fœnigraci graciles in quib. semina continentur parua, Nasturtio similia, gustu feruido. Hæ utiq; notæ in vniuersum omnes, herba illi quā pictā hīc exhibemus adamussim quadrāt.

LOCVS.

Nascitur passim prope vrbes, domorum areas, rudera & hortos.

TEMPVS.

Per integram æstatem floret, autumno autem semen in siliquis profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Erysimi haud secus quā Nasturcij calfacit & exiccat. Herba etiam ipsa arefacta similem semini vim obtinet. Humida tamē ac viridis, multo semine inferior est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Erysimi semen thoracis fluxionibus purulentis, tuſsientibus, regio morbo, coxædicum doloribus linctum cum melle confert. Bibitur etiam contra leſalia venena. Ex aqua aut melle illitum, occultis carcinomatibus, duritiis, parotidibus, testiū ac mārmarum inflammationibus prodest. In vniuersum extenuat & calefacit. Mitius ad eclegmata fiet, si aqua madefiat & torreatur, aut linteolo illigatum circumlita pasta perassetur.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Irionis semen sicut gustu Nasturtio simile appareret, ita facultate igneum est & excalefactoriū. Porro ubi in eclegmate uti ex usu est, præstat aqua præmaceratum torrere, aut lintcolo illigatū subindeque crusta pistoria inuolutum assare. Vtile est cum eclegmatis ad promouendas crassorum lentorumque in thorace & pulmone humorum expuitiones. Quin & parotidas induratas, atque duritias mammarum & testiculorum veteres iuuat. Refert Dioscorides, quod cū aqua & melle illitum, oculis proffit canceris.

EX PLINIO.

Vtilissimum tuſsientibus cum melle, & in thoracis purulentis excreationibus. Datur & regio morbo, & lumborum vitiis, pleuriticis, torminibus, cæliacis. Illinitur verò parotidum & carcinomatum malis. Testium ardoribus ex aqua, aliās ex melle. Infantibus quoque utilissimum. Itē sedis vitiis & articulariis morbis cum melle & fico. Cōtra venena etiam efficax potum. Medetur & suspiriosis. Item fistulis cū axungia veteri, ne intus addatur.

DE HELXINE CISSAMPELO.

CAP. XCVII.

Helxine Cissampelos à ligando lizeret & lizeron.

NOMINA.

Eλξίνη κισσάμπελος græcis, Helxine cissāpelos et Cōvoluulus Latinis nominatur. Vulgus her-

herbariorū & officina, Volubilē mediam & Vitealem appellant, Germani Mittelluinden, oder Vitealis. Vuingartenuinden (Gallicè Campanette, Cissampes ou Vitreole, aliis lizet) Rectè autem Cissampes los quare los dicitur: in vineis enim potissimum nascitur, & dicitur. folio hederaceo. Conuoluulus verò, quòd crebra resolutione vicinos frutices & herbas implicet. lus.

FORMA.

Folia habet Hederae similia, minora tamen. Ramulos exiguos circumplectentes quodcunque contingunt. Folia denique eius scissili ordine alterna subeunt. Flores primum candidos Liliæ effigie, dein in puniceum vergentes, profert. Semen angulosum in folliculis acinorum specie.

LOCVS.

In vineis nascitur, vnde etiam ei appellatio Cissampeli, vt diximus, indita est.

TEMPVS.

Aestate, potissimum autē Iulio & Augusto mensibus, floret.

TEMPERAMENTVM,

Calidam esse ex viribus quas illi veteres tribuunt, facile conicere licebit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius potus, aluum subducendi facultatem obtinet.

EX GALENO.

Helxine, quæ & Cissampelos nūcupatur, digerendi

vendi facultatem habet.

DE HEPTAPHYLLO.

CAP. XCVIII.

Heptaphyllum tormētilla quauis & vulgare pentaphyllum sæpe cum foliis septē inuenitur, vt Tormentilla cum quinque.

NOMINA.

Tormen-
tilla.

Eπτάφυλλον Græcè, septifoliū Latinè, vulgò Tormentilla nominatur. Sunt ex recentiorib.

Hepta-
phyllon.

qui perperam Bistortam vocent. Germanicè Tormentill, Rotheil Vurtz (Gallicè Tormétille) appellatur. Heptaphyllum autē à septenario foliorum numero dicta est. **FORMA.**

Quinquefolio similima est, nisi quòd septem non quinque habet folia, vtrinque lanuginosa, exigua, parua, serrata, caulem certis ferè interstitiis ambientia, flores luteos, radicē puniceam ac modicè intortam. Ex hac descriptione omnib. constare puto, herbam nostris Tormentillam dictam, non esse Diosco-

Tormétilla = ridis Quinquefolium. Hoc enim, vt reliqua omittam, la non est tam, radicem non intortam, sed rectam & oblongā. **Quinque-** = folium. habet. Plinius etiam lib. xxv. cap. ix. herbā quinquefolium incipere & desinere cum vite scribit.

Tormentilla autem non maturè prouenit, sed cū virescētia florent. Accedit quòd hæc in montosis & syluestribus incultisq; hoc verò pratis, cultis & aquosis in locis potius prouenit. Apuleius etiam vtrinq; herbam seorsim describit.

LOCVS.

Nascitur montosis, vt diximus, locis ac syluis.

TEMPVS.

Serò ac cum iam vites florent, herba hæc apparere incipit.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores indicant hæc herbam in tertio ordine frigida & siccam esse. Cæterum non esse frigidam, potissimū in tertio ordine facultates eius abūde declarant. Gustus etiam adstrictionem illā tāta frigiditate prorsus carere palam ostendit. Quare cum easdem quas Quinquefoliū facultates habeat, idem etiam temperamentum obtineat necesse est. Erit itaque radix desiccatoria ex tertio ordine, nulatenus tamen manifesta caliditate participans.

VIRES EX APVLEIO.

Heptaphyllo herba trita & cum oleo mixta, pedes perunges, & tertio die dolorem tollit.

EX RECENTIORIBVS.

Facultatem obtinet g'urinandi vulnera. Farina herba vel radice ex succo Plantaginis propinatur in difficultate vrine. Et ad eam respersu vulnera ad cicatricē perducit. Cum albo oui subacta & figlina decocta, datur cholericis. Foliorū vis deploratis fistulis instillatur, neque non oculis ad disentiendas nubeculas. Ad putrescētia oris vlcera herba & radix comanducata, & in ore retenta valent. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurismataque san-

FLANTARVM HISTORIAE

nat. Et vt antea diximus, facultates ferè easdem quas Quinquesolium obtinet. Quapropter venenis resistit, dysenterias, & omnes sanguinis eruptiones compefcit.

DE ERUCA. CAP. XCIX.

Eruca nobis Roquete.

NOMINA.

Eϋζωμος Græcis, Eruca Latinis, officinae Latini-
num nomen retinuerunt, Germanis Vueisz
senff (Gallicè de la Roquette) appellatur. Euxo-

Euxomos mos autem Græcis, quoniam iura commendet, ha-
vnde di- beatq; in eisdem peculiarem gratiã, dicta est. Eru-
cta. cam verò ideo nominatam volūt quòd erodat: hæc
Eruca. enim vbi degustaueris, os & linguam satis acriter
vellicat.

GENERA.

Duplex est Eruca. Vna hortensis seu satiuæ, quæ
Germanis zam Vueisz senff dicitur. Altera syl-
uestris iisdem Vuilder Vueisz senff appellatur.

FORMA.

Sesquipedali thyrso consurgit satiuæ, folio longo,
angustoque, in profundas sed rariores crenas laci-
niato, gustu præter modum acri, floribus pallidior-
ribus, semine in siliquis rapi, vel sinapi, firmo, radi-
ce candida. Sylvestris folio satiuæ simili, strictiore
tamen & minore flore luteo.

LOCVS.

Satiuæ in hortis nascitur. Sylvestris Hispania fa-
miliaris:

miliaris: prope tamē aquas prouenit magna copia. Quæ autem apud nos creditur esse syluestris Eruca, ea non est, sed Erisimon, de qua quidem herba suo in loco abundē scripsimus.

TEMPVS.

Satiua tota æstate floret: syluestris autem circa Calendas Iunij potissimum crumpit: alio enim tēpore vix reperitur.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentum Erucæ idem cum temperamēto Erisimi.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cruda Eruca satina largius comesta venerē stimulat. Idem potest semen eius, quod vrinam cit, coctionem adiuuat, aluumq; bonū efficit. Utuntur semine ad cendimenta. Quod vt plurimo tēpore seruetur, aceto vel lacte maceratum, & in pastillos digestum recōdunt. Syluestris semine homines in Hispania sinapis vice utuntur. Est autem ad ducendā vrinam efficacior, & multo quā satina acrior.

EX GALENO.

Olus hoc perquam manifestē calefacit, adco vt non faciliē solū absque iunctis Lactucæ foliis edatur. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in venerem stimulos addere. Caput magis dolore afficiet si solum edatur.

EX PAVLO.

Eruca tēperamēto Erysimō similis, flatulenta est, ob quod

PLANTARVM HISTORIAE

ob quod ad venerē instigat. Semē eius vrinā quoq;
mouet. Cæterū sylvestris domestica valentior est.

EX PLINIO.

Eruca diuersa est quàm Lactuca natura cōcitat-
rix veneris: idcirco iungitur illi ferè in cibus, vt ni-
mio frigori par feruor immixtus tēperamētū aquet.
Eius semen scorpionū venenis & muris aranci me-
detur. Bestiolas omnes innascētes corpori arcet. Vi-
tia cutis in facie cū melle illitū. Lētigines ex ace-
to. Cicatrices nigras traducit ad candorem cū felle
bubulo. Aiunt verbera subituris potū ex vino, du-
ritiam quandam contra sensum induere. In cōdiē-
dis opsoniis tanta est suauitas, vt Græci euzomon
appellauerint. Putāt subtrita Eruca si foucantur o-
culi, claritatem restitui. Tuſſim infantium sedari.
Radix eius in aqua decocta, fracta ossa extrahit.
Trita folia sylvestris Erucæ sinistra manu decerpta,
& trita ī aqua mulsa, si bibātur, venerē stimulat.

DE EVPATORIO ADULTERINO.

C A P. C.

Eupatorium adulterinum quod haecenus
officinæ celebrarunt.

N O M I N A.

N Vm herba hæc veteribus Græcis & Latinis
cognita fuerit, & quo nomine ab iisdem ap-
pellata sit, mihi nondum constare ingenuè fateor.

Officina. Officinæ tamen ferè omnes pro Eupatorio vero,
rū error. cū tamen non sit, haud sine magno errore vtun-
tur.

tur. Hinc cum nomen aliud non esset quo illam appellaremus, Eupatorium adulterinum nominare placuit. Germanicè Kunigundkraut, hoc est, herba rini adulterini. S. Kunigundis vocatur, & Vuasserdost, (Gallicè Curaige) ab Origani similitudine, & quòd iuxta aquas proveniat. Aliis Hirtzenklee, quòd vulnerati cervi sibi hac medeantur herba.

FORMA.

Caulis edit rotundum, purpureum, geniculatū, solidum & hirsutum, circa quam ala panduntur, folia longa, Canabinis ferè similia, amaraq;. Flores in summo parvos coacervatos, in candido purpureascentes, tandem in pappos tenues abeuntes. Radicem multis fibris capillatam & inutilem. Errant haud dubiè qui herbam hanc Dioscoridis Hydropiper esse putant. Nam etsi ferè tota eius herba facies floribus demptis, Hydropiperis delineationi respondet, tamen quia nulla prorsus piperis in foliis aut floribus acrimonia apparet, non est cur Hydropiper dici possit aut mereatur.

Eupatorium adulterinum non est Hydropiper.

LOCVS.

In fluminum ripis, aliisq; locis humidis nascitur, potissimum verò iuxta resides aquas, aut tardo fluxu prorepentes.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu vehemèter amara est, vt calidam & sic-

eam esse in secundo ordine, aut in medio tertij non sit dubium.

VIRE S.

Haud dubiè herba hæc abstergit, expurgátque, & quæ in venis est, crassitiem incidit: quamobrem menses & urinas mouet, educēdoq; ex thorace pulmoneq; puri auxiliatur, aliasq; facultates amari saporis, quas recenset Galenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvij. obtinet. Potest itaque obstructions iecoris & lienis aliarumq; partium corporis soluerre. Ex recentioribus sunt qui hanc vulnerariã esse tradunt, neque temerè: id ipsum enim posse, siccitas eius testatur. Suffitum præterea eius herbae venenatas fugare feras iidem scribunt. Evidentiissimum verò est hanc etiam contra venena esse admodum efficacem.

DE EREBINTHO. CAP. CI.

NOMINA.

EΡΕΒΙΝΘΟΣ græcè, Cicer latinè, officina latinè nomen retinuerūt, Germanicè zyflern (Galicè pois cices) nominatur.

GENERA.

Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum & nigrum. Nos ex iis tribus nigri tantum pieturam damus. Differunt potissimum in floribus: hoc enim ut cernis purpureos, album verò candidos flores producit.

FORMA.

Cicer satiuū caule est lignoso, obliquo, foliis exiguis, multis, circinatis, flore albo vel purpureo, siliis rotundis, radice tenui & non admodum longa.

LOCVS.

Pullo crassoque solo gaudet.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atque subinde in siliis semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est primo in ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cicer satiuum bonam facit aluum, urinā cit, inflationes parit, cutis colorem commendat, menses & fetus educit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium & myrmecias. Ad scabiem, acoras, impetigines, vlcera cōcrescētia & maligna, cum hordeo & melle. Alterum genus *arietinum* nominatur. Vtrunque cit urinas, dato cum Rosmarino contra regium morbum & cutem subeunt aquas eorum decocto. Lidunt autem vesicā exulceratam & renes. Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna singula earum capita eminentiā sive singulis *Ciceribus* tāgere, deligataq; in linteolo semina illa post se abiicere, vt acrochordones decident.

EX GALENO.

Cicer legumen est flatuosum quod nutrire potest, aluo mouenda habile, cienda urinā idoneum, &

PLANTARVM HISTORIAE

semini generando aptum. Prolicit verò & menses. Porro quod vocatur arietinum, ceteris efficacius urinam prouocat. Decoctum eius calculos renum confringit. Reliquum autem Cicerum genus quod Orobiaum vocant, eadem vi pollet, puta attrahēdi, digerēdi, incidēdi, extergendi. Lienem & iecur, & renes expurgant, scabiēsque & impetigines extergunt. Parotidas & testes induratos discutiunt. Maligna etiam vlcera cum melle sanant.

EX SIMEONE ANTIOCHENO.

Cicera difficulter cōcoquantur & excremēta gignunt. Venerem stimulāt, magisq; quā fabae nutriunt, obstructiones tollunt, & menses educūt. Habent salsam simul & dulcem qualitatem, & ob saluginem ventrem mouent, propter dulcedinem autem urinam. Inflationes quoque faciunt, & lac gignūt, extergendiq; facultatem obtinēt. Nigra medicamentosam vim habent: urinā enim vehementissimè mouent, & calculos renū & vesicæ frāgūt. Nullū verò legumen sic vt Cicera, præcipuè autem nigra & parua, lapides frāgere potest. Id verò magis eius ius, quod tamē vesicæ morbis supra cetera legumina officit. Cicera verò rubra calidiora & crassiorū sunt partiū quā alba. Oīa autē urinā ducūt. Madefacta nocte vna ī aqua & sumpta, lūbricos eiiciunt, sed qui utitur, sex ieiunet horæ oportet. Imposita vt cataplasma parotidibus, molliūt & discutiūt tumore. Farina horū aceto subasta,

Etia, & scabiosis inuncta prodest. Ius eorūdem ictericos inuat, & urinam albā reddit. Oportet verò iis neque ante cibum, neque post uti, sed in medio.

DE ECHIO. CAP. CII.

Echion in viis frequēs agro Pharrhisino.

NOMINA.

Eχιον, ἢ ἀλκυδιῶδιον græcis, Echion & Alci-
biacum latinis dicitur. Officinis ignotū. Vul-
gares herbarij sylvestre Buglossum nominant, quos Buglossū
sequētes Germani Vuild Ochsenzungen, Gal- sylvestre.
licè Pois cices) appellant. Echion autem dictū vo Echion
lunt, quòd contra ferarū iclus sit vtile. Alij quòd quare di-
florescit capitulis viperæ similibus. Rectius Diosco etum.
rides, quòd semina viperino capiti similia habeat.

FORMA.

Folia obtinet oblonga, aspera, tenuia, Anchusa
proxima, minora tamē & pinguia. Habet & acu-
leos exiles foliis adiacentes. Cauliculos tenues mul-
tos, & utrinque foliola tenuia, pennata, nigra, mi-
nora proportionē ad cacumen caulis. Iuxta folia flo-
res purpureos, in quibus semen est viperino capiti si-
mile. Radix digito exilior, subnigra. Ex qua sanē
delineatione sole clarius sit, herbam cuius picturā
hīc exhibemus esse Echion. Folia enim habet præ-
longa, hirsuta, tenuia, ad Anchusam accedētia, mi-
nora tamen pinguiāque, tenuibus spinis horridula,
cauliculos tenues, numerosos, minutaq; folia utro-
que latere dependentia, nigra, in summo caule

PLANTARVM HISTORIAE

minuscule, inter quæ purpurei flores emicant, in quibus semina viperarum capitulis similia insidēt, à ceruice paulatim in rostellum extenuata, tumidiore superna parte, in qua quædā prominulæ quasi sedes oculorum apparent, id quod ego hisce oculis non semel, sed iterum atque iterum conspexi. Radix digito tenuior nigricat.

LOCVS.

Vbiq; ferè ad itinera, & in asperis locis nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidum esse citra tamen insignem siccitatem inde conicitur, quòd lactis procreatricem facultatem obtinet. Medicamenta enim, Galeno lib. quinto, capite vigesimo de Simp. med. facul. teste, quia pituitosos humores calefacientia in sanguinem vertunt, lac procreare solent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix nō solum iis qui à serpentibus morfi sunt succurrit pota cum vino, verumetiam præsumentes eam ne feriantur facit. Idem præstant folia & semen. Sedat etiam dolores lumborum, & cum vino aut sorbitione sumpta lac proritat.

EX PAVLO.

Echion spinosa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur.

DE ELEOSELINO.

CAPVT. CIII.

NOMINA.

Eλεόςελινον, ἢ ὑδρόσελινον græcis, *Apium palustre & rusticum latinis, Germanis Vuasfer epff, oder Eppich, oder bauren eppich (Gallicè de Lache, ou esgrun persil) nominatur. Sic dictum græcis, quòd in paludibus & aquosis locis proueniat.*

FORMA.

Apio satiuo maius est, caule tenero, concauo, folio molli, raro nec hirsuto, simile Apio sapore, odore, floribus, semine & radice.

LOCVS.

Nascitur in paludibus & aquosis locis.

TEMPVS.

Iulio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod Apium satium temperamētum obtinet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eadem omnia quæ satium potest.

EX PLINIO.

Eleoselino vis priuata contra araneas.

DE ELLEBORO ALBO.

CAP. CIIII.

Ellebori radice nobis sola cogniti, noster enim elleborine quædam verius fuerit.

NO-

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Eλλεβορος λευκος Gracis, Elleborus cādidus
& Veratrum album Latinis, officinis pariter
Latinis Elleborus albus, Germanis Vueifz niefz
uurtz (Gallicè Ellebore blanche) appellatur.

Elleborus Elleboron autem Græci dictum volūt, quòd cibum
cur dictus corporis cripiat. Album à radice vocarunt, quæ nī
Albus quā gri respectu candida est.

re cognos

FORMA.

minatus.

Plantagini similia folia obtinet, aut Beta sylues
tris, breviora tamen, nigriora, & colore rubentia.
Caulē palmi altitudine, cauum, quum siccati in
coeperit corticibus seu tunicis inuolutum. Radices
illi subsunt numerosæ, tenues, ab exiguo & oblongo
capite ceparum modo prodeuntes. Quod autē Dio
scorides dicit colore rubere folia, id de costis eorum
intelligendum erit.

LOCVS.

Nascitur in montanis locis frigidis & asperis.

TEMPVS.

Radices eius per messem legenda sunt.

TEMPERAMENTVM.

In tertio ordine est excalefaciētiū & exiccātiū.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Optimus habetur qui mediocriter extentus est
& albus, fragilis, carnosus, nō acuminatus, iū cens
que, aut quū frangitur puluerulentus, exilem inte
riorem medullam habens, gustu non admodum fer
uens.

uens, neque saluam confertim ciens. Huiuscemodi
autem strangulat. Purgat vomitionib. varia edu-
cens. Miscetur collyriis, quæ claritati oculorū offic-
cientia purgare possunt. Menses ducit, & fetus in
vtero appositus enecat. Sternutamenta cit, & mu-
res interficit, cum melle & polenta subactum. Car-
nes simul coctum minuit. Datur ieiunis per se &
cum Sesamo, aut Ptisana succo, aut Alicæ, aut mul-
sa, aut pulte, aut lenticula, aut alia sorbitione. Pa-
ni compinsitur & torretur. Apparatus & victus
ratio ab iis tradita est, qui de ratione & modo dā-
di eius, dicato priuatim opere, scripserunt. Potissis-
imum autē Philonidi Siculo ab Enna subscribimus.
Longum enim esset ei qui de medica materia agit,
curandi quoque rationem docere. Dant autē aliqui
cum copiosa sorbitione, aut succo multo, aut modicū
cibum dari præcipientes, statim Elleborum offerūt,
præsertim iis in quib. suspecta timendæve erit strā-
gulatio, aut corporis imbecillitas imminet: tutò e-
nim ea sic peragitur purgatio, quòd non intempe-
stiue medicamentum corporibus cibo munitis acce-
dat. Sedi etiam balani ex Elleboro subdita cū ace-
to, vomitiones eliciunt.

EX GALENO.

Elleborus extergentis simul & excalfacientis
facultatis est. Quamobrem ad alphos, impetigines,
scabies, leprasq; accommodus est. Quinetiam si in
fistulam callo indurata infundatur duobus tri-
búsve

bisve diebus, callum detrahit. Dentibus si cū aceto colluantur prodest.

EX PLINIO.

Candidum veratrum vomitione, causasq; morborum extrahit : quondam terribile, postea tā promiscuū, vt plerique studiorum gratia ad providenda acrius quæ cōmentabantur, sæpius sumptitauerint. Carneadem responsurum Zenonis libris: Drusum quoque apud nos, tribunorum popularium clarissimum, cui ante omnis plebs adstās plausit, optimates verò bellum Marsicum imputauere, constat hoc medicamēto liberatum comitiali morbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam vt diximus, Sesamoides admiscet. Italia veratrū vocat. Farina eius per se & mixta radiculæ qua lanas diximus lauari, sternutamentū facit, somnūque. Leguntur autem tenuissimæ radices breuesq; ac veluti decurtate etiam hæ. Nā summa quæ est crassissima, cepis similis, canibus tantū datur purgationis causa. Antiqui radicem corticemq; carnosissimum eligebant, quò tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis spongiis opertam turgescentēque, in longitudinem findebant. Deinde fila in umbra siccabant, iis vtentes. Nunc ramulos ipsos à radice sua grauissimi corticis, ita dantes. Optimum quod acre gustu, feruensq; in frangendo puluerem emittit. Optimum præterea quod celerrimè mouet sternutamenta, sed multo terribilius nigro, præcipuè

puè si quis apparatus poturorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, intempestivas somni vires, singultus infinitos, aut sternutamenta, stomachi dissolutiones, tardiores vomitus aut longinquiores, exiguos aut nimios. Sed antiquorum vitium erat, quòd propter hos metus parcius dabāt, cùm celerius erumpat, quò largius sumitur. Themison binas non amplius drachmas donauit. Sequentes et quaternas dedere, claro Herophili præconio, qui Elleborum fortissimi ducis similitudine æquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire. Præterea mirū inuentum est, quòd incisum forficulis, cortex remanet. Hoc inanito, medulla cadit. Hæc in nimia purgatione data, vomitiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne nubilo detur die, quippe impatientibus cruciatus existit. Nam æstate potius quàm hyeme dandum, nō est in dubio. Corpus septem diebus præparandum cibis acerbis, abstinentia vini, quarto & tertio die vomitionibus, pridie cænæ abstinentia. Albū è dulci datur, aptissimè verò in lacte aut pulce. Nuper inuenere dissectis raphanis inserere Elleborum, rursusq; comprimere raphanos, vt transeat vis, atque eo lenimento dare. Reddi post quatuor ferè horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis. Medetur in morbis comitialibus, vertigini, melancholicis, insanientibus, lymphaticis, elephātiæ albæ, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, incipientibusq;

PLANTARVM HISTORIAE

pientibusque tympanicis, stomachicis, spasticis, clinicis, ischiadicis, quartanis quæ aliter non desināt, tussi veteri, inflammationibus, torminibus redeuntibus. Vetant dari senibus & pueris. Item mollibus & feminei corporis animæ ve exilibus, aut teneris, et foeminis minus quàm viris. Item timidis, aut si exulcerata sint præcordia, vel tumeant, minimè que sanguinem excreantibus, vel latere vel faucibus. Medetur extra corpus eruptionibus, pituita cū axungia illitum. Item suppurationi veteri. Mures polenta admixtum necat. Muscæ quoque necantur albo trito, & cum lacte sparso. Eodē & phthiriasis emendatur.

DE ELLEBORO NIGRO ADULTERINO. CAP. CV.

NOMINA.

Elleborus
niger ad-
ulterinus
cur dictus

H

Erbam hanc cuius picturam damus non esse verum Elleborum facile constabit, si eam ad descriptionem referas. Verum quum magna pars hodie medicorum pro Elleboro nigro, neq; tamen citra summam efficacitatem, vtatur, adulterinum nigrum Elleborum appellare placuit. Germanis Christuurtz dicitur, non alio sanè nomine quàm quòd circa seruatoris nostri CHRISTI natalem diem flores, modo calido in loco sita sit herba, producat. Cæterū etsi genuinus Elleborus non sit, tamen non admodum ab illo abluat descriptio, nec viribus multo inferior est, vt

in alterius iopia huius vsus citra errorē esse possit.

GENERA.

Duo eius esse genera deprehendimus. Vñ quod officinæ hodie Elleborum nigrum, Germani verò Christuartz, vt diximus, nominant. Nos certioris discriminis causa, Elleborum nigrum adulterinum hortensem appellauimus, quòd scilicet sua sponte, Hortēsis. & nisi plantatum sit, in hortis non proueniat. Alterum quòd syluestre sit, & sponte sua nascitur, Elleborum nigrum adulterinum syluestrem nuncupamus. Germanis Leuszkraut dicitur.

FORMA.

Hortensis caulem, vel potius pediculū habet oblongū & foliis nudum, nisi in summo, vbi folia oblonga, angusta, pluribusq; diuisuris incisa, atque adeò in ambitu serrata producit. Florem habet herbacei coloris. Radices tenues, nigras, veluti à capitulo ceparum pendentes. Sylvestris priori non admodum dissimilis est, nisi quia caulem obtinet crassiorem, foliaq; minora. Florem etiam etsi herbaceum habeat, tamen è medio eius, folliculi, aut siliquæ duæ aut tres, in quibus semen est, exeunt.

LOCVS.

Hortensis, vt dictum est, passim in hortis nunc prouenit: sylvestris in montibus asperis, lapidosis ac sublimibus.

TEMPVS.

Hortensis hyeme, circa CHRISTI nimirum natalem,

natalem, ut comprehensum est, floret. Sylvestris autem verè & initio æstatis.

TEMPERAMENTVM.

Quñ experientia testetur Elleborum nigrũ adulterinum, potissimum hortensem, eandem quam genuinus habere facultatem, idem etiam obtineat temperamentum necesse est. Calidus itaque & siccus in tertio ordine erit.

VIRE S.

Purgat perinde atque genuinus inferiorem ventrem, pituitam & flavã bilem ducens. Prodest comitiali morbo laborantibus, melancholicis, insaniẽtibus, articulorum doloribus correptis, & resolutis. Menses in pessa subditis trahit. Fœtus necat. Porro cum illis etiam insit extergendi vis, alphas, impetigines, scabiẽm, leprasq; curant. Erodentibus medicamentis commiscetur. Idcòque sylvestris non temere, quòd pediculos interficiat, Leulzkrout Germanis meis dicitur. Non verò pediculos tantum, verum etiam oues & alia animantia comestus necat.

DE HELXINE. CAP. CVI.

Helxine Parietaria nobis.

NOMINA.

Eλξίνα, ἢ πορδίκιον Gracè, Helxine & Vreccolaris Latine nominatur. Officinæ vocant parietariam, & dempta vna litera Paritariam. Vulgus Muraliũ & Muralem, Germani Tag vnd nacht, s. Peterskraut, oder Glaszkraut. (Gallicè

licè Parietaire.) *Helxine autem ab aspero semi-* *Helxine*
ne quòd tenaci nexu vestibus adhæret, dicta est. vnde di-
Perdicium verò, quod ea perdices præcipuè vescan- *Perdicio.*
tur. Vrceolaris autem, quòd detergendis vitreis, vr-
ceolis vasisq; efficax sit. Muralis & Parietaria, Vrceola-
quòd muros ac parietes natales locos sibi fecerit. *ris.*

FORMA.

Muralis.

Cauliculos habet tenues, subrubentes, folia Mer- *Mer* *Parieta-*
curiali similia, hirsuta, circa caules veluti exigua *ria*
semina, aspera, vestibus adherentia. Hæc sanè pi-
etura sic plantæ illi respondet, vt nulla prorsus sit
nota quæ illi non adamussim conueniat. Est enim
fruticosa, cubitalis, cauliculis tenuibus, leniter ru-
bescentibus, foliis Mercurialis herbæ, hirsutis, flo-
ribus purpureis minutissimis, exili per ambitum eius
semine, aspero, vestibus adhærente, radice subrubra,
fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, muris, maceris, parietibus
& vinctis. Nunc in hortis etiam plantata prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Facultas Perdicio inest abstergendi & constrin-
gendi cum humiditate subfrigida.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia refrigerandi constringendiq; vim obtinèt.
Quare illita sacros ignes sanant, condylomata, a-
v *dusta,*

PLANTARVM HISTORIAE

dusta, incipientes panos, inflammationes omnes, & oedemata. Succus eius cerussæ mixtus, ignib. sacris & iis quæ serpunt malis vtiliter illinitur. Inungitur podagris cum cerato Cyprino, vel scuo hircino. Diuturnas tusses adiuvat, cyathi mensura absorptus. Contra inflammatas tonsillas gargarissatus & illitus prodest. Aurium quoque dolores cum rosacco infusus iuuat.

EX GALENO.

Vim habet abstergendi & paulatim constringendi ac refrigerandi. Quare phlegmonas omnes inter initia, & in augmento vsque ad statum sanat, maximè calidas. Quinetiam incipientibus phygethlicis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoque eius ad dolores phlegmonosos mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhmia. Aliqui etiam medicorum iis qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerunt. Certè euidens extergendi experimentum præbet & in vasis vitreis.

EX AETIO.

Exterit alopecias & impetigines priuatim aspersuè illita. Sedis hæmorrhoidas aperit, fistulis medetur, & sinus cohibet trita & cum modico sale apposita.

EX PLINIO.

Hæc inficit lanas, sanat ignes sacros, tumores, collectionesq; omnes & adusta. Panos succus eius cum psimmythio, & gutturi incipientia turgescere. Itè

veterem

*vetcrem tuſſim cyatho hauſto. Et omnia in humi-
do. Sicut tonſillas & varices cum roſacco. Imponi-
tur & podagris cum caprino ſeuo ceraq; Cypria.*

APPENDIX.

Monēdi ſunt hoc loco medici vt rectum Helxi-
nes uſum diſcant. Nam haſtenus non rectè eam in
frigidis vitiis pro fomento uſurparunt, cum refrige-
randi conſtringendique vim habeat. Cæterum cum
abſtergendi quoque illi facultas inſit, poteſt etiam
calculoſis, & iis qui difficultate urinae laborāt ex-
hiberi potiſſimum ſi aliquid cōſimilem facultatem
obtinens ei admiſceatur. Sic Aetius ſedis hæmore-
rholdas aperire tradit, ſi trita cum ſale, cui etiam
abſtergendi vis inēſt apponatur. Quare qui cal-
culoſis hanc herbam propinant, curent vt aliquid
quod abſtergendi facultatem habeat, commiſcāt.

DE ERYTHRODANO.

CAP. CVII.

Rubia fatiua nobis Garance, & ſylueſtris
frequens.

NOMINA.

Eρυθρόδανον Græcè, Rubia Latine vocatur. Rubiacum
Officinæ rubeam tinctorum appellant. Ger- vocata.
manicè Rote (Gallicè Garance) nominatur. A ru-
bore radicis, quo lanae & coria tinguntur, factum
illi vtrunque nomen eſt.

GENERA.

v ij

Dioscor.

PLANTARVM HISTORIAE

Satiua. Dioscoridi & alijs duo Rubiae sunt genera. Altera enim satiuæ est, altera verò sponte prouenit, et syluestris existit: nec esse videtur alia quàm quæ à nostris Stellaria vocatur.

FORMA.

Caules satiuæ quadranguli, longi, asperi, similes Aparinæ, multo tamen maiores robustioresq; folia per intervalla in singulis geniculis habentes, stellarum modo in orbem circumiacentia. Fructus rotundus, per initia viridis, mox ruber, postea cum maturit niger. Radix tenuis, longa, rubra. Syluestris itidem caules quadrangulos, vt diximus, emittit, folia per intervalla in singulis geniculis stellarum instar in orbem circumiacentia, flores candidos, radicem tenuem, longam & rubram, adeò vt suo colore tingere etiam videatur.

LOCVS.

Nascitur in plerisque nunc Germaniæ locis, agropotissimum Argentoracensi & Spirensi. Seritur autem propter emolumentum quod ex ea quaestuosissimum sentitur.

TEMPVS.

Aestate colligitur fructus, & subinde etiam effoditur radix.

TEMPERAMENTVM.

Calida est in secundo ordine, & sicca in tertio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix urinam ciet, qua de causa regio morbo laborantibus

borantibus cum aqua mulsa auxiliatur: itē ischia-
diacis & resolutis. Vrinam multam & crassam du-
cit, nonnunquam etiam sanguinem. Bibentes quidē
quotidie lauari oportet, & excrementorū quæ red-
duntur differentiam spectare. Aduersus venenato-
rum morsus succum cum foliis bibere prodest. Se-
men ex oxymelite potum, lienem absomit. Apposita
radix, fetus, menses, & secundas trahit. Albas
vitilignes ex aceto illita sanat.

EX GALENO.

Rubia tinctorum radix acerba & gustu amara
est. Itaque quæcunque agere diximus vbi cuiusmodi
coiuerint qualitates, ea omnia in hac radice lucu-
lenter conspicias: quippe quum & lienem & iecur
expurget, et urinam crassam copiosamq; ac nonnun-
quam etiam sanguinolentam moueat. Quin & men-
ses ciet, ac mediocriter quæ extersionem postulant,
extergit: proinde vitilignes albas cum aceto illi-
ta inuat. Sūt qui eam ischiadicis & resolutis in po-
tu cum melicrato exhibeant.

EX PLINIO.

Erythrodanū, quam nos Rubiam vocamus, qua
tingantur lanae, pellesq; perficiuntur, in medicina
urinam cit, morbum regium sanat ex aqua mulsa,
& lichenas ex aceto illita: & ischiadicos & para-
lyticos, ita vt bibentes lauentur quotidie. Radix se-
menq; trahūt menses, aluum sistunt, & collectiones
discutiunt. Contra serpentes rami cum foliis impo-

PLANTARVM HISTORIAE

nuntur. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum.

DE ZEA. CAP. CVIII.

Zea spelta nobis.

NOMINA.

Zεία Græcis, Zea & Semen Latinis, vulgo & Italis Spelta dicitur. Gallicè del'espeau (Semen autem latini à præstantia frugis appellarunt. Hinc est quòd Homerus etiā hanc celebrauerit dicens, ξείδιωπος ἀργεῖα. Quibus sanè verbis innuit aruum Zeam largiens, non vt nonnulli arbitrantur quòd vitam donet, Plinio autore.

GENVS.

Duo Zeæ Dioscorides facit genera. Vnum cuius grana in singulis tunicis seu glumis gemina, quod Græcis eam ob causam δίνουκος cognominatur. Germanis hoc genus Speltz, oder Dinckelkorn vocatur. Alterū simplicis est grani, & Germanicè nominatur. Einkorn, oder S. Peters korn.

FORMA.

Primum genus culmo, geniculis & spica tritico simile est, duobusq; vtriculis iunctis duo grana simul fert. **Alterum.** culmo & spica est breuioribus, grana singula in singulis tunicis duplici ordine seu versu dispositis proferens, ac in summitate aristis suis planè hordeum refert.

LOCVS.

Latum pingueq; solum desiderat.

TEMPVS.

Iunio mense floret, Iulio autem maturitatem consequitur.

TEMPERAMENTVM.

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeum, quatenus ad calefaciendi & refrigerandi facultatem attinet, placide verò exiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Zea magis nutrit quàm hordeum. Ori suavis est. Digesta in panificia minus quàm triticum alit.

EX GALENO.

Zea vniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici & hordei: itaque ex illis cognoscatur.

EX PLINIO.

Zea farina efficacior hordeacea videtur, trimensis mollior. Ex vino rubro ad scorpionum ictus tepida, & sanguinem excreantibus. Item arteriæ. Tussi cum caprino seuo aut brutyro. Ex Fœnogreco mollissima omnium. Vlcera manantia sanat, & furfures corporis, stomachi dolores, pedes & manus cum vino & nitro cocta.

EX SIMEONE SETHI.

Zea facultatē habet proximam tritico. Est verò facilis concoctionis, bonique succi: ad hæc etiam emplastica existit.

PLANTARVM HISTORIAE
DE ERIGERONTE. CAP. CIX.
Senecio nobis senecion.

NOMINA.

Hερῖνον Græcis, Senetio latinis, officinis in-
usitata, Germanis Grindkraut (Gallicè
Erigeron du Seneçon) dicitur. Græcis autē Erigerō quasi
cur dicta. vernus senex nominatur, seu citò vel vere senescēs
quod celeriter in pappū & lanuginem abeat. Ita
que compositione nominis, tempus simul quo floret,
& floris mox deflorescentis euentum, indicare vo-
luerunt Græci, vt quo tempore quærenda, & qui-
bus notis inuenienda esset, omnes scirent. Non igitur
senectutis ratio aliqua in ea est, sed canescentes
humani capilli modo post florē eius pappi, vt à se-
nectute denominaretur, effecerunt. Eam etiam ob
Senetio. causam Romani Senetionem illam vocauerunt.

FORMA.

Herba est cauliculo cubitali, subrubro, foliis cō-
tinuis, in extremitatibus Erucae modo incisuris di-
uisis, sed minoribus multo: floribus luteis, celeriter
scissis dehiscentibusve, & in pappos deflorescenti-
bus: vnde & Erigeron dicta est, quòd vere scilicet
capilli modo flores canescant. Radice inutili. Om-
nes hæ Dioscoridis notæ, herbae quam Germani
Creutzuurtz & Grindkraut nominant, respō-
dere deprehenduntur. Siquidem cauliculus est illi
cubitalis, subruber, folia cōtinua habēs, per extre-
mitates Erucae instar laciniosa, minora tamen. Flo-

res lutei, qui scissi statim in lanuginem abeunt. Er- Senetio
rant toto cœlo qui Senetionē Nasturtium esse gar- nō est Na
riunt. LOCVS. sturtium.

Nascitur passim in sepibus, & circum oppida.

TEMPVS.

Vere erumpit, quo etiam tempore, vt dictū est,
canescit,, & durat ferè tota æstate eius herba pro-
uentus. TEMPERAMENTVM.

Erigeron, Paulo Aegineta autore, mixtā tempe-
raturā obtinet: refrigerat enim & modicè discutit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus refrigerandi vim obtinent,
quapropter cum exiguo vino, aut per se illita folia,
testium sedisq; inflammationes sanant. Cum mane-
na, tum reliquis vulneribus, tum nervorum quoq;
medentur. Idem præstant pappi per se ex aceto illi-
ti, verum recentes epoti strangulant. Totus autem
caulis in aqua decoctus, & cum passo potus, stoma-
chi dolores à bili contractos persanat.

EX PLINIO.

Lanugo eius cum croco & exiguo aquæ frigide
trita illinitur epiphoris. Tosta cum mica salis, stru-
mis. Erigeron quoque cum farina thuris & vino
dulci, testium inflammationes sanat.

DE HEDYOSMO. CAP. CX.

Mentha nobis nomen retinet, & Balsamū
quoque dicitur multiplex.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Hδύοσμος, ἢ μίνθη Græcè, Mēta Latinè dici-
tur. Officinæ nomen latinum retinuerunt.

Hedyosmon vnde Germanicè Muntz (Gallicè de la Mente) voca-
tur. Hedyosmon Græci, quod suauem spiret odorem
dictum. nominauerunt. Menta autem dicta est, quòd odore
Menta. suo mētem excitet, aut quod grato, vt ait Plinius,
odore mensas percurrat.

GENERA.

Mentæ in vniuersum duo sunt genera. Vna enim
Satiua ge satiua & hortensis est: altera syluestris & fera. Sa-
nera. tiua iterum quatuor præcipua sunt genera. Vna
est quam Germani Deyment simpliciter, vel
krausz Deymēt vocant. Altera, quā iisdē krausz
Balsam. Tertia, quæ iisdē Balsammuntz appella-
tur, & Vnser Frauen mūtz oder spitz mūtz:
à nostræ ætatis herbariis Romana vel Saracenica.
Quartam Germani quidam Hertzkraut non
nulli Balsamkraut vocant. Per me tamen licebit
has species, quādoquidem facultatib. similes sint vt
cuius placuerit, nominare. Nobis autem vt certius
discernerētur prædictis nominib. appellare placuit.
Syluestris, quæ latinis Mētastrum vocatur, & vul-
gò equina Menta, Germanicè Roszmuntz Vuil-
der Balsam, oder Vuild Muntz dicitur. Non
ignoramus plures esse Mētæ species, nos tamen eas
duntaxat quas vidimus, pictas exhibemus.

FORMA.

Satiua

Satiua prima caulē habet quadrangulum, à ra Primā.
dice lentè punicantem, & lanugine pubescentē, fo-
liam ferè rotundum, serratum, molle & odoratum,
flosculos purpureos internodia geniculatim coro-
nantes, verticillato semper ambitu. Altera priori Secundā.
per omnia similis est, nisi quòd illi subpurpureus
flos circa cauliculorum fastigia spicatur. Tertia fo-
lio longiore & acutiore constat, flosculis purpureis
coliculorum cacuminibus spicatim insidentibus.
Quarta itidem longioribus foliis est, floribusq; pur-
pureis internodia geniculatim, haud secus quàm in
prima, caules coronantibus. Mentastrum verò foliis
lanugine canescentibus, atque hirsutioribus, Sisyma-
brio procerius, odore magis viroso, flosculis spicatim
coliculorum fastigia coronantibus.

LOCVS.

Satiuæ passim in hortis proueniunt. Amant apri-
cum locum, non pinguem, non stercoreatum, humidis
facilius adolescunt. Syluestris autem, quæ Mentas-
trum alio nomine appellatur, vliginosus gaudet lo-
cis, passimq; irrigua hoc Mentastro pubent.

TEMPVS.

Florent omnes mense Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Vtraq; tam hortensis scilicet quàm syluestris, gu-
suacris, & facultate calida est, ex tertio ordine
excalesciētū. Infirmior tamē est hortēsis, minusq;
calescit. Exiccat autē in secundo ordine: illi enim

PLANTARVM HISTORIAE

ex cultura aliquid humiditatis accedit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi, adstringendi atque exiccandi vim habet menta hortensis. Proinde sanguinem sistit succus eius cum aceto potus. Lumbricos rotundos enecat. Venerē concitat. Singultus, vomitiones, choleramq; sedant duo aut terni surculi cum acidi granati succo poti. Cum polenta illita abscessus discutit. Imposita fronti, capitis dolores mitigat. Mamas quæ tenduntur, aut lacte turgent, compescit. Cum sale canum morsibus illinitur. Aurium doloribus eius succus cum aqua mulsa subuenit. Mulieribus ante coitum admota, conceptioni resistit. Linguae scabritiem confricata leuigat. Lac coire densariq; in caseum nō sinit, immersis in iis foliis. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem usum habet. Sylvestris in sanitate deterioris usus est quàm satina.

EX GALENO.

Menta satina ad venerem mediocriter excitat, id quod omnibus inest, quæ humiditate semicocta & flatuosa participant. Denique in abscessibus aliqui eam cum polenta imponunt. Habet etiā quidam amarum in se & acerbum: illo quidem lumbricos interficit, acerbitate verò si cum oxycrato bibatur, recētes sanguinis excreationes reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba tenuium partium. Actius addit, potum eius decoctum tribus seriastim

tim diebus, colicos omnino sanare.

EX PLINIO.

Mentæ hortensis odor animum excitat, & sapor
 auditatem in cibis: idco in mammarum mixtura
 familiaris ipsæ accessere, vt coire densariq; lac nō
 patiantur. Quare lactis potionibus additur, ne hu-
 ius coagulati potu strangulentur. Data in aqua &
 mulso, eadem vi resistere & generationi creditur,
 cohibendo genitalia densari. Acquē maribus &
 fœminis sanguinem sistit, & purgationes fœmi-
 narum inhibet. Cum amylo ex aqua pota, cœli-
 acorum impetus. Syriation & vomicas vuluæ cura-
 uit. Ille & iecinorum vitia ternis obolis ex mulso
 datis. Item sanguinem excreatibus in sorbitionem.
 Vlcera in capite infantium mirè sanat. Arterias hu-
 midas siccant, siccas adstringit, pituitas corruptas
 purgat in mulso & aqua, Voci succus sub certami-
 ne utilis duntaxat, qui & gargarisatur vna tumē-
 te, adiecta ruta & coriandro ex lacte. Vtilis et cō-
 tra tonsillas cum alumine, linguæ asperæ cum mela-
 le. Ad conuulsa intus per se, vitiisq; pulmonis. Sin-
 gultus & vomitus sistit cum succo granati, vt De-
 mocritus monstrat. Recentis succus narium vitia † Aliās
 † spiritu subducto emendat. Ipsa trita cheleras in spiritus
 aceto quidem pota. Sanguinis fluxiones intus: Illeū subduc-
 etiam imposita cum polenta, & si mamma tēdant. Etos.
 tur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumi-
 tur & contra scolopendras, & scorpiones marinos,
 &

PLANTARVM HISTORIAE

Et ad serpentes. Epiphoris illinitur, Et omnibus in capite eruptionibus, item sedis vitis. Impetigines quoque, vel si teneatur tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt Et lieni mederi eam in horto gustatā, ita ne vellatur. Arida quoque farinam tribus digitis apprehensam, Et stomachi dolorem sedare in aqua, Et similiter aspersa in positionem, ventris animalia pellere.

APPENDIX.

Animaduertendum, ea quæ Plinius Mentastro tribuit, Calaminthæ deberi, vt satis liquet Dioscoridem legenti. Neque sanè mirum, quandoquidem autores societate quæ est inter Mentam, Mentastrium Et Nepetam decepti, tum species, tum nomina confundunt.

APPENDIX ALTERA.

Ceterum appendicis etiam vice hic annotandum erit, Aristotelem sectione xx. proble. secundo, cum asserit Mentam refrigerare posse corpora, non pugnare cum Galeno aliisque medicis qui illā esse calidam affirmant. Per se nanque calida est Menta: at quia esa libidinem proritat, Et hæc cum immodica fuerit corporis vires deiecit, atque adco animum Et corpus refrigerat, ideo eam ex accidente, quia videlicet vt in venerem immodicè ruamus efficit, refrigerare dixit Aristoteles.

EX SIMEONE SETHI.

Inuat iecur frigidum, Et ventrem corroborat

ac stomachum, coctionem facit, vomitum sedat & singultum. Prodest etiam ad cordis morsus, & appetitionem suscitatur. Flatus discutit, & lūbricos interimit, & sissimum sylvestris Mentæ ius. Venerem stimulat, & iccinoris obstructiones tollit. Verum hoc vesci ad satietatē non oportet, quoniam sanguis nē extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauā bilē mutat: dein efficit ut sanguis qui maximē est tenuiū partiū discutiatur, & crassus ac melancholicus relinquatur, atq; idcirco oportet biliosos ab ea abstinere. Cōtrita cū sale, & morsui rabiosi canis imposita medicamentū fit salubre. Arida verò triata, & post cibum sumpta, ad concoctionē facit, & lienosos iuuat. Cū vino pota difficulter pariēti succurrit. Ferunt etiā quòd mansa lippienti imposita, fiat remedium: quodq; eius decoctum absortū, confestim sanguinem è faucibus eiicientes sanet. Huius semen ventrem purgat, & pulmonem lēdit.

DE HEMIONITIDE CAP. CXI.

Hemionitis tua est Dioscoridis phyllitis, vulgaris scolopendria. NOMINA.

Hμιοῦντις, ἡ σκολοπενδρία Græcis, Hemionitis Scolopendria latinis, Plinio Tencrion, officinis et herbariis dria officis. Scolopēdria & Lingua ceruina, Germanis Hirs-narum. zung (Gallicè Langue de Cerf) nominatur. A-lia tamen est à Dioscoridis Scolopendrio, quæ A-splenon alio nomine dicitur. FORMA.

Folium Dracunculo simile profert, lunatū. Ra-dices.

dices verò illi multæ subsunt, tenues. Neque caule
 Scolopendria est ptione satis liquet, eam herbam quam vulgus Sco-
 Hemionitis lopendriam vocat, esse Hemionitin, quòd tota illi
 Dioscoridis pictura, nulla reclamante nota, conue-
 niat. Sunt enim illi folia Dracunculi seu Ari, instar
 lunæ corniculantis falcata. Etsi enim interdum in
 altum surgant, tamen inter initia potissimum in-
 curua, & lunæ crescentis modo falcata sunt. Ra-
 dicibus etiam coheret multis exilibus, nunquã flo-
 rescen, , nec caulem, nec semen proferens. Non esse
 Scolopendria non autem Phyllitim in primis folia docent, quæ in ea
 est Phyllitis sunt recta, & minimè sicut in Lingua ceruina lu-
 nata. Dein in tergo veluti vermiculi, qui in Phylli-
 tide pensiles, in Lingua ceruina autem sessiles &
 nequaquam propendentes sed liratim digesti sunt.
 Tertio natales ipsi: Phyllitis enim in vmbrosis opa-
 cis ve, & hortis nascitur, Scolopèdria verò seu He-
 mionitis in petrosis. Quarto, quod nec omnium ma-
 ximè mouet, Phyllitidi nulla prorsus licnem liquã-
 di facultas inest, quam tamen Scolopendriæ vulga-
 ri adesse, præter communem consensum, quotidia-
 na etiam experimenta demonstrant. His itaque de
 causis Phyllitis, Scolopendria vulgaris esse aut di-
 ci nõ debet. Dato enim quòd descriptio per omnia
 conueniret, facultates tamẽ ipsæ, quæ diuersæ sunt,
 aliam à Scolopendria esse manifestè docerent.

LOCVS.

Nascitur

Nascitur locis vmbrosis, montosis ac petrosiss, copiosissimè autem iuxta montem haud procul à Tubinga situm, què Germanico vocabulo Farnberg nominant, prouenire solet. Nunc passim in hortis habetur. TEMPVS.

Aestate vsque ad autumnum abundè nascitur.

TEMPERAMENTVM.

Adstringens simul & parum amara est, vnde credibile est in primo ordine esse calidam, & in secundo siccam.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba gustu adstringit. Hæc autem cum aceto pota lienem liquat. EX GALENO.

Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto pota, lienosis auxilio est. EX PLINIO.

Medetur lienibus. Constátque sic inuentum: cum exta super eã proiecta essent, fertur adhæsisse lien, cumq; exinanisse. Ob id à quibusdam Splenion vocatur. Narrant fues qui radicem eius edunt, si unde di-
ne splene inueniri. etum.

DE ERYNGIO. CAP. CXII.

NOMINA.

Hέρυγγιον Græcis, Eryngium latinis, officinis Iringus. corrupto vocabulo Iringus vocatur. Plerique etiam Centumcapita nominant, à numero nimirum capitum quæ in summo obtinet. Plinij tamen Centumcapita, ab Eryngio est diuersa, vt etiã
Serapio.

Serapio=
nis Cen=
tum capi=
ta est A=
ster.

Serapionis. Si quis enim diligenter eius descriptionem excutiat, cā planè esse deprehendet, quæ Dioscoridi Aster Atticus & Inguinalis appellatur. Vtriusque enim pictura sic sibi respondent, vt planè vna esse herba videatur. Germanis Eryngium nominatur Mansztreu, Brachendistel, & Raddistel (Gallicè Chardon nommè cent testes.

FORMA.

In genere aculeatarum stirpium est Eryngium, cuius folia initio sale condita olerum modo comeduntur. Sunt autem lata, & in ambitu aspera, gustu odorata. Quum vero adolescunt, in multis caulium eminentiis spinis aculeantur: in quorum summitatibus globosa capita, durarum acutissimarumque spinarum ambitu stellæ instar circumuallantur, quorum color modo viridis aut cædus, interdum cæruleus inuenitur. Radix illi oblonga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis crassitudine, & odorata. E qua nimirum delineatione omnibus perspicuum fit, spinam cuius picturam nunc exhibemus, esse Eryngiū: aculeatis enim foliis & per extrema spinosis conspicitur, odoratis, caule cubitali, in cuius vertice coacta in globum capitula, durorum & acutissimorum spiculorum vallo, stellæ instar radiatur, quorū color in pubertate viridis, adultæ cæruleus flaccescenti candidus conspicitur: radice pollicari, intus candida, foris nigra, sed odorata.

LOCVS.

Nascitur

Nascitur in campestribus & asperis locis. Prope Argentoratum eius magna est copia.

T E M P V S.

Colligi hanc quidam, vt Plinius tradit, cum sol Cancri hospitium tenet, hoc est, sub solstitio, iussere.

T E M P E R A M E N T V M.

Eryngiū caliditate aut parum aut nihil ea quæ moderata & temperata sunt superat. Siccitatem vero in tenui essentia cōsistentē nō exiguā obtinet.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Vim habet calefactoriam radix. Potā mēses & vrinas pellit. Tormina & inflationes discutit. Cum vino iecinorosis, venenatorum morsibus, & iis qui letiferum hauserunt succurrit. Bibitur aduersus pluviam cum Staphylini semine pondere drachmæ vniū. Appensa & illita tubercula discutere prodicitur. Radix cum hydromelite pota, opisthotonicis et comitialibus medetur.


E X A E T I O.

Potum radice decoctum colicis medetur. Multo addito calculos, stillicidia, difficultates vrinae, & renū vitia sanat: quod per quindecim iugiter dies, & ieiunos, & in lectū ituros bibere oportet. Quod si cum eo Sium quoque decoxeris, magis proficies. Affirmabat quidam assiduo Eryngij usu, nūquam postea minxisse calculos, cum prius eo morbo frequentissime vexaretur.

E X P L I N I O.

Clara in primis aculeatarum Eryngion est, contra serpentes & venenata omnia nascens. Aduersus ictus morsusq; radix eius bibitur drachma ponderis in vino: aut si plerunque tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter efficax contra chersydros ac ranas. Omnibus verò cōtra toxica & aconita efficaciorē Heraclides medicus, in iure anseris decoctam, arbitratur. Apollonius aduersus toxica cū rana decoquit, ceteri in aqua. DE THRIDACE. CAP. CXIII.

NOMINA.

 ῥιδαξ Gracè, Lactuca Latine: officina latinū nomen retinuerūt: Germanicè Lattich, oder Lactuck (Gallicè Vne Laitue) nominatur. Dicta autem Lactuca est, quòd copia lactis, quod credebatur leniter mouere ventrem, exuberet: vnde apud veteres in primis epulis veniebat, quod Martialis etiam iis testatur verbis:

Prima tibi dabitur ventri Lactuca mouendo
Vtilis. GENERA.

Lactuca primū in satiuam & syluestrem deducitur. Satiuæ tria sunt genera, crispa nimirum, rotunda, & capitata. Nos vna icone duo complexi sumus genera. Folium enim quod statim à radice

Crispa Lactuca erumpit, eam Lactucam refert quæ Latinis crispa, à foliis crispissimis, Germanis krauser Lattich appellatur. Columella lib. xi. cap. iiij. Cecilianam & Beticā à regionibus in quibus crescit, nominat. Reliqua

liqua folia eam quæ rotunda à foliis rotundis vo- Rotunda.
 catur, præ se ferunt. Germanicè Breiter Lattich
 nominatur. Tertiū generis Lactuca, quæ Capitata
 dicitur, à foliis suis, quæ vbi parum à terra attolū- Capitata
 tur, mālī cuiusdam speciem rotundam obtinent, &
 instar Brassicæ capitatæ, in capitulis ferè formā ex-
 tuberāt. Germanis grosser Lattich vel Vueisser
 Lattich à semine candido nominatur. Sylvestris
 Lactuca sativæ opponitur, sponte enim sua in arvis
 nascitur. Germanis Vuilder Lattich nuncupatur.

FORMA.

Sativa prima, cuius imaginem hīc damus, folia
 Intybo sativo haud dissimilia habet, in rectūque-
 surgit, caulibus in summo brachiatus, in quorum
 cacumine flores sunt lutei. Altera foliis, quæ crispa
 admodum sunt, duntaxat à priori variat, aliās per
 omnia similis. Sic etiā capitata non nisi foliis suis,
 idq; dū paululū creverūt, à prioribus differt. Ideo-
 que duabus picturis, quæ omnes referunt, contenti Lactuca
 fuimus. Sylvestris similis est sativæ Lactucæ, radi- Sylve-
 ce tamen brevior, proceriore caule, candidioribus stris.
 foliis, gracilioribūsq; , asperioribus, & gustu a-
 maris, quæ ut addidit Theophrastus, vbi consum-
 mata sunt, aculeantur. Ex qua delineatione abun-
 dè constat, Lactucam sylvestrem esse eam herbam
 quæ passim nunc ab officinis & herbariis, non sine
 magno errore, Endivia dicitur. Ea enim in arvi Officina =
 & vinearum limitibus sponte nascitur, folio Las rū error.
x iij Ltuca,

PLANTARVM HISTORIAE

*Et uca, & cum adoleuit per oras aculeato, & laci-
niatim serrato, caulibus bicubitali proceritate con-
surgentibus, spinulis inhorrescentibus, quibus succus
inest lacteus, amarusq; , flore ut Lactuca satina lu-
teo. Desinant itaque deinceps ea herba pro Endi-
uia uti medici, si modo rectè cōsultū agris cupiūt.*

LOCVS.

*Satina in hortis provenit. Sylvestris in aruis &
vinearū hortarūmq; maceriis sua sponte nascitur.*

TEMPVS.

Florent Iulio mense, atq; subinde semen proferūt.

TEMPERAMENTVM.

*Lactuca satina humidum est frigidumq; olus,
non tamen extreme: siquidem edendo non foret: ve-
rū maximè secundum aqua, ut sic dicam, fonta-
ne frigiditatem. Simcon Sethi frigidam & humi-
dam in tertio ordine statuit. Sylvestris autem mi-
nus refrigerat & humectat.*

VIREs. EX DIOSCORIDE.

*Satina Lactuca stomacho accommodata est, re-
frigerat, somnum conciliat, aluum mollit, lactis &
būdātiam facit. Elix a magis alit. Illota autem cō-
esta stomachicis prodest. Semen eius potum vene-
rem assidue somniantibus opitulatur, & concubi-
tum arcet. Ipsa tamen frequentiores in cibo, clari-
tati oculorum officiunt. Condiuntur muria. Quum
in caulem prodierunt, vim quandam nanciscuntur
succo aut lacti sylvestris Lactuce similem. Sylue-
stris*

stris viribus in totum Papaueri similis est, vnde aliqui eius succum Meconio permiscuerunt. Aquosa per aluum purgat potus in posca liquor obolorum duorum pondere. Exterit argema & caliginē. Cum lacte muliebri inuncta ad ambustia prodest. In vniuersum soporifera est & dolorem leuat. Menses trahit. Contra scorpionum ictus, & phalangiorū morsus bibitur. Semen haud secus quā satia libidinum imaginationes in somno, ac venerē arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur succus eius in fictili vase, antea, vt in aliis liquaminibus moris est, insolatus.

EX GALENO.

Lactuca ad calidas phlegmonas accommodata est, et ad parua et leuia erysipelata, maioribus tamē satisfacere minimē idonea est. Est etiā eduliū sitim arcens. Semē potū geniturae profluiū cohibet: quā obrem etiam iis qui libidinosi somniis vexantur, datur. Sic & sylvestris Lactucæ semen. Cuius quoque succus colligitur, argema & caliginem expurgans. Ad adustiones cū lacte mulierū inungitur. Omnibus aliis oleribus paucissimū sanguinē et vitiosum generantibus, ex sola lactuca non multus quidē, nec vitiosus, haud tamen omni ex parte laudabilis gignitur. Vt plurimum cruda ipsa vescuntur. Aestate autem cū in semen iam proruptura est, in aqua dulci praequentes, cum oleo, garo & aceto assumūt, aut cū aliquo ex condimentis, opsoniis ve,
 & iij præsertim

praesertim iis quæ caseo constant. Plerique etiam antequam excaulescat, in aqua elixa vtuntur: vti ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse coeperunt. Nā amicus quidam meus, quum olere hoc à longo tempore me vt familiari cibo vsum fuisse sciret, viderétque post mandi à me citra magnam molestiam non posse, cocturae rationem indicauit. In iuuentute enim, quoniam assiduo os ventriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia Lactucis utebar. Quum autē ad prouectam ætatem peruenissem, olus hoc contra quàm in iuuetute somnū iā studio & industria accersenti mihi, auxilio fuit: quippe qui etiamnum iuuenis vigiliis dedita opera me assuefeceram declinante iam ætate, ipsa ex se in somni, grauius hoc incommodo molestabar. Aduersus quod vnicum mihi praesentissimum remediū Lactuca vespere cōmāducata semper fuit. Frigidū ergo humidumq; succum profert, haud quaquā tamen vitiosum. Itaq; sicut alia olera à iusta cōcoctio ne non excidit, neque alium cohibet, vti neq; impellit. Atque hæc illi non immeritò accidunt, quum nec austera, nec acerba sit, quibus facultatibus in vniuersum alius sistitur, quemadmodū a salis, acris, & omnino abstergendi vim habentibus ad excretionem concitatur, quorū nihil Lactucæ inest.

EX PLINIO.

Est quidē natura omnibus refrigeratrix, & idcō æstate gratæ à stomacho fastidium auferunt, cibiq; appetentiam

appetentiam faciunt. Diuus certè Augustus Lactuca conseruatus in ægritudine fertur, prudētia Musæ medici, cū priores eam ob religionem minimè commanducarent, in tantū recepta commēdatione, vt seruari etiam in alienos menses eas oxymeslite repertum sit. Venerem inhibent, æstum refrigerant, sonnumq; faciunt. Cruditatē ipsæ nequaquā faciunt, nec vlla res maiorem in cibis auiditatē incitat inhibetq;. Ambustis prosunt recentibus, priusquam pustulæ fiāt, cum sale illitæ. Vlcera etiā quæ serpunt, coercent initio cum aphronitro, mox in vino tritæ. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt. Eruptiones papularum ex vino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederūt, ad quod vtilissimæ quammaximi caulis & amara. Quidā lacte infundunt. Deferuefacti ii caules & stomacho vtilissimi traduntur, sicut somno, & satina maximè Lactuca, & amara lactensq;, quam Miconidem vocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte vtilissimum esse præcipitur, dū tempestiuè capiti inunguntur. Semen satinarū contra scorpiones dari. Semine trito ex vino poto & libidinum imaginationes in somno compesci. Tentantes aquas non nocere Lactucam edētibus. Quidam tamen frequētiores in cibo officere claritati oculorum tradiderunt.

DE THYMBRA. CAP. CXIIII.

Satureia nomen retinet Sarriete. NO

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Θ ὕμβρα Græcis, Thymbra Cunilâque latinis, Kunel Germanis (Gallicè de la Sarriette) appellatur.

GENERA.

Hortensis Thymbrae seu Cunila duæ sunt species. Vna hortēsis seu sativa, quæ quia minori est acrimonia, in condimentario genere eduliis concoquitur: hinc à saturando Satureia dici cœpit. Alii tamen à Satyris nomen traxisse putant, quòd scilicet marcescentes coitus stimulet. Germanicè Saturon, Hunerful, Ioseplen, Zuubel oder Gartenhyssop, oder Sergenkraut nominatur. Altera agrestis siue

Satureia unde dicta. saturando Satureia dici cœpit. Alii tamen à Satyris nomen traxisse putant, quòd scilicet marcescentes coitus stimulet. Germanicè Saturon, Hunerful, Ioseplen, Zuubel oder Gartenhyssop, oder Sergenkraut nominatur. Altera agrestis siue

Sylvestris rustica Cunila est, quæ peculiariter Thymbra nuncupatur.

FORMA.

Thymbra similis est Thymo, sed minor atq; tenerior, ferens spicam floribus plenam, coloris viridis. Satureia pedali altitudine surgit, fruticosa, sarculosiss utrinque cauliculis, folio Hyssopi, flosculis per intervalla ex purpura candicantibus, odore saporeque gratissimo.

LOCVS.

Thymbra in tenui solo & asperis locis nascitur. Satureia in hortis scribitur passim.

TEMPVS.

Aestate utraque Cunila floret.

TEMPERAMENTVM.

Thymbra calida & sicca in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Thymbra

Thymbra eadem quæ Thymus præstat si confectum
 similiter sumatur. Vtilis etiam in sanitate eius vsus.
 Est etiam satina Thymbra in cunctis sylvestri mi-
 nor: ad cibum verò utilior, propterea quod non ad
 deò efficax illi sit acrimonia.

EX PAVLO.

Thymbra sylvestris eadē quæ Thymus præstat.
 Hortensis autem omnibus quidem imbecillior, sed
 ad cibum laudatior.

EX PLINIO.

Nusquam vtrunque Thymbrae genus additur,
 quippe similis effectus.

EX HERBARIO ANTIQVO.

Farina eius ex vino pota, medetur pulmonis, tho-
 racis, & vesicae vitiis. Ciet vrinas, menses pellit.
 Herba ipsa cum floribus Lethargicos excitat cal-
 factu, aut coronæ modo capiti imposita. Succus cū
 rosaceo auribus infunditur. Cū triticea farina co-
 xēdicibus illinitur. Satyreia vsus marcescētes coitus
 stimulat, quare à Satyris traxisse nomen putant.
 Stomachi concoctiones adiuvat, fastidia discutit,
 hebetes oculos exacuit.

DE THLASPI. CAP. CXV.

Thlaspi nobis frequens.

NOMINA.

⊖ λασπι, ἢ θλασπίδιον, ἢ σίμητι ἀγριῶν
 græcis dicitur: Thlaspi, Capsella, et Scādula
 cū latinis Gal. Senene sauuage. Sūt hui⁹ tēporis
 herbaris

PLANTARVM HISTORIAE

Nasturtiū herbarij qui Nasturtium tectorū, & Sinapirusti-
 tectorum. cum, quòd digitis friatum sinapim suboleat, appet-
 Sinapi ru= lent. Alij Bursam pastoris vocant, non sanè quòd sit
 sticum. reuera eius herbae species, sed quòd ad formā illius
 Bursa pa= quamproximè accedat. Sic antiquo herbario Bur=
 storis. sam pastoris appellare Thlaspin placuit. Thlaspi
 Thlaspi autem Græcis à fructus forma dictum est, qui Na=
 unde dic sturtio similis est, sed latior, & velut infractus &
 Etum. contusus, ὁλῶσθαι enim iisdē contundi est & in=
 fringi, infringēdoq; quod globosum tumidumveerat
 malleo, lapide, pedēve cū dilatatione exaequare.

GENERA.

Duo Thlaspis genera damus. Vnū latioribus fo-
 liis, quod ad Dioscoridis descriptionē proximè ac-
 cedit. Hoc Germanicè Baurnsenff, oder Kriesz
 nominatur. Alterum foliis angustioribus constat, et
 Germanicè Besemkraut, quòd scoparū vices sup-
 pleat, vocatur. Quare si quispiam hæc duo genera
 ab inuicem distinguere certis appellationibus vo-
 luerit, primum Thlaspi maius aut latifolium, alte-
 rum verò minus aut angustifolium appellet. Dios-
 scorides etiam duo Thlaspios genera facit, vnum la-
 tifolium, alterum angustifolium.

FORMA.

Herbula est angustis foliis ad digiti longitudi-
 nem, in terrā versis, in extremitatibus incisis, sub-
 pinguibus. Causlem tenuem, duorum dodrantum e-
 mittit, adnascentes sibi paucos ramulos habentem,

Et per totam eius ambitum fructus est in summo modicè latus, in quo semē exiguum Nasturtio simile, disci figura, veluti conquassatum, vnde Et nomē inuenit. Florem obtinet album, semenq; acre. Ex ea sanè descriptione satis constat, herbam hanc quam pictā damus esse Thlaspin, angusta eni n folia habet, potissimum suprema eius parte, digitali longitudine, in terram se cōuertentia, per extrema leniter incisa, cau' em duūm dodrantum, agnatis in copaucis calycibus, breui pediculo nitētibus, quadam ligularum vel cochleariorum effigie, in quib. semen continetur Nasturtio simile, sed latius Et veluti cōquassatum, quod acerrimi esse gustus deprehenditur, ita vt māsum Sinapis modo, os Et linguā velalacet.

LOCVS.

In fossis, semitis, Et sepibus prouenit.

TEMPVS.

Maior Et Iunior mēsis floribus Et semine prægnans inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Semen calfacit Et exiccat in quarto ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Calefacit, bilem per superna Et inferna purgat acetabuli mensura potum. Ischiadicis in clystere infunditur. Potum sanguinem ducit, Et interiores abscessus rumpit, menses cit, Et fetus necat.

EX PAVLO.

Semē Thlaspi facultatem habet acrem, ad cō vt
internos

PLANTARVM HISTORIAE

internos abscessus potum disrumpat. Menses cit, & foetus necat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Potest enim aliqui tum supernè, tum infernè biliosos vacuare humores acetabuli mensura epotū. Infunditur & contra coxendicum dolores. Quinetiam potum sanguinem trahit, & internos abscessus rumpit.

EX GALENO.


Thlaspi semen facultate acre est, adeò vt internos abscessus potum rumpat. Menses mouet, & foetus necat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Est enim aliqui tum infernè, tum supernè biliosorum humorum euacuatorium, acetabuli mensura potum.

EX PLINIO.

Semen asperi gustus, bilem & pituitam vtrinq; extrahit. Modus sumendi acetabuli mensura. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem extrahat. Menses quoque cit, sed partus necat.

DE THERMIS. CAP. CXVI.

NOMINA.

 ἔρμος ἡμερος Græcis, Lupinus satiuus Latinis: Officinæ Latinum nomen retinuerunt: Germanis Feigbon (Gallicè Lupin.) appellatur.

FORMA.

Vnicum caulem obtinet Lupinus, folium quinquefariam aut septifariam dissectum, florem candidum, siliquas in quibus quina senaue intus grana,

na, dura, lata, rufaꝑ; continentur. Radicem luteam capillamentis fibratam.

LOCVS.

Exilem amat terram, arenosam & rubricā precipue. Limoso agro nō exit, culturāꝑ; reformidat.

TEMPVS.

Ter floret, primum Maio, deinde Iunio, & tertio Iulio mense. Post vnumquemque florem siliquas producit.

TEMPERAMENTVM.

Immensa amaritudo euidenter calidum & siccum esse monstrat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Farina eius cum melle linctā lumbricos pellit. Ipsi quoque mācerati, & amari adhuc comesti idē efficiunt. Decoctum eorundem cum Ruta & Pipe repotum idem facit: vnde & lienosis prodest. Eodem gangrenas, vlcera tetra, incipientem scabiem, alphos, maculas, exanthemata, & achoras persundere vtile. Menses & foetus idem decoctum cū myrrha & melle subditum trahit. Farina eorum cutem liuorēque expurgat. Inflammationes cum polenta & aqua mitigat. Ischiades & tubercula cū aceto lenit. In aceto cocta & illita strumas dissipat, et carbunculos rumpit. Decocti pluviali aqua donec in succum liquecant faciem abstergunt. Cum radice nigri Chamæleonis ouium scabiei medetur, si tepido decocto abluantur. Radix cum aqua cocta

PLANTARVM HISTORIAE

Et pota cit vrinam. Vbi autem edulcati fuerint, triti cum aceto Et potum stomachi fastidium leniunt, Et cibi auiditatem excitant.

EX GALENO.

Lupinus editur coctus, multis antè diebus maceratione in aqua amaritudinē deponens, fitq; tunc nutrimentum crassi succi. Cæterum vt medicamentum ita preparatus ex genere est emplasticorū. Qui verò naturam amaritudinem habet, huic extergendi Et dirigendi vis inest. Lumbricos occidit illitus, Et cum melle linctus, aut cū posca potus. Quin Et decoctum eius lumbricos eiicere potest. Foris identidē persusum, alphas, achoras, exanthemata, scabies, gangrenas, vlceraq; maligna inuat, partim extergendo, partim digerendo, citraq; mordacitatem siccando. Expurgat iecur Et lienē cum Ruta Et Piperis suauitatis gratia assumptum. Elicit menses ac fetum cum myrrha Et melle adpositum. Porro Lupinorum etiam farina sine mordacitate digerit: nec enim liuida tantum, sed Et strumas Et tubercula curat: atqui tunc in aceto, aut oxymelite, aut posca hanc decoquere oportet, pro laborantis nimirum temperamento, Et affectus diuersitate, quod ex usu est inueniēdo. Digerit item quæ liuida sunt, Et quæcunque modo dictum est præstare decoctū, eadem omnia efficit Et farina. Sunt verò etiā qui Ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

EX PLINIO.

Ex omnibus quæ eduntur sicco nulli minus ponderis est, nec plus utilitatis. Mitescunt cinere aut aqua calidis. Colorem hominis frequentiores in cibo exhilarant. Amari contra aspidas valent. Ulcera atra, aridi decorticatiq; triti, supposito linteolo, ad vinum corpus redigunt. Strumas, parotidas in aceto cocti discunt unt. Succus decoctorum cum ruta & pipere, vel in febris datur ad ventris animalia pellenda, minoribus triginta annorum. Pueris vero impositi in ventrem ieiunis prosunt. Et alio genere tosti, & in defuncto poti, vel ex melle sumpti. Idem auiditatem cibi faciunt, fastidium detrahunt. Farina eorum aceto subacta, papulas pruritusq; in balneis illita cohibet, & per se siccatur ulcera. Liores emendat. Inflammationes cum polenta sedat. Si ad mellis crassitudinem decoquantur, vitilignes nigras & lepras emendant. Rumpunt carbunculos impositi, panos & strumas minuunt, aut maturant. Cocti ex aceto cicatricibus candidum colorem reddant. Si vero celesti aqua decoquantur, succus illic smegma fit, quo solent fouere gangrenas, eruptiones pituitæ, ulcera manantia, vtilissimum. Expedit ad lenem bibere, & cum melle mensuris hærentibus. Lienem crudi cum fico sicca triti ex aceto imponuntur. Radix quoque in aqua decocta, urinas pellit. Medentur pecori cum Chamelconte herba decocti, aqua in potum collata. Sanant & scabiem quadrupedum omnium in asinurca decocti, utroque liquore postea mixto. Cum us

PLANTARVM HISTORIAE

crematorum culices necat.

DE IO. CAP. CXVII.

Viola purpurea aut nigra nobis Martia
& quadragesimalis quod tunc ferè flo-
reat.

NOMINA.

Ion quare dicta. **I**ον πορφυρεόν Græcis, Viola muraria vel pur-
purea Latinis, blauu Veiel oder Mertzē vio-
len Germanis (Gallicè Violette de Mars) dici-
tur. Officina simpliciter Violam nominant. Nican-
der Ion Græcis dictam credit, quod Nympha quæ-
dam Ionia, florem illum Ioui primum dedere mu-
neri. Alij Græci Ion vocatum putant, quod cum Io
Viola vn- in vaccam à Ioue conuersa esset, terra florem illum
de voca- pabulo bouis eius fuderit. Latini quoque detrita &
ta. litera, Violam quasi vitulam imitatione Græcavi-
deri possunt appellasse.

FORMA.

Folium habet minus tenuiusq; quàm Hedera, ni-
grius tamen nec dissimile. Cauliculus statim à ra-
dice medius prosilit, in quo flosculus suauiter olens,
purpureus. Humilis præterea est, statimq; à nume-
rosa radice orbiculata folia sine ramis exeunt. Se-
mē quoq; minutū in folliculis vasculisve rotundis,
vt pictura indicat, extrema ferè æstate producit.

LOCVS.

Nascitur in opacis & asperis locis, ad radices ma-
ximè murorum, hortorum marginibus, & sepibus.

TEM

TEMPVS.

Viret hæc perpetuò, Theophrasto teste, si cultus adhibeatur: tamen vere, & Martio mense floret, quo potissimum tempore colligi flores eiusdem debent. Semina verò in æstate, vt dictum est.

TEMPERAMENTVM.

Viola folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Frigida autem sunt primo ordine, humida verò secundo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Refrigerandi vim obtinet. Folia eius per se et cū polenta illita, stomacho æstuanti, oculorum inflammationibus, sedisq; procidentis auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est cum aqua potum, angina correptis, & puerorum comitialibus, mederi affirmant.

EX GALENO.

Folia per se, aut cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigāt, Imponuntur & ori ventriculi æstuanti, & oculis.

EX PLINIO.

Purpureæ violæ refrigerant. Contra inflammationes illinuntur stomacho ardenti. Imponuntur & capiti in fronte. Oculorum priuatim epiphoris, & sede procidente, vniūve. Et contra suppurationes. Crapulā & grauedines capitis impositis coronis olfactūve discutunt. Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureum est ex iis comitialibus medetur,

PLANTARVM HISTORIAE

maximè pueris, in aqua potum. Semē scorpionibus aduersatur.

EX SIMEONE SETHI.

Prosunt ad intestinorum dolores, cor vero offendunt. Dolores capitis qui sunt à flaua bile sopiunt pota & odorata. Ventriculum irritant, & flauam in eo inuentam bilem. Caput siccum humectant, calidūque refrigerant suo odoratu. Somnum inducunt. Humida capita destillationibus obnoxia reddunt.

DE VIOLA MATRONALI.

CAP. CXVIII.

Violæ matronalis tibi pictio dictæ, nobis Bachares videntur.

NOMINA.

Veteribus Græcis & Latinis cognita fuerint nec ne Viola qua hodie, quod eas matronæ colere soleant, matronales vocantur, nondum compertum habemus. Quare vulgari & vsitato nomine, donec rectius inuentum fuerit, utemur. Germanicè, quod raræ adhuc in Germania dum ista scriberemus fuerint, Vuelsch veiel appellare volumus, ut nimirū hac nomenclatura à Leucoiis, de quibus suo dicemus loco, segregaremus. Possent etiam haud ineptè Frauenuciel, ad imitationē Latini nominis appellari.

GENERA.

Tria Violarū matronalium damus genera. Pri-

mi enim generis candida est, alterius punicea, tertia purpurea: nec differre admodum nisi solis floribus videntur.

FORMA.

Fruticosa est herba, cubitali altitudine, ramosa, caule & foliis lanuginosis, oblongis, angustis, mollibus ac canescētibz, floribus aut albis, aut puniceis, aut purpureis quadrifoliis, semine in oblongis siliis, quibus lato ac tenui, radice longa, lignosa, subrusa & acri.

LOCVS.

In hortis & cultis locis proueniunt.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus florent.

TEMPERAMENTVM.

Admodum calidas esse sapor foliorū & radicis, qui acris est, abundē docet. Humiditatē autem multam, Galeno lib. 4. cap. 18. de simplic. medi. facult. teste, eo quod amara non sint, admistam habent.

VIREs.

Incidendi & digerendi per halitum vim obtinent. Ideoq; radix aut folia decocta in aqua, conuulsis, difficultate spirandi laborantibus, & veteri tussi auxiliantur. Vrinam & menses ducunt, sudoresq; ciendi facultatem habent.

DE IRIDE. CAP. CXIX.

NOMINA.

Ipsa Græcis, Iris Latinis appellatur: officinis suam appellationem retinuit. Germanis blauu Gil-

PLANTARVM HISTORIAE

gen, blau Schuuertel, Veieluurtz (Gallicè du glaieul, ou de la flâbe) dicitur. A cœlestis arcus

Iris vnde dicta. *similitudine, quam flores eius repræsentât, vt paulo post dicemus, nomen accepit Iris. Sunt qui non sine pudendo errore aliam assignent herbam recto, aliam casui paterno, ita vt Iris ab Ireos, tanquam purpureus color à niueo, distingui putetur imperiis herbariis. Promanasse autem hunc errorem ex*

Causa vul- *Græca voce λείριον, qua Liliū, quod candidos garis erro-* *profert flores, genti illi significatur, parū per vnius literæ abiectionem deprauata verisimile est. Primam nanque literam abiicientes, vltimam verò in σ vertentes, εἶριος dixerunt pro λείριον. Sed hæc opinio indigna est quæ explodatur, cū Dioscoridem & alios veteres omnes seorsim de Iride & Lyrio siue Lilio agere constet.*

FORMA.

Folia Gladiolo similia fert, maiora tamen, latiora & pinguiora. Flores in caule æqualibus inuicem spatiis distantes, inflexi, varij. Aut enim cædidi, aut virides, aut lutei, aut purpurei, aut cærulei conspiciuntur. Vnde ob hanc varietatē arcui cœlesti assimilata est. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ simulatq; fuerint dissectæ, siccantur in vmbra, & filo traictæ recoduntur. Hæc Dioscoridis pictura tota huic herbæ, quam Irim hodie herbarij & officinæ vocant, suffragatur. Siquidem & radicibus nititur solidis, geniculatis & odoratis,

adeo

adeò vt violarum purpurearum odorem prorsus re-
 ferre videatur, & hoc nomine à Germanis nostris
 Veieluurtz, hoc est, Violacea radix, sit appellat. Violacea
 ta. Folia Gladioli faciem simulant, maiora duntaxat,
 latiora & pinguiora. Caule recto sesquipeda-
 li, è cuius fastigiis pari intervacante spatio flores ex-
 rumpunt, inflexis mutuo foliorum labris, qui nitent
 varia colorum mistura, instar coelestis arcus. Quæ-
 admodum enim aquarius ille arcus, qui est imago
 malè expressi solis, caua nube recepta, varios men-
 titur colores, sicut cœruleas, virides, luteas, purpu-
 reasq; lineas ducat, ita cauo calyculi sinu versico-
 lores lituras flores ostendunt, qua diuersa specie cœ-
 lestem æmulantur arcum. Falluntur itaque qui in
 toto floris ambitu huiuscemodi varietatem perqui-
 rūt, cum inflexa foliorum labra vel purpureus, vel
 cœruleus semper color inficiat.

LOCVS.

Passim in hortis & maceris vinearū puenit. Lan-
 datissima tamē est quæ in Illyrio & Macedonia na-
 scitur, & melior inter has quæ densa & breui ra-
 dice constat, quæq; frangenti contumax est, colore
 subrussa, admodum odorata, gustuq; feruida.

TEMPVS.

Floret vere, Maio potissimum mense, quo sanè tem-
 pore flores colligi debent. Radices autem suo tem-
 pore, hoc est, autumno.

TEMPERAMENTVM.

PLANTARVM HISTORIAE

Iris in altero calefacit ordine, in tertio autē desiccatur. Abstergit quoque & maturat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Irides omnes calefaciendi extenuandiq; vim obtinent. Contra tuſſim efficaces, humoresque non facile excreabiles extenuant. Biles ex hydromelite drachmarum ſeptem pondere potæ purgant. Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medetur. Cum aceto potæ venenatorum morſibus, leuonofis, conuulſis, refrigeratis, rigentibus, & quibus genitura effluit, auxiliatur. Menſes cum vino potæ ducunt. Decoctū earum ad muliebria fomenta vtile, molliens aperiensq; locos. Iſchiadicis infunditur. Fiſtulas & ſinus carne explent. Quinetiam glandis modo cum melle appoſitæ, foetus extrahunt. Strumas veteresq; durities coctæ & illitæ emolliunt. Aridæ vlcera explent, & cum melle purgāt. Nudata offa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & roſaceo vtiliter illinuntur. Lentigines, cutis in facie vitia cū Elleboro albo, & duabus melis partibus illitæ emendant. Peſſis, malagmatis & acopis miſcentur. In vniuerſum magni uſus ſunt.

EX PAULO.

Iris tuſſi vtilis. Humores in thorace nō facile excreabiles extenuat. Torminibus medetur, vlceraq; ſordida expurgat. Cum mulſa pota aluum ducit.

EX PLINIO.

Infantibus eam circumligari ſalutare eſt. Dentientibus

tientibus præcipua est & tuſſientibus, tinearumve vitio laborantibus inſtillari. Cæterum vlcera purgat, capitis præcipuè, ſuppurationes veteres. Alium ſoluit duabus drachmis cum melle. Tuſſim, Tormina, inflationes, pota. Lienes ex aceto. Contra ſerpentium & araneorum morſus, ex poſca valet. Cõtra ſcorpiones, duarum drachmarum pondere in pane vel aqua ſumitur. Contra canum morſus ex oleo imponitur. Et contra perfrictiones. Sic & nervorum doloribus. Lũbis verò & coxendicibus cum reſina illinitur. Vis ei concaſfactoria. Naribus ſubdita, ſternutamenta mouet, caputq; purgat. Dolori capitis cum Cotoneis mális aut Strutheis illinitur. Crapulas quoque & orthopnœas diſcutit. Vomitiones cit, duobus obois ſumpta. Oſſa fracta extrahit, impoſita cum melle. Ad paronychias farina eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet, alarumque vitia. Succo duritias omnes emollit. Somnum conciliat, ſed genituras conſumit. Sedis rimas & condylomata, omniáque in corpore excreſcentia ſanat.

DE HIERACEO. CAP. CXX.

Hieraceum vtrunque híc frequens.

NOMINA.

Iερώνιον, ἢ σoxyίτης Græcis, Hieraceum Latiniſ dicitur: officinis inuſitatũ. Germanicè, quum aliud nomen expiſcari non poterimus, Habichkraut (Gallicè Cichorée iaulne) appellauimus,

ad

PLANTARVM HISTORIAE

ad Græcam alludentes appellationem: neque enim

Hieraceū alia ratione Græci hanc herbam Hieraceum no-
vnde di- minarunt, nisi quod accipitres, quos illi ἰόπαγας di-
Etum. cunt, scalpendo eam, succoq; oculos tingendo, obscu-
ritatem cū sensere discutiant. Sonchites autē di-
Sōchites. eta est, quod Soncho non admodum dissimilis sit,
maximè quod ad eius circumferentiam & extre-
mam partem, in qua caules & flores sunt, attinet.
Hæc enim & illa concavo, & lacteū succum emit.

Lactuca lente caule, luteisq; floribus est. Apuleius Lactucā
syluatica. syluaticam appellat. Plinius quoque libro viges-
mo, cap. 7. ut alij omnes ferè, in Lactucarum spon-
te nascentium numero, propter similitudinem, Hie-
raceon hoc habet. Quàm autem inuicem similes
sint Hieraceum & Lactuca sylvestris, utriusque
icones & effigies collatæ monstrabunt.

GENERA.

Hieracei duo sunt genera maius nimirū & mi-
nus. Maius Germanicè grosz Habichkraut, mi-
nus autem klein Habichkraut nominatur.

FORMA.

Hieraceū Hieraceum maius caulem habet asperum, mo-
maius. dicè rubentem, spinosum, cōcauum. Folia per inter-
ualla rariusculè diuisa, Soncho per circumferētiā
similia. Flores in oblongis capitulis luteos. Quæ de-
signatio prorsus hāc quam pictā damus herbam
exprimit. Siquidem caulem emittit scabrum, sub-
rubrum, spinulis horrentem, cauum, folia ex inter-
uallis

Nullis & raro laciniata, Sonchi foliis non dissimilia. Flores in longiusculis capitulis luteos. Minus Hieraceum folia ex interuallis per ambitum diuisa Hieracei^{as} furis scissa obtinet. Caules de se emittit cauos, tene minus. ros & virides, in quibus flores lutei circulum circumscribentes. Quæ itidem notæ omnes herbæ illi, cuius picturam exhibemus, conueniunt.

LOCVS.

Vtrunque in quibusdam pratis prouenit.

TEMPVS.

In fine Iulij mēsis, & per vniuersum Augustum floret Hieraceum. Succus eius capitur per messes inciso caule.

TEMPERAMENTVM.

Maius Hieraceum planè Sonchi temperamento constare videtur, refrigerat itaque & mediocris adstrictionis est particeps. Minus in gustu paulò maiorem amaritudinem refert.

VIRVS. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Hieraceum maius refrigerandi, & modicè adstringendi, ideoq; æstuanti stomacho, & inflammationibus illitum prodest. Succus erosionē eiusdem in sorbitione mitigat. Herba ipsa cum radice illita scorpionum ictibus auxiliatur. Minus facultates habet superiori easdem.

EX PLINIO.

Succus sanat omnia oculorum vitia cū lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionēque omnes,

PLANTARVM HISTORIAE

omnes, præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus aluum purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpentium ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta, thyrſi q̃ triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maxime contra scorpionum ictus. Verum contra phalāgia, commixto vino ex aceto.

APPENDIX.

Sunt qui tantā inesse huic herbæ vim cōtra oculorum vitia credant, vt radicem etiam à collo suspensam caliginem oculorum sanare posse dicant.

DE HIPPVRI CAP. CXXI.

Hippuris cauda equina vulgo, multiplex etiam nobis est.

NOMINA.

Equisetū. **ἵππουρις** Græcis, Equisetum, herba aut salix equinalis Latinis, recētioribus herbariis verbum **Cauda equina.** verbo reddētibus, Cauda equina, Germanis Roszschuuantz, Pferdtschuuantz, Roszuuadel, Ratz, enuedel, katzenzagel, kantenkraut, Schaffthouu (Gallicè Queue de Cheual) nominatur. Nomen tam Græcum quàm Latinum à **Hippuris** caudæ equinæ imagine, quam comæ illius præ se cur dicta. ferunt, accepit.

GENERA.

Eius duo sunt genera. Vnum longius, quod nonnulli etatis nostræ herbarij ab asperitate quam obstat **Asprella.** tinet Asprellam vocant. Hinc est quod materiarij fabri

fabri ligneam pectinum & aliorum minorum operum ruditatem huius herbe scabritia in nitorem expoliant. Germanicè grolz Roszschuuantz dicitur. Alterum breuius est, ad abstergendam vasa aptum. Germani klein Roszschuuantz appellant.

FORMA.

Primum Equiseti genus cauliculos habet inanes, leniter rubentes, subasperos, solidos, geniculis qui inuicem inseruntur dissectos, in quibus folia iunceæ, crebra & tenuia. In altitudinem adsurgit, scædendo proximas stipites comis circumfusa depēdet multis, nigris vt equorum cauda. Radix illi est lignosa, dura. Alterum comas per intervalla habet breuiiores, candidiores & molliores.

LOCVS.

Longius Equisetum in aquosis locis & scrobibus provenit, nec eo in fossis prope aquas & vmbrosis locis alia planta frequentior est, vt hoc nomine χαράδραν Græcis dictum sit. Neque enim χαράδραν aliud est illis nisi terra rima & fissura. εφυσον etiam non alia ratione, quàm quod εφυσον in aquosis produceretur, nominauerunt. Alterum in pratis inuenitur, nec ferè frequentius occurrit, inuisa fœniseis.

TEMPVS.

Vtrunque æstate suis in locis copiose provenit.

TEMPERAMENTVM.

Adstringens

PLANTARVM HISTORIAE

Adstringentem cum amaritudine facultatem, ac proinde valenter simulq; citra mordicationem exsiccantem, obtinet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adstringit, quapropter succus eius sanguinem ex naribus crumpentem sistit. Dysentericis cum vino potus confert. Vrinam cit. Folia cruenta vulnera glutinant trita & inspersa, Herba & radix tussietib. orthopnoicis, ruptisq; succurrit. Quin etiam intestinorum diuisiones, vesicæ dissectionem, & intestinorum ramicem coalescere cogique folia in aqua pota feruntur.

EX GALENO.

Vulnera maxima conglutinat, etiam si praefectos esse nervos contingat: praeterea intestinorum ramices cogit. Caterum ad sanguinis reiectionem, ad fluxum muliebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & ad alia vètris profluvia generosum est medicamentum herba ipsa aut ex aqua, aut ex vino epota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quòd nonnunquam etiam vesicæ, & tenuium intestinorum vulnera succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluvio sanguinis ex naribus, tum fluxu obnoxii in ventre affectibus ex austerorum quopiam vinorum potus, ac si febre teneatur ex aqua.

EX PLINIO.

Vis eius spissare corpora. Succus sanguinem è naribus fluentem inclusus sistit, item aluum. Medetur dysente-

*dysentericis in vino dulci potus cyathis tribus. Vri-
nam cit. Tussim, orthopnoeam sanat: item rupta,
& qua serpunt. Intestinis & vesicae folia bibun-
tur. Enterocælen cohibet.*

DE HIBERIDE. CAP. CXXII.

Hiberis in pratis frequens.

NOMINA.

IΒΕΡΙΣ, ἢ καρδάμουττινὴ, ἢ ἀγριοκάρδαμου
Græcis, Galeno & Paulo alio nomine Lepidion:
Hiberis, Nasturtium agreste Latinis appellatur. Nastur-
Officinis nostris incognita. Germanis Gauchblum tiū agre-
(Gallicè Passeraige sauvage) non alia ratione ste-
quàm quòd pleròsque qui in illius notitiam non-
dum peruenierunt infatuet. Potest etiam commodè
dici Vuilder Kresz. Cardamantice, & Agrio= Agriocare
cardamum Græcis appellata, quòd radici odor in- damò cur-
sit Nasturtij: vel quòd eius folia partim Nastur= dicta.
tio aquatico, quod à Dioscoride Sisymbrium car-
damine dicitur, partim etiam hortensi, quod Car-
damon Græcis nominatur, similia sint: vel quòd gu-
stu Nasturtium referant.

FORMA.

Folia Nasturtio similia habet, verno tēpore vi-
rentia, cubitali lōgitudine, aut minore, flore lacteo,
radicibus duabus, sed vna apud nos frequentius, ni-
titur, odore Nasturtij quàm acerrimo. Ex qua ni-
mirum descriptione omnibus perspicuum sit, here-
bam cuius picturam exhibemus esse Hiberida:
caulem

PLANTARVM HISTORIAE

cau' em enim cubitalem obtinet, foliâque Nasturtio similia. Quæ enim à radice statim exeunt, aquatici, quæ verò in supremo caule emicant, hortensis Nasturtij folia referunt. Verno quoque tempore virent, flos denique lacteus est, hoc est, in albo purpurascens: hunc enim Dioscoridem vocare lacteum florem, satis testatur quarta Ranunculi species, cuius etiam florem, qui colore huic similis est, lacteum esse scribit. Semen quoque in siliquulis tam exiguum producit, vt, Plinio etiam teste, vix aspici possit: radicem autem exilem atque acrem, cui inest Nasturtij odor.

LOCVS.

Nascitur incultis locis, circa itinera & prata.

TEMPVS.

Verno tempore apparet, Aprili potissimum mense & Maio, durâtque ad æstatis initia, quo potissimum tempore lacteum florem fundit: initio enim purpureo colore maculatus videtur: efficaciorēque vsum obtinet, quòd tum semen etiam in siliquulis proferat.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine calefacientium, vt Nasturtium, minus tamen eo desiccatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix calefacit & adurit. Vtilis est ad coxendicis dolores cum suillo adipe falso, emplastri modo quaternis horis illita. Deinde in balneum descendatur,

scendatur, & oleo cum lana locus perungatur.

EX GALENO.

Similis Nasturtio tum odore, tum gustu, tum viribus.

EX PLINIO.

Coxendicibus & articulis omnibus cum axūgia modica vtilissima, viris plurimum quaternis horis, fœminis minus dimidio adalligata, vt dein in balneum descēdatur in calidā, & postea oleo & vino corpus perungatur, diebusq; vicens interpositis idē fiat, si qua admonitio doloris super sit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos. Imponitur in ipsa inflammatione, sed imminuta. Adalligata capiti cum Quinquefolio, epiphoras & si qua in oculis vitia sunt, emendat.

APPENDIX.

Recentiores herbarij eius herbæ cuius picturam damus vsum probant contra pediculos, si lixiuio incoquatur. Vnde colligere licebit, eam exiccandi & ex alto euocandi trahendiq; facultatem, haud secus atque Nasturtium aut Sinapi, habere. Nā, Galeno lib. i. de composit. medic. secundum locos, cap. vii. teste, medicamenta quæ phthiriasi medentur, necessariò exiccant atque ex alto trahunt. Vt iterū euidentissimum sit hanc herbam, eo quòd Nasturtij facultates obtineat, esse veram Hiberida, nō obstante quod rarò aut nunquam duabus, sed vna potius & exili nitatur radice.

PLANTARVM HISTORIAE
DE HIPPOSELINO. CAP. CXXIII.
NOMINA.

Ιπποσέλινον Græcis, *Olus atrum* Latinis dici-
Officina = tur: officinae eius semine perperam pro Petroselin-
rū error. no macedonico utitur. Germanis groß Epffich,
oder groß Eppich (Gallicè ache, ou hache)
Hippose= appellatur. Hipposelinon autem à magnitudine di-
linum vn= etum est: siquidem Græci magnis & amplis re-
de dictū. bus hippo præponere solent, adeò ut Hipposelinum
Olus atrū Latinis nihil aliud nisi grande Apium sit. *Olus au*
quare ap= tem atrum vel pullum à foliis, quæ atro colore ni-
pellatum. tent, appellatum esse videtur.

FORMA.

Maius est hortensi Apio, caule cauo, alto, tenero,
veluti lineas habente, foliis latioribus, subpuniccis,
Libanotidis coma, plena flore, in corymbos ante=
quam defloreat congesta, semine nigro, oblōgo, soli=
do, acri, odorato, radice odorata, intus candida, ori=
grata, pro caulis magnitudine non admodū densa.
Porrò ne mireris quòd picturæ non ex omni parte
respondeat descriptio: neque enim Hipposelinū inte=
grum, & quod ad perfectam peruenit ætatem, flo=
resq; & semen produxit, damus, sed id tantū quòd
primo crumpit. Radicē itaque tantū & folia de=
pingi curauimus, ut quæ Oleris atri, cuius sæpe fit
apud Dioscoridem mentio, forma, saltē in foliis &
radice, esset, cerneret. Annitemur tamen ut aliquā=
do integram eius herbæ picturam exhibeamus.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis, & iuxta paludes.

TEMPVS.

Satum tardè prouenit, ideóque factum vt integrè depictum dare nobis haud licuerit. Floret, Plinio teste, aestate.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, vt Apium, & siccum in medio tertij.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Estur olerum modo ceu Apium. Radix etiam cocta & cruda estur. Quinetiam folia & caules cocti manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur. Crudæque ad salgama condiuntur. Semē totum in mulso menses ducit. Rigore concussos calfacit potum & illitum. Vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eadem præstat.

EX GALENO.

Hipposelini similis Apio vis est, validior tamen. Mensium autem & urinæ ciendæ potissimum facultatem habet, vt liquet ex capite eiusdē de Smyrnio.

EX PLINIO.

Olus atrum quod Hipposelinum vocant, aduersatur scorpionibus. Poto semine torminibus interaenis medetur. Itēque difficultatibus urinæ semen eius decoctum ex mulso potum. Radix eius in vino decocta calculos pellit, & lumborum ac lateris dolores. Canis rabiosi morsibus potum & illitum medetur.

PLANTARVM HISTORIAE

DE IXO. CAP. CXXIIII.

NOMINA.

Iξos Græcis, Viscum Latinis & officinis, Germanis Mistel, oder Affolter (Gallicè du Guy, ou de la Glu) nominatur.

FORMA.

Planta est fruticosa, lenta, semper virens, intus porracei coloris, extrà subflava, foliis buxi, acinis exiguis, sine flore.

LOCVS.

Nunquam in terra, sed semper in arbore, quercu præsertim, piro, mâloq; provenit.

TEMPVS.

Autumni initio cum suis acinis decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit cū acrimonia: ex plurima enim aëria & aquea, paucissima terrena substantia cōstat. Igitur acrimonia in eo amaritudinem excellit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Discutit, emollit, attrahit: tubercula, parotidas, cæterosq; abscessus cum resina & pari cera mixtū, maturat. Epinyctidas in splenio curat. Cū thus re antiqua vlcera, et malignos abscessus mollit. Lienes cum calce, aut gagate lapide, aut asio coctum & impositum minuit. Cum auripigmento aut sandaracho illitum, vngues extrahit. Mixtum cū calce & fæce, vim suam intendit.

EX GALENO.

Valentey.

Valenter ex alto humores extrahit: nec tenues tantum, sed & crassiores eosq; diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere quæ non protinus admota calfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut *Thapsia*.

DE ISATIDE. CAP. CXXV.

Isatis sylvestris nobis Guesde.

NOMINA.

Iσάτις Græcis, Isatis Latinis vocatur. Gallis, ut in commentariis suis testatur Cæsar, *Glasum* olim dicebatur, nunc *Guadum*. Germanis autem ad hoc nomē alludētibus, *Vueydt* (Gallicè du Guesde, ou Pastel) nominatur. Arabibus Nil, Nilech, & Indicum, ut libro primo *Paradox.* cap. vigesimo sexto monstrauimus. Barbari deprauata voce *Osatim* appellant.

Guadum.

Nilech.

Indicum.

Osatim,

GENERA.

Duo Isatidis sunt genera. Vna enim satina, qua tingendis lanis infectores vtuntur. Altera verò sylvestris, qua lanarum infectores haud vtuntur. Priorem Germani simpliciter *Vueydt*, alteram verò cum adiectione *Vuuld Vueydt* nominant.

FORMA.

Satina folia habet *Plätagini* similia, sed pinguiora, nigrioraque, caulē duobus cubitis altiorē. Hæc *Dioscorides*, qui reliquas notas, quæ sylvestri similes per omnia sunt, commemorare noluit. Ex sylvestris tamen effigie facile quales sint æstimare pote-

Satina.

PLANTARVM HISTORIAE

ris, hæc enim teste Dioscoride, satinae similis est, for- Sylvestris lia tamen maiora obtinet, ad Lactuca folia access- dentia: caules etiam tenuiores, multifidos, rubican- tes, qui in cacumine folliculos linguarum figura mul- tos dependentes habent, in quibus semen. Flos ei lu- tens & tenuis.

LOCVS.

Isatis satina copiose in Germania provenit præ- sertim agro Erphordiano, cui magnum questum ad- fert. Viridem enim herbam trusatilibus molis pre- munt, ut herbaceam sanie excludant: dein abacto liquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis computrescere in æstate feruente sinunt. Hos corti- nis infectoriae coquunt officinae, & laneos pannos, ac vellera demergunt, ut cæruleum imbibant colo- rem. Sylvestris sua sponte in quibusdam Germania locis nascitur, ut Tubingæ, ubi omnes vinearum ma- ceries hac herba septæ videntur.

TEMPVS.

Maio & Iunio mense florent, ac subinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Isatis satina valenter admodum exiccantis, nondum tamen mordentis facultatis est: amara enim simul atque adstringens existit. Sylvestris verò acre quid- dam tum gustu, tum actione præfert: proinde va- lentius quam satina desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Isatidis

Isatidis sativæ folia omnia œdemata & tubercula illita discutere possunt. Cruenta vulnera glutinant. Sanguinis profluvia sistunt. Ulcera phagedænica, herpetas, erysipelata, & putrescentia sanant. Sylvestris eadem quæ sativa potest. Lienosis etiam pota & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Sativa magna ulcera durorum corporum glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint, & sanguinis profluvio laborantibus partibus utiliter illinitur. Tumores œdematodes mirifice discutit, simul & reprimat, omnibusque ulceribus malignis mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si erodantur. Quod si quando laborantis natura validior appareat, foliis eius tritis aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticeam, aut polentam, pro vincete in unoquoque affectu, miscere oportebit. Sylvestris vero potentissimè humidis putredinibus obsistit, ad cætera vero iam comprehensa deterior: immoderatus enim & cum mordacitate desiccatur, talia namque irritantur hoc pacto, & phlegmone gravari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienosis quoque utilis est, quum altera prodesse nondum possit.

EX PLINIO.

Isatidis folia trita cum polenta, vulneribus pro sunt. Sanguinem sistit. Phagedænas & putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanat. Item tumores ante suppurationem. Contra ignem sacrum, radice vel foliis
 & iiij prodest,

PLANTARVM HISTORIAE

prodest, vel ad lienes pota.

DE ITEA. CAP. CXXVI.

NOMINA.

ITEA Græcis, Salix Latinis, Vuiden, oder Fel-
Salix cur ber Germanis (Gallicè Saulx) appellatur. Sa-
dicta. lix verò à saliendo dicta est, quòd ea celeritate cre-
Itea vnde scat, ut quasi salire videatur. Sic etiam Iteā quasi
vocata. Salicem vocauerunt Græci.

GENERA.

Tria Salicis genera Theophrastus lib. iij. capi.
Salix ni- xij. de historia plantarū recenset. Primam nigram
gra. nominari dicit, quòd nigro aut puniceo cortice ob-
Candida. ducta sit. Secundam candidam, quod cādido obdu-
Pumila. catur cortice. Tertiā coactæ breuitatis ac pumilā,
 Helicen Arcadibus appellari scribit. Plinius etiam
 lib. xvij. cap. xxxvj. tria Salicis nomina cōmemo-
Viminalis rat: Viminalem, candemq; purpuream. Vitellinam
Vitellina. à colore luteo, graciliorem priore: Gallicam, quæ sit
Gallica. tenuissima. Lucius Columella lib. iij. ca. xxx. eius-
Græca. dem quoq; tria facit genera, Græcam, Gallicam, et
 Sabinam, quā etiam Amerinam vocari à plurimis
 scribit. Græcam flauī coloris, Gallicā obsoleti pur-
Sabina. purei, tenuissimiq; viminis, Sabinā gracilib. virgis
 atque rutilibus esse asserit. Quæ sanè singula pul-
 chrè cum iis quæ Theophrastus tradit, cōuenire vi-
Prima Sa dentur. Nam primam Salicis speciem, quam Theo-
licis spe- phrastus nigram aut puniceam vocat, Plinius Vi-
cies. minalem, Columella verò Sabinam & Amerinam
 appellat,

appellat, Germani rot Vuiden nominant. Secunda. Secunda.
dā speciē, quam Theophrastus candidam, Plinius
Vitellinam, Columella autem Grecam vocat, Ger-
mani, geel Vuiden. Tertiam, quæ Theophrasto Tertia.
Helix dicitur, Plinius & Columella Gallicā ap-
pellant, Germani verò à tenuitate klein Vuidē.

FORMA.

Salix breui caudice cōsurgit, ramis longis, è trun-
co extremo veluti à capite prodeuntibus lentis, fle-
xilibus: foliis longis, subtus incanis, supernè viren-
tibus: flore seu nucamento squamatim compactili,
lanuginoso, propendente, fructu qui facilè ante ma-
turitatem evanescat.

LOCVS.

Aquosis lætatur, ideoq; auctu perquam facilis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere. Ocyssimè amittit fru-
ctū, antè quàm omnino maturitatem sentiat, ob id
dicta Homero ὠλεσίκαρπος, hoc est, frugiperda
Odyss. κ. ubi sic canit: μακρά τ' αἰγίροι καὶ ἰ-
τέα ὠλεσίκαρποι. Fructū siquidem fert, Plinio
autore, abeuntē in araneā antequam percoquatur.

TEMPERAMENTVM.

Salicis tum folia, tum flores, citra mordacitatem
exiccantis sunt facultatis, ac modicè adstringunt.
Cortex tamen eius siccior.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Adstringunt Salicis folia, fructus, cortex & suc-
cus.

PLANTARVM HISTORIAE

*cus. Folia trita cum exiguo pipere & vino pota is-
leosis conueniunt. Per se etiam cum aqua sumpta,
præstant mulieribus ne concipiant. Fructus potus
anguinem expuentibus prodest. Cortex eadem
præstat. Vstus & cum aceto subactus, clauos &
callos illitus tollit. Ex foliis & cortice succus in pu-
tamine mali punici cum rosaceo calfactus, aurium
doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras fo-
ueri optimum. Furfures exterit. Excipitur etiam è
Salice succus exciso cum floret cortice: in inte-
riore enim eius parte concretus inuenitur. Vim au-
tem habet exterendi quæcunque pupillæ claritati
obstant.*

EX GALENO.

*Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinationem
quis uti posset. Verum floribus eius maximè propè
omnes vtuntur medici ad exiccatis emplastri præ-
parationem: est enim vis eorum desiccatoria: habet
etiam quandam adstrictionem. Sunt qui succum ex
ea expressum, medicamen seruent mordacitatis ex-
pers & exiccatorium, ad multas res utile. Haud
enim inuenias quid ad plures res utilius medica-
mento citra mordacitatem exiccate, quod paulum
etiam adstringat. Porro arboris cortex similem fac-
cultatem obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod
temperatura sit siccioris, velut omnes cortices. Sed
hunc quidam comburunt, eiusq; cinere vtuntur ad
ea omnia quæ valenter desiccare oportet. Nam clas-*

uos quos vocant, callos, myrmeciasq; tollunt, aceto ipsum macerantes acri. Nonnulli autem dum floret *Salix*, corticem eius incidunt, & succum quandam colligunt, vtunturq; ad ea quæ pupillas obfuscant, extergente videlicet simulq; tenuium partium medicamine. Vti verò illo ad multa alia quis posset, siquidem talis sit.

EX PLINIO.

Salicis fructus ante maturitatem in arancam abit. Sed si prius colligatur, sanguinem reiciētibus prodest. Corticis è ramis primis cinis, clauum & callū aqua mixta sanat. Vitia cutis in facie emendat, magis admixto succo suo. Est autem hic trium generum. Vnum arbor ipsa exudat gummi modo. Alterum manat in plaga cūm floret, exciso cortice trium digitorū magnitudine. Hic ad purgāda quæ obstant oculis, item ad spissanda quæ opus sunt, ciēdamque vrinā, & ad omnes collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detruncatione ramosum à falce destillans. Ex iis aliquis cum rosaceo in calyce māli punici calfactus, auribus infunditur: vel folia cocta, & cum cera trita imponuntur. Itē podagricis. Cortice & foliis in vino decoctis fouere nervos vtilissimum. Flos tritus cum foliis fursures purgat in facie. Folia trita & pota intemperātiā libidinis coercent, atque in totum auferunt vsum sæpius sumpta.

PLANTARVM HISTORIAE
DE CAPNO. CAP. CXXVII.
NOMINA.

Kάπνος Græcis, Fumaria Latinis: officinis
Fumus terræ, Germanis Erdtrauch, Dau-
benkiopff, katzenkorbel (Gallicè Fumeterre,
ou pied de Geline) appellatur. Fumaria verò
hæc herba dicta est propterea quòd succus eius o-
culis inditus, veluti fumus lachrymas mouet, ocu-
lósque mordicat.

FORMA.

Fruticosa herbula est, Coriandro similis, tenera
admodum: foliis candidioribus, cineracei coloris,
vndique numerosis: flore purpureo.

LOCVS.

Nascitur in segetibus hordeaceis, hortis, vineis,
sepibus, & maceriis, aliisque locis incultis atque
pinguibus.

TEMPVS.

Carpitur in fine Maij mensis & Septembris.

TEMPERAMENTVM.

Capnos calida & sicca in secundo esse videtur ordi-
ne, id quod ex gustu patet: acris enim & amara est.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius succus acris est, visum acuit, lachrymas
ducit, vnde & nomen traxit. Illitus cum gummi
duplices palpebrarum pilos renasci non sinit. Com-
manducata herba biliosam vrinam trahit.

EX GALENO.

Capnos aeris simul & amare qualitatis est par-
 ticeps, nec tamen planè expers est acerbæ. Quæ ob-
 rem biliosam urinã multam prouocat, sanatq; ieci-
 noris obstructiones & debilitates. Succus eius ocu-
 lorũ aciem acuit, nõ parũ lachrymarum trahēs, ve-
 luti ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Ple-
 beius quidam ea vti solebat ad stomachum robo-
 randum, vnãq; ventrem lubricandum. Siquidẽ her-
 bam primũ desiccata cõdebat: dein cũ vri volebat
 subductionis quidem gratia melicrato inspergebat
 roborandi verò causa, vino nimirum diluto.

EX PLINIO.

Claritatem facit inũctis oculis, delachrymatio-
 nẽmque ceu fumus vnde nomen accepit. Eadem
 emulsas palpebras renasci prohibet. Bilem per uri-
 nam trahit.

DE CICI. CAP. CXXVIII.

NOMINA.

Kίσι, ἢ κρότων græcis, Ricinus latinis, Maue-
 ritanis Kerna, officinis nonnullis Cataputia Cherua.
 maior, quibusdam etiam Pētadaetylōn & Palma Catapu-
 Christi, quod scilicet eius folia in humanã manus tia maior.
 effigiem articulentur: Germanis Vunderbaum,
 oder Creutzbaum dicitur. Croton autem & Croton &
 Ricinus à similitudine animalis, quod semen eius Ricinus
 referre videtur, nominata est. Sunt enim Græcis vnde di-
 κρότῳες, & Latinis Ricini, insecta animantia, &c.
 quæ canibus præsertim adherent, quibus cibi nul-
 lus

PLANTARVM HISTORIAE

lus exitus est, colore livido, nullis discreta membris, in globum continuè crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies sponte sua decidat. Hinc est quod à Germanis nostris Zeckenkorner nominentur.

FORMA.

Arbor est parvæ ficus magnitudine, folia Platano similia habens, maiora tamen, laeviora & nigriora. Caudices verò & ramos arundinis modo cōcanos. Semen in vuis racemisve asperis, quòd cortice nudatum, Ricino animali simile est. Quæ descriptio ita picluræ quadrat, ut nihil magis.

LOCVS.

Nascitur nusquā in Germania nostra, nisi satum fuerit. Satum autem semel copiosè prouenit. Sine difficultate etiam passim iam in hortis prouenit.

TEMPVS.

Carpitur Autumno dum semine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Ricinus in secundo vel summum tertio ordine calefacientium & siccantium esse apparet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Oleū Ricini. Ex semine Ricini oleū nomine Ricininum exprimitur, ad edendū minimè aptū: alioquin tamen lucernis & emplastris vtile. Grana triginta numero putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, & aquam per aluum deiciunt. Vomitiēes etiam mouent. Est verò iniucunda admodū & laboriosa

boriosa huiuscemodi purgatio: stomachũ enim validè subuertit. Tusa & illita varos, maculáſque ſole contractas purgant. Folia trita cum polenta, oculorum cedemata & inflammationes ſedant, manimáſque turgentes cohibent. Per ſe aut cum aceto illita, ignes ſacros reſtingunt.

EX GALENO.

Semen Ricini, quòd etiã purgat, extergēdi & digerendi facultatem obtinet. Sic verò & foliũ, ſed vnde quaque debilius. Oleum quod ex ſemine cõſicitur, tum calidius, tum tenuiorum partium, quàm eſt oleum commune, ac proinde quoque digerit.

DE CIRSIO. CAP. CXXIX.

Circium Bugloſſum.

NOMINA.

Kίρσιον Gracè, Spina mollis, Bugloſſum ma- Bugloſſa.
gnum Latine nominatur: officina, necnon
herbarij Bugloſſam vel linguam bouis vocant. Cir- Cirſiõ cur
ſion autem eò quòd varices, quos Graci ῥιγοὺς dicta.
nominant, ſanet, dicta eſt. Germanis Ochſen-
zung (Gallicè Bugloſe, ou langue de Beuf)
appellatur.

GENERA.

Nos duo damus genera, quorum vnum Germanicum, alterum verò Italicum eſt, in quo omnia ſunt maiora.

FORMA.

Caulis eſt tener, duũ cubitorum, triangularis.

PLANTARVM HISTORIAE

Ab inferiore parte foliolis rosaceorum figura, angulos spinosos per intervalla, sed molles habentibus. Folia Buglosso similia, modicè hirsuta, longiora, albicantia, extremitatibus aculeata obtinet. Cacumen in caule orbiculatum, hirsutum, in quo capitula in summo purpurea, quæ in lanugines evanescent. Hæc sanè descriptio satis monstrat, Cir-

Buglossa
nostra.

sion esse Buglossam hodie vocatam, cùm ei delineationes omnes, nulla ferè reclamante nota, conveniāt. Siquidem caulis ei tener, bicubitalis, triangularis, spinosis per intervalla angulis, sed mollibus & in-

Locus Dio
scoridis e-
mēdatur.

noxii aculeis. Folia Buglosso similia, longiora tamen aut lege μικρότερα, hoc est, minora, cū Plinio: subcandida, leniter hirsuta, in extremis partibus aculeata. Cacumen quoque caulis circinatum, hirsutum, in quo capitula purpurea. Et si verò reliqua omnia conveniant, tamen capitula purpurea non abeunt in pappos neque in nostra, neque in Italica.

LOCVS.

Producitur locis cultis & incultis, arenosis potissimum & petrosis. Italicum etiam hodie in multis hortis magna copia nascitur.

TEMPVS.

Carpitur Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM,

In primo calefacere & humectare ordine apparet.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Radicem Cirsii laboranti loco adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

EX PLINIO.

Hanc herbam radicemve eius adalligatam, dolores varicum sanare tradunt.

APPENDIX.

Non plures iam commemoratis facultates Cirsio, Dioscorides & veteres alij tribuunt. Videant igitur nostræ ætatis medici, ne temere Buglossæ suæ quas non obtinet vires adscribant.

DE CORIANNO. CAP. CXXX.

Coriandrum nobis frequens, odore dum viret stercoreis humani.

NOMINA.

Kόριον, ἢ κέρειον græcis: Corion seu Coriā non latinis, vulgò & officinis Coriandrum, Germanis, qui latinā seu officinarū appellationem imitātur Coriander (Gallicè Coriandre) nominatur. Corio nomen fecisse cimices verisimile est, quos folia & caules eius olent: κέρεις enim Græcis infecti id genus est, quod latinis cimex dicitur.

Coriandrum.

Coriō quare vocatū.

κέρεις.

FORMA.

Caulis Corianno exilis, sesquicubitalis, ramosus. Folium dum primum erumpit Adiatī, dein Fumariæ, odore gravi. Flores candidos. Semen rotundum ac nudum, firmū & diuturnum. Radicem breviusculam, ligneam, neque admodum fibratam.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Amat terrā pingue, Palladio teste, sed & macro solo nascitur. Nūquam autem nisi satum provenit.

TEMPVS.

Autumno dum semine pręgnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Coriandri temperamētum minimē frigidum ac simplex est, sed variē coalitum & compositum. Est enim copiosa quidem amaritudinis particeps, quæ in tenui simul ac terrestri substantia fundatur: sed & aquosæ humiditatis tepidæ ei non parum inest. Habet etiam adstrictionis nōnihil, sicut paulō pōst ex Galeni verbis clarius innotescet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hæc Dioscoridis: Vim refrigeratoriā habet Coriandrum, unde il-
litum cum pane aut polenta crysipelatis, & herpes
verba pau tibus medetur. Epinyctidas, testium inflammatio-
lō pōst Ga nes, carbunculōsque cum melle & vva passa sanat.
lenus exi Cum lomento strumas & tubercula discutit. Lum-
bilat.. bricos semen cum passo potum pellit, geniturāque
auget. Largius tamen sumptū, mentem non sine pe-
riculo mouet, quapropter copiosiore & cōtinuum
cuius vsus cauere oportet. Succus cum cerussa, aut
argenti spuma, necnon aceto & rosaceo illitus, ar-
dentes in summa cute inflammationes iuuat.

EX GALENO.

Coriannon siue Corion, aut vtcunque vocare lue-
bet. Vetusiores Græci Coriannon nominabant, ac
recentiores

recentiores omnes medici Corion appellant, sicut
& Dioscorides refrigeratorem esse herbam dicti-
tans, sed perperam. Siquidem ex contrariis constat fa-
cultatibus, plurimum habens amaræ essentiae, quam hendi-
mus esse tenuium partium, & terrenam, nec
modicum etiā aquæ humiditatis obtinentem, quæ
est facultatis tepida. Habet autem & adstrictio-
nis paucillum. Ex quibus omnibus variè quidem a-
git ea quæ scribit Dioscorides, & non tantum ex re-
frigeratione. Ceterum ego cuiusque particulatim
actionis causam enarrabo, tametsi propositum fue-
rat mei unius duntaxat hoc in libro sententiam ex-
promere. Sed fortè nihil obstabit, imò si verum fa-
tendum est, proderit nonnihil superiores metho-
dos, quæ in paucis medicamentis sunt dictæ, hunc
in modum repetere. Primum ergo non Dioscorides
tantum, sed & alij complures medicorum indeter-
minatè, & citra limitationem de morbis pronun-
tiant, sicut sanè hac quoque tempestate non paucos
reperias medicos insignes, præter alia, hac in re ma-
ximè hallucinantes. Interdum enim atra, livida, fri-
gidaq; reddita parte quæ erysipelas habuit, nec am-
plius refrigerantia poscente medicamenta, cum an-
tea, sed ea quæ infixum parti præter naturam hu-
morem euacuent, ù tamen refrigerare persuerant.
Aliquādo autē ad digerentia quidē transcunt, cete-
rum erysipelas sanare dicunt. Et sanè scribunt incip-
ientibus etiamnum & crescentibus erysipelatis alia

conuenire medicamenta, aliaq; declinantibus. Verum res ita non habet. Neq; enim erysipelas etiam vocari debet posteaquam inflammatio eius & feruor, ac biliosum illud abierint: neq; quæ facultate sunt frigida, neq; quæ illa sanant, remedio esse putandum est, sed velut si vel initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quæpiam aut liuidus, aut niger extiterit, cū frigidum esse affectum existimabis, & quæ digerant ex calfaciantq; poscere: ad eundem modum si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidē prior est, sed secunda alio nomine appellanda. Aut si displicet nominis mutatio, saltē sicut aliqui alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendum sanē est, si cui ita placet, vt talis affectio etiā erysipelas vocetur: sed eā etiam calidam dicere vbi iam refrigerata est, id verò neutiquā concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratoriū esse credamus, sicut Dioscorides Coriannon, quod, vt ipse ait, cum pane aut polēta illitum, erysipelas sanat. Nā quod exquisitum est erysipelas & iam vtique inflāmatum & flauum est, nequaquā cū pane sanabit Coriannon, sed illud quod iam refrigeratū est. Proinde nos superioribus voluminibus, quum determinata ac definita experientia cuiusque medicamenti facultatem explorandam censuimus, quam maximè fieri posset simplicissimum eligi

eligi affectum cōsuluimus. At plerique medici, ne-
 que quòd vel plurimi morborum protinus ab ini-
 tio compositi innadant, norūt, neq; quòd alius affe-
 ctus sit erysipelas exactum, alius verò is qui voca-
 tur ab omnibus nobis vsitatè, vt à veteribus quoq;
 phlegmone. Alij autē inter hos mediū plurimi, par-
 tim vt sic dicam erysipelata phlegmonode, partim
 phlegmone erysipelatodes. Ac inuenias nōnquam
 vbi neutrum vincat, sed ad vnguē paria sint. Quin-
 etiam nonnunquam edematodes esse erysipelas cō-
 spicitur, sicut aliud scirrholes, vt cōpositorū mor-
 borum haud paruus aceruetur numerus. De qui-
 bus copiosius cum alibi differuimus, tum in libris
 de curandi ratione. Dicetur autem & nunc, quo- Lib. I 4.
 ad saltem eorum meminisse necesse est, quòd exa-
 ctum erysipelas haud vnquam ab antedictō cata- Exquisi-
 plasmate curari possit. Voco autem exactū, quum tum crysi-
 à biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quòd pelas.
 longè à refrigeratione absit Coriandrum, vel exiis
 quæ ipse scripsit Dioscorides discere licet, Nā stru-
 mas, inquit, cum lomento discutit. Quòd verò nul-
 lum refrigerantium medicamentorum idoneum sit
 discutiendis strumis, vel ipsum Dioscoridem nō du-
 bitare arbitror, vt qui sexcenta scripserit medica-
 mēta strumas sanare potentia, quæ omnia temperie
 calida, & actionibus digerentia esse confessus est.
 Hactenus Galenus: cuius quidem, etsi prolixa sint,
 verba ideo recēdere placuit, vt vulgi & nōnullorū

PLANTARVM HISTORIAE

etiam medicorum errorē detegeremus, qui prater
veritatem Coriādri temperamentū esse frigidū as-
serunt. Denique vt ex hoc loco discerent studiosi,

Periculo- quā periculosum sit Dioscoridis ac aliorū veterū
sum Dio- scripta sine limitatione sequi. Admonitos quoq; le-
scoridis ctiores esse volumus, hoc caput ex eorum esse nume-
scripta si- ro, in quo Galenus à Dioscoride dissentit.
ne limita-
tione le-
gere.

EX PLINIO VALERIA- NO MEDICO.

Non dubitanter Coriādro refrigeratrix potestas
datur, non tamen simplex, vt prudentissimè Galeno
videtur, sed cui quedā portio austeritatis immixta
sit, inde quòd quedā ex eo vitia curantur, quæ nū-
quā omnino curaret, si sola virtute frigida niteret-
tur. Cum melle & vna passa tritum & impositū,
omnes tumores collectionesque compescit. Præcipuè
tamen isto genere medicaminis doloribus testium
subuenitur. Succo mali granati & oleo in potione
permixtum, animalia interancis innata persequi-
tur. Semen ex aqua potum solutionem vètris strin-
git. Scriptū à multis legitur tria Coriandri grana
tertianas excludere ante accessionem si fuerint de-
uorata. Iisdem quoque repellendis efficax est ipsum
Coriandrum ante solis ortum ignorantī cervicali
viride subiectum. Mirum est quod Xenocrates tra-
dit, si vnum seminis granum femina biberit, vno
die mēstrua cōtineri, biduo si duo, & totidem die-
bus quot grana sumpserit.

Eadem

Eadem ferè sunt quæ alter Plinius lib. naturalis histo. xx. capite xx. scribit, ideòque omittere placuit. Tantùm addit, Marcum Varronem putare Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptam æstate seruari.

APPENDIX.

Non transeundum silentio erit quod Dioscorides hic diligenter monet, Coriandri copiosum & cōtinuum vsum esse fugiendum. Ideòq; errare vehementer recentiores medicos, qui eo tam frequenter, potissimum ad caput roborandum, cui insensissimum est, vtūtur, manifestius est quàm vt probatione indigeat. A quo sanè errore vel id saltē reuocare cōs deberet, quòd idem Dioscorides, libro sexto, Coriandrum inter venena connumeret.

Coriandro nō copiose & continuo vtendum.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonum est, & eundem corroborat. Cibos in ventriculo donec probè concoquantur retinet. Tostum igne ventrem sistit. Prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. Sanguinis fluxuum potum, & si imponatur, compescit. Cum vino potum, lumbricos educit: immodicus tamen eius vsus delirium facit. Huius etiam succus potus venenū est & occidit. Qui enim hunc bibunt, muti fiunt, & desipiunt.

DE CASSUTHA. CAP. CXXXI.

Cassutha si thymo innascitur Arabum est Epithymum, nobis in satireia, hyssopo

& maiorana est sæpe visa omnino eadē, nec genere ab hac variare videtur quæ in lino, orobo, lente, vicia etiam luxuriari solet. Ea omnis primum radiculis nititur, quæ tū are-
scunt & vanescunt quando primum à planta cui inuoluitur cirris suis alienum depascitur alimentum.

NOMINA.

Kατούθα recentioribus Græcis: Cassutha, y
litera in v transeunte, ut sæpè fieri solet, lati-
nis appellatur: officinis & herbariis nostræ ætatis
hinc deflexa quadam pristini nominis vmbra, Cus-
scutha dicitur, cum primū Cassutha, dein conuersa
Cuscutha, postremo Cuscuta cœperit appellari. Sunt
qui podagram lini vocant, quòd quasi compedibus
id cui incederit illiget, nec vinctum eo facile pos-
sit extricari. Germanis Filtzkraut, oder Flach-
szseiden, oder Todtern (Gallicè Goutte de
lin, ou agoure de lin) dicitur. Errant qui Dio-

Podagra
lini.

Andros a= scoridis Androsacen esse putant, cum veteres Græ-
ce non est ci, quod sciam, de Cuscutha hodie dicta, nihil me-
Cassutha. moriæ prodiderunt. Plinius tamen lib. xvi. capite
ultimo, eius videtur meminisse iis verbis: Est & in
Syria herba quæ vocatur Cassythas, non tantum
arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluens sese:
Plinii lo= Cassythas enim legēdū non Cadytas: sic enim codi-
cus emen= ces aliquot Pliniani, ut in suis annotationibus do-
datus. Etissimus Herpyolans admonet, ijq; emendatiores,
habent.

habent. Iam igitur memoria Plinij Cassytha herba suo nomine Syriaco venerat in Latium, quod multis postea seculis vsurpantes tam Pœni quàm Arabes, suis scriptis protriuerunt. Quod autem Plinius sine spiritus protulit, id librariorum culpa factum esse suspicor, qui inuertentes mutarunt Cassythā in Cassythas. FORM A.

Herbosis fruticibus adnascitur, earum adminiculo fulta: radice nulla, sed velut ab alarū sinu procedente cirro capillamentōve miræ longitudinis, statim ab eius ortu sese ramulis conuolvente. Quæ iā veluti clauiculis nixa, sensim proserpens herbarum fastigia scandens, & crebris volutionibus opere topiario per vertices rotata, comas herbarum cōplectitur: tã volubilis illi natura est. Foliis vidua cernitur, Florem fundit album, semine quoque scatet tenui. Cirri dilutiores rutilant purpura, nonnumquam ex rubro rufescunt, fidibus lyrarum crassitie pares.

LOCVS.

Nō in terra, sed in herbis arboribusq; passim nascitur Cassythā, quas tam spisso sæpius irretit cōtextu, vt tentorii modo herbosum cespitē à sole vindicet. Nonnumquam cacuminibus impendens stirpes humi deturbat, propriamque parentem suis laqueis strangulat, aut continuò materni alimenti situ perducit ad tabem.

TEMPVS.

Æstate; Iulio potissimum & Augusto mēribus,
maximus

PLANTARVM HISTORIAE

maximus illius in Germania proventus esse solet, hoc enim tempore tanta eius est luxuria, vt mole sua stirpes onerata ferè procumbere videantur.

TEMPERAMENTVM.

In primo calefacientium abscessu seu ordine, & desiccantium secundo statuendum: quandam enim resipit amaritudinem.

VIRE S.

Abstergendi naturam obtinet, & cum quadam adstrictione roborandi facultate prædita est. Iecinoris impedimenta laxat, infarcti & obstructi lienis expedit vitia, venas pituitosis atque biliosis exonerat humoribus, pellit vrinam. Regio morbo subuenit, qui iecinoris obstructionibus contrahitur. Febribus iis auxiliatur, quæ pueros malè habent: sed usu nimio stomachum sua adstrictione grauatur: verùm noxa tollitur, si Anisi momentum adiiciatur. Natura eius flauam bilem per aluum exigere, sed efficacior cum Absinthio præbet effectum. Hæc quidem ex Pœnorū ac Arabum sententia facultates Cassuthæ tribuuntur, qui vtique vires illius longè magis gliscere pollicentur, si parentis ingenium ei patrocinetur. Hinc est quòd hanc forsitan veteres Græci, quamuis triuialem, eo nomine subticuerunt, quòd natiuas suæ merito parentis dotes adsciuisset, è sinu cuius vernaculum ebibens humorem aleretur. Nam vt testatum iidem Arabicæ factionis medici reliquerunt, si calidæ insidet herbæ arborivæ,

borive, calidam fortietur facultatem, & si decubuerit frigida, vim sibi frigidam vendicabit.

DE CESTRO. CAP. CXXXIII.

Betonica betoine, Sylvestris autē duplex nobis armorie dicitur, tunica & tunici ablata prima syllaba, & o in v corrupta officinis, altilis autem nobis ocellus eulet dicitur.

NOMINA.

Kίστρον Gracè, Betonica seu Vetonica latine: in officinis antiquū nomen retinuit, braunbetonick Germanicè (Gallicè, Betoine, ou de la Betoefne) appellatur. A varietate autem & copia remediorum, Cestron à Gracis dicta est: Cestron hac siquidem voce opus interpunctum, acūve pictū unde dinominauere. Libri etiam à varietate subiecti, ab eta. aliquot Gracis hoc titulo inscripti sunt. Plinius quoque aliquando Ebur cestrum, id est, picturatum dixit. Betonica verò ab inuentoribus Vetonibus, Hispaniæ populis, nominata est.

FORMA.

Herba est caulem tenuem obtinens, cubiti altitudine, aut maiorem, quadrangulum. Folia longa, mollia, quernis similia, per ambitum incisuris diuisa, odorata, propè radicem maiora. In summo caulium semen veluti Thymbræ spicatum inest. Radices subsunt tenues vt Ellebori.

LOCVS.

Nascitur in pratis, syluis, mōtosis, frigidis et opacis

PLANTARVM HISTORIAE

Ψυχότρο cislœcis, ideóque Græcis Ψυχότροπον vocata est.
 Φορ.
 TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca in primo ordine completo, aut
 in medio secundi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia Betonica carpuntur & siccantur plurimos
 ad vsus. Radices cū hydromelite potæ, pituitosam
 vomitionem eliciunt. Folia dantur ruptis, cōuulsis,
 vuluæ affectionibus, & eiusdem strangulationibus
 drachmæ vnius pondere cum hydromelite. Ternæ
 in vini sextarijs duobus contra serpentium morsus
 ebibuntur. Herba ipsa illita venenatorū morsibus
 prodest. Aduersus etiam venena drachma ex vino
 pota conuenit. Hæc si quis persumpserit, letale hau-
 stum venenum nihil nocebit. Vrinam cit. Aluum
 subducit. Medetur comitialibus & furiosis cum
 aqua pota. Iecinoris & lienis vitijs drachmæ pon-
 dere cū aceto mulso pota succurrit. Cōcoctionē ad-
 iuuat, si quis à coena eā fabæ magnitudine cū mele
 lecto cocto deuorauerit. Eodem modo & acida ructan-
 tibus propinatur. Stomachicis eam manducare, &
 succum deuorare proderit, si postea dilutum vino
 sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus triū obo-
 lorum pondere cum diluti vini cyathovno. Ischia-
 dicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua. Hydro-
 picis autem binis drachmis, febrientibus cum hy-
 dromelite,

dromelite, non febricitantibus cū mulso Regio morbo laborantes recreat. Menses ducit drachmæ pondere cum vino pota. Aluū purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem pota. Cū mel le tabidis, purulentis auxiliatur. Folia cum inaruerint trita ad hos effectus fictili vase reponuntur.

EX GALENO.

Vim habet incidendi, vt gustus indicat. Amariuscula enim est, & subacris ipsa herba, id quod et particulatim edita ostendit actio. Nam consistentes in renibus lapides rumpit, & pulmonem & thoracem & iecur expurgat, abstergitq;. Menses mouet, & comitialibus prodest. Rupta atque conuulsa curat, & omnibus bestiarum morsibus illita vlceri auxiliatur. Acidum ruētantibus & ischiadicis bibita succurrit. EX PLINIO.

Morsibus serpentum imponitur Betonica præcipue, cui vis tanta perhibetur, vt inclusæ circulo eius serpentes, ipsæ sese interimant flagellando. Datur & ad ictus semen eius denarii pondere cū tribus cyathis vini, vel farina drachmis tribus sextario aquæ imponitur. Obolis tribus in aqua, contra purulentas, contrâque cruentas excreationes facit. Faciles præstat vomitiones radix eius Ellebori, modo quatuor drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spinæ lenat eiusdem farina ex aqua mulsa. Aluum soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Folia siccantur in farinam plurimos

PLANTARVM HISTORIAE

plurimos ad vsus. Fit vinum ex ea & acētum, stomacho & claritati oculorum. Paralyfin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad lateris & pectoris dolores farina eius bibitur.

DE BETONICA ALTERA.

CAP. CXXXIII.

NOMINA.

Dvas esse Betonicae species præter Paulū Aeginetam lib.vij. Plinius etiam lib.xxv. cap.vij. abundè docet: & in aliquibus Dioscoridis codicibus huius quoque secunda Betonica mentio fit.

Herba
Tunica.
nica.

Hanc itaque posteriorem, tam officinae quàm herbarii medici Tunicā, detractis a Betonica duabus literis prioribus, nominant. Germanis Garszblumen & Negelblumen, quòd flores eius garyophyllorum odorem referant, appellare placuit.

GENERA.

Sylvestris

Duū est generū. Vna siquidē sylvestris est, quā Germani Vuild Negelblumen, hoc est sylvestrē Garyophylleam, & Dondernegele, Feldnegele, & Blutz ropffle (Gallicè Des armoiries.) Altera altilis est, quæ alio nomine Betonica

Altilis.

seu Vetonica coronaria, quòd illius in coronis nō minus vsus sit, dicitur. Germani heymisch Negelblumen (Gallicè des euilletz) quasi domitatam Garyophylleam appellant.

FORMA.

Specie multum à priore Betonica differt. Radice

ccm

cem enim totam rubram, odoratamq; habet. Folia porracea, oblonga, stamine quo medium diuiditur puniceo ac rubente, cum recto calamo triangula, floribus in vertice purpureis. Hæc Dioscoridis delineatio vtrique generi communis est: priuatim tamē syluestris Betonica herba fruticosa est, foliis porri, oblongis, angustis, per extremum mucronatis, cæsis, cōcoloribus calamis, teretibus, geniculatis, cubitalibus, floribus speciosis, simplicibus, qui quinis, senisve folijs constāt, lentè fimbriatis, magna ex parte purpureis, quamuis & interdum niuei conspiciantur. Altilis seu coronaria, foliis est porraceis, oblongis, per extremum mucronatis, concoloratu cæsis, teretibus canaliculis sesquicubitalibus, geniculatis, cocuntibus pyxidatim internodiis, floribus omnium speciosissimis, Garyophyllorum odoratu, sed longè suauissimo, quandoquidem alius cocco rutilat, alius saturata nitet purpura, alius candido, alius emaculato blanditur colore, alius versicolore variatur commistū. Omnibus teres longiusculusque calyx spectatur, orbiculo superiorum denticulatus, à quo quina senave folia prodeunt, lentè quidem fimbriata. Nonnulli tamen flores frequentiore coma stipantur, geminis vtrinque emicantibus stamineis apicibus.

Syluestris
Betonica.

Altilis seu
coronaria
Betonica.

LOCVS.

Syluestris in pratis, montibus, nitidisq; locis nascitur. Coronaria verò passim in fictilibus vasis alia
tur.

PLANTARVM HISTORIAE

tur, neque facile ades inuenies, ante quas non expōsitam intuearis. TEMPVS.

In æstate vtriusque magna est copia. Coronaria tamen longiori tempore durat, atque æstiuas, autumnales, hyemaleſque ſtruit coronas.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & ſiccā eſſe tum amaritudo, tū odor & alia multa declarant.

VIRE. EX. DIOSCORIDE.

Animas hominum & corpora cuſtodit. Contra nocturnas peregrinationes, loca inſidioſa, & difficiles ſomnos commēdatur. In totum, ad omnem mēdendi rationem celebrata. Recens trita vulneribus capitis indita dolorem finit. Vulnera glutinat. Fracta oſſa extrahit, et hoc quotidie efficit, donec perſaneſcat. Dolori capitis medetur, ſi decocta ea ex aqua caput perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix eiſdem ſuffiatur.

EX INCERTO,

Farina eiſ tam aduerſus toxica quā ſerpentū & ſcorpionū iētus ex albo vino bibitur. Quartanæ reliquarūque febrium horrores diſcutit. Comitialibus opitulatur ſub ipſam acceſſionem propinata. Eadem per ſe carcinomatis inſpergitur, quæ tamen præſtiterit herba ſucco prius abluiſſe. Eſt ſtamen contra ventris tēnias. Succus peſtis arcet cōtagia, atque etiam hauſtus, ſi iam morbus inuaſerit, liberat. Fit ex flore oleum ad canis rabioſi morſus, ad fiſtulas

stulas & parotidas, quibus illitus medetur. Visus aciem exacuit. Ieiuno sumpta dolorem dentium sedat, iure decocti colluto ore. Discutit grauedines. Partum, qui sine febre sit, accelerat. Nervorū vultu neribus impenitur. Præsumpta ebrietatem arcet. Intertriginem in itinere faciundo non sentient, qui ex vino biberint. Fastidia cū aceto mulso discutit. Iis qui ex morbis sese recolligunt, aluum ex aqua calida deiicit. Vomitiones cohibet. Dolores podagrar ac inflationes ventris sedat. Venena rabiosi canis morsu impressa elicit plagæ diutius illigata.

APPENDIX.

Recentiores sylvestris Betonica succum mirificè commendant in atterendo & educendo calculo, & medendis comitialibus. Altilis autem radicem contra pestis contagia vtilē esse tradunt. Hæc ob causam ex floribus etiam eiusdem, medicamentum conficiunt, quod Conseruam hodie vocāt, quod ad eundem usum adhibent.

DE COLCHICO. CAP. CXXXIIII.

Colchicon à necandis canibus nobis turchien. Ephemerum non lethale nobis lilium conuallium & grand muguet.

NOMINA.

Kολχικόν, ἢ ἐφήμερον Græcis: Bulbus agre Hermodactylis latinis, officinis & herbariis Hermodactylus. Etylus dicitur. Germanis Zeitloisē (Gallicè Mort Colchicā au chiē) Colchicum à Colchide veneni ferace, in cur dictū.

B. qua.

Ephemerum.

qua nascitur, nomen desumpsit. Dictum vero est Ephemerum, quoniam vno die sumptum interficiat, atque adeo ab altero Ephemero, quod minimè letale est, & de quo suo loco diximus, non solum figura, verumetiam facultatibus differt. Et si verò Ephemeron Colchicum etiam significet, tamen præcipuè id Ephemerò quòd veneno caret, hoc nomine intelligitur.

FORMA.

Autumni exitu florem subcandidum, crocino similem profert. Post florem folia Bulbo similia, pinguiora tamen. Caulem palmo altum, rufum ferentem semen. Radicem habentem corticem in nigro rufescentem, quæ cortice suo nudata, alba, tenera, succo plena, et dulcis inuenitur. Habet Bulbus eius in medio rimam fissuramve vnde flos erumpit. Huius descriptionis in vniuersum notæ omnes ita Hermodactylo nostro conueniunt, vt nemo, nisi Tiresiacior sit, Dioscoridis esse Colchicū ambigere possit. Exitu enim autumnii in pratis florem ædit albicātem, croci floribus similem. Posterius, Februario nimirum mense & primo statim vere, folia Bulbi, sed pinguiora. Caulem palmæum ferentem semen rufum. Radicem cortice in nigro, colore rufescente, quæ decorticata cādicat, teneraq; succo plena, & dulcis apparet. Bulbus etiam eiusdem diuisionem in medio obtinet, ex qua flos erumpit, vt pictura exquisitè tibi monstrat. His accedit, quod Serapio A-

rabs

rabs sub nomine Hermodactyli, Dioscoridis Colchicon prorsus depingat. Alium tamen esse à nostro Hermodactylo illum putamus, quem Aetius, Paulus Aegineta lib. vii. & Actuarius peculiariter & Græcorum. priuatim articulorum doloribus conducere scribunt. Paulus enim separatim tanquam diuersorum mentionem fecit, & de Colchico & Ephemero diuersa ab Hermodactylo capita constituit.

LOCVS.

Magnus Colchici in Messenia, & apud Colchos prouentus. Nascitur & passim in omnibus pratis Germaniæ nostræ. TEMPVS.

Flores in Autumni exitu, vt diximus, apparent. Folia autem post flores generantur, & primo statim vere è terra erumpunt. Semen in æstate Iunio potissimum mense producitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccū nonnulli Colchicum in secundo ordine, seu à medio recessu statuunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix eius comesta fungorum modo strangulando, enecat. Hanc autè depinximus, ne pro Bulbo deuorata aliquem lateat. Mirū est enim quantum ignaros propter suauitatem inuitet. Hæc Dioscorides. Proinde satis liquet Hermodactyli huius nostri vsum minimè tutum esse: venenum enim est, & vsq; ad sanguinis excretionem per inferna subducit. Eius tamen, radicis potissimum & foliorum, ad ene-

PLANTARVM HISTORIAE

candos ac abigendos pediculos vsus esse potest.

REMEDIA CONTRA COL- CHICVM.

Remedio sunt edētib^{us} quacūque cōtra fungos apem ferunt. Bubulum etiam lac potum, adeo vt quoties hoc affuerit, nullum praterca querendum praesidium sit. EX PAULO.

Ephemeron, quod nonnulli Colchicon, eò quòd in Colchide nascatur, vocant, aut Bulbum agrestem, epotum protinus totum corpus prurire facit, velut urtica & scilla tactū irritatumq; interiora erodit, stomachum vrit cum pōderosa gravitate. Inuale- scēte autē malo, cruenta strigmētis mista per aliū egeruntur. Succurrendum, vt Salamādrae, vomitio- nibus & clysterib. Sed antequā vires sibi adsciscat venenum, dari debet foliorum quercus, aut glādiū, aut malicorii, aut serpylli decoctum cum lacte bi- bendū: aut Polygonii succus, aut surculorum vitis, aut rubi, aut tenerarū ferularū medulla, aut myrti cum vino. Benefacit etiam castanearū interior tu- nicula, si cū aliquo ē succis, quos praediximus, assue- matur. Origanū quoque cū lixiuia potum, in idem efficax est. Adeo verò exactum praesidium est lac vaccinum calidum potum, & simul in ore cōten- tum, vt hoc praesente nullum aliud desideretur.

DE CLEMATIDE DAPH-

NOIDE CAP. CXXXV.

Clematis nobis Peruinca dicitur.

NOMINA.

Kληματὶς δαφνοειδὴς Græcis, Clematis
 Daphnoides latinis, Peruica officinis, Vinca
 peruinca vulgò nominatur. Germ. eò quod semper
 vireat, Yngrun, vel Syngrun, (Gallicè Du Lifs Clematis
 seron.) Clematida Græci, quoniam κλήματα, vnde di-
 hoc est, sarmenta seu viticulas per terram spargat, ἔτα Daph-
 dixerūt. Daphnoida verò à foliorum Lauri, quam noides.
 eius folia habent figura. Plinius lib. xxiiij. cap. xv.
 Clematida Aegyptiam nominat: libro autem xxi.
 cap. xi. Vincam peruincā, aliòque nomine Chamæ-
 daphnē dici tradit, quòd scilicet humilis videatur Chamæ-
 Laurus, vt nomen sonat. Non est autē cur eā Cha- daphne.
 mædaphnē putes, quæ Romanis Laureola aut Lau-
 rago dicta est, hæc enim à Vincaperuinca genere
 & facultatibus diuersa est, & seorsim illam Cha-
 mædaphnen depingit Plinius lib. xxiiij. cap. xv. vt
 hinc manifestissimum sit Plinio duplicē esse Cha-
 mædaphnen. Vnā quam sic appellant Dioscorides, Plinio du-
 Galenus, & alii Græci. Alteram quam priuatim plex Cha-
 Vincamperuinca alio nomine vocat Plinius. Sic mædaph-
 autem, quod humi serpat, & se in modum funiculi ne-
 porrigat vicina quæq; vinciens, appellat.

FORMA.

Sarmenta oblonga habet, iunceæ crassitudinis.
 Folium exiguum, Lauro figura & colore simile,
 multò tamen minus. Iam si quis imaginem & ef-
 figiem Clematidis Daphnoidis exquisitus explo-

PLANTARVM HISTORIAE

Vincaper ret, ea deprehēdetur esse quæ hodie vulgò *Vincæ*
uinca. *peruinca* nominatur. Hæc enī humiles & graciles
 spargit iuncos, foliaq; *Lauri* figura et colore obtinet,
 multò tamē minora: flore hyacinthino seu in purpu
 ræcæruleo, inodoro, rotundo, foliis quinq; sed conti
 nuis distincto. Ea etiam, ut *Plinius* ait, semper vi
 ret, in modum lineæ foliis geniculatim circumdata.
Hybernas sua perpetua fronde texit coronas.

LOCVS.

Gignitur pingui, umbroso, lætoq; solo, sed inculto,
 in agrum vinearumq; marginibus.

TEMPVS.

Hæc etsi nunquam non virescat, vere tamē dun
 taxat florescere videtur, Martio potissimum mense
 & Aprili.

TEMPERAMENTVM.

Siccitas in *Clematide*, *Paulo Aegineta* teste, cæ
 teris qualitatibus præualet. Id quod gustus etiam
 ostendit: gustanti enim adstrictionem quandam &
 amarorem habere videtur. Adstringit autem mo
 dicè, sed fortiter amara est. Siccat itaque, at citra
 mordicationem.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius, caules ac folia in vino pota, alui proflus
 uia & dysenterias finiunt. Vteri dolores cū lacte
 & rosaceo, aut cyprino in pessa apposita sanant. Cō
 manducata dentium dolorem mitigant. Venena
 torum morsibus imposita prosunt. Feruntur & ac
 spidum

spidum morsibus cum aceto pota auxiliari.

EX GALENO.

Clematis daphnoides nequaquam est exulceratoria, neque acris, imò alui profluvii & dysenterii cum vino pota prodest, dentiumque dolores mansa mitigat. Vteri doloribus in pessa admodum vsui est, tantum abest ut vrat aut vlceret.

EX PAVLO.

Clematis quibusdam Daphnoides, aliis Myrsinoides, nonnullis Polygonoides, sarmenta habet prælonga, crassitudine iunci, folium verò Lauri. Siccan di facultate pollet, qua alui fluores, difficultates intestinorum, & dentium dolores finit. Contra venenatorum morsus prodest.

APPENDIX.

Iam commemoratæ facultates satis ostendunt Clematida daphnoida esse Vincamperuincam: nam codex antiquus manuscriptus, quæ in rebus dubiis lumbens cito & sequor, easdem prorsus vires Peruincæ tribuit. Sanguinis enim è naribus profluvio mirum in modum prodesse tradit. Item ijs qui sanguinem vomunt aut spuunt. In summa omnem sanguinis fluxum folia eius sistere asserit, ita ut evidentiissimum sit Peruincam officinarum eandem esse cum Clematide hac nostra. Quibus etiam accedit pictura & descriptio eiusdè, quæ utraque adamussim Peruincæ nostræ respondent.

Cardamum idest nasturtium narbonensibus nascitur, à naribus torquendis dicitur nobis cresson alenois.

NOMINA.

Cressio
hortensis.
Cardamū
vnde dicitur.
Etum.

Kαρδαμουν Græcè, Nasturtium satiuū latinè dicitur. Officinis latinū nomen retinuit. Barbari nostræ ætatis herbarii Cressionē hortensem vocant. Germanicè Gartenkresz (Gallicè Cresson alenoys, ou nasitort) dicitur. Cardamum verò Græcis nonnulli dictum esse arbitrantur, ἀπὸ τοῦ καρδίας, quòd cor foueat, & in syncope illa, quæ Cardiacam nominant, plurimum valeat. Alij diuersa ratione vsi, sic dictum quòd caput edomet, quasi καρπὸν ἀμυν, putant. Nam arcem mentis obsidens suo ferit acremento, & ignea vi præditum caput tentat. Sunt è Græcis qui τὰ καρδὰ τὸ νοεῖν μύειν, id est, quòd pupillas oculorum cœuntibus vnà palpebris abscondat, ita dici censeant. Nam luminibus admotum subinde cogit conuiuere. A quo, vt volūt, euentu καρδαμύττειν verbum declinarūt, quòd conuiuere nostra lingua dicimus. Nasturtium autem appellatum est, Varrone & Plinio testibus, à naribus torquendis, quòd odore & seminis acrimonia sternutamenta prouocet.

καρδαμύττειν.
Nasturtiū
quare appellatum.

FORMA.

Nasturtium caulibus assurgit sesquipedalibus, statim à radice minorum foliorum pediculo, floribus

ribus candidis semine per ramorum latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore.

LOCVS.

Passim in hortis satum prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimum mense. Sequenti tempore semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Nasturtii semē calefacit et desiccatur ordine quarto. Herba quoque sicca similem semini facultatem possidet. Humida autem adhuc & viridis propter aqueæ humiditatis admistionē multò inferior est, adeoque sic mordacitas eius moderata est, vt cum pane ea vti liceat cœu opsonio.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Omnium semen calefacit, acre est, & stomacho inimicum. Aluum turbat. Lumbricos pellit. Lienē imminuit. Fœtus in vtero enecat. Menses cit. Venærem excitat. Sinapis & Erucæ semini simile est. Lepras & impetigines abstergit. Lienem illitum cum melle extenuat & reprimat, & fauos expurgat. Sorbitionibus incoctū ea quæ in thorace sunt educit. Potum serpentibus aduersatur. Suffitu easdem fugat. Capillos deciduos continet, Carbunculos rumpit ad suppurationem ducens. Ischiadicis cum polenta & aceto illitum confert. Oedemata & inflamationes discutit. Furunculos cum muria illitum ad suppurationes ducit. Herba omnia eadem

PLANTARVM HISTORIAE

dem, sed minore effectu, potest.

EX GALENO.

Nasturtii semen adurentis est facultatis par-
ticeps sicut sinapi. Proinde coxendicis & capitis do-
lores, atque adco quodcunque rubrificationem po-
stulat, eo perinde atque Sinapi excalefaciunt. mis-
cetur quoque remediis quæ exhibentur asthmati-
cis, tanquam id quod crassos humores valenter in-
cidere valet, velut et Sinapi. Nam per omnia ei si-
mile est. EX PLINIO.

Nasturtium Venerem stimulat, animum exa-
cuit, aluum purgat. Detrahit bilem potum in aqua
decem denariorum pondo. Cum lomento strumis illi-
tum, opertumq; Brassica, præclare medetur. Capitis
vitia purgat, visum clarificat. Commotas mentes
sedat ex aceto sumptum. Lienem ex vino potũ, vel
cũ fico extenuat. Tussim ex melle, si quotidie ieiun-
ni sumant. Semen ex vino omnia intestinorum ani-
malia expellit, efficacius addito Mentastro. Prodest
& contra suspiria cum Origano & vino dulci. Pe-
ctoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos
discutit cum pice, extrahitq; corpori aculeos. Et ma-
culas illitũ ex aceto. Cõtra carcinomata adiiçitur
ouorũ album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infan-
tibus verò è melle vtilissimè. Sestius adiicit hoc
serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolo-
res contritum & alopecias emendare addito Sina-
pi: grauitatem aurium trito imposito auribus cum
fico.

fico. Dētiū dolores infuso in aures succo. Porrigie-
nem & vlcera capitis cum adipe anserino. Furuncu-
culos concoquit cum fermento. Carbūculos ad sup-
purationem perducit & rumpit. Phagedanas vlce-
rum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis
cum polēta ex aceto illinitur. Item licheni & vne-
guibus scabris: quippe natura eius caustica est.

DE CRINO. CAP. CXXXVII.

Lilium nomē retinet. Est nobis & Lilium
rubrum, vulgò dictum à floris colore in
flauum inclināte, radice bulbosa, sed cro-
cea quod hic croceum vocat.

NOMINA.

Πίον, καὶ Λείριον Græcis, Lilium siue Iu-

K nonis rosa Latinis, Lilium album officinis,

Vueilz Lilgen, oder Gilgen Germanis,

(Gallicè Du lis) dicitur. Veteres Græcorum poetae

singunt è Iunonis lacte respersa terra natū Lilium.

Nanq; cū Hercules puer, quem ex Alcmene sustu-

lerat Iupiter, Iunonis dormiētis vberibus admotus

esset, & lacte se repleisset, post suclū digressus mā-

ma lactē copiose profluxit. Quod in caelo à puero

vago & incerto suclū perfusum est, lacteam effecit

viam: quod humi sparsum est, Lilium lacteo flore

nitentem creauit, vnde rosa Iunonis dictum.

FORMA.

Lilium caule simplici, rarò duplici, tricubitali, co-

moso, foliis longis, Satyrj effigie, ex herbaceo ni-

tentibus,

Iunonis
rosa qua-
re dictum
Lilium.

PLANTARVM HISTORIAE

dem, sed minore effectu, potest.

EX GALENO.

Nasturtii semen adurentis est facultatis par-
ticeps sicut sinapi. Proinde coxendicis & capitis do-
lores, atque adeò quodcunque rubrificationem po-
stulat, eo perinde atque Sinapi excalefaciunt. mis-
cetur quoque remediis quæ exhibentur asthmati-
cis, tanquam id quod crassos humores valenter in-
cidere valet, velut et Sinapi. Nam per omnia ei si-
mile est. EX PLINIO.

Nasturtium Venerem stimulat, animum exa-
cuit, aluum purgat. Detrahit bilem potum in aqua
decem denariorum pondo. Cum lomento strumis illi-
tum, opertumq; Brassica, præclarè medetur. Capitis
vitia purgat, visum clarificat. Commotas mentes
sedat ex aceto sumptum. Lienem ex vino potũ, vel
cũ fico extenuat. Tussim ex melle, si quotidie icium-
ni sumant. Semen ex vino omnia intestinorum ani-
malia expellit, efficacius addito Mentastro. Prodest
& contra suspiria cum Origano & vino dulci. Pe-
ctoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos
discutit cum pice, extrahitq; corpori aculeos. Et ma-
culas illitũ ex aceto. Cõtra carcinomata adiicitur
ouorũ album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infan-
tibus verò è melle vtilissimè. Sestius adiicit hoc
serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolo-
res contritum & alopecias emendare addito Sina-
pi: grauitatem aurium trito imposito auribus cum
fico.

fico. Dētiū dolores infuso in aures succo. Porrigie-
nem & vlcera capitis cum adipe anserino. Furuncu-
culos concoquit cum fermento. Carbūculos ad sup-
purationem perducit & rumpit. Phagedanas vlce-
rum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis
cum polēta ex aceto illinitur. Item licheni & vne-
guibus scabris: quippe natura eius caustica est.

DE CRINO. CAP. CXXXVII.

Lilium nomē retinet. Est nobis & Lilium
rubrum, vulgò dictum à floris colore in
flauum inclināte, radice bulbosa, sed cro-
cea quod hic croceum vocat.

NOMINA.

Πῖνον, καὶ Λείριον Græcis, Lilium siue Iu-
K nonis rosa Latinis, Lilium album officinis,
Vueiſz Lilgen, oder Gilgen Germanis,

(Gallicè Du lis) dicitur. Veteres Græcorum poætæ
singunt è Iunonis lacte respersa terra natū Lilium. Iunonis
Nanq; cū Hercules puer, quem ex Alcмене sustu rosa qua-
lerat Iupiter, Iunonis dormiētis vberibus admotus re dictum
esset, & lacte se repleſſet, post suctū digressus mā- Lilium.
ma lactē copiose profluxit. Quod in cælo à puero
vago & incerto suctu perfusum est, lacteam effecit
viam: quod humi sparsum est, Lilium lacteo flore
nitentem creauit, vnde rosa Iunonis dictum.

FORMA.

Lilium caule simplici, varò duplici, tricubitali, co-
moso, foliis longis, Satyrū effigie, ex herbaceo nis-
tentibus,

PLANTARVM HISTORIAE

rentibus, flore eximij cādoris, foliis foris striatis, & ab angustis in latitudinem se paulatim laxatibus, forma calathi, resupinis per ambitū labris, luteis emicantibus ex fundo calycis apicibus, alterius quā flos odoris, constat. Flos ille languido semper collo est, non sufficiēte capitis oneri. Radix bulbosa. Hæc descriptio planè huic Lilio conuenit, quod hodie cādidum vocamus. Nos alterius etiam generis picturam adiecimus, quod Croceum appellauimus, à flore eius, qui non, vt in priore, candidus, sed croceus est. Folia quoque eius angustiora sunt quàm prioris, aliàs simile, vt pictura luculenter ostendit.

LOCVS.

Pasim apud nos in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret initio mensis Iunij.

TEMPERAMENTVM.

Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utique in gustu amaritudinē habet, partim ex aquea, eaque tēperata. Radix autem & folia primi ordinis sunt exiccantium & abstergentiū. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quàm in foliis.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Lirinum
oleum.

Ex Lilij flore vnguentum fit quod ab aliis Lirinum, ab aliis Susinum appellatur, ad emolliendos nervos, priuatimq; vulnarum durities aptum. Folia herbae illita, serpentium morsibus subueniunt. Feruēfacta

uefacta ambustis profunt. Eadem in aceto condita vulneribus opitulantur. Succus foliorum cum aceto & melle in aereo vase coctus, contra vetusta ulcera, & recentia vulnera medicamentum fit. Radix assa, aut cum rosaceo trita ambustis medetur, vuluā emollit, mēstrua ducit, & vlceribus cicatricem inducit. Cum melle subacta nervorū præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphos, lepras, furfuresq; emēdat. Achores abstergit, faciemq; emēdat et erugat. Testiculorū inflāmationes trita cum aceto, aut Hyoscyami foliis, & farina triticea demulcet. Semen cōtra serpentium morsus potū valet. Illinūtur sacris ignibus semen & folia cum vino trita.

EX GALENO.

Quod ex flore Lilij conficitur oleum & vnguentum, citra mordicationem digerendi simulq; emolliendi facultatē obtinet. Vnde fit vt vteri durities bus sit aptissimum. Porrò radix foliaq; per se trita desiccant, & abstergunt, & digerūt moderatē: proinde quoq; ambustis cōpetunt: siquidem hæc quoq; moderatē desiccantem extergentemq; facultatem postulant. Radicem ergo assam tostāmue, ac deinde cum rosaceo contritam, ambustis quoad obducatur cicatrix imponūt: quippe cum alioqui & aliorum vlcerum omnium bonum sit inducenda cicatrici remedium. Quinetiam vteros emollit, mensesque prouocat. Folia verò præcoquentes, & ipsa ad obductam vsque cicatricem imponunt, non

PLANTARVM HISTORIAE

in ambustionibus duntaxat, sed aliis quoque vulneribus. Sed sunt qui aceto ea condicentes ad vulnera suo tempore vtantur. Quum alphos, aut pforā, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi mel est. Cæterum si id moderatè illi ac cōuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa quæ valenter exiccari postulant absque morſu. Imposuimus verò etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus utroq; erat, atque insigne medicamen ad omnia ea quæ exiccari postulāt absque morſu fuit, cetera vulnera omnia ingentia, & maximè quæ in capitibus muscutorum eueniunt, & quæcunque humida flaccidæ, diuturna & ægrè ad cicatricem perducuntur.

EX PLINIO.

Lilij radices multis modis florem suum nobilitauerunt, contra serpentium iētus ex vino potæ, & cōtra fungorum venena. Propter clauos pedum in vino decoquuntur, triduoq; non soluuntur. Cum adipe aut olco decoctæ pilos adustis reddunt. E mulso potæ inutilem sanguinem cum alio trahūt. Lienis & ruptis & vulsis prosunt. Et menstruis fœminarum in vino decoctæ. Impositæq; cum melle neruis præcisus medentur. Lichenas, lepras & fursures in facie emendant. Erugāt corpora. Folia in aceto cocta
vulne-

vulneribus imponuntur. Epiphoris testium in mele cum Hyoscyamo & farina tritici. Semen illinitur igni sacro. Flos & folia vlcerum vetustati imponuntur. Succus qui flore expressus est, ab aliis mel, ab aliis syrium vocatur, ad emolliendas vulvas uti-
lis. Sudores mouet, suppurationes concoquit.

EX SIMEONE SETHI.

Odoratum frigido capiti prodest. Oleum verò quod ex ipso paratur, vim habet discutiendi, & emolliendi. Huius autem radice quidam vtuntur ad vulnerum sanationem.

DE CUCURBITA SATIVA.

CAP. CXXXVIII.

Cucurbita lata longa & minor quæ nobis lagenosa dicitur, est frequens.

NOMINA.

Κολοκύνθα ἐρώσιμος Græcis, Cucurbita

K Latinis vocatur: Officinæ latinū nomen retinuerunt. Germanis Kurbisz (Gallicè vne

Courge.) Græci ex aduerso vocabulum imposuerunt, Κολοκύνθω nominantes, quòd scilicet pumili breuesque sint partus, quos ipsa passim enititur, cū tamen corporis mole omnes herbarum arborumve fructus videantur superare. Cucurbitam verò Lata.

tini à concuruatu haud dubiè dixerunt, quòd facile si quid obstiterit aut fuerit impedimēto quo minus extendatur, incurvescat.

κολοκύνθα quare nominata. Cucurbita cur dicta.

PLANTARVM HISTORIAE

GENERA.

Plinius lib. 19. cap. 5. duo (latina Cucurbita genera facit. Vnam camerariam vocatam, quae facile & admodum flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas & testudines operit. Alteram plebeiam, quae scilicet suis flagellis humi repit. Nos ad formam respicientes tria eiusdem genera fecimus. Vnam maiorem, alteram verò minorem. Maiorem vocauimus, sic à floribus & fructu, quos maiores habet. Minorem cōtrā, quae praedicta minora obtinet. Tertiam longiorem, à fructu oblongiore diximus.

FORMA.

Cucurbita amplexicaulis est, reptantibus flagellis in altum scandens, in ramosque vitis modo se diffundit: tamen ob caulis infirmitatem, humi spargitur, ni propius adsit cui caducus innitatur: folio rotundo, Personatae aut Asari foliis haud dissimili: flore candido, fructu coloris herbacei primum, flauo paulò post, pyri forma turbinato, qui aut in longum prorogatur, aut in orbem collectus intumescit, aut in breue crassamentum cogitur. Cortex recenti tener, inueterato durus, quo carne prius exinanito peregrè proficiscentes vrceorum vice frequenter vuntur in eo vina condentes, quo per iter se à sitis iniuria vindicare possint.

LOCVS.

Amat rigua & aquosa loca Cucurbita, nec nisi sata prouenit.

TEMPVS.

Tardius in Germania ob soli frigiditatem fructus Cucurbitæ maturefcit, ideoque vix ante exactum autumnum maturum eius fructum inuenies. Cibus autem quotidianus, donec lignescat, esse potest.

TEMPERAMENTVM,

Cucurbita frigida humidaq; temperatura est, vtraque qualitate secundi ordinis.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Cucurbita cruda trita & illita, ædemata, abscessusq; mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam siriasin vocant, in sincipite vtiliter illinuntur. Oculorum inflammationes, podagrâsq; similiter inuant. Succus è ramentis contusus per se, & cum rosaceo instillatus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis inunctus adiuvat. Totius Cucurbitæ elixæ & expressæ succus cum exiguo melle & nitro potus, aluum leniter soluit. Si quis in Cucurbitam crudam excavatam vinum infundat, & sub dio habeat, temperatumq; ieiunus bibat, aluum leniter molliet.

EX GALENO.

Succus ramentorum Cucurbitæ ad aurium dolores cum phlegmone inunctos, cum rosaceo vtentibus prodest. Sic tota quoque illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. Comesta humida est, & sitim arcet. Cruda cibo insuauis est, stomacho perniciofa,

eiosa, & concoctus planè inexpugnabilis, adeò vt si quis alterius cibi inopia ingerere eam cōpellatur, ceteri quidam iam ausus est, pondus cum algore ventriculo incumbere sit sensurus, stomachumq; euer-
tet, & ad vomitionem concitabit, quæ vna cum ab urgentibus symptomatis liberare potest. Hanc igitur, aliaq; ex fugacibus complura, aut mox quam elixata est, aut fricta in sartagine, aut assam omnes homines esse consueverunt. Ipsa quantum in se est, humidum frigidumq; corpori alimentum præbet, ac id ipsum ea de causa exiguum, sed leniter per alium subit, cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob communem omnium humidorum ciborum rationem, qui scilicet citra adstrictiones tales sunt. Nec sanè infeliciter concoquitur, modò non anteuertat corruptio. Plura lib. ij. de aliment. facul. Galenus.

EX PLINIO VALERIANO.

Veteres medici de Cucurbita ita senserunt, vt eam aquam dicerent coagulata. Galenus humida putat virtutis & frigide, idq; ex eo probat, quòd ipsa in cibo sumpta stomachum relaxat, bibendi desideria non excitat. Cetera etiam in Cucurbita talia, vt apertè frigida potestatis exempla demonstrat. Cruda & trita leniunt omnem tumorem. In cibo sumpta molliunt ventrem. Succus eorum, vt Galenus ait, ad compescendum velociter auriculæ dolorem tepesactus infunditur. Idem succus & dolorem dentium mitigat, si diutius in ore teneatur.

Sed.

Sed & rosaceo mixtus, & vñctioni corporis admo-
tus, februm restinguit ardores. Cinis aridæ corticis
efficaciter potest combusta sanare. Eundem cine-
rem didicimus ab expertis vulnera in veretro iam
in putredinem versa purgare, & ad cicatricem vs-
que perducere. Semini sicco illa vis traditur, vt in
puluerẽ tusum & inspersum impleat vulnera quæ
cauata sunt. Quidam illud in vino bibendum dede-
re, vt solutiones alui fluentis inhiheret. Viticulæ
quoque Cucurbitæ iam senescentes cum passo &
aceto dysentericis datæ, miro modo saucia intesti-
na componunt.

EX SIMEONE SETHI.

Concoctus facilis, bñiq; succi est, & admodum
nutrit. Sitim sedat, vrinam cit, & ventrem mouet.
Calidis & siccis temperaturis prodest, & inflāma-
tiones ventris & iecoris sedat. Pituïtosos autem læ-
dit, colicósque affectus. Si malos humores assequi-
tur, ab iis corrūpitur, & malum succum generat.
Semen genitale minuit, & Veneris appetentiã ex-
tinguit. Sanguis ex ea procreatus, cōsistentia tenuis
est. Thoraci, pulmōni & vesicæ prodest. Succus ra-
mentorum eius cum rosaceo impositus, ad aures in-
flammatione laborantes confert. Integra verò illi-
ta, calidas inflammationes refrigerat.

DE COLOCYNTHIDE.

CAP. CXXXIX.

Colocynthis nomen retinet nobis.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Coloquin-
tida.

Kολοκυνθὶς Græcis, sylvestris Cucurbita La-
tinis, Coloquintida barbaris & officinis, ger-
manis Vuilder Kurbisz, vel Coloquint (Gallicè
des Coloquintes) appellatur. Sic autem nomi-

Colocyn- nata est, quasi parua Cucurbita. Nam si eius fru-
this vnde etum satina contuleris, quantitate longè minor e-
dicta. rit, ac pilæ forma in orbem coactus.

FORMA.

Vitículas foliaq; per terram strata emittit, satiz-
uo Cucumeri, ei nimirum quæ Citrulum hodie offi-
cina vocant, similia, diuisuris scissa, fructum rotun-
dum, mediocri pilæ similem, vehementer amarum,
fungosa candidaq; intus medulla: flores, quod Dio-
scorides omisit, pallescētes ac luteos, Cucumeri iam
nominato similes.

LOCVS.

In Germania sua sponte non nascitur, sata tamen
prouenit, sed rarissimè perfectionem attingit, quòd
frigidior sit eius terra quàm quòd in ea fructū pro-
ferre possit. In orientalibus en. m & calidioribus
locis nata ad nos defertur.

TEMPVS.

Eius flores in fine ferè æstatis, fructus autem ex-
tremo autumno apparent, qui primum quidem her-
bacei, mox pallidi sunt. Legēdi verò sunt cū cœ-
perint in pallidiorem colorem demutari. Et durat
integræ natura & viribus ad quinque annos.

TEMPE.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Medulla fructus purgandi vim habet, quatuor obolorū pondere cum mulsā aqua sumpta, & cum nitro, myrrha & melle coacta in catapotiiū. Arefacta pile trita, vtiliter miscetur clysteribus ischiadicorum, resolutionis nervorum, & colico dolore affectorum, pituitam, bilem & strigmenta, interdū etiam cruenta educentes. Apposita fetus enecant. Dentium dolores, si quis repurget hanc, & luto oblinat, & in aceto nitroq; inferuescat, & ad colluendos dentes det, tollit. Si verò quis aquam mulsam aut passum in ea decoxerit, & sub dio refrigeratū bibendum dederit, crassos humores & strigmenta purgat. Stomacho supra modum aduersatur. Sedi etiam ex ea balani subiiciuntur, ad excrementa eiicienda. Quinetiam virentis succo, ischiadici vtiliter perfricantur.

EX GALENO.

Colocynthis gustu amara est. Sed quæ amarissimo dū potatur adsunt opera medicamentō, ea euidēter efficere nequit, ob purgatoriā facultatem quā validam in se continet, nimirum cum iis quæ expurgat, per aluum & ipsa excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadicis prodest.

EX PLINIO.

Herbacea arefacta per se inanit aluum. Infusa

PLANTARVM HISTORIAE

quoque clysteribus intestinorū omnium vitiis me-
detur, & renum, & lumborum, & paralyſi ciec-
to ſemine. Aqua mulſa in ea decoquitur ad dimidias,
ſic tuſſienti inſunditur obolis quatuor. Prodeſt &
ſtomacho, farina arida pilulis cum decocto melle
ſumptis. In morbo verò regio utiliter ſemina eius
inſumuntur, & protinus aqua mulſa. Carnes eius
cum abſinthio & ſale dentium dolorē tollunt. Suc-
cus verò cum aceto calefactus mobiles ſiſtit. Item
ſpina & lumborum ac coxarum dolores, cum oleo
ſi inſricetur. Præterea, mirum dictu, ſemina eius ſi
fuerint pari numero adalligata febribus, ſanare di-
cuntur quas Græci periodicas vocant.

DE COTONEA MALO.

CAP. CXL.

NOMINA.

Κυδωνία μηλιά Græcis, Mâlus Cotonea
K et Cydonia Latinis, officinis Citonia, ger-
manis Kuttentbau (Gallicè Vne Coin

Cydonia gnaciere) nominatur. Cydoniam verò Græci à Cy-
vnde di- done Cretæ oppido, vnde primum aduecta eſt, dixe-
cta. runt. Cotonea verò à Sidonte Corinthi vico nomi-
Cotonea. nata eſt. Sunt tamen qui ſic vocatam velint, quòd
mâla eius lana quidam tegi videantur, quæ cotton
dicitur. Atqui in re non admodum magni momen-
ti, parum refert vtram amplectari ſententiam.

GENERA.

Cotonea arboris mâla Dioſcoride & Galeno au-
toribus

toribus duum sunt generum. Alia enim minora, rotunda, odoratioꝛaque sunt, quæ vera Cotonea appellantur. Alia autem maiora, dulciora, ac minus acerba, Galeno in fine libri sexti de tuenda sanitate teste, Struthea nuncupantur.

Struthea.

FORMA.

Arbor notior est quàm vt debeat representari. Mâlo vulgari haud dissimilis est, nisi quòd infra magnitudinem illius subsidet, fructu scilicet incuruatos deprimente ramos, prohibentéque parentem crescere. Folium quoque eius angustius à terra albicat. Poma tenui lanugine pubescunt, & incisuris crispantur, vt pictura affabrè ostendit.

LOCVS.

In cultis & hortis provenit. Locum tamen peculiariter & frigidum & humidum desiderat. Si in calido statuitur assidua irrigatione illi succurri oportus est: fert tamen mediocris situs, inter frigoris & caloris naturam, statum. Planis & decliuis gaudet.

TEMPVS.

Autumno poma eius maturescunt.

TEMPERAMENTVM.

Mâla Cotonea frigido & terrestri temperamento donata sunt, propterq; vincentem adstrictionem minus cæteris mâlis humida existunt. Frigida itaque sunt primo ordine, & sicca secundo.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Cotonea stomacho accommodata sunt, vrinam

C iij mouent.

PLANTARVM HISTORIAE

mouent, Tosta mitiora fiunt. Cœliacis, dysentericis,
 purulenta excreantibus, cholericis prosunt, præse-
 tim cruda. Maceratorum liquor potus stomachi at-
 que alui fluxionibus opitulatur. Succus crudorum
 assumptus orthopnoicis auxilio est. Decocto eorum
 sedes & vuluæ procidentes proluuntur. Quæ melle
 condiuntur, vrinam ciēt, mel autem naturā eorum
 induit: quippe adstringens & cōspissans obstruēsvē
 fit. Quæ autem cum melle coquuntur, stomacho uti-
 lia sunt, & gustu iucunda, minus autem constri-
 gunt. Cruda cataplasmatibus miscentur ad cohiben-
 dam aluum, contrāque stomachi subuersionem: &
 ardorem, mammarum inflammationes, lienes indu-
 ratos & condylomata. Fit vinum ex iis tuis & ex-
 pressis, sed quo perduret, sedecim sextariis succi, vo-
 nus mellis adiicitur, alioqui acescit. Prodest autem
 Vnguentū ad omnia quæ dicta sunt. Vnguētum etiam ex ipsis
 Melinum. conficitur, quod Melinum appellatur, quo utimur
 quādo adstringēti oleo opus est. Eligi oportet vera,
 quæ parua, rotunda & odorata sunt. Struthea autē
 vocata & magna, minus utilia. Flos & viridis &
 siccus cataplasmatibus utilis, iis potissimum quæ ad-
 strictionem desiderant conueniēs. Inflammationib.
 oculorum, sanguinis reiectionibus, alui fluxionibus,
 mensiumq; impetui cum vino potus prodest.

EX GALENO.

Eximiū quid Cotonca præ aliis malis possident:
 nam & plus adstringūt, & durabilem succum ha-
 bent,

bēt, si cocta cum melle asseruare quis cupiat. Aliorum succus repositus acescit, utpote frigida humiditate multa redundans. Struthaeorum quoque succus perennare potest, ubi recte fuerit preparatus, quemadmodum & Cotoncorum: verum hic minus suavis & incundus est, maximeque adstringit, ita ut huius quoque aliquando usus sit idoneus ad vetricis maiorem in modum dissoluti robur restituendum.

EX PLINIO.

Cotonea cocta suauiora. Cruda tamen duntaxat matura, prosunt sanguinem excreantibus, ac dysentericis, cholericis, coeliacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt constringentem illam vim succi. Imponuntur & pectori in febris ardoribus, & tum decoquuntur in aqua, ad eadem quae supra scripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda decocta uel cerati modo imponuntur. Lanugo eorum carbunculos sanat, cocta in vino, & illita cum cera. Alopeciis capillum reddunt. Quae ex iis cruda in melle cōdiuntur, urinam mouent. Mellis autē suauitati multum adiiciunt, stomachoque id utilius faciunt. Quae uerò in melle cōdiuntur cocta, quidam ad stomachi vitia trita cum rosaceo foliis decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lienibus, orthopnoicis, hydropicis prodest. Item mammis, condylomatibus, varicibus. Flos & viridis & siccus, inflammationibus oculorum, excreationibus sanguinis, menfibz mulierum. Fit & succus ex iis mitis, cum vi-

PLANTARVM HISTORIAE

no dulci tusus, utilis & coeliacis & iecinori. Deco-
cto quoque eorum fouentur, si procidant vuluæ &
interanea. Fit & oleum ex iis, quod Melinum vo-
cauimus, quoties non fuerint in humidis nata. Mi-
nus utilia Struthea, quamuis cognata.

EX SIMEONE SETHI.

Stomachū adstringunt & corroborant & ante
cibum sumpta ventrē cohibent, urinam prouocāt.
Si ad satietatem edantur, difficulter cōcoquuntur.
Dulcia minus adstringunt, acida verò magis, vomī-
tūque compescunt. Post cibum sumpta ventrem
mouent: sed quibus est imbecilla facultas vētris re-
tentrix, & excretrix valida, plus cibi accipiant.
Mansa à potu vini vaporē in caput distribui pro-
hibent. Si qua pręgnans, vt fertur, crebrius hæc co-
medat, puerum industrium & versutum pariet.

DE CASTANEA. CAP. CXLI.

NOMINA.

ἀσωνα, ἢ διὸς βάλανος, ἢ σαρδιάννα

K βάλανος, ἢ λόπιμον Græcis: Casta-
nea, Sardoniana glans, Iouis glans, Nuxq;

castanea Latinis appellatur. Germanis nostris Ca-
stani, vel Kesten (Gallicè Chastaignier) vocā-

Castaneæ tur. Castaneæ autem à Castano Magnesiæ oppido,
vnde di- vnde primum aduectæ sunt, nominatas esse cōstat.
Etæ. Sardonianæ verò glandes, quoniam in Sardinia opti-

Sardonianæ mæ nascantur.

FORMA.

glandes. Arbor est vulgò cognita, Iuglandi handquaquā
dissimilis.

disimilis, folio tātū venosiore & fimbriato. Nux
quam producit intus solida, & plurimum plana,
triplici tegminis ambitu septa, membrana primum
amara, mox lento cortice, demum echinato calyce.

LOCVS.

Puram & resolutam terram desiderat, opacoq;
& septentrionali cliuo letatur. Montes & valles
diligat. In plerisque Germaniæ locis copiosissima
provenit.

TEMPVS.

Incunte vere germinat, seriusq; Vergiliarum oc-
casu fructificat.

TEMPERAMENTVM.

Adstringit & exiccat Castanea haud secus quā
aliæ glādes. Calida verò & sicca est primo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Castaneæ adstringunt, eademq; quæ glādes pos-
sunt. Potissimum autem quæ inter carnem & cor-
ticem membrana est. Caro his qui Ephemerō, hoc
est, Colchicon, biberunt, accommodata est.

EX GALENO.

Castaneæ inter omnes glandes principatū tenēt,
solæq; sylvestrium fructuum alimentum memora-
bile corporibus præbent.

EX PLINIO.

Castaneæ vehementer sistunt stomachi & ven-
tris fluxiones, sanguinem excreantibus prosunt, car-
nes alunt.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO VALERIANO.

Castaneæ ex omnibus fortissimum quidẽ cibum corpori præstant, sed qui difficilè concoquatur. Costæ autem in carbonibus, vel in fictili vase sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tuſſientib. profunt. Aqua in qua cum suo cortice decoquuntur, celiacis, dysentericis, sanguinemq; excreantibus bibenda haud inutiliter propinatur. Interior mēbrana quæ corticem fructumque discernit, ad tertiam partem decocta in aqua & potui oblata, mirè aluū fluentem refrenat, adeò vt Dioscorides putet etiam cathartico dato, per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquam necesse sit, purget.

EX SIMEONE SETHI.

Copiosum corpori alimentum præbent, tardè transeunt, & difficulter coquuntur. Crassum humorem, capitis dolorem, & flatum efficiunt, ventremq; sistunt. Si torreantur, aut siccentur, multum nocu-
menti deponunt.

APPENDIX.

Capitis dolores creant. Inflationes pariunt, concoctu difficiles. Tostæ tamen crudis innocentiores sunt. Arefactæ multum noxæ remittūt. Tritæ cum melle & sale rabiosorum canum morsibus imponuntur. Mammarum duritias discutiunt, cum hordeaceo polline & aceto impositæ, iisq; vino maceratis, & cum farina subactis, pessi vice vtuntur ad supprimendos menses.

DE CARYO BASILICO.

CAP. CXLII.

NOMINA.

Kάρυον βασιλικόν Græcis, Regia nux & Persica, Iuglânsq; Latinis: officinis nux simpliciter, Germanis Vuelschnusz (Gallicè Noix) appellatur. Κάρυον autem Græcis à capitis gra- Caryo vno uedine vocatam esse notissimum est. Nam folia ar- de Græci boris huius grauem expirant halitum, viresq; eius appella- in cerebrum penetrant, atque adco cos sopore ten- rint. tans lædit qui sub arbore decubuerint. Basilicā ve- Basilica et rò, Regiámve & Persicam, cò quòd è Perside pri Persica mum in Græciam à regibus delata sit, dictam esse cur dicta. constat. Iuglandem à iuuando & glande nomina- Iuglans. tam existimant.

FORMA.

Arbor est prægrandis, multis prælongisq; nixa radicibus, procero caudice, multis summatim ramis ingentibus brachiato, ad binum ternumve cubito- rum complexus sæpius crassescente, cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente, foliis latis, oblongis, è iucundo grauitèr subolentibus, patulámque iaculã- tibus umbram & insalubrem, per autumnum de- Umbra Iu ciduis. Verni temporis initio veluti quodã gestien- glãdis ar- te foliorum conceptu, panicula prælòga, collo squa- boris insa- matim compaëtili protracta, ordine nucis pineæ lubris. protuberat, dehiscitque. Flauescens statim quàm frondem facere cœpit, nutans caducáque prolabi- tur.

PLANTARVM HISTORIAE

tur. Tum super ramenti huius pediculum flos erumpit, totidémque calyculacea tegumenta quot flores petiolo contrahuntur, singulísque iis singulae includuntur nuces, multis munitae inuolucris. primū herbaceo cortice, mox ligneo putamine, dein tenui tunica. Crispi intus nuclei quadripartitò digerūtur, lignosa intercedente membrana.

LOCVS.

Montibus latatur, aquasq; odit. Passim in omnibus ferè Germania hortis prouenit.

TEMPVS.

Germinat post afflatum Fauonii, non cacumine vt maxima pars arborum, sed lateribus impulsò priore pullulo. Fructificat autumnò.

TEMPERAMENTVM.

Huius temperamentum ex virium enarratione patebit. Virides verò nuces primo ordine siccae, secundo verò calidae censentur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Nuces inglandes difficiles cõcoctu, stomacho inutilis, bilem augent, capitis dolorem faciunt, tussientibus inimicae. Ad vomitiones ieiunis in cibo vtilis. Praesumptae & à cibo comestae cum caricis & ruta letalib. venenis aduersantur. Largius esitatae latos lumbricos pellunt. Illinuntur mammarũ inflammationi, abscessibus, luxatisq; cum exiguo melle & ruta. Cum cepa verò, sale & melle, canis hominisque morsui conferunt. Tormina cum putamine suo cre-

matæ

mata & vmbilico admota sedant. Cortex combustus, tritusq; in vino & oleo, infantibus inunctus capillos elegantes efficit, alopeciasq; replet. Sistit menses crematum tritumq;, cū vino admotum quod intra nuces clauditur. Vetusarum autem nucum nucleoli illiri, gangrænas, carbunculos, ægilopas & alopecias commanducati & impositi celeriter sanant. Fit etiam ex iis contusis & expressis oleū. Recentes nuces stomacho minus nocent, dulciores enim sunt. Quam ob causam alliis miscentur, vt acrimoniam auferant. Illitu liuores quoque tollunt.

EX GALENO.

Arbor tum in germinibus, tū in foliis adstrictiorem quandam possidet. Cæterum euidentē & plurimam in nucis putamine recenti & sicco: proinde eo fullones quoque vtuntur. At nos ea exprimētes, succo similiter vt mororum & ruborum decocto in melle, vt stomatico medicamento vtimur, & ad omnia reliqua ad quæ modo dicti succi conueniunt. Porro nucis ipsius quod edendo est, oleosum est & tenuiū partiū, ideoq; etiam facile † exprimitur: & quo diutius recoditum fuerit, magis tale efficitur. † Aliās
 Quamobrem oleum ex ea inueterato exprimere licet: tunc sanè admodum discutiens fit, vt eo nonnulli ^{ἐκχολοῦ}
 gangrænas, & carbūculos, & ægilopas sanēt: nonnulli ^{του, in bi}
 li verò etiā ad nervos vulneratos vtūtur. Cæterum ^{lem vertia}
 si recens sit adstringentis nonnihil qualitatis quoque obtinet. At quod imperfectū est etiamdum, & ^{tur.}
 nondum.

PLANTARVM HISTORIAE

nondū siccum, veluti reliqui fructus omnes qui vi-
rides sunt plenum est semicoctæ humiditatis. Cor-
tex tamē eius ubi inaruit, tenuium partiū & exic-
catorium est medicamentum, morsus expers.

EX PLINIO.

Arborum ipsarum foliorūque vires, in cerebrū
penetrant, hocque minore momento, sed in cibis nu-
clei faciunt. Sunt autem recentes iucundiores, sic-
cæ vnguiniosiores, & stomacho inutiles, difficiles cō-
coctu, dolorem capitis inferentes, tussientibus inimi-
cæ, & vomituris ieiunis aptæ in tenasmo solo: tra-
hunt enim pituitam. Eadē præsumptæ venena he-
bētant. Item anginam cum ruta & oleo. Item ad-
uersantur cepis, leniuntq; earum saporem. Aurium
inflammationi imponuntur cum mellis exiguo. Itē
cum ruta mammis & luxatis. Cum cepa autē &
sale & melle, canis hominisq; morsui. Putamine nu-
cis iuglandis, dens cauus inuritur. Putamen combus-
tum tritumq; in oleo aut vino, infantium capite
peruncto, nutrit capillum: & ad alopecias sic vtun-
tur. Quo plures quis nuces ederit, hoc facilius ti-
neas pellit. Et quæ perueteres sunt nuces, gangranis
& carbunculis medentur. Item sugillatis. Cortex
iuglandium lichenū vitio & dysentericis prodest.
Folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuariis
Mithridatis maximi Régis densicti, Cn. Pompeius
inuenit in peculiari commentario ipsius manu com-
positionem antidoti, duabus nucibus siccis, Item si-

cis totidem, & ruta foliis viginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoq; canis morsus, nuclei à ieiuno homine commanducati illitiq;, præsentī remedio esse dicuntur.

EX PLINIO VALERIANO.

Nux viridis, vtpote adhuc aquatioris humoris, styptica & frigida virtute censetur. Potest denique & stomacho aliquid vigoris acquirere, & vētrem cū garo sumpta mollire. Nuces autem siccæ, duræ, cum caricis duabus, & viginti ruta foliis addito salis grano simul conteruntur, nullisq; venenis oppressi poterit ea die quisquis ieiunus accepit. Inter Calendas & Idus Iulij centum numero nuces statim vt arbori deceptæ sunt, cortice adherēte quasi santur: his admiscuntur aluminis scissi libræ tres, et in nouo fictili vase ponuntur: super hæc infunduntur olei boni libræ tres, & diligenter in loco neque humido, neque nimium sicco obruuntur, post nonaginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorū damna restituit.

EX SIMONE SETHI.

Virides ventrem mouent, quamobrem quidam ante cibū cum sapo comedūt. Facilius etiam quam amygdalæ concoquuntur, Aridæ in ore inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores sūt, si cum caricis edantur. Ferūt etiam eum qui nuces cum caricis & ruta ante reliquos cibos esitauerit,

non magnopere à venenatis medicamentis ledi. Cō
coquuntur facilè nuges in frigidis vētriculis, in ca-
lidis verò in bilem magis mutantur. Fauciū & ca-
pitis dolorem afferunt, & tusses augent. Ante alios
cibos sumpta, vomitum adiuvant. Ad satietatē co-
mestas, lumbricos educere scimus. Ad dentium pru-
ritum vtilēs sunt.

DE CALTHA. CAP. CXLIII.

Caltha seu calendula nobis Soulsie à sol-
sequio dicitur, quòd flos cum solis ortu
aperitur, & occasu clauditur.

NOMINA.

Quo nomine Græci plantam hanc appellaues-
rint, fateor ingenuè mihi nondum constare.

Latinis autē dicta videtur Caltha vel
Calthula, quam vocem deinde corrumpentes offi-
cinae, in Calendulam immutarunt. Quanquam ve-
risimile etiam sit, sic nominatam esse, quòd omnib.
Calēdula quare di-
cta.
Flos omniū
mensium. mensium. Calēdis fruticare comperiat. Atq; hinc
fit quòd nonnulli florem omnium mensium appel-
lent. Germani Ringelblumē (Gallicè Soulsie)
vocant, ab intorto, & in circulum acto semine.

FORMA.

Herba est fruticosa, caule dodrantali, lignoso, fos-
siliis longiusculis, in angustum desinentibus, floribus
speciosis croceis luteisve, non ingrati, quamvis gra-
vis odoris, qua dote in coronamenta venit: semine,
cuius vagina scorpionis caudā imitatur: radice sim-
plici,

plici, multo capillitio fibrata. Cur autem hæc herba Caltham esse credã, facit imprimis Plinius, qui lib. xxi. cap. vi. Caltham odore grauẽ esse scribit. Dein Virgilius qui Aegloga secunda sic canit: Mollia luteola pingit vacinia Caltha. Luteolam à luteo florum haud dubiè colore, nominans.

LOCVS.

Prouenit in cultis, atque vix hortum inuenies in quo copiosè nascatur.

TEMPVS.

Singulis ferè mensium Calendis, vt diximus, flores deprehenditur, Maio incipiens mense: Magis autem autumno eiusdem emicant flores.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse statuunt, neque id immeritò, quandoquidem dulcedine modica cū amaritudine coniuncta participet.

VIRE. EX RECENTIORIBVS.

Herba ipsa adhibetur condimentis & acetariis. Flos ex vino potus ciet menses: item herbae succus, quo in dentium dolore os presentaneo remedio coluitur. Non parũ etiam eius flos ad flavos reddendos capillos conducit. Idem perinde atque ipsa herba, secundas educit mirificè, si aridus suffitibus admotus fuerit.

DE CARYOPHYLLATA.

CAP. CXLIH.

Caryophyllata quòd radix seccata Caryo-

D ij phyllum

PLANTARVM HISTORIAE

phyllum olet, nobis Sanamunda ab effe-
Etis vocatur, acetariis etiam folio expeti-
ta herba.

NOMINA.

Caryoe-
phyllata
non est La-
gopus.

Q Valiter Grecis & antiquis Latinis scripto-
ribus hæc herba nominata sit, nondum cō-
pertū habeo. Cur enim Dioscoridis La-
gopus non esse credam, etsi paniculum pedi lepoz-
rino prorsus similem habeat, facit quòd in manu-
scripto & peruetusto herbario seorsim descriptam
& depictam utranque herbam viderim. Pictura
autem Lagopi longè aliam herbam, quæ in segetis-
bus nascitur, quàm sit Caryophyllata, exprimit: de
qua suo loco dicemus. Neque desunt qui herbã hæc
de qua agimus, Cum Plinio dictam velint, quorū
certè sentētia periculo vacat, quòd eadem facultas
utrisque radicibus sit. Sed ad institutum reuertamur.
Herbã quam recentiores Latini Caryophyl-
latam, ab odoris suauitate quam radices de se præ-

Benedicta bent, nominant, vulgus herbam Benedictã, à diuina
Sanamun na sua effic icia, & Sanamundam appellant. Gera-
da. mani Benedicte nuurtz. (Galli l'Herbe be-
noitte.)

GENERA.

Duo esse eius herbæ genera animaduerti, nō ta-
men multum à se dissidentia. Primum genus Ca-

Caryoe-
phyllata
hortensis.

ryophyllatam, hortensem vocauimus, cui ex cultu-
ra aliqua teneritas accedit in foliis, floribus & pa-
niculis. Flos huic paulò minor & pallidior quàm
syluestri.

syluestri. Germanicè Gartē, oder heymisch Benediētenuurtz appellari potest. Alterum huius herbae genus *Caryophyllatam syluestrem* diximus, *Caryo-* quòd scilicet citra culturam proueniat. Flores eius *phyllata* multò maiores, magisque ad croci colorē accedūt. *Syluestris* Germanicè Vuild Benediēten vurtz nominari commodè potest. Differentiam tamē nemo rectius quàm ipsa pictura demonstrabit.

FORMA.

Caulis illi sequicubitalis, geniculatus, angustus, terna è pediculo longo folia articulatim exeuntia, per ambitum serrata, bina etiam prioribus minora, singula genicula cingunt. E medio alarum sinu ramuli funduntur tenues, quib. in summis flos luteus emicat, quo succusso caput extuberat circinatis acinulis cumulatè stipatum, quasi rudimentū eluccat naturæ fragum inchoantis. Radix multis luteis capillamentis fibrata, *Caryophyllon* olet.

LOCVS.

Primum in hortis plantatum prouenit. Alterum in montanis, opacis, & iuxta sepes nascitur.

TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores, & peruetustus etiā herbarius, calidā & siccam esse in secundo ordine statuunt. Folia sanè in gustu nō mediocrem adstrictionē ostendunt. Radix itidem haud paruum adstrictionē obtinet.

PLANTARVM HISTORIAE VIRE. EX RECENTIORIBVS.

Radix eius luto & sordibus eluta siccatur, et in bre aceti respersa arca & vestes iucundo commenda-
dat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas
concoctiones, sedandosque coli dolores. Radix eius
pectoris laterisq; dolores & cruditates iucundo sa-
pore discutit. Manuscriptus herbarius facultatē ha-
bere dissoluendi, digerendi, & obstructiones tollen-
di scribit. Fomentum item ex vino decoctionis eius
menses ciere. Contra venena tritam cum vino sum-
ptam valere. Concoctionem præterea roborare, do-
lorem ventriculi & intestinorum à frigiditate aut
flatibus ortum, decoctam in vino sanare ait. Mirifi-
cè etiam ad interna vulnera huius herba decoctū
confert. Externa verò ex ea collui debent.

DE CENTAVRIO MINORE.

CAP. CXLV.

Centaurium paruum nomen nobis reti-
net, Centore.

NOMINA.

Kενταύριον μικρόν, ἢ λιμνήσιον, καὶ λι-
μναῖον Græcis, Febrifuga & Fel terra La-
tinis, officinis Centauria minor, Germanis Klein
Tausend guldekraut, Fieberkraut, Erdtgall
& Biberkraut, (Gallis Centaure, ou Fiel de
terre) appellatur. Centaurium, quòd ea curatus di-
citur Chiron Centaurus, cum Herculis excepti ho-
spitio pertractanti arma sagitta excidisset in pedē.

Limnæon

Cētauriū
vnde di-
ctum.
Limnēsīū.

*Limnesiō & Limnæum, quòd secundum aquarum
scatebras ac paludes, quas Græci λίμνες dicunt,
nascatur. Febrisfuga, eo quòd febres fugat, & pro Febrisfuga
cul è corpore pellat. Fel terra, ob summā quam ha Fel terra.
bet amaritudinem.*

FORMA.

*Herba est Hyperico Origanove similis, caulem
habens altitudine supra dodrantem, angulosum.
Flores in puniceo colore subpurpurascētes, ad Lych
nidis flores accedentes. Foliis parvis & oblōgis ve
luti Ruta, Semē tritico simile. Radicem exiguam,
inutilem & leuem.*

LOCVS.

*Propter lacus & rigualoca, Dioscoride autore,
nascitur. Apuleio verò teste in solidis & fortibus
quoque locis prouenit, id quod non rarò in Germa
nia nostra accidere compertum habeo.*

TEMPVS.

*Floret æstate & autumno, quo maximè tempo
re, quia semine est prægnans, colligitur.*

TEMPERAMENTVM.

*In foliis & floribus vincit qualitas amara pan
lulum obtinens adstrictionis, atque propter eiusmo
di temperamētum admodum exiccatorium est me
dicamentum, expers mordacitatis.*

VIRE. EX DIOSCORIDE.

*Herba ipsa adhuc virens tusa & illita vulnera
glutinat. Vlcera vetera purgat, & cicatrice obdu*

cit. Biliosa & crassa per aluum ducit. Decoctum eiusdem ischia dicis commodè infunditur, sanguinè educens, & à dolore lenans. Succus ad oculorū medicamenta perutilis, cum melle quæ pupillas obtenebrant expurgans. In pessa admotus menses ac foetus educit. Priuatiim potus neruorum affectibus succurrit.

EX GALENO.

Centauri minoris radix prorsus inefficax est. Rami verò & potissimum folia quæ in iis sunt atque flores, vtiliora. Vlcera magna herba ipsa adhuc recens illita glutinat. Vetera quoque & quæ agrè ad cicatricem perducere possunt eodem modo vtentibus cicatrice obducuntur. Arcfacta glutinatoriis & desiccatoriis miscetur facultatibus, iis videlicet quæ sunt. & fistulas sanare sunt nata, & veteres durities emollire, tum vlcerū maligna sanare. Miscetur etiam iis quæ rheumaticis affectibus medentur, in quibus ea medicamenta optima sunt quæ vehementer desiccantia cum quadam adstrictione nullā habent mordacitatem. Decoctū herbe quidā Ischia dicis infundunt, seu biliosa ac crassa ducens: nam & talia purgat. Quanquam quum adeò vehementer operabitur vt cruenta euacuet, tunc magis proderit. Succus porrò eius quum adsimilis sit facultatis, hoc est, exiccatoria & abstersoria, & reliqua iam dicta pulchrè efficere potest. Cum melle etiam oculis illinitur, mensesq; & foetus appositus in pessa

foeuocat. Sunt qui ipsum præbeant & iis quibus nerui affecti sunt, vt qui euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt. Optimâ etiam medicamentum est ad iecinoris obstructions soluendas. Bonum quoque licni indurato foris impositum, & nihilo secius si quis bibere sustinuerit.

EX PLINIO.

Purgat aluum succus Centaurij minoris drachma in hemina aquæ cum exiguo salis & aceti, bilémque detrahit.

DE CYAMO. CAP. CXLVI.

NOMINA.

Kύαμος Græcis, Faba Latinis dicitur. Officina Latinum nomen retinent. Germanis Boonen, (Gallis Vne Febue) appellatur.

FORMA.

Sola Faba inter legumina sine adminiculo nititur, folio carnosio, Portulacæ simili, flore cristato, versicolore, partim albo partim purpureo, atris quibusdam maculis notato, quas M. Varro lugubres vocat literas: siliqua plerumque semipedali, fructu intus lato humani vnguis effigie, colore non simplici, sed aut fuluo, aut nigro, iam verò etiâ herbaceo & coccineo: radice singulari, lignosa, & capillata fibris. Quæ hic à quibusdam, quasi nostra non esset vera Faba, afferuntur argumenta, non tanti momenti sunt vt confutatione indigeant: constat enim nostram, eas quas veteres illi adscripserunt, habere

notas

PLANTARVM HISTORIAE

notas & facultates. Non tamen negamus in diuersis terris maiorem aut minorem produci posse.

LOCVS.

Passim in hortis sata prouenit. Latatur loco pinguisimo & stercorato.

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Faba in refrigerando & exiccando ad medianam temperaturam propinquissimè accedit. Est itaque frigida & sicca in primo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Spirituosa, inflans, concoctu pertinax, insomniat tumultuosa faciens. Tussi tamen confert, carnesque generat. Decocta in posca, & cum cortice comesta, dysenterias & celiacas fluxiones sistit. Vtilis contra vomitiones in cibo sumpta. Minus inflat priore aqua in decoctione effusa. Viridis magis stomacho nocet, plusq; inflat. Farina eius per se & cum polenta illita, ex plaga inflammationes mitigat, & cicatrices ad reliqui corporis colorem reducit. Mammis in quibus lac in grumos cogitur, & inflammatione laborantibus auxiliatur, lacq; extinguit. Cum melle & scenigræci farina furunculos, parotidas, ac sugillata oculorum discutit. Cū rosa, thure, & oui albo, præcidētes oculos, staphylomata & œdemata cōpeascit. Macerata in vino suffusiones & ictus oculorū sanat. Ad sistendas fluxiones sine cortice cōmandu-

cata

cata fronti imponitur: testium inflammations in vino decocta sanat. Puerorum pubi illita diu impubes seruat. Alphos exterit. Euulsos pilos vt non nutriantur & graciles fiant, cortices illiti efficiunt. Cum polenta, alumine & oleo veteri illiti strumas discutiunt. Decoctum illorum lanas tingit. Factas ab hirundinibus sanguinis eruptiones, cortice ablato, Faba qua parte cohaeret diuisa, si dimidia apponatur, comescit. EX GALENO.

Caro Faba paulum quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex adstringentis: idcirco medicorum nonnulli totam Fabam cum polenta decoctam dysentericis, celiacis & vomentibus exhibuerunt. Porro vt edulium flatulenta est, & coctus difficilis, vt si quid aliud. Excreationibus quidem ex thorace & pulmone idonea. Vt medicamentum verò foris imposita sine molestia exiccat. In podagricis ea saepenumero vsi sumus ex aqua decocta, deinceps adipe suillum admiscentes. Ad neruorum tum cōtusiones, tum vulnerationes, farinam eius cū oxymelite imposuimus. Ad eos qui ex ictu iam phlegmone occupabantur, cum polenta. Sed & testium & mammarum bonum est cataplasma. Nam hae partes cū phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant, maximè cum māmā ex lacte in ipsis cōcreto phlegmonem patiātur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tēpore glabra permanet. Manifestè

PLANTARVM HISTORIAE

manifestè fabacea farina cutis sordes detergere cōspicitur, quod intelligentes mangones, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac vtuntur. Illinunt præterea & hac faciem quemadmodum ptisana: nam quæ in summa cute eminent lentes exterit, & maculas velut ex sole cōtractas. EX PLINIO.

Faba hebetare sensus existimata, insomnia quoq; facere. Solida fricta, feruensq; in acri aceto coniecta, torminibus medetur. In cibo fressa, & cum alio cocta, contra deploratas tusses suppurationesq; pectorum, quotidiano cibo sumitur: & commanducata ieiuno ore, etiam ad furunculos maturandos discutiendosve imponitur, & vino decocta ad testium tumores & genitalium. Lomento quoque ex aceto decocto, tumores maturat atque aperit. Item liuoribus, combustis medetur. Voci etiam prodesse, auctor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarum cinis, ad coxendices, & ad nervorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertias sistunt aluum.

DE CONSOLIDA MEDIA.

CAP. cxlvii.

Quam hic dat Consolidam mediā vulneribus glutinandis aptissimam, nouimus à media nobis dicta diuersissimam.

NOMINA.

INter multas alias herbas quibus vulnera glutinandi facultas inest, & hac cuius picturam damus

mus connumeratur. Hinc est quòd vulgus herba= Consolidariorum illam Consolidam mediam nominet. Quae media. etiã appellatione nos vti volumus quòd nobis, quo nomine veteribus græcis aut latinis appellata sit, nondum constaret. Rectius tamen Solidago dicere= tur. Germanis Gulde guntzel nuncupatur.

FORMA.

Caulcm habet quadrangulum, lanuginosum, ex quo per internalla folia bina ex singulis geniculis in extremitatibus laciniata, Menthae similia emicant. A medio caulis ad fastigium vsquẽ ex singulis foliorum alis, flores sex aut septem in purpureo cœrulei exeunt. Radix illi subest lignosa, quæ multas à se exiguas radices capillamentorum instar per terram late serpentes propagat.

LOCVS.

Pasim in pratis nascitur.

TEMPVS.

Floret copiosè Maio mense.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit & amara est, vt calidam & siccam esse nemo dubitare possit.

VIRE S.

Vulnera glutinat. Sanguinis grumos ex casu, vel cõtusionibus coactos in corpore disiccit et dissoluit. Præsens remedium est aphthis & vlceribus in ore serpentibus. Decoctum eius tumoribus illitum eos dissipat. Vsus etiam eius ad intertrignes, vlcera pudens

PLANTARVM HISTORIAE

puerorum, & intestinorū exulcerationes prodest.
DE CANNABE. CAP. cxlviii.

NOMINA.

Kάναβις Græcis, Cannabis Latinis, Barbaris
& vulgò Canapus dicitur, Germani autem
Hanff (Gallis Du Chanure.)

GENERA.

σχοινός
σπορος.

Cannabis duo sunt genera. Vna enim sativa est,
quam Græci σχοινός πορον, quòd magni in vita
usus sit ad robustissimos funes texēdos. Germa. Za-
mer hanff dicitur. Altera sylvestris, quam Latini
Terminalem vocant, Germani Vuilden hanff.

FORMA.

Sativa
Cānabis.
Sylvestris

Sativa Cānabis folia fert fraxino similia, gra-
uis odoris, caules longos, inanesq̃, semen rotundum.
Sylvestris verò virgas fundit Althea similes, nigrio-
res, asperiores & minores, cubitali altitudine. Folia
sativæ similia, asperiora & nigriora. Flores subru-
beos, Lychnidi similes. Semen & radicem Althea
similia. Eius effigiem videre nobis nondum licuit.

LOCVS.

Sativa in locis cultis sata provenit. Sylvestris in
sylvis & asperis locis, Apuleiōque teste, iuxta semi-
tas & sepes nascitur.

TEMPVS.

Herba ad vsus medicos carpitur dum maximè
viret. Semen autem eius, Plinio autore, cum matu-
rū est, id quod prope autūni æquinoctiū accidit.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Admodum calefacit & exiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Satiue maiori copia sumptum genituram extinguit. Ex viridi autem succus expressus, contra aurium dolores vtiliter instillatur. Syluestris radix decocta illitaq; inflammationes mitigat. Tumores discutit, & callos discit. Huius cortex texendis funibus vtilis est. EX GALENO.

Cannabis semen flatus extinguit, adeoque desiccatur, ut si plusculum edatur genituram exiccet. Sūt qui ex viridi succū exprimentes, ad aurium dolores ab obstructione, ut mihi videtur, natos vtuntur. Semen etiam Cannabinū difficulter concoquitur, stomacho & capiti aduersatur, prauosque humores creat. Admodum excalfacit, ideoq; caput aestuoso ac medicamentoso halitu sursum misso tentat.

EX PLINIO.

Semen Cannabis extinguere genituram virorum dicitur. Succus ex eo vermiculos aurium, & quodcūque animal intraverit, eiicit, sed cum dolore capitis. Tantaq; vis ei est, ut aqua infusa, coagulare dicatur, et ideo iumentorum aluo succurrit pota in aqua. Radix contractos articulos emollit in aqua cocta. Item podagras & similes impetus. Ambustis cruda illinitur, sed sepius mutatur priusquam arescat.

EX SIMEONE SETHI.

Semē Cānabis comestum idem nocumentū quod
Corian-

Coriandrū affert:immodicè enim si estur,vt illud, deliriū facit. Folia verò arida pota, veluti farina, aut magis pro potione hæc farina exiccata, ebrieta tem quandam hospitalē facit, & quæ ab hauriente non sentiatur. Apud Arabas enim pinsitur, subigiturve pro vino, & inebriat. Desiccatur verò semē genitale vt Caphura. APPENDIX.

Quum ex iam dictis constet Cannabinū semen caput faciliè tentare, atque adeo ledere, imprudenter faciunt, qui vulgi errorem sequentes, in morbis, iisq; maximis, capitis ex hoc semine confecta iussula egrotantibus magno eorum malo exhibent.

DE CARDIACA CAP. cxlix.

Cardiaca nobis Agria palma, haud scio quaratione dicitur, nisi fortè à rudi foliorum fissura tanquā in digitos, à qua sed perfectiore ricinus, vulgò etiam Palma Christi nuncupatur: Amara sorba in hortis sponte sua passim luxurians.

NOMINA.

Quo nomine herba hæc veteribus sit appellata, nondum nobis constat. Nostri tamen temporis herbarii Cardiacam vocant. Germani Hertzgspar, oder Hertzgsper. Cardiacā verò haud dubiè à recentioribus nominata est, quòd cordis palpitatiōni, quā illi perperā cur dicta. καρδιακὴν appellant, mirificè conferre videatur. Alia est hæc à Ballote, de qua suo loco diximus.

FORMA.

Cardiaca caulem ex se mittit quadrangulū, geniculatū, nigrum: folia laciniata, nigra, per intervalla in caule ex singulis geniculis prodeuntia: flores in candido purpureos, orbiculato ambitu caules circumiacentes: radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam. LOCVS.

Paſſim in ruderibus & circa ſepes naſcitur.

TEMPVS.

Iulio mēſe floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Amara admodū exiſtit, vt hoc nomine calidam eſſe in ſecundo ordine, & ſiccam in tertio conſtet.

VIRE S.

Recentiores rectè contra cordis palpitatiōē, conuulſionem, & reſolutionem conducere tradunt: poſteſt enim quum amara ſit herba, ſua caliditate & ſiccitate craſſos humores qui in venis & aliis partibus, nervoſis potiſſimum, ſunt, incidere, extenuare, & diſcutere. Hac etiam ratione morbo comitiali, confert, vrinas mouet, & menſtrua educit, aliāſque facultates quas Galenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvii. amaris tribuit, obtinet.

DE CARO. CAP. CL.

NOMINA.

Kαρὸς Græcis, Caron vel Carcum latinis, offici-
cinis Carui nominatur. Germani Mattku- Carui-
mich, oder Vuysenkumel (Gallis Des Carot-
E tes)

PLANTARVM HISTORIAE

Careū vn tes) dicitur. A Caria fortè regione, in qua laudatissimum nascitur, appellationem accepit.

FORMA.

Caules emittit quadrangulos ab vna radice multos, folia Staphylini, flores candidos, & in caulium summo semen angulosum ac copiosum, radicem oblongam & luteam.

LOCVS.

Passim in pratis Germa. nostrae prouenit. Optimum tamen est quod in Caria, vt diximus, nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine pregnans est.

TEMPERAMENTVM.

Cari semen calfacit & exiccat tertio quodāmodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen Cari calfacit, vrinam cit. Stomacho & origratū accommodumq;. Concoctiones adiuvat. Antidotis & oxyporis vtiliter miscetur, Aniso proportionem respondens. Radix elixa Pastinacæ sylvestris modo edendo est.

EX GALENO.

Flatus extinguit & vrinas ciet, non semen tantum, sed & planta.

DE CARYO PONTICO. CAP. cli.

NOMINA.

Auellanae. **K**άρυα ποντική, ἢ λεω Γκαρύφα. Græcis: Auellanae nuces, & Prænestina Latinis, Haiselnußz Germa. (Gallis Noysette, ou Aueline)

nomina.

nominatur. Pontica autem vocantur, quòd in Asiã Ponticæ Græciãque è Ponto venerunt. Parua, quòd Iuguares vocantur, glandibus minores sint. GENERA. cata.

Duo eius sunt fastigia. Vna enim est sylvestris, quam priuatim Germani nostri Haselnusz nominant. Altera verò urbana seu domestica, quam isdem Rotnusz, oder Rurnusz appellant.

FORMA.

Corylus arbor in qua Auellana nux provenit, can-
dice est multis infernè stolonibus fruticante, super-
nè ramis brachiato, virgis breuibus, sine alarum si-
nus enodibus, crassisq; nonnullis, foliis ab vna parte
nigris, altera verò subalbis, per ambitum serratis,
materia admodum lenta, cortice summo tenui, pin-
gui, maculis albis vario, medulla tenui & flaua.
Non floret, sed floris vice quidã in eo peculiare co-
pactili callo racematim coherentes, & veluti præ-
longi vermes singulari pediculo pèsiles iuli erupūt,
qui incūte vere dehiscunt ac defluunt cū folia pro-
siliūt, ac tum calyculacea tegumenta totidem sum-
matim fimbriata, quot iuli supra pediculū exeunt,
eorumq; singulis nuces singule insunt. Domestica
nō differt à sylvestri, nisi quòd eius foliū maius, & ca-
caudex procerior, melior fructus, rubra membrana
inclusus. DOMESTICA.

LOCVS.

Gaudet argillosis & viginosis locis: nascitur itaque in plano. Nemora etiam & mōtes Corylis vestiuntur.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Autumno leguntur Auellanae nuces.

TEMPERAMENTVM.

Tum cortex, tum planta, tum fructus gustanti austerior quam Iuglans apparet, plus itaque habet essentiae terrestris & frigidae. Simeon Sethi calidas & humiditas esse Auellanas asserit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Stomacho aduersantur Auellanae. Trita in aqua mulsa, & pota veterem tuſſim sanant. Tosta vero & cum exiguo pipere comesta destillationem maturant. Tota cremata, trita cum axungia aut seuo vsino & inuncta, alopecias explent. Ferunt aliqui vsta earum putamina, & in puluerem redacta cum oleo caſiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perſuſo ſyncipite.

EX GALENO.

Valentiores sunt Auellanae quam Iuglandes: nam densior strictiorque; his est substantia, ac minus oleosa. Cetera magnae nuci similia sunt.

EX AETIO.

Auellana, quae & Nux pontica nuncupatur, quod in Euxino poto frequens sit, praeter quod frigidior. austerior, terrestriorque; est, in reliquis Iuglandi assimilatur. Comesta dolorem capitis inuehit.

EX SIMEONE SETHI.

Magis nutrit quam Iuglandes nuces, difficiliorque; concoquuntur. Inflationes faciunt, & ut quidam

dam aiunt, ieiunum intestinum lædunt. Facilius autem concoquuntur, minusq; ventrem sistunt, si interior earum cortex abiiciatur. Dicitur quòd si quis ante reliquos cibos cum ruta sumpserit, huic neque morsus, neque venena officere illo die posse, et scorpiones ab ipso fugere. Sumptæ cum caricis, iam à scorpione ictos iuuant. Ad aciditatem à nigro humore exiccatam omnino confert.

DE CENTVM MORBIA. CAP. clii

An hæc Centummorbia sit vulgò dictum & putatum gramen Parnasi explora.

NOMINA.

HVicherbæ, vt aliis multis, nomen aliud imponere nō licuit, quàm, quo vulgò hodie appellari solet, Centummorbiæ. Sic autem haud dubiè à chirurgis, qui illa quotidie vtuntur, à mirifica sua quam in plurimis vlceribus medendis obtinet facultate, dicta est. Sunt qui à foliorum similitudine, quæ nummi speciem referunt, Nummulariam vocant. A nonnullis Hirundinaria, quòd passim terræ hirudinis instar affixa sit, dicitur. Nec desunt qui Serpentariam appellent, quòd comperit sit serpentes hac herba si vulnerentur sibi mederi. Germanicè Egelkraut, oder Klein Naterzung, oder Pfennigkraut nominatur.

FORMA.

Serpit per terram, exiguisq; radiculis è coliculis

E iij latiss

PLANTARVM HISTORIAE

*latis prodeuntibus nititur. Folia habet ex utroque
caulis latere rotunda, pinguiusque: flores luteos.*

LOCVS.

*Provenit in locis humidis, potissimum verò circa
fluenta.*

TEMPVS.

Maio mense apparet, Iulio autem floret.

TEMPERAMENTVM.

*Gustu admodum adstringit, ut hinc constet secū-
di aut tertij ordinis exiccantium esse herbam.*

VIREs.

*Huius flores & folia trita adeò desiccāt adstrin-
guntq; ut quævis vlcera glutinare valeāt. Ideoq; po-
ta cum vino dysenterias, ventris imbecillitates flu-
xusque ac humiditates sanant. Cataplasmatibus vi-
tu illita vlcerum putredinosa iuuant. Prosumt etiā
ad sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, &
ad omnia interanea vulnera & vlcera potissimū
pulmonis. Externis etiam vlceribus summè cōfert,
si vino in quo herba hæc decocta est, lauentur at-
que abstergantur.*

DE COCCIMELEA. CAP. CLIII.

NOMINA.

ΟΚΚΙΜΗΛΕΑ Græcis, Prunus Latinis & of-

K ficinis, Germanis eius arboris fructus Pflau-

men, oder Prumen, (Gallis Vn pru-

nier) dicuntur.

GENERA.

Sativa

Pruna.

*Duo sanè prunorum habentur genera. Vnum sa-
tinorum, in quo genere sunt nigra, cādicantia, vera
sicoloria,*

sicoloria, cerea, hoc est, ex candido in luteum pal-
lescētia, purpurea, Damascena, & si qua sunt alia.
Alterum sylvestrium, quæ Galeno lib. ij. de alimen-
torum facultatibus ἀγριοκοκκίμηλα, & in Asia
Πρόμνα. Pruneola siue Prunula vulgò nominan- Pruneola.
tur, Germanicè Schlehen. Caue eorum amplecta-
ris sententiam, qui Poterium esse putant: neque e-
nim facultates, neque notæ Prunulis respondent.

FORMA.

Prunus arbor est radicibus summo cespite vagā-
tibus paucis, caudice subrecto, scabro, multis bra-
chiato ramis, folio ex oblongo ferè rotundo, per o-
ras minutim serrato, flore candido, foliato, pomo,
carne, cuteq; vestito, osse intus duro in quo nucleus
includitur.

LOCVS.

Satiua Prunus in hortis nascitur. Damascena in
Damasco Syria, à quo cognominata sunt. Sylvestris
autem passim in sepibus reperitur.

TEMPVS.

Satiua in æstate poma sua profert, sylvestris au-
tem autumno.

TEMPERAMENTVM,

Satiuæ pruni fructus mediocriter humectāt &
refrigerant. Sylvestris adstringunt, vt fusius ex co-
mundem facultatibus innotescet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eius pomum estur, stomacho tamen aduersatur.

Aluum mollit. Syriaca autem pruna, & praesertim in Damasco genita, exiccata stomacho utilia sunt, & aluum cohibent. Folia in vino decocta & gargarissata columellam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Praestant idem & Syluestrium Prunorum fructus cum maturuerunt siccati. Cum sapa decocti stomacho utiliores, & ad cohibendam aluum aptiores redduntur. Gummi Prunorum glutinat. Potum in vino calculos conterit. Ex aceto illitum, impetigines infantium sanat.

EX GALENO.

Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem plus, aridus verò minus. Cæterum Dioscorides, haud scio cur, Pruna Damascena siccata ventrem sistere ait, quum tamen & ipsa palam etiam subducant, minus tamen iis quæ importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringunt: at quæ Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsæ arbores fructibus proportionem respondent: minus enim astringunt quæ in Iberia nascuntur, magis verò quæ Damasci. Porro ut in summa dicam, quarum in foliis aut germinebus adstrictio quædam inesse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonæ in columella aut tonsillis existentes colluuntur. Syluestrium fructus evidenter adstrictorius est, venterque sistit. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto verò puerorum sanare impetigines. Ac si id præstat, clarum est incidendi tenuandi;

diq; illi facultatem inesse. Rarò fructum hunc austerum aut acidum, aut omnino iniucundum inuenias, ubi exactam maturitatem fuerit assecutus. Priusquam enim eò perueniat, nullus est fermè qui non acorem, aut acerbicatem præ se ferat: est qui & amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verùm quum humectare & refrigerare mediocriter vètre[m] statuemus, vtis erit: quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porrò æquè ac ficibus concessum est, vt vel exiccata vtilia permaneant. Damascenis prima laus benitatis magna hominum opinione defertur. Proxima iis quæ in Iberia & Hispania pueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cū mediocri adstrictione magna laxaq; sunt, at parua, dura, acerbāq; & in cibo permolesta, & ventri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maxime conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abudè vètre[m] molliūt, etiā si sola comedātur, & multò magis si melicratum ipsum subsorbeatur.

EX PLINIO.

Pruni folia decocta tonsillis, gingiuis, vna prosunt in vino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt. Syluestrium quidem Prunorum bacca, vel è radice cortex, in vino austero si decoquatur, ita vt triens ex hemina supersit, aluum & tormina sistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. Et in iis & satiuis Prunis est limus arborum.

PLANTARVM HISTORIAE

borum, quem Græci Lichena appellant, rhagadiis
& condylomatibus mirè utilis.

DE CONIO. CAP. CLIIII.

Cicuta nobis est maior, cuius caule cauo
quòd bibant rustici, bibeul dicitur: Gall.
Cigue. Alia est minor, odore nō ingrato,
tenera multum. Cætera priori similis quæ
arborescit terra pingui.

NOMINA.

K ὤνειον Græcè, Cicuta Latinis & officinis,
Germanis Vutzerling, Vundtscherling
Schirling, oder Vuterich, (Gallicè Cigue)
quasi tyrānus dicitur, quòd scilicet hominē interfi-
ciat: si intra corpus sumatur. Hinc est quòd Athe-
niēses eius succo in interimēdo sapientissimo philo-
sopho Socrate, quē falsò Anytus & Melytus quasi
parum rectè de Diis sentiret, accusarunt, vñ sunt.

FORMA.

Caulem profert geniculatū Fœniculi modo, ma-
gnum. Folia ferula, vel, vt Plinius ait, Coriandro
similia, angustiora tamen & graueolentia. In ca-
cuminibus adnascētes ramulos & umbellā. Flo-
rem subalbum, semen Aniso simile, albidius tamen.
Radicem concauam nec profundam.

LOCVS.

Passim in pratis, locis incultis, & vmbrosis na-
scitur.

TEMPVS.

Iulio mense flores & semina profert.

TEMA

TEMPERAMENTVM.

Summam habet refrigerandi vim Cicuta, atque adeò venenum est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Inter letalia cōnumeratur Cicuta, sua frigiditate enecans. Remedio est meraci vini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus cōtusis, priusquam semen & coma arescat, expressusq; in sole dēsatur. Multus aridi ad medendi rationem vsus est. Miscetur vtiliter collyriis, quæ leuādi doloris gratia adhibētur. Herpetas & erysipelata illitus restinguit. Herba cū coma trita & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, languidaq; reddit. Lac extinguit, mammas in virginitate increscere prohibet. Puerorum testiculos tabescere facit.

EX PLINIO.

Cicuta venenum est, publica Atheniensium pœna inuisa, ad multa tamen vsus nō omittēdi. Semini & foliis refrigeratoria vis, quæ si enecat, incipit algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquā perueniat ad vitalia, vini natura excafactoria. Sed in vino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur foliis floribusq;: tūc enim maximè tēpestius est & melior. Semine trito expressus, & sole densatus in pastillos, necat sanguinē spissando. Hæc altera vis. Et ideo sic necatorum macule in corporibus apparent. Ad dissoluenda medica-

PLANTARVM HISTORIAE

medicamenta vtuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandum malagma. Præcipuus tamen est ad cohibendas epiphoras æstiuas, oculorumq; dolores sedandos circumlitus. Miscetur collyriis, & alios omnes rheumatismos cohibet. Folia quoque tumorem omnem doloremq; & epiphoras sedant. Anaxilaus autor est, mammæ à virginitate illitæ, semper staturas. Quod certum est, lac puerperarum mæmis imposita extinguit, veneremque testibus circa pubertatem illita.

DE CYN OGLOSSO OFFICINARVM. CAP. CLV.

NOMINA.

Lingua
canina.

KΥΝΟΓΛΩΣΣΟΝ Græcè, Latine lingua canina: officina Græcam appellationem retinuerunt, Germanicè Hundzizung (Gallicè Langue de Chien) appellatur. Animaduertendum tamen nos non temerè adiecisse officinarum: neque enim Dioscoridis Cynoglossen. damus Caninam linguam, quæ vidua caule est, & viribus etiam ab hac nostra diuersa.

FORMA.

Caulem obtinet cubitalem, & interdum longior, hispidum, surculosum: folia angusta, prælonga & lanuginosa, non venosa, molliaq;: florem primum purpureum, dein cœruleum, stamina habentem purpurea: radicem oblongam, & profundè terram penetrantem.

LOCVS.

Pasim

Pasſim circa itinera provenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio menſibus fleret.

TEMPERAMENTVM.

*Recentiores herbarij frigidam & ſiccam eſſe ſta-
tuunt in ordine ſecundo.*

VIRE S.

*Oris & aliis maleficis vlceribus medetur. Dyſ-
enteria etiam prodeſt. Debet itaque illius herba
uſus eſſe in omnibus vlceribus, vulneribus, ſcabc
Hiſpanica, & ſimilibus morbis. Auxiliatur etiam
gonorrhœa & deſtillationibus: atque hinc eſt quòd
catapotiorum compoſitioni, quorum nomenclatura
eſt ad omnes morbos catarrhi, aut de Cynogloſſo, Catapo-
tis de Cynogloſſo.*

DE CNICO. CAP. CLVI.

NOMINA.

K *nlxgs Græcè, Cnicus & Cnecus Latinè no-
minatur. Officinæ Cartamum & Crocū hor Cartam-
tenſem appellant. Germani Vuilden gartenſaff= Crocus
ran (Gallicè Safran ſauluage) ad differentiam hortenſis.
Atractylidis, de qua ſuprà dictum eſt.*

FORMA.

*Folia habet oblonga, inciſuris diuiſa, aſpera, acu-
leata. Caules cubitales, in quibus capita oliuæ ma-
gnitudine. Florem ſimilem Croco, ſemen candidum
& ruſum, oblongum, anguloſum.*

LOCVS.

Naſcitur

PLANTARVM HISTORIAE

Nascitur in hortis & agris satius.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, ac subinde semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excalefacientium eius semen, si quis foris eo uti volet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius flore vtuntur in opsoniis. Semen tunditur & ex eo exprimitur succus, qui cū hydromelite aut gallinaceo iure datus aluum purgat. Stomacho tamen aduersatur. Fiunt etiam placentæ quæ aluum emolliunt, si succus eius amygdalis, nitro, aniso, & melli cocto misceatur. Oportet autem ante cenam in partes quatuor diuisas Iuglandis nucis quātitate duas aut tres sumere. Eas hoc modo conficere oportet. Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostarum & decorticatarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendum aluum efficacius efficit.

EX GALENO.

Cnici semine duntaxat ad purgationes vtimur.

DE CENCHRO. CAP. CLVII.

NOMINA.

ΕΨΧΕΡS Græcis, Miliū Latinis & officinis, Germanis Hirsz (Gallicè du Mil, ou du Millet) appellatur. Nomen, Festo autore, à

Miliū vnde dictū.

re, à miliaria summa deriuatum.

FORMA.

Fru menti genus stipula cubito altiore, genicula-
ta, folio arundinaceo, semine in inba tereti & pen-
dulo, folliculo concluso, radice numerosa, capillata,
ac multiplici fruticante culmo.

LOCVS.

Satum in aruis prouenit. In frigido & aquoso so-
lo prius serendum, postea in calido præcipiunt. Ga-
det solo limoso vliginosoq;.

TEMPVS.

Augusto mense demetendum.

TEMPERAMENTVM.

Milium primo ordine refrigerat, exiccat autem
tertio exoluto, aut certè secundo intenso. Paululum
etiam tenuium est partium.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Minus ceteris frugibus alit. In panes autem co-
actum, aut tanquam puls confectum aluum sistit,
vrinam autem mouet. Tostum verò saccis inditum
& fomenti loco appositum, torminibus & aliis do-
loribus auxilio est.

EX GALENO.

Milium vt ferculū comestū inter omnia frumē-
tacea edulia minimum nutrimenti confert. Sed &
ventrem desiccāt. Porrò foris impositum in sac-
culis idoneum est fomentū iis quæ citra morsum exic-
cari postulant. Cataplasmatibus etiam modo illitum
exiccare

**Panis ex
milio.**

exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. Panis ex milio exigui est alimenti & refrigerantis. Constat insuper præaridum & instar arenulae aut cineris friabilem esse: caret enim penitus glutinoso pingui: iure itaque aliud humentem desiccatur. Milium tamen ad omnia panico præstantius, nam & suavius editur, facilius concoquitur, ventremque minus cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti incoctam esitant, veluti triticeam agricolæ: clarumque est id edulj tanto quàm illa quæ per se sola sumuntur melius esse, quanto lac milij natura ad boni succi procreationem, aliâque omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoque ipsam in edendo suauitatem ac voluptatem.

E X P L I N I O .

Milio sistitur aliud, discutuntur tormina, in quibus usum torretur antè. Nervorum doloribus & aliis feruens in sacco ponitur, neque aliud utilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis usus eius est ad omnia quibus calor profuturus est. Farina eius cum pice liquida serpentium & multipedum plagis imponitur.

E X S I M E O N E S E T H I .

Difficulter concoquitur, ventrem sistit parumque nutrit. Iuvat eos qui refrigeratione & exiccatione
ventriculi

ventriculi indigent. Sumptum cum lacte, vel amygdala thasia facilius cōcoquitur, & humidius fit.

DE CRAMBE SATIVA.

CAP. CLVIII.

Brassica nobis à caule insigni & arboreo caulis dicitur. Ea nobis multiplex magis est quàm quæ hîc scribitur & pingitur.

NOMINA.

KΡΑΜΒΗ ἢ ἡμῶρος græcè, Brassica sativa latinè, officinis & vulgò *Caulis*, Germanicè *Kol* (Gallicè *Des Chauls*) appellatur. Crābe græcis dicta cēsetur quasi κροάμβλη, quòd pupillas oculorum, quas Græci χέρες vocāt, obtundat, hebetetq;. In qua certè sententia fuisse Columellam hoc eius de cultu hortorum carmen testatur:

Nūc veniat quāuis oculis inimica Corāble. Attici integro nomine κροάμβλω protulerunt, alio sed potiore etymi sensu, quasi κροῶ ἀμβῆ, vel rectius ἀντέβη, id est, crapulæ satietatiq; contraveniat. Nā vino aduersatur, vt inimica vitibus. Antecedēs in cibus ebrietatem arcet, & postea sumpta crapulam discutit.

GENERA.

Et si plurima sint Brassicæ genera, vt ex veteribus rei rusticæ scriptoribus liquet, quatuor tamen dūtaxat, quæ hodie vsitatae sunt, producemus: quarum vna Græcis λεῖα, hoc est, levis nominatur, Brassicæ grandibus & latis foliis, caule magno: Germanis levis.

E

breiter

breiter oder großer kol vocatur. Altera crispa,
 Apiana. quæ à similitudine apij *σελινοειδής*, id est, Apia-
 na nuncupatur. Vulgò crispus caulis, Germanicè

Crambe. krauser kol. Tertia propriè vocatur Cräbe, minu-
 tioribus caulibus, & tenuioribus foliis, flore luteo,
 Germanicè kleiner kol, vt ab aliis discernatur,
 nominari potest, aut simpliciter & sine adiectione

Capitata. kol. Quarta sessilis est, folio & capite patula. Vul-
 gus caputos caules, quasi capitulatos appellat, quor-
 niā in capitis formā extuberant. Folia enim horum
 in orbem glomerātur, exterius callosa & per ambi-
 tum rugata, multis intus carinarum voluminibus,
 externis semper interiora cōplectentibus. Huc allu-
 dentes Germani Cappiszkraut vocāt. Nōnulli à
 candore foliorū Brassicam albam, & caules albos,
 appellare maluerunt. Hoc genere Brassicæ in plæ-
 risque Germaniæ partibus, Boioaria potissimum,
 per integrum anni curriculum quotidie victitant,
 quòd illic eius prouentus sit vberrimus.

FORMA.

Caule est Brassica leniter rubēte, crasso folio præ-
 grandi, carnosio, ex cæsis candicante, in latus vtrin-
 que diffuso prominulis venarū toris fruticāte, cyma
 patula, flore tum luteo, tum albo, semine in siliquis.

LOCVS.

In hortis hodie passim proueniunt Brassicæ.
 Frigidis verò & pluuiis regionibus positio earun-
 dem optima.

TEMPVS.

Augusto mense potissimum florent, ac subinde semen etiam proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Brassica tum manducata, tum foris imposita exiccat. Sicca verò & calida primo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE,

Brassica satius aluo est idonea, si leniter feruesca et aedatur. Percocta verò aluum sistit, & multo magis bis cocta, & in lixivio decocta. Aestiu stomacho nocet & acrior est. In Aegypto propter aemulitudinem non estur. Obscuritate visus laborantibus & tremulis comesta auxiliatur. A cibo sumpta ex crapula & vino noxas restiguit. Cyma eius stomacho utilior, sed acrior, & ad ciendam vrinam validior. Cōdita sale stomacho inimica est, aluumque conturbat. Crudus eius succus cum iride & nigro deuoratus aluum mollit. Cum vino potus viperarum morsibus succurrit. Cum Foenigraci farina, podagricis & articulorum doloribus correptis, ulceribusq; sordidis & vetustis illitus prodest. Caput purgat per se naribus infusus. Menses ducit cum loliacea farina inditus. Folia per se aut cum polenta trita, oībus inflammationibus & oedematis cōferūt. Erysipelatis, epinyctidis & lepris medetur. Cū sale carbūculos rūpūt. Capillorū in capite defluxū retinent. Cocta autē & melli mixta gāgranarū pascētibus malis opitulantur. Cruda ex aceto comesta

lienosis profunt. Mansa verò deuorato succo vocem amissam restitunt. Decoctum eius potum, aluum & menses mouet. Flos post conceptionem in pello subditus sterilitatem facit. Semen eius praesertim quae in Aegypto nascitur, potum lumbricos pellit. In antidota celiacorum additur. Faciem lentiginēsque expurgat. Cauliculi virides cū radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores impositi mitigant.

EX GALENO.

Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esca, tum foris imposita, non tamen etiam admodū acré. Alioqui & ulcera glutinat, & maligna ulcera sanat. Praeterea phlegmonas iam induratas, ac a grē solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadē facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiā in se abstersorium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maximè Brassicae Aegyptiae, quanto ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amara qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamēta quae ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, lentigines, & quaecūque alia modicam abstersionem postulāt, adiuvat. Caulis Brassicae combusti, cineres efficiunt admodū desiccantes, ut videlicet iam & adurentē vim participēt. Hac ratione ei veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis,

neris, adhibent. Nam valenter digerens medicamentum efficitur. Brassicæ quoque succus purgandi quandam vim obtinet: contrà solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis quàm incitare deiectionem potest. Proinde quum expellere alui excrementa propositum erit, ahenò in quo elixa vnà cum aqua fuit, propius admoto, ipsam eximere confestim, vasculoque in quo paratur, oleũ cum garo iniicere oportebit. At humentem aluum siccare volentes, quum mediocriter bullisse videbitur, priore aqua effusa repente aliam calentem iniicimus, ac ita rursus in ea discoquimus vsque dũ tenera flaccidâque euaserit.

EX PLINIO.

Cato crispam maximè probat, dein leuicam grandibus folijs, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorũ caligini, scintillationibusq; vel stomachi doloribus, crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laseris radícula, sumptam acetabulis duobus matutino. Tantamq; esse vim, vt qui terant hæc validiores fieri se sentiant. Ergo vel cum vino tritam, sorbendam vel ex olei intinctu sumendâ. Podagræ autẽ, morbisq; articulariis illini cũ ruta, coriãdri & salis mica, hordei farina. Aqua quoque eius decocta, neruos articulosq; mirè iuuari. Si foveantur vulnera & recentia & vetera, etiã carcinomata, quæ nullis aliis medicamentis sanari possunt. Foceri prius aqua calida iubet, & bis die tri-

tā imponi. Sic etiam fistulas eluxatas, & tumores
 reuocari, quæq; discuti opus sit. Insomnia etiā, vigi-
 liasq; tollere decoctam, si ieiuni edant quamplurimam
 ex oleo & sale. Tormina, si decocta iterum
 decoquatur addito oleo & sale cumino, polenta. Si
 ita sumatur sine pane, magis profuturam. Inter res
 liqua bilem detrahit per vinum nigrū pota. Quin
 & urinam eius qui Brassicā esitauerit, asseruari
 iubet, calefactamque nervis remedio esse. Auribus
 quoque ex vino succum Brassicæ tepidum instillari
 suadet. Idq; etiam tarditati audientium prodesse
 assenerat. Et impetigines eadem sanari sine vlcere.
 Græci biles detrahete non percoctam putant. Item
 alium solvere, eandemq; bis coctam sistere. Vino
 aduersari, vt inimicam vitibus. Antecedente in ci-
 bis cancri ebrietatem. Postea sumpta crapulā discu-
 ti. Hūc cibum & oculorum claritati conferre mul-
 tum, succo verò crudæ angulis vel tantum tactis
 cum Attico melle, plurimum, Hippocrates celiacis
 dysentericis bis coctam cum sale dari iubet. Itē ad
 tenasmon, & renum causas. Lactis quoque vberta-
 tem puerperis hoc cibo fieri iudicans, & purgatio-
 nem foeminis. Crudus quidem caulis si edatur. Par-
 tus quoq; emortuos pelli. Inuenio & à podagra li-
 beratos edēdo eam, decoctæq; ius bibendo. Hoc &
 cardiacis datum & comitialibus morbis addito sa-
 le. Itē spleneticis in vino albo per dies quadraginta.
 Cōtra verò singultus coriandro, & anetho, & mel-
 le, ac

le, ac pipere, & aceto. Illitā quoque prodesse inflas-
tionibus stomachi. Item serpentium ictibus, & sordis-
dis vlceribus & vetustis, vel ipsam aquam cum hor-
deacea farina. Succum ex aceto, vel cum Fœnograeco.
Sic aliqui & articulis, podagrisq; imponunt. Epiny-
ctidas ac quicquid aliud serpit in corpore, imposita
leuat. Item repentinas caligines: has & si maditur
ex aceto. Sugillata verò & alios liuores pura illis-
ta. Lepras & psoras cum alumine rotundo ex aceto.
Sic & fluentes capillos retinet. Epicharmus testium
& genitalium malis hanc utilissimè imponi asse-
rit. Efficacius eandem cum faba trita. Item convulsis
cum ruta. Et muris aranei morsus, foliorum aridorum fa-
rina alterutra parte exinanit. Stipitum Brassicæ ari-
dorum cinis, inter caustica intelligitur. Ad coxedi-
cum dolores cum adipe perunctus. Plura de Brassicæ
viribus vide apud Catonem de re rustica, cap. clvj.

EX SIMEONE SETHI.

Malum & melancholicum succum precreat. Vi-
sum hebetat, & somnum per contraria insomnia in-
terturbat. Succus eius aliquatenus purgat: cor-
pus verò eius ventrem sistit. Quapropter in quis-
bus humectam alium exiccare volumus, ipsam mos-
dicè decoquētes, aquamq; primam abiiciētes, confe-
stim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim ne-
que aeris, neq; frigida aquæ quod bis coquitur, tan-
gere debet. Aestiva Brassica peioris succi est quàm
hyberna. Cit verò urinam, lumbricos interficit, &

his qui ex vino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem quod ab humiditate ortam hebetudinem sanat. Cocta cum pingi carne, plurimum noxae atque vitij amittit. Flos eius proprietate quadam semen genitale corrumpit, vtero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem laedit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magis defectiones vocis inuet. Vulneribus imposita, ea conglutinat, & malefica vlcera, & induratas inflammationes sanat.

DE CRUCIATA. CAP. CLIX.

Cruciatam habemus aliam à foliorum quatuor situ, in crucis formam, flore pallido, denso, enterocelis efficacem.

NOMINA.

Quo nomine veteres hanc herbam appellauerint, nondum compertum habeo. Neque enim Isatis est, quam vulgus Saponariam vocat, ut suo loco docebimus, ideoque nomen quo illam nominaremus fingendum fuit. Ad imitationem autem Germanicæ nomenclaturæ Cruciatam diximus, cur dicta. quod eius radix in modum crucis transfossa sit. Ut hoc etiam nomine Græcè *σαπυγτύπος* dici posset. Germanicè Creutzwurcz, Sperenstich, & Madergeer (Gallicè La Cruciate) nuncupatur.

FORMA.

Caulis rotundum obtinet, dodrantalem, in summo

Summo rubentem, alas multas habentem, è quibus singulis bina folia crassa, angusta & oblonga, floresque orbiculatim purpurei è siliquis coloris herbacei prodeunt. Radicem albam, longam, crucis instar ab utroque latere perforatam, à qua illi nomen inditum est.

LOCVS.

Nascitur locis incultis.

TEMPVS.

Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Admodum amara est, vnde facile colligere licet calidam & siccam esse.

VIRE S.

Recentiores eius esse magnum contra pestilentie venena vsum tradunt. Item quòd ea quæ in thorace sunt educere valeat. Quæ sanè singula præstare posse, amarus sapor qui illi inest abundè docet. Abstergunt enim expurgantque amara, & quæ in venis est crassitiem incidunt, Galeno libro quarto de simplicium medicamentorum facultatibus capite decimosextimo, autore. Quamobrem menses etiam mouet, comitali morbo competit, & alia quæ amaris ab eodem tribuuntur, præstare potest. Vulneribus etiam glutinandis mirificè conducit.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Ἰόσος Gracè, Hedera Latinè Epheuu

K Germanicè (Gallicè du Liarre) dicitur.

Athenienses Bacchum appellarūt Citton,

Cissos cur quo nomine rigens Hedera quæ sine adminiculo nominata stat, sola omnium generum ob id vocata est cissos: è diuerso nunquam nisi repens humi Chamacissos.

Dionysia. Sic Dionysia, hoc est, Bacchica nominata est à Baccho, qui primus ex indis in Graciam Hederam asportauit: vel quòd in tutela eius fuerit. Nam vt ille iuuenis semper, ita hæc viret. Nec secus omnia,

Hedera sicut ille mentes hominum, illigat. Hedera verò diu-
nde ap- Et a est, quòd vetustis parietibus hæreat: vel potius
pellata. quia edita petat, & altè diuagetur: vel quia id cui adhæserit, edat atque corrumpat.

GENERA.

Plurimas, Dioscoride autore, sigillatim habet
Candida. species, sed maximè generales tantum tres. Candida enim quedam dicitur, eo quòd candidum fert fructum: hæc femina à Plinio vocatur. Germanis Vveißler Epheuu nominari commodè potest. Altera nigra, quæ nigrum producit fructū: hæc Plinio mas nominatur. Germanis schuuarzer Epheuu. Hæc etiam parietibus obrepit, murisque pertinacius hæret quàm vt possit abire, hinc Mau repheuu Germanis vocatur, & Baume pheuu, quòd scilicet arbores suo complexu frangulet. Tertia priuatim Helix, id est, clauicula, & hederula nūcupa-

nūcupatur. Germanis klein Epheuu, oder Erdepheuu.

FORMA.

Nigra, quæ in Germania nostra prouenit, arbor Nigra.
res & parietes radicosis amplectitur brachiis, in to-
tum fruticosa, folia primum cum pubescit angulo-
sa, complurimum in triangulam faciem exeuntia
habens. Vetusiori rotundantur, pinguis, dura, im-
mortali virore: flore exili, vitigineo, non inodoro:
baccis primum herbaceis, mox atris, & nonnūquā
croceis, longiori pediculo in vna modum dependē-
tibus, sparsioribus racemis non in globum candida
modo coeuntibus, sed in acinos discretis. Radice nu-
merosa, densa, flexuosa, contorta, ac surculosa, nec
admodum profunda. Candida inter media folia co- Candida.
mittit brachia, quibus arbores complectitur, ma-
ximè ramosa & robusta, corymbis, hoc est, racemis
in orbem circumactis, aut folio albicat. Helix quæ Helicis.
tumuis diu uiuat, Theophrasto autore, nunquam
fert fructū, adeoq; sterilitate à cæteris distat. Par-
ua tenuiæve huic folia, angulosa & rubra, viticu-
laq; tennes sine corymbis.

LOCVS.

Hedera aquis gaudet. Nigra passim circa mu-
ros crescit. Helix verò in syluis humi serpit.

TEMPVS.

Nusquam non viret Hedera.

TEMPERAMENTVM.

Hedera ex cōtrariis composita est facultatibus:
habet

habet enim quiddam adstringentis substantia, quæ terrena & frigida est. Habet etiam nonnihil acris, quæ calida est. Nec deest tertia, aqueam namq; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si viridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetque quæ terrea est & frigida adstringensq;, & ea quæ calida & acris.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hedera omnis acris & adstringens est. Nervos tentat. Flores triū digitorū carptu, in vino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti prosunt. Tenera folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū & corymborum succus cum irino vnguento, melle, aut nitro naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores valet, atque eo perfunditur caput cū aceto & rosaceo. Dolentibus & purulentis auribus cū oleo medetur. Nigræ hedera succus, aut e poti corymbi imbecillitatē pariūt, mentemq; turbant largius sumpti. Pilule quinque corymborū tritæ calefactæq; in malicorio cum rosaceo si instillantur in contrariam aurē, dolorē dentiū mitigant. Denigrāt capillum illiti corymbi, Folia in vino decocta, omnium vlcerum generi, etiamsi cacoethe sint, illinantur. Vitia cutis in facie & ambusta, vti iam diximus decocta, sanant. Mouēt menses triti & subditi corymbi. Idem poti post purgationes feminarum drachmæ pondere sterilitatem faciunt. Pediculus folio-

melle irrigatus, ac vuluæ inditus, mēstrua & fœtus extrahit. Succus instillatus in naribus, graueolentiam & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculosq; illita necat. Radicum succus cum aceto potus, phalangiorum moribus succurrit. EX GALENO.

Viridis, foliis eius in vino decoctis, vlcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt, ad sanitatē reducit. Igne etiā factas exulcerationes cicatrice includit. Cū aceto decocta folia lienosis prosunt. Flores autem quodammodo validiores sunt, vt ad lenorem redacta cum cerato ambustis conueniant. Præterea succus medicamentum est, quod naribus infusum capiti purgando idoneum existit. Vetustas aurium fluxiones sanat: ad hæc vlcera vetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat aut rosaceo, aut dulci oleo misceatur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, vsque adeo calidæ potestatis vt obscure adurat.

EX PLINIO.

Natura omniū Hederarum in medicina anceps. Mentem turbat & caput purgat largius pota. Neruis intus nocet. Iisdē neruis adhibita foris prodest. Eadem natura quæ & aceto, ei est. Omnia generacius refrigerant. Vrinam ciunt potu, capitis dolorē sedant præcipuè cerebro: continentiq; cerebrū membrana vtiliter mollibus foliis impositis, cū aceto & rosaceo tritis et decoctis, addito postea rosaceo oleo.

Illinunt

PLANTARVM HISTORIAE

Illinuntur autem fronti, & decocto eorum fouetur os, caputq; perungitur. Lienī & pota & illita prosunt. Decoquantur & contra horrores febrium, eruptionesq; pituita, aut in vino teruntur. Corymbi quoque poti vel illiti lienem sanant: iecinora autem illiti. Trahunt & menses apppositi. Succus Hederae tedia narium graueolentiamq; emendat, praecipue albae sativae. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur etiam purus lentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior alba est, ferro calefactus: satisq; est acinos sex in vini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem alba terni, in aceto mulso poti, tineas pellunt: in quacuratioe vetrici quoque imposuisse eos utile est. Hederae quam chrysocarpon appellauimus, baccis aurei coloris viginti, in vini sextario tritis, ita vt terni cyathi potentur, aqua qua cutem subierit, per urinam educit Erasistratus. Eiusdem acinos quinq; tritos in rosaceo oleo, calefactosq; in cortice punici, instillauit dentium dolori a contraria aure. Acini, qui croci succum habent, praesumpti potu, a crapula tutos praestant. Item sanguinem excreantes, aut torminibus laborantes. Hederae nigrae candidiores corymbi poti steriles etiam viros faciunt. Illinitur decocta in vino omnium vlcerum generi, etiamsi cacoethe sint. Lachryma Hederae psilothrum est, phthiriasimq; tollit. Flos cuiuscunque generis trium digitorum

digitorum carptu, dysentericos & aluum citam emendat, in vino austero bis die potus. Et ambustis illinitur vtiliter cum cera. Denigrant capillum corymbi. Radicis succus in aceto potus, contra phalangia prodest. Huius quoque ligni vase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt, maxime que comburunt, & ita illinunt ambusta, prius perfrusa aqua calida. Sunt qui & incidant succi gratia, coque vtantur ad dentes erosos, frangi que tradunt, proximis cera munitis ne ledantur. Gummi etiam in Hedera quaerunt, quod ex aceto utilissimum dentibus promittunt.

DE CERASO. CAP. clxi.

NOMINA.

Kερος Græcis, Cerasus Latinis, Germanis Kirschenbaum (Gallis vng Cerisier) dicitur. Cerasum autem arborem, vt Athenæus refert li. ij. Dioscoroph. à Cerasunte Pontica ciuitate, vnde dicitur primus in Italiam Lucullus intulit, debellato Mithridate. Ille idem est qui etiam fructum cognomine ciuitatis appellauit Cerasum.

GENERA.

Multa Cerasiorum sunt genera, in Germania tamen tria, quod sciam, duntaxat proueniunt. Primi enim generis sunt rotunda, ac maxime rubent, suaque voce illis dicuntur Amarellen. Alterius generis, quod ad figuram attinet, prioribus similia sunt, differunt autem colore, qui illis ad nigredinem accedit.

Vocantur

PLANTARVM HISTORIAE

Tertium. Vocantur autem horum lingua Vueichsel. Tertij generis predictis minora sunt ac longiora, partimq; rubent, partim nigricant: à nonnullis priuatim Kirschen vel Kerschen appellantur. Nos vna icone omnia tria complexi sumus. Quae in utroque genere nigra sunt, ea vescentium manus & labra succo suo, qui sanguineus est, mororum instar inficiunt.

FORMA.

Cerasus folio ferè Mespili, duro, latiore, et in ambitu serrato constat, cortice læuo, in candido nigricante, flore albo racematim congesto, fructu rubro aut nigro, magnitudine fabæ.

LOCVS.

Frequens est in omnibus hortis Cerasus. Quae tamen posterioris generis Cerasia profert, in syluis nonnunquam & nemoribus etiam reperitur. Gaudet autem aquosis montibus,

TEMPVS.

Iunio ac Iulio potissimum mensibus fructus maturitatem consequitur. Flores primo statim vere apparent. **TEMPERAMENTVM.**

Cerasorum non vnum idemq; est temperamentum, quod ex eorundem facultatibus perspicuum sit. Si meon tamen Sethi frigida & humida esse tradit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cerasia quidem ipsa si viridia sumantur, ventri utilia sunt. Eadē siccata aluum sistunt. Gummi Cerasorum cū vino diluto sumptū, vetustæ tussis medetur.

detur. Colore cōmendat. Visum exacuit. Appeten-
tiam inuitat. Idem ex vino potum calculosis auxi-
lio est. EX GALENO.

Cerasus arbor fructum fert non paris adstrictio-
nis in omnibus particulatim plantis participē. Nā
& in horum, sicut etiam malorum granatorum, &
malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdā
verò dulcis, in nonnullis autem acida exuperat.
Quinctiam ipsorum dulcium ea quæ nondū conco-
cta sunt ac matura, quædā admodū acerba sunt,
quædam similiter moris acida. Sed in moris immat-
uris acida qualitas acerbam exuperat, in Cerasis
non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in in-
testinis sunt, subducunt, sed minus apta stomacho
sunt. Contrā austera. Quæcunque verò acida sunt
ea pituitosis excrementosisq; stomachis conueniēt.
Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil e-
tiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi commu-
nē omnibus viscosis & mordacitatem expertis me-
dicamētis facultatem obtinet, quæ ad arterias ex-
asperatas accommoda est. Propriè autem (si quidē
verum est quod quidam scribunt) calculis vexatos
cum vino potum adiuvat. Nam sic illi tenuiū par-
tium quædam facultas inest.

EX PLINIO.

Cerasa & aluum molliunt, stomacho vtilia. Ea-
dē siccata aluum sistunt, vrinam ciunt. Inuenio a-
pud autores, si quis matutino roscida deuoret cum

PLANTARVM HISTORIAE

suis nucleis, in tantum lenari aluum, vt pedes morbo liberentur.

EX SIMEONE SETHI.

Cerasia mali succi sunt, ventrem subducant, huiusmodi ventriculum laedunt, praesertim cum non sunt matura. Prosunt autem calidis & siccis ventriculis ac temperaturis. Gummi verò arboris cum vino sumptum, calculosis auxiliatur.

APPENDIX.

Sunt qui tradunt gummi quod ex arbore destillat veteri tussi mederi, ex quo vino sumptum, gutturis lenire asperitates, fastidia discutere, & ciborum appetentiam moliri. Colorem cutis facere gratiorem, & oculis asferre claritatem. Lichenes infantium ex aceto sanare.

DE CYANO. CAP. CLXII.

Cyanus vt Graecis dicitur, à colore floris, sic nobis Bleuet & percele, cur verò Gal. Aubifoin, velut ab albo foeno dicatur, non video, nisi fortè quòd in eo genere quaedam flore sunt etià albo, & qui purpurei sunt in terra ligati, & aquae inferna parte immissi, tandem albescent.

NOMINA.

Baptifecula. **K**ύανος Graecis, Plinio & Latinis aliis Cyanus appellatur. Nonnullis Baptifecula, quòd secantibus & metentibus officiat, retusa in eius occursu falce. Nam & seculam veteres falcem dixerunt.

runt. Rectius tamen Blaptifecula vocaretur, quòd
 βλάπτειν Græcis nocere significet. Nostri florem Flos frum-
 etumetorū, Ger. autē Blau kornblumen, (Galli memorū.
 Blaeole, ou Aubifoin, ou Bluet, ou Bleuet)
 nomināt, quòd scilicet in frumetario nascatur agro.
 Cyanos verò dicta est hæc planta, ob florem quem Cyanos
 profert cæruleum, aut quòd honorem nomenq; dede cur dicta-
 rit cæruleo colori. Hinc est quòd pueri in hodiernū
 usque diem barbulas calyceibus erutas, ex candido
 omi liquore terant, quo in pingendis grandioribus li-
 teris cærulei nitorem mentiantur.

FORMA.

Caulis illi est angulosus, folia angusta & oblonga,
 calyces rosarum, sed squarosi atque tristes, quos
 plurimæ cæruleæ stipant Barbulae. Radix oblonga,
 lignosa, fibris quibusdam capillata.

LOCVS.

Trinialis flos est, passim in frumentis nascens.

TEMPVS.

Iunio potissimum mense floret, nec parum gratia
 suo cæruleo colore frumentis adfert. Hinc est quòd
 rusticorum etiam coronis inseratur, quanquam in-
 odoratus prorsus sit.

TEMPERAMENTVM.

Frigida est temperatura atque adcorepellentis,
 id quòd gustus etiam facile indicat, viscositatem
 manifestam & nullum prorsus caloris indicium
 præ se ferens. VIREs.

PLANTARVM HISTORIAE

Recentiores rectè tradunt huic herbae facultatē inesse, qua oculis alijsq; partibus inflammatione laborantibus proſit.

DE CROMMYO. CAP. clxiii.

NOMINA.

K ρόμμυον Græcis, Cēpa, & in neutro Cēpe, Latinis dicitur. Officinæ genuinum nomē retinuerunt. Germanis Zuuibēl (Gallis Oignon) appellatur: quod sanè vocabulum à Gallico detortum esse videtur: quandoquidem Galli sua lingua Cēpam vocent Siboulam. Crommyon autē, Aristotele in problematis autore, dictum est, quod oculi pupillam comprimi cogat. Nam oculos vellicando expressis subinde lachrymis contrahi pupillas certū est. Itidem libro ix. Diosoph. testatur Athenæus.

Crommyon unde dictum.

Cēpa quare vocata.

Cēpa verò à capitis magnitudine.

FORMA.

Folia habet ferè porracea, intus concava: caulem teretem rotundumq; per cuius fastigium flores primum candidi, ac subinde semen, in orbem sparguntur: radicem capitatā pluribus compactā tunicis, quæ summam prætenuibus rufisq; vestitur membranis, vertice nigricantem, à quo fibræ capillitii modo fruticant. LOCVS.

Terram Cēpæ amant pinguem, vehementer subactam & irriguam, passimque hodie in omnibus plantantur hortis.

TEMPVS.

 Floret

Floret Iulio potissimum mense, & deinceps semē profert, quod non antè legendum, quàm cū nigrū colorem prae se feret. Siquidem eo colore perfectiōnem fatetur, nigritiaq; maturitatis index est.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine excalefacientium, essentiāque eius crassarum est partium. Si succum eius exprimās, quod reliquum est admodum terreae substantiae est, cuiusque calidae: at succus aquea acriaq; caliditatis.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Cepa longa acrior est quàm rotunda, item flaua quàm cādida, sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordicāt, flatu gignunt, appetentiam inuitant, extenuāt, sitim excitant, fastidium pariunt & expurgant. Alio vtilis sunt. Detractis tunicis inq; oleum coniecta, ac pro glandibus subdita haemorrhoidas, reliquasq; excretiones aperiunt. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginaq; laborantibus. Suppressos menses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cum sale, ruta et melle illinitur. Cū aceto autem in sole inunctus alphas sanat. Cum pari spodio, scabra, lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe vtilis est. Alui fluoribus prodest. Aurium grauitati ac sonitui confert. Ad

PLANTARVM HISTORIAE

purulentas aures, & eliciendam aquam in iis interceptam valet. Alopeciae earum succo vtiliter perfricantur: celerius enim quam Alcyonium pilos euocat. Largior Ceparum cibus capitis dolores ciet. Cocta vehementius urinam pellit. In morbis, cocta etiam, copiosius comesta, lethargum efficit. Cum passis viuis, & fico illita, tubercula concoquit & rupit.

EX GALENO.

Hemorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit, & alopecii attrita pilos Alcyonio citius restituit. Porro succus eius iis qui suffusione oculorum laborant, aut aciem oculorum obtusam praecraessitudine humorum obtinent, inunctus prodest. Tota Cepa manducata flatuosa est. Itaque quae temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant. Crassos corporis humores extenuat, glutinososque incidit. Bis tamen aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliatur, quam ne sic quidem vim perdit extenuandi: verum facultatem quandam obscurissimam alendi corporis exinde acquirit, cuius antea quam decoqueretur, nihil prorsus obtinebat.

EX PLINIO.

Cepae olfactu ipso & delachrymationi, & caliginini medentur, magis vero succi inunctione. Somnum etiam facere traduntur, & vlcera oris sanare, cum manducata cum pane. Et canis morsus virides ex aceto illata, aut sicca cum melle & vino, ita ut post diem

diem tertium soluantur. Sic & trita sanāt. Tostam in cinere epiphoris multi imposuere cū farina horaeaceae, & genitaliū vlceribus. Succo & cicatrices oculorum, & albugines, & argemas ininxere, & serpentium morsus, & omnia vlcera cū melle. Item auricularum cum lacte mulierum, & in iisdem sonitum ac grauitatem emendantes, cum adipe anserino, aut cum melle stillauere. Et ex aqua bibēdum dederunt repente obmutescētibz. In dolore quoq; ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiariū omnium, priuatim scorpionum. Alopecias fricūere & psoras tussis cepis. Coctas dysentericis vescēdas dedere, & contra lumborum dolores. Purgamenta quoque earum cremata in cinerem, illinentes ex aceto serpentium moribus, inter ipsas quoque multipedes ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inutilia esse prae cordiis & cōcoctio- ni, inflationemq; & sitim facere dixerūt. Asclepiadis schola ad validum quoque colorem profici hoc cibo. Et si succum ieiuni quotidie edant, firmitatem valetudinis custodiri, stomacho vtilia esse, ac spiritus agitationi, ventrem mollire, haemorrhoidas pel- lere subditas pro balanis, succum cum succo foeniculi contra incipientes hydropyses mirē proficere. Item cōtra anginas, ruta & melle. Excitari eisdem lethargicos.

EX SIMEONE SETHI.

Cepa lotium cit, & semen genitale gignit. Cibi

G iij appetentiam

PLANTARVM HISTORIAE

appetentiā excitat. Capitis dolores facit, & stomacho officit. Rationem etiam, vt aliqui ferūt, lēdit. Si verò coquatur, plurimum malignitatis deponit, & utilis fit ad thoracis asperitates, & tusses. Hæmorrhoidas imposita aperit, & cum aceto inunctum alphas extergit. Etsi autem crassarū partium substantiam habeat, humores tamen crassos & lentos extenuat. Vētriculum verò inflat. Si crebrius quis ea utatur, in lienis vitia incidit.

DE CAMPANULA. CAP.

CLXIII.

Campanula huius videtur nobis Gante-lée, & Gan nostre Daine à dactylotheçæ in floribus forma.

NOMINA.

QUum nobis non constet quo nomine veteribus appellata sit hæc herba, placuit illam Campanulam, à florum similitudine, qui Campanula unde dicta. Cernicaria. campanam planè referunt, nominare. Germanis Halzkraut, hoc est Cernicaria, (Gallis des gâs nostre Dame, ou des ganteletz) dicitur, quòd scilicet ad oris & cernicis fauciumq; mala mirifice conferat.

FORMA.

Caulem profert quadrangularem, hirsutum, rubescētem, folia oblonga, hirsuta, in extremitatibus incisa & serrata, ad Vrticam proximè accedētia, flores purpureos campanæ aut calathæ similes, in medio luteum quid prominens obtinentes, quibus emarcescen-

emarcescentibus in rotundis capitulis semen prouenit. Radicem multifariam intortam, & cādidam.

LOCVS.

Gignitur in pratis siccis, in quibus dumeta plurima existūt. Propemodum enim nunquam nisi in dumetis reperiri potest.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Gustu astringit, vt hinc exiccandi illi vim esse quisque conicere queat.

VIRE S.

Adstringendi habet facultatem, ideoq; decoctum illius vnicē ad oris exulcerationes, aliaq; eiusdem mala quæ adstrictione indigent, confert. Vtilis etiā haud dubiè ad alia quæuis vlcera, ob insignē quam obtinet in exiccando facultatem.

DE CALAMINTHA.

CAP. CLXV.

Quenam herbæ Calaminthis genera apud Dioscoridem & Galenum explicant, hodie parum constat, vt Musæ Ruellius repugnet, ob historiæ Dioscoridis & Galeni obscuram breuitatem.

NOMINA.

Kαλαμίϑη Græcis, Calamintha Latinis, officinis Calamentum nominatur. Germanicas Calaminthæ appellationes paulò post indicabimus. Calamintha tha quare verò dicta.

verò dicitur quasi vel bona, vel utilis mentha: nãque nidore suo serpētes fugat. Quod testatur etiam Aristophanes iis verbis: σὺ δὲ ὄζεις καλὴ μὲν θύς, ὄφεις ἑλασινῆς. Nisi quis existimet à καλῆς, hoc est, ligno, quasi lignosam appellari mentham.

GENERA.

- Primum.** Calamintha Dioscorides tria facit genera. Primum amat mōtes, ideo huius generis Calamintha montana vocatur. Germanis stein oder Katzen mūtz (Gallis Calamēt, ou Poliot sauuage, ou herbe au Chat) dicitur. Alterum Latini propriè Nepetam, vulgus eò quòd Pulegio simile sit, sylvestre Pulegium nominat. Germani etiam vulgi opinionē sequentes, Vuilden Poley & Kornmūtz vocant. Officinæ pro Calamento hoc solo genere vutuntur. Tertium Mentastrum simile est, Germanicè Geelmuntz commodè appellatur.
- Secūdum.**
- Pulegium sylvestre.**
- Tertium.**

FORMA.

Primum Calamintha genus folia Ocymo similia habet, subalba, ramulos angulosos, florem purpureum. Alterum Pulegio simile est, maius tamen: propter quod quidam, ut dictum est, sylvestre Pulegium nominant, quoniam & odorem illius amuletur. Tertium mentastri similitudine est, longioribus foliis, caule & ramis prædictis maius, sed minus efficax: flore luteo.

LOCVS.

Primi generis Calamintha in montibus & asperis

ris gignitur, vnde & montana dicta est. Alterius
in campestribus & agris. Tertij in aquosis locis.

TEMPVS.

Florent Iunio, potissimum verò Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calamintha essentia est tenui & calida, siccaq;
in tertio quodāmodo ordine. Horū manifesta sunt
indicia, partim gustu apparentia, partim experien-
tia cognita. Gustu quidem acris & palām calida
est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Omnium folia gustu feruentia admodū & acria.
Radix inutilis. Pota aut illita demorsis à serpente
opitulatur. Decoctum eius potum vrinas & men-
ses expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnceæ, tormini-
bus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Præsumpta in
vino venenis resistit. Regium morbum expurgat.
Lumbricos & ascaridas cum sale & melle pota,
enecat. Nec secus cocta crudaq; si teratur. Elephā-
ticos esitata adiuuat, si postea serum lactis bibatur.
Folia trita & apposita menses ducunt, & fœtus in-
terimūt. Accēsa aut substrata serpētes fugant. Ni-
gris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta
& illita. Sugillata tollunt. Ischiadicis imponitur,
vt humorem ex alto euocet, meatusq; transmutet,
summam cutem exurens. Vermes necat succus au-
ribus instillatus.

EX GALENO.

Pericli-

PLANTARVM HISTORIAE

Periclitantibus & corpori admoventibus extrinsecus imposita, primū quidem valde excalfacit & mordicat, cutemq; laniat, postremò etiam vlcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum ipsa per se sicca, tum etiam cum melicrato, perspicuè calfacit, & sudorem ciet, omnēque corpus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitum reptantes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segni, intrò verò assumentes, sicuti est dictum. Quinetiam & coxendicibus eam quidam in agritudinibus ischiadicis tanquam strenuum remedium illinūt: trahit enim quae in profundo haerent, totumq; adeò articulum excalfacit, cutemq; non obscure adurit, mensesq; tum pota, tum apposita admodum efficaciter prouocat. Bonum etiam elephāticorum remedium, non eò tantū quòd strenuè tenues humores digerat, verumetiam quia extenuet & incīdat valēter crassos, quales sunt qui hunc morbum procreant. Sic & cicatricibus atris candorē reddit, & sugillata digerit. Sed ad taliarecentē magis quā arentē adhibere praestat. Quippe arefacta vehementior redditur, & ad vrendum promptior. Porro talis cū sit, ad venenatarū bestiarum morsus assumitur, velut etiā cauteria, & quaecunque medicamenta calida sunt & acria, tenuiumq; partium, quaeq; facile ex alto ad sese circumiacentem omnem humiditatem possunt attrahere.

here. Caterum quæ illi inest amaritudo, planè exigua est, verùm ad quadam ita efficaciter agit, vt quæ valentissima est, nimirum quum coniuncta sit vehementi calori cū tenui essentia. Quare & ascaridas & lumbricos succus eius infusus aut potus enecat. Eadem ratione aurium vermes, aut si alicubi in parte corporis sinuosa, aut implicata quæ putredine tētetur, talis prouenerit affectus. Sic & cōceptū seu pota, seu admota interimit & eiicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem: abstergendi verò propter vnicam amaritudinem. Itaque asthmaticis ob omnia antedicta prodest. Ictericis verò potissimum ob amaritudinem, sicut alia ferè omnia amara, vtpote abstergentia & expurgantia in icterinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

EX PLINIO.

Decocta in aqua ad tertias discutit frigora. Mulierum menstruis prodest. Aestate sedat calores. Vires quoque contra serpentes habet. Fumum ex canidoremq; fugiūt, quam & substernere in metu obdormituris vtile est. Tusa agilopis imponitur, & capitis doloribus recens, cum tertia parte panis temperata aceto illinitur. Succus eius instillatus naribus supinis, profluvium sanguinis sistit. Item radix cum myrti semine in passo tepido gargarizata, anginis medetur.

PLANTARVM HISTORIAE

DE CRITHE. CAP. CLXVI.

Hordeum Polystichon seu hexastichon à disticho Picardis distinguitur, Parisiensibus confunditur.

NOMINA.

Kριθή Græcis, Hordeum Latinis & officinis dicitur. Germanis Gerstee, (Gallis Orge.)

Polenta. Ex eo polenta, quam Græci ἄλφιτον nominat, & Ptisana, medicamenta veteribus vsitatissima, conficiuntur.

GENERA.

Hordeum polystichū Rustici duo esse Hordei genera tradunt. Vnū Polystichum, quod sic dictum est, quia in multos versus spicatur. Sunt enim ex hoc genere quæ spicam tribus, interdum quatuor, nunc sex, nunc octo versibus distinctam proferunt. Germanis Grosz Gerst, hoc est. Hordeum magnum vocatur. Alterum Distichum nominatur, quod scilicet in duos duntaxat versus spicetur. Germani Klein Gersten, id est, Hordeum exiguum appellant.

FORMA.

Culmum habet tritici, fragiliorem tamen minoremq; quinque, sex, & interdum pluribus geniculatum articulis, simplici in stipula folio, & eo quidem scabro ac lato. Grana ferè nuda, longiore capillamento, mordacique arista. In versus spicatur, radice frequenti, capillis fibrata.

LOCVS.

Hordeum pinguisimum amat agrum.

TEME

TEMPVS.

Erumpit à primo satū die septimo, & caput alterum grani in radicem exit, alterum in herbam. Metitur Augusto mense.

TEMPERAMENTVM.

Hordeum primi sunt ordinis in exiccando & refrigerando.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hordeum optimum est candidum, purumq; Minus quam triticū nutrit. Ptisana tamen ob cremorem in elixatione redditum, plus alimenti præbet quàm polenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atque faucium scabritias, exulcerationesq; pollet, quibus etiam triticea ptisana præsidio est, sed plus alit, magisq; urinā mouet. Lac abundè suppeditat, si cum Fœniculi semine decocta sorbeat. Absterget, urinā ciet, inflat, stomacho aduersatur, & ædemata concoquit. Farina hordeacea cum fico in multa aqua decocta, ædemata & inflammationes discutit. Duritias cum pice, resina & simo columbino coquit. Cum meliloto autem & papaueris calyce dolores finit qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes, cum lini semine, fenogreci & ruta illinitur. Strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit. Cum myrto autem, aut vino, aut sylvestribus pyris, aut rubo, aut malicorio, alui profluvia sistit. Podagricis inflammationibus cum cotoneis,

aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liguata eadem cum aqua, atque cum pice & olco decocta, pus excitat. Cum aceto autem liguata, & cum pice decocta, contra articularum fluxiones prodest. Farina ex iis aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

EX GALENO.

Hordea pauxillum etiam abstersionis habent. Paulò etiam plus desiccant quàm farina fabacea, cui non insint cortices. Cetera verò similia sunt foris vtentibus. In cibo autè hoc præstant fabis, quòd flatuosam naturam exuant: fabis quantumcunque coxeris, flatuosa natura remanet: sunt enim crassioris essentiae quàm hordea, quamobrem iis plus etià nutriunt. Quoniam verò ambo paulum à medio recesserunt, multo sunt vsui. Nam talia medicamenta multis aliis miscentur cum materie quædam: itaque etiam cera & oleum paucis medicamentis coniunguntur. Polenta verò multo plus hordeo desiccatur. Plura de hordeo, ptisana & polenta apud Galenũ libro primo de alimentorum facultatibus offendes.

EX PLINIO.

Farina ex hordeo et cruda & decocta, collectiones impetusq; discutit, lenit & concoquit. Decoquitur aliàs in mulsæ aqua, aut fico sicca. Ad iecinoris dolores cam in posca positam cõcoqui opus est, aut cum vino. Cum verò inter coquendum discutien-

dumq;

dumq; cura est, tūc in aceto melius, aut in facce acet-
ti, aut cotoneis pyrisve decoctis. Ad multipedū mor-
sus cum melle, ad serpentium in aceto & contra
suppurātia ad extrahēdas suppurationes ex posca,
addita resina & galla. Ad cōcoctiones verò & vl-
cera vetera cum resina. Ad duritias cum fimo co-
lumbino, aut fico sicca, aut cinere. Ad nervorū inflā-
mationes, aut intestinorum, vel laterum, vel viri-
lium dolores, cum papauere aut meliloto, & quo-
ties ab osibus caro recedit. Ad strumas cum pice
& impubis pueri vrina. Cum oleo & fœnogræco
contra tumores præcordiorum, vel in febribus cum
melle, vel adipe vetusto. Suppuratis triticea farina
multò lenior. Nervis cum Hyoscyami succo illini-
tur. Ex aceto & melle lentigini.

DE CROCO CAP. CLXVII.

NOMINA.

K Ρόκος Græcis, Crocus Latinis appellatur.
Officina antiquum nomen retinuerunt. Ger-
mani Saffran (Galli Safran) vocant simpliciter,
aut cum adiectione, zamer saffran. Sic verò vo- Crocus vici
catus à Croco iuvene, qui propter amorem Smila- de dictus.
cis virginis, in florem sui nominis versus est: quod
Ouidius testatur, qui sic scriptum reliquit:

Et Crocum in paruos versum cū Smilace flores.

FORMA.

Crocus folio est angusto adusque capillamēti pe-
nè exilitatem: flore purpureo Colehici floribus non-

H | admodum

PLANTARVM HISTORIAE

admodum dissimili, in quo flammea Croci stamis-
na: radice bulbosa, copiosaq; ac viuaci.

LOCVS.

Nascitur in Coryco monte Ciliciae optimus. Pro-
ximam nobilitas ei qui in Olympo Lyciae monte pro-
uenit. Dein ei qui ex Aegis Aetoliae urbe affertur.
Nunc in plerisque Germaniae locis plantari coepit
haud infeliciter, quod viribus è locis iam comme-
moratis allatis haud cedat.

TEMPVS.

Florem ante folium edit: per autumnum nanque
Vergiliarum occasu floret, neque ultra mensis spa-
cium flores durant. Postquam autem hi decidunt,
statim folia angusta & oblonga prodeunt, virentq;
tota hyeme.

TEMPERAMENTVM.

Crocus paulum quid adstringens obtinet, quod
terreum frigidumque est: sed superat in eo calesca-
ciens & qualitas & facultas, ut tota essentia se-
cundi sit ordinis excalescentium, & primi exic-
cantium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Crocus emollit, coquoquit, leniter adstringit, vri-
nam cit, & coloris bonitatem efficit. Arcet crapu-
lā cū passo potus. Fluxiones oculorum cū lacte mu-
liebri inunctus sistit. Potionibus quae pro interaneis
parantur, vtiliter miscetur: item iis quae vuluae se-
diq; subiiciuntur & illinuntur. Venerem stimulat.

Inflama

Inflammationes erysipelatosas inunctus lenit. Aurium remedijs vtilissimus est. Letalem sanè dicunt hunc si trium drachmarum pondere cum aqua bibatur. Radix eius cum passo pota urinam cit.

EX GALENO.

Crocus concoquendi vim quandam habet, adiuuante scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodum excofaciant, paucula adest adstrictio, ea parem facultatem habent essentijs emplasticis nominatis, quas cum inactas caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse constat.

EX PLINIO.

Discutit inflammationes omnes quidem, sed oculorum maxime ex ovo illitum. Vulvarum quoque strangulatus. Stomachi exulcerationes, pectoris & venum, iecinorū, pulmonum, vesicarumq; peculiariter inflammationi earum vehemēter vtile. Item tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus. Urinam cit. Qui Crocū prius biberint, crapulā nō sentiēt. Ebrietati eo resistūt. Coronæ quoq; ex eo mulcent ebrietas. Somnū facit. Caput leniter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cū Creta Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonus est, ciborumq; concoctionem efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethargica vitia iuuat. Discutiēdi quoque vim obtinet &

visceribus utilis est, ad spiritusq; difficultatem conducit. Si quis illo mediocriter utatur, bonum colorem habebit: sin verò citra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibiq; inappetentiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus ubi dolèt, summopere prodest, superpositis Beta foliis.

DE CYNOCRAMBE.

CAP. CLXVIII.

Hęc brassica canina licet mercurialis mas dicatur ob eius similitudinē, tamen Dioscoridi diuersæ sunt plantæ.

NOMINA.

Υνονο γρμβη, η κυνία η λιποβωσις αγρια.
K αργύρω Græcis, Canina Brassica, Cynia, & sylvestris Mercurialis mas Latinis, Vuild Bingelkraut das mennle, Hundszkol Germanis appellatur.

FORMA.

Caulē ex se mittit dodrantalē, tenerum & subalbidū. Folia Mercuriali similia, albescentia ex certis intervallis. Semen prope folia paruum, rotūdū. Ex qua quidē delineatione sole meridiano clarius est, herbam cuius picturā damus esse Cynocrāben. Si quidem ea caulem binūm palmorū altitudine habet, mollem & subcandidum. Folia Mercuriali similia admodū, certis interstitiis, subalbida. Semen item iuxta folia exigū, rotūdum, geminorū instar testiculo

testiculorum cōnexum: & in summa, nihil est quod non in ea descriptioni adamussim respondeat.

LOCVS.

In syluis copiosè prouenit.

TEMPVS.

Semen veris initio, nempe Aprili mense, profert, maturescit autem Maio.

TEMPERAMENTVM.

Quum gustu nihil à satina Mercuriali distet Cynocrambe, colligitur hinc idem quod illa, obtinere temperamentum.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Caulis & folia pota, & olerum modo comestum aluum cient. Ius verò decoctorum bilem & aquosa detrahit.

APPENDIX.

Alia est Cynocrambe ab hac nostra, ea cuius mentionem facit Galenus, Paulus & alij, adde etiam Dioscorides, verum sub nomine Apocyni: quod lectorem, ne diuersas herbas vnā esse putaret, monere volui.

DE COLVTEA. CAP. CLXIX.

Colutea nobis Baguenaudier, cuius folia & folliculos sene loco non sine viribus substituunt pauperes.

NOMINA.

Kολυτῖα Græcis, Colytea & Colutea Latinis (Gallice Baguenaudier) dicitur: à nullo

PLANTARVM HISTORIAE

tamen, quod sciam veterum, quàm à Theophrasto lib. iij. de plant. hist. cap. xviij. celebrata.

GENERA.

Colutea. Duo eius sunt genera. Vnū quod priuatim Colutea vocatur, officinis incognitū. Germani Vuelch Linsen appellāt. Alterum officinis cognitū & frequenti vsu à medicis vsurpatū, Mauritano sermone Sena nominatur. Germani ad eam alludētes appellationem, Senet nuncupant. Differunt autem inter se magnitudine: siquidē primū genus maius est altero, vtpote quod quadriennio, Theophrasto loco paulò antè citato teste, se in arborē efferat. Siliquæ etiam illius magis turgido spiritu distenduntur, Sena verò siliquas profert lunatas, nec ita prætumidas. Semen denique Coluteæ rotundum, lentis obtinens similitudinem, Senæ autem oblongum, cordisq; humani instar acuminatum.

FORMA.

Colutea Frutex est ramis exilibus, folio farnigraci, flore
descriptio genistæ aut pisi luteo, membranco folliculo, pellucente, prætumido, & veluti quodam spiritu distendente turgido, ita vt digitis si prematur, crepitans dissiliat, in quo semen atrum, durum, latum, lentis magnitudine, pisi gustu, in ordinemque digestum clauditur.

LOCVS.

Sæpius vtrunque in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret

*Floret Colutea Maio & Iunio mensibus, ac sub
inde in siliquis oblongis semen profert.*

TEMPERAMENTVM.

*Arabes calidam in principio secundi, & siccam
in primo ordine statuant.*

VIRES. EX ACTVARIO.

*Sene siliquosus quidam fructus à barbaris appel
latur, qui citra noxam drachmæ pōdusculo potus,
pituitā & bilem deicit: post hos reliquos humores
modestissimè purgat, retorridam atramq; bilem, &
iūsq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetu
sto capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini
succurrit. Sed feruesfacti ius potius quàm triti fari
na propinatur. Interaneorum obstructiones tollit.*

APPENDIX.

*Quum non forma tantum, imò etiam sapore duo
hæc Coluteæ genera sibi similia sint, facilè etiā hîc
colligitur facultate inter se minimè differre. Quare
vtrunque citra molestiā atram bilem retorridamq;
educit, caputq; ac cerebrum, & instrumenta sensuū
à noxiis purgat humoribus. Quid multa? aduersus
omnia vitia ab atra bile nata valet.*

APPENDIX ALTERA.

*Dum hosce commentarios conscriberemus non e
rat ad manum Græcus Theophrastus: quare cū La
tino tantum vtendum esset exēplari Theophrasti,
non satis coniiicere potuimus, an per γ aut per ο
vox ipsa scriberetur, cū nō rarò Latini eas voces*

PLANTARVM HISTORIAE

in quibus Græcè v est, per v efferant. Quare Latine dici hanc herbam Coluteam & Colyteam putauimus. Sed nactus tandem Græco Theophrasti co-
 Colutea dice, statimprehendimus κολυτέα à κολυτέα
 differt à diuersam esse: id ipsum enim Theophrastus manife-
 Colytea. stè innuit. In Latina verò Theodori versione per-
 peram pro Colytea scribitur Colycea: id quod nobis etiam tenebras offudit.

DE CORONOPO. CAP. CLXX.

Coronopum, id est, pedem cornicis pingit quam nos merito cornu cerui vocamus, quòd adultæ eius folia cornu ceruini effigie ramosa sint. Coronopus nobis alius est in syluis frequens folio infernè violam nigram aut geranium referente, superno exiguo in pedis cornicis formam planè diuiso, cui flos supereminet luteus paruus.

NOMINA.

Pes Cornicis.	Κορονόπος, ἡ ἄσπις Græcis, Pes Cornicis & Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis incognita herba. Germanis cōmodè
Coronopus vnde dicta.	Kraen oder Rappenfusz (Gallicè Capriole, ou sanguinaler, ou dent au Chien) appellari potest. Coronopus enim non alia ratione dici cœpit, quàm quòd Cornicis pedem effigie representet. Sanguinaria autem Sanguinalisve vocata est, quòd sanguini sistendo apta sit herba. Sunt qui herbam
Sanguinaria.	
Herba stellæ.	

Stellæ

Stellæ nominant, alludētes haud dubiè ad Græcam appellationem astrion. Nonnulli quòd folium eius multipartitò cōsectum in ceruini cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu vocarunt.

FORMA.

Herbula est oblonga, per terram strata, foliis fissis, radice gracili & adstringēte. Ex qua quidē descriptione, etsi concisa admodum, satis liquet, herbā hanc cuius picturam damus esse Coronopum. Herbula enim est foliis oblongis & scissis, ac in multas partes laciniatis, atque ad cō cornicis pedem effigie referentibus, humi quoque semper sparsa proserpit: radice denique tenui admodū & adstringente prædita. Quibus omnibus id quoque accedit, quòd Dioscorides Psyllium folia Coronopo similia habere scribit: quod si verum esse ex vtriusque herbe collatione experiri volueris, senties Coronopi huius nostri folia planè Psyllij foliis similima esse, potissimum ubi primum è terra erumpunt: imò quòd ad folia, flore. & semina attinet, omnia in vtrisque sibi similia deprehendes, in eoq; solo distare cōperies, quòd Psyllium folia non fissa habeat, & in altum surgat, singulāque iam ducta maiora producat: contra Coronopus humi repat, minoraq; omnia profert. Vtraque igitur herba luteos obtinet flores, & semina in capitulis pulicibus similia. Capitula verò in Coronopo sunt multo quàm in Psyllio tenuiora ac longiora, id quod pictura graphicè monstrabit.

bit. Ex iis quoque manifestū sit errare illos toto cœlo, qui gramen aculeatum & Coronopum vnā & eādem herbam esse contendunt, cū tamen forma non parum distare videantur. Atque hinc est quòd omnes veteres tã Græci quàm Latini vtrāq; herbam seorsim, & in diuersis locis descripserint. Plinius siquidem lib. 24. cap. 19. aculeatum gramen in cacumine aculeos plurimum quinos habere, atque adèd Dactylon vocatum esse hoc nomine, quòd scilicet digitorum speciem referat, scribit. Coronopus verò neq; quinos, neque in cacumine aculeos obtinet, sed tantū folia fissa, vel si aculeos placet appellare has fissuras, non in cacumine, sed in ambitu passim foliorum eas reperiēs: vt certum sit Coronopum non esse aculeatum gramen.

LOCVS.

Dioscorides in incultis, semitis, & iuxta domicilia nasci tradit. In Germania tamen, quòd sciam, nusquam nisi sata prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio mēse, ac subinde in oblongis capitulis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Ex adstrictione ipsa satis constat radicem ipsam siccandi vi præditam esse.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Herba cocta estur olerū modo. Radicē habet in cibo adstringentem, quæ cæliacis conducatur.

EX GALENO.

Coronopodis radix comesta cœliacis prodesse creditur.

EX PLINIO.

Seritur interim Coronopus, quoniam radix cœliacis præclare facit in cinere tosta.

DE CYCLAMINO. CAP. CLXXI.

Cyclaminus frequens in loco Aurelianensi. in hortis etiam nostris prouenit.

NOMINA.

Kυκλάμινος, ἢ ἰχθυόθερον Græcis, Rapum et tuber umbilicumq; terræ Latinis, Cyclamen officinis mutata voce, Panis porcinus & terræ, atque Arthanita à nostræ ætatis herbariis, Germanis Erduurtz oder Apffel, Schuuein oder Seuubrot (Gallicè Pain de Porceau) dicitur. Cyclaminus Cyclamino Græci nomen fecerunt, circumactā in nus unde orbē eius circinationē cōtemplati, αὐτὸ τὸ κύκλος, dicta. quasi ab orbe Cyclaminon, hoc est, orbicularē dixerunt. Fuitq; hæc prior & antiquior plantæ huius theron. appellatio. Ichthyotheron verò iidem, quòd pisces Rapum terræ necantur, nominauerūt. Romani Rapum terræ, ræ. quoniam eius radix in terra velut Rapum extube Tuber terræ. Quæ sanè ratione terræ tuber, quòd in molem, ræ. quādam intumcat: aut umbilicum terræ, quoniam Umbilicus ut umbilicus circinata forma emergit, sic & Cyclaminus sub terra conspicitur, etiam appellarunt. Panis porcinum Porcinum haud dubiè primū vocarūt subulci, cinas.

qui

PLANTARVM HISTORIAE

qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Ceteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, quod saepius radicem in orbem circumactam intuerentur, quæ non in globum innumescens, sed veluti pressa sese in latitudinẽ explicaret, quæ for-

Panis terra. ma quotidiano vsu panes visuntur, terræ panẽ coeperunt appellare.

FORMA.

Folia Hederae habet, purpurea, varia, suprà infraq; albicantibus maculis. Caulẽ longitudine quatuor digitorum, nudum, foliisq; carentem, in quo flores rosarum effigie purpurei. Radicem nigram, rãpo similem, in latitudinem se pandentem.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis & vepribus, maximè sub arboribus.

TEMPVS.

Cyclaminus ad finem Augusti folia sua quæ per integrũ retinuit annum, amittit, & subinde noua emittit, atq; statim inter ea flores ostendit, qui integro durant autumno.

TEMPERAMENTVM.

Clarum est ex particularib. operationibus, quas statim subiiciemus, Cyclaminum esse calidam & siccam in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Cyclamini cum hydromelite pota pituitam, aquamq; per inferna trahit. Menses pota & apposita

apposita cit. Tradunt si pragnans mulier radicem
 transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa ac-
 celerat. Bibitur & in vino cōtra letalia, praesertim
 leporem marinū. Illita contra serpentium ictus re-
 medio est. Immistā vino ebrietatem facit. Regium
 morbum sistit tribus drachmis pota cum passo, aut
 diluta mulsa. Sed oportet cū qui bibit cubiculo cas-
 lido reclinare, multis vestibus cōtectum, quò sudet.
 Eiectus verò sudor felleus colore inuenitur. Succus
 eius ad purgandum caput, naribus instillatur. Sed
 etiam ad deiiciēda excrementa in lana subiicitur.
 Umbilico, imo ventri & coxae illitus succus aluum
 molliat, verū abortum efficit. Suffusis & hebetis
 bus oculis inunctus cum melle succus prodest. Me-
 dicamentis abortum inferentibus admiscetur. Sedē
 procidentem cum aceto inunctus succus compescit.
 Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassi-
 tudinem decoquitur. Radix cutem extergit. Exan-
 themata reprimat. Vulneribus per se ex aceto aut
 melle medetur. Illita lienem minuit. Vitia cutis in
 facie à sole & alopecias emendat. Decocto eius lu-
 xata, podagra, & capitis vlenscula, pernionesque
 utiliter fouentur. Ipsaq; in vetere oleo feruēfacta,
 ad cicatricem perducit quae olea illō inuncta fue-
 rint. Cauata radix oleo expletur, & cineri feruens
 imponitur, adiecto interdum thyrrhenica ceræ
 modico, ut strigmenti crassitudinem contrahat vng-
 uctum, cum primis utile pernionibus. Radix Scil-

le modo concisa reponitur. Narrant ad amatoriam assumi contusam, & in pastillos conformatam.

EX GALENO.

Cyclaminus varias vires obtinet, nā et extergit, & incidit, & ori venarū aperit, et attrahit, & discutit. Clarū verò id est ex particularib. operibus. Nā succus eius hemorrhoidas reserat, violenterq; ad secessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, strumas, aliasq; durities discutietibus commiscetur, ac suffusus cū melle illitus cōpetit: ad hæc quoque per nares expurgat. Addeò est vehemens eius facultas, vt abdomine illito ventrē subducatur, & foetum interimat. Nā & alioqui validū interimendo conceptui medicamen est, in pesso addita. Tota verò radix succo imbecilior est, quāquam & ipsa vehemens sit. Nā & menses siue epota, siue apposita euocat, & regio morbo prodest. nō modo ipsam viscus expurgans, sed etiā quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem excernens. Proinde à potione omnibus modis sudoris adiuvanda prouocatio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem extergit cū in aliis, tum quòd alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curet. Lienē quoque induratum iuuat illita, tum recēs, tum arida. Sūt qui radicem siccam asthmaticis exhibeāt.

EX PLINIO.

Cyclamini radix cōtra serpentes omnes bibitur.

In omnibus ferenda domibus, si verum est, ubi sata sit, nihil nocere mala medicamenta: amuletum vocant: narrantq; ea ebrietatem repræsentari, addita in vinum radice. Et siccata Scillæ modo cōcisa res ponitur, decoquiturq; eadem ad crassitudinem mel lis. Suum tamen venenum inest ei, tradiuntque si prægnans radicem eam transgrediatur, abortũ fieri. Radix denique tribus drachmis bibitur in loco calido, & perfrictionibus tuto: sudores enim fellices mouet.

DE CYPERO. CAP. CLXXII.

Cyperus nobis Souchet, fortè à radice quam Galli Souche vocant, cuius vis & usus est præcipuus.

NOMINA.

Kύπερος ἢ κύπερος Græcis, Cyperus & Cypirus Latinis dicitur. Quñ enim Græci quãdoq; diphthongo, vt Theophrastus, quandoque vocali breui, quemadmodum Dioscorides, Galenus et alij quidam, penultimam scribant, sit vt aliqui, e, alij verò i retineant. Poetæ qui e ex diphthongo retinuerũt, meritò penultimam in Cypero producũt. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Germanis Vuilder Galgan (Gallicè Souchet) vocatur.

FORMA.

Cyperus porri folia habet, longiora tamen, gracilior & solidiora. Caulẽ cub: talem, & nonnunquã altiore, angulosũ, schæno similem, in cuius ca-

cumine

PLANTARVM HISTORIAE

cumine minorum foliorum ac seminis productio est. Radices illi subsunt, quarum usus est, oblonga, oliuarum modo sibi inuicem commissa, aut rotunda, nigra, suauiter olentes, & amara: vel, ut Theophrastus delineauit, inaequales, partim crassa, carnosaeq; partim graciles atq; surculosa. Ex qua descriptione omnib. esse perspicuum arbitramur, stirpem cuius nunc picturam damus esse Cyperum. Si quidem folia fert porracea, longiora, exilioraq; caulem altitudine cubiti, aut altiore, angulosum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt, inter quae semen residet. Radices huic sunt oblongae, oliuarum modo inter se connexae ac inuicem implexae, aut rotunda, nigrae, iucundè spirantes, gustu amara. Praeterea magna inaequalitate notantur, quod pars quaedam crassa carnosaque, quaedam gracilis atque lignosa sit. Nemo enim non videt radicis tenuitatem surculosam protinus in oliuaria tubercula verticillari. Nascitur quoque è latere huius radícula, quod Theophrastus etiam notauit, unde cauliculus erumpit alius, ut pictura affabrè monstrat.

LOCVS.

Nascitur in locis cultis & palustribus. In Germania certè non nisi cultus in hortis prouenit.

TEMPVS.

Minuta folia in cacumine cum semine Iunio & Iulio mense producit.

TEMPERAMENTVM.

Cyperus

*Cyper*i radices maximè vsui sunt, excalfacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radici *Cyper*i calefaciendi vis inest, vrinamq; mouendi. Calculosis & aqua inter cutem correptis pota succurrit. Aduersus scorpionum ictus remedio est. Refrigerationibus vuluæ & præclusionibus fortis auxiliatur. Pellit menses. Arida trita oris vlceribus, etiam si depascent, prodest. Malagmatis calefacientibus miscetur, & vnguentorum sissamentis accommodatur.

EX GALENO.

*Cyper*i radices maximè vsui sunt, excalfacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem. Itaque vlceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirificè prosunt: habent enim quiddam etiam adstringens, quapropter vlceribus item oris conueniunt. Quin & incidendi vim quâpiam illis inesse testificandum, quæ & calculo vexatis congruunt, & vrinam mensesq; mouent.

EX PLINIO.

Cypero vis in medicina psilothri. Illinitur pterygiis, vlceribusque genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris vlceribus. Radix aduersus serpentium ictus & scorpionum præsertim remedio est. Vuluas aperit pota. Largiori tanta vis, expellit eas. Vrinam ciet & calculos: ob id utilissima hydropicis. Illinitur & vlceribus quæ serpunt, sed

his præcipuè quæ i stomacho sunt, ex vino vel aceto illita. Iunci radix in tribus heminis aquæ decocta ad tertias tuſſi medetur. Semen toſtum & in aqua potiſſiſt aluum & ſeminarum menſes, capitiſq; dolores facit.

DE LATHYRI. CAP. CLXXIII.

Lathyrus nobis à purgandi violentia Eſpurge dicitur.

NOMINA.

Cataputia minor, quod in pilulis quibuſdã, ſeu potius catapotiis, ſemẽ ferat: aut, quod veriſimilius eſt, quia graniſ eius ad aluum ſubducẽdam pro catapotiis vtantur. Germani Springkraut, Springkorn oder Treibkorn (Gallicè Eſpurge) appellant, quòd ſemen ſcilicet niſi in tempore auferatur, ſua ſponte ex loculamentiſ ſaliendo excidat.

FORMA.

Caulem præfert cubitalem, vacuum, digiti craſſitudine: in cuius cacumine ſunt alæ. Folia in caule oblonga, amygdalinis ſimilia, latiora tamen & leuiora. Quæ vero in ſummis ſunt ramuliſ, minora, Ariſtolochia aut oblongæ Hedera figura. Fructum fert in ſummis ramis tribuſ loculamentiſ diſtinctum, rotundum ceu Capparin, in quo terna ſunt ſemina putaminibuſ inuicem diſcreta, rotunda, maiora, cruſis quæ quum corticiſ buſ exuuntur, candida ſunt, & guſtu dulcia.

Ra-
dix.

dix illi tenuis & inutilis. Totus autē frutex lacteo
 liquore, Tithymali modo, plenus est. Hāc certē de Cataputia
 scriptiōē, si singula cōparare velis, ita Cataputia minor
 minori quadrare inuenies, vt nulla prorsus sit nota
 quam nō pictura referat. Nā hac caulem cubitali
 emittit longitudine, & digitali crassitudine. Gignū
 tur in fastigio alae, & folia in caule oblonga, amygda
 lae proxima, latiora & leuiora. Quae autem in
 summis emicant ramulis, minora iis quae caule am
 biunt conspiciuntur, Aristolochiae aut longioris He
 dere figura. in cacuminibus fructum gerit triplici
 cellula conceptaculo ve distinctū, cum Capparin ro
 tūdum, in cuius ventriculis grana tria intercursan
 tibus membranis diuisa continentur, cruus maiora,
 rotunda, quae corticibus exuta alba spectantur, gu
 statu dulcia.

LOCVS.

Nascitur locis cultis & sabulosis.

TEMPVS.

Carpitur autumno dum fructu praegnans est, se
 menq; eximitur dum tuniculae quibus includitur,
 inaruerunt.

TEMPERAMENTVM.

Calidam in tertio, & in primo ordine humidam
 statuunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Purgant aluum grana eius sex vel septem sum
 pta in catapotio, aut comesta, aut cum caricis aut
 palmulis deuorata, frigida superpota aqua. Ducūt

PLANTARVM HISTORIAE

autem pituitam & bilem, & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum præstat. Folia cum gallinaceo aut oleribus decoquuntur ad eundem effectus.

EX GALENO.

Sunt qui Lathyrin dicant Tithymali esse speciem, tum quòd similiter illis succum habeat, tum quòd eodem modo purget, vniuersaq; illis facultate similis sit, nisi quòd semē gustantibus videatur dulce: quod sanē etiā maximē purgatoriā vim obtinet.

EX PLINIO.

Grana vicena in aqua pura aut mulsa pota, hydropicos sanant. Trahunt & bilem. Qui vehementius purgari volunt, cum folliculis ipsis sumunt ea, nam stomachum ledunt: itaque inuentum est, ut cū pisce, aut iure gallinacei sumerentur.

DE LEUCOIO DIOSCORIDIS.

CAP. CLXXIII.

Leucoia nobis à caryophylli in floris figura, & acrimonia Gyroflée dicuntur, & vnū genus luteū officinis cum Mauris Keiri.

NOMINA.

Viola alba.
Cheiri.

Λευκόιον Græcis, Viola alba, vel Viola simpliciter Latinis, officinis Mauritana voce Cheiri vel Keirim appellatur, Germanis Veiel (Gallice Gyroflée,) Non autem temere adiectum est Dioscoridis: hac enim voce à leucoio Theophrasti, de quo suo loco dicemus, segregare volumus.

G E N E R A.

Etſi Leucoij nomine Viola ſignificetur cãdida, tamen & pro lutea, & cœrulea, & purpurea ſolet uſurpari. Quatuor itaq; Violæ huius ſunt genera, quæ ſola ſorum diuerſitate inter ſe differunt. Alia Viola pur enim candida, alia lutea, alia purpurea. Non eſt ta purea du- men quòd per purpurcã hîc intelligas eã quæ Græ plex. cis ἰορ, & Latinis propriè Viola dicitur: nam eius alia ab ea de qua hîc agimus familia eſt, huicque tum qualitate tũ facultate, adde etiã forma, cõtra- ria. Ea enim quæ ἰορ Græcis vocatur, humilis eſt, ob id à nōnullis ſeſilis dicta, & latiore folio. Con- trà noſtra illa, vt mox dicemus, cubitali eſt altitu- dine, & minimè ſeſilis. Idem de candida dictũ pu- Viola can- tes, nã ea quoque duplex eſt: vna de qua hîc fit ſer dida due- mo, alia ſeſilis, de qua in præſentia nihil dicemus. plex. Nos tria dũtaxat genera picta damus: cœruleas e- nim videre nō licuit. Quare ſuppoſititiũ hoc verbũ in Dioſcoride puto, maximè cum Plin. lib. xxi. vbi de ſatinis Violis loquitur, purpurea ſcilicet lutea & alba, nullam de cœrulea mentionem fecerit.

F O R M A.

Cubitali altitudine profiliunt, ramoſæ, caule Braſſicæ exiliore, folio longo, molli, caneſcente, flore quadrifolio, Viola ſylueſtris odorem referente, non vnius coloris, nam alij candidi, alij lutei, alij pur- purei. Semen foliaceum tenuibus quidem, ſed quin- cuncialibus ſiliquis continetur.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Vbiq̃ue ferè in hortis & cultis reperiuntur. Nō enim nascuntur magna ex parte nisi sata fuerint.

TEMPVS.

Primo vere & Maio potissimum mense, inter flores emicat Leucoion. Hoc itaque tempore flores carpendi. Semen inter aestatis initia profert.

TEMPERAMENTVM.

Leucoion abstergentem facultatem possidet, & tenuium est partium, Galeno autore, proinde vt calidum sit necesse est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lutea in medicina præcipui vsus est. Huius flores aridi effervescit in desectionibus, contra vuluæ inflammationes valent, & menstrua educunt. Cezrato excepti rimas sedis sanant: cum melle oris ulcera. Semen eius duū drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle appositum, menses, secundas & fetus educit. Radices cum aceto illitæ, reprimunt lienem, & podagricos iuuant.

EX GALENO.

Leucoii frutex vniuersus extergentem facultatem obtinet, ac tenuis partium est, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciores. magis etiā quam virides, aled vt & oculorum crassas cicatrices extenuent. Tūc menses quoque decoctum corum mouet, & secundas, fetumq; emortuum elicit, & si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum

ut si quod aliud amarū. Quod si quis viriū eius vehemētiam multa aqua almiſta mitiget, aut certē id genus aliquo, habebit & ad phlegmonas bonū medicamentum. Sic decoctum eius si non merū fuerit, vteri phlegmonas identidem perſuſum ſanat, potiſſimum quæ diutino tempore ad ſcirri modū induruerē. Sic cum cerato vlcera agrē ad cicatricē peruenientia curat. Sunt verò etiā qui cum melle ad oris vlcera adhibeant. Semen quum eiusdem ſit facultatis, aptiſſimū eſt duarum drachmarum menſura potum, tum menſibus ciēdis cū melle appoſitum conuenire creditur, foetumq; viuētē interficere ac mortuum eijcere. Radices ſimilis quoque facultatis, niſi quatenus craſſioris ſunt eſſentiae, & magis terrene, cum aceto lienes induratos ſanant. Nōnulli verò & phlegmonas induratas iis curant.

EX PLINIO.

Extenuant, menſtrua & urinam ciunt. Minor viſ eſt recentibus, ideoq; aridis poſt annum vtendū. Lutea dimidio cyatho in aqua tribus, menſes trahit. Radices eius cum aceto illitæ ſedant lienem. Item podagram, oculorum inflammationes, cum myrrha & croco. Folia cum melle purgant capitis vlcera, cum cera rimas ſedis, & quæ in humidis ſunt. Ex aceto verò collectiones ſanant.

DE LAPATHO. CAP. clxxv.

Oxylapaton à lapato, vulgus Lapatiēce & Parelle. Secundū genus Lapatum, rotun-

PLANTARVM HISTORIAE

dum vulgò dictum videtur, aut ei affine rhabarbarum cartusianorum. Tertium genus est oxalis, Turonice nobis dicta. Quartum oxalis vulgaris, nomen Parisiis oxale retinens.

NOMINA.

Lapathū **Λαπάθου** Græci, Rumicem Latini, barbari **Λαπάτιον** vocant. *Lapathum* autem ab effectu nomen accepit, quòd scilicet exinaniat: etenim **λατῶσαι** vacuare vel exinanire Græcis est: omnium siquidem generum foliis decoctis alius molitur.

GENERA.

Primum. Huius quatuor genera facit Dioscorides. Primum oxylapathon Græcis & Latinis dicitur. Officina *Lapathum acutū*, Germ. Mengeluurtz Grindtuurtz, Streiffuurtz, Zitteruurtz, Vuildampfer (Gallicè De la parelle, ou de Lapacièce) nominant. Oxylapathum, quamvis anceps in acidū saporem vel acutam figuram videatur significatio, tamen nomē hoc à foliis quæ in mucronem desinūt

Secundū. accepisse videtur. Secundum genus hortense prioris dissimile, non quidem in vniuersum, sed duntaxat in foliis, quæ Serapione teste, multò sunt latiora. Hoc genus haud dubiè est Rhabarbarum monachorum, quod passim hodie in hortis plantatur: Oxylapathum enim per omnia ferè simile est, folia tamen latiora obtinet, & ob cultum paulò tenerius est. Cùm autem primum erumpunt folia, purpurea ferè sunt, dein quotidie viridiora sunt, ut pictura ipsa

ipsa monstrat. Tertium sylvestre, paruum, plantagi Tertium.
 ni simile, molle & humile est, quod vulgato nomi-
 ne bonus Hērīchus, Germanicē guter Heinrich
 dicitur, id quod ex forma primum colligitur: folia
 enim eius oxalidi, nisi quòd ampliora sunt, atque
 adeo ad plantaginis nonnihil accedunt folia, simi-
 lia sunt. Flores autem eius & semen sic Oxylapas-
 thum referunt, vt vix ab inuicem discerni queant.
 Dein vires etiam conueniunt: vulneraria enim her-
 ba est Bonus Henrichus, ac mirificè ad sordida pur-
 ganda, ac glutinanda vlcera confert, sic vt appensa
 etiam, ac trita vulneribus imposita, vermes qui in
 iis nati sunt excidere faciat. Quartum genus Græ-
 ci ὄξαλιδα, Latini Oxalidem, officina Acetosam, Quartum
 Germani Saur Ampffer nominant. Oxalis autem Acetosa.
 ideo dicta est, quòd in gustu acorem planè respiciat,
 vnde etiam vulgus Acetosam vocauit. Hanc pro-
 priè Romani appellant Rumicem, forsitan quòd Rumex
 ab ea succus non aliter atque mamma, quam Ru- vnde dic-
 men veteres dixerunt, sitientibus exugi soleat. Ga- eta.
 lenus tria tantum genera Lapathi facit, Oxalidē,
 Oxylapathon & Hippolapathon, quòd sic Græci
 quasi grande Lapathum dicunt, magnis amplisque Hippo.
 rebus hippo præponere soliti, ab equo excellētis am-
 plitudinis animali magnitudinem mutuantes.

FORMA.

Oxylapathum foliis duris & in cacumine acu- Oxylapas-
 tis, semine herbaceo acuminato ex minutissimis thi-
 peidis

PLANTARVM HISTORIAE

pediculis dependente, radice longa & lutea vel potius crocea. Secundū genus Oxylapatho perquam simile est, foliis tamen latioribus ac tenerioribus constitut, caule bicubitali interdum, striato, floribus exiguis, luteis, semine ut Oxylapatho triangulari, radice longa & lutea seu crocea. Tertium genus, quod vulgus hodie Bonum Henrichum vocat, folium Oxalidis, latius tamen, aut Aro, vel ut Dios-

Oxalidis. scorides inquit, plantaginive simile obtinet. Aliqua enim Ari, aliqua autem plantaginis folia referunt. Causlem prioribus duobus humiliorem, in quo flores & semina racematim multa dependent. Radicem verò longam & subflavam. Oxalis autem folia sylvestri & parvo humilive Rumici similia habet. Caulis eius non adeò grandis est, sesquicubitus altus. Semen acuminatum, rubrum, quod foliaceo vestitur involuero, sapore acri, quod in caule & ad nascentibus coliculis nascitur.

LOCVS.

Oxylapathon in palustribus & circa fossas potissimum nascitur. Secundum genus hodie in multorum hortis cōsutum provenit. Tertium passim in arvis, sepibus & circa itinera crescit. Oxalis in omnibus pratis copiosissimè provenit.

TEMPVS.

Aestate antequam prata demetantur omnium copia haberi potest.

TEMPERAMENTVM.

Recens

Recentiores Acetosam statuunt esse frigidam & siccam in secundo. Atqui quale huius & reliquarum Runicum sit temperamentum, ex facultatibus earum lem, quas mox dicemus, facile deprehendent studiosi. Secundi generis Rumex in foliis manifestissimam aciditatem ostendit, ut hinc etiam coniectere liceat esse Runicem, utcumque monachi & cum iis multi quoque medici, Rhabarbarum esse contendunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omniū Runicum olus decoctum aluum molli-
lit. Crudum illitum cum rosaceo aut croco melice-
rides discutit. Semē sylvestris & Oxylapathi et O-
xalidis cum aqua aut vino utiliter contra dysente-
rias, cœliacos affectus, stomachi fastidia, scorpio-
numq; ictus bibitur. Si quis etiā in potu præsumat,
nihil ictus patietur. Radices ipsarū ex aceto et cru-
de illitæ, lepras, impetigines, scabrososq; ungues sa-
nant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfri-
candus est. Pruritus decoctū earum sedat, si eo fo-
ueantur. Coctæ in vino si cum iure colluantur, au-
rium dentiumq; dolorem mulcent. Strumas paroti-
dasq; discutunt si cum vino decoctæ illinantur. Lie-
nes autem cum aceto. Aliqui utuntur radicibus cō-
tra strumas, vinculo collo eas appendentes. Tritæ
& appositæ feminarum fluxiones sistunt. Deco-
ctæ cum vino & potæ regio morbo correptos emē-
dant. Calculos vesicæ comminunt. Menses cient.

Scorpionum

PLANTARVM HISTORIAE

Scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon easdē ante dictis Rumicū generibus vires obtinet.

EX GALENO.

Lapathum moderatē digerentem facultatem habet, oxylapathum verò mistam: nam simul cum eo quòd digerit, nonnihil quoque reprimendi facultate participat. Semen eorum manifestam quandam adstrictionem obtinet, adeò vt & dysenterias, & alui profluvia sanet, potissimum autem oxylapathi. Hippolapathon easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

EX PLINIO.

Syluestria Lapatha scorpionum ictibus medentur, & ferire prohibent habentes. Radix aceto decocta si coletur, succus dentibus auxiliatur: si verò bibatur, morbo regio. Semen stomachi inextricabilia vitia sanat. Hippolapathi radices priuatim vngues scabrosos detrahunt. Dysentericos semen duabus drachmis in vino potum, liberat. Oxylapathi semen lotum in aqua cœlesti, sanguinem reiicientibus, adiecta acacia lētis magnitudine, prodest. Præstantissimos pastillos faciūt ex foliis & radice, addito nitro & iure exiguo. In vsu aceto diluunt. Sed satium in epiphoris oculorum illinunt frontibus. Radice melicerias & lepras curant. In vino verò decocta, strumas & parotidas & calculos. Poto vino & lienes, cœliacos aquè & dysentericos & tenasmos. Ad eadēq; omnia efficacius ius Lapathi.

& ructus facit, & vrinam ciet, & oculorum caliginem discutit. Item pruritū corporis, in solia balnearum additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat & commanducata dentes. Eadem decocta cum vino, sistit aluum. Folia soluant adiecto sale.

APPENDIX.

Alterius generis Rumicis, qui Rhabarbarū mo- Rhabar-
nachorum vocatur, radix purgandi etiam vim ob- barimona
tinet, si in puluerem redacta drachmæ pondere su- chorū fa-
matur. Neque id mirum admodum, cum etiā Dio- cultas.
scorides ipse omnium Rumicum olus decoctum al-
uum mollire, atque decoctas eorundem radices cū
vino, regio morbo correptos emendare, ob bilis vi-
mirum per inferna educationem, testetur.

DE LIMONIO. CAP. clxxvi.

Limonium nobis frequens officinis no-
men non habet.

NOMINA.

Λειμώνιον Græcis, Limonion, Beta sylvestris
& Tintinabulum terre Latinis, vulgo Pyro-
la, Germanis Vuintergun, Holtzmangoldt,
Vualdtmangoldt, oder Vualdtkol (Gallis Li- Beta syl-
moine, ou Bette de pre, ou bette sauage,) ap- uestris vn
pellatur. Beta autem sylvestris hæc herba dicta est, de dicta.
quod in syluis & locis muscosis, hortensi Betæ pri- Tintina-
mum erumpenti haud dissimilis, proueniat. Tinti- bulum ter
nabulum, à floribus eius tintinabulo similibus. Py- ra.
rola, quod eius folia arboris pyri folio similia sint. Pyrola.

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Folia Betæ similia habet, tenuiora tamen & minora, decem, aut plura. Caulcm tenuem, rectum, lilio aequalcm, semine rubro, gustuq; adstringente plenum. Ex qua siquidem descriptione abunde liquet, herbam quam vulgus Pyrolam vocat esse Limonium. Foliis enim Betæ similis est, verum tenuioribus & minoribus (legendum enim in Dioscoride $\mu\iota\kappa\rho\tau\omicron\tau\omicron\pi\alpha$. & non $\mu\alpha\kappa\rho\tau\omicron\tau\omicron\pi\alpha$, Plinio lib. vigesimo, capite octauo, teste) decem, interim pluribus. Caule tenui, recto, lilio simili, pleno seminis rubri, quod gustu adstringit. Quibus accedit quod germanicè Vualdtmangolt, id est, Beta sylvestris nominatur. Neque vires discrepant: adstringit enim, vulnerariaq; herba est Pyrola, haud secus atque Limonium. Flores denique tintinabulo similes sunt, ut citra vllum discrimen Pyrolam Dioscoridis esse Limonium assecrere liceat.

LOCVS.

In vmbrosis & sylvestribus prouenit locis.

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & semen gustu vehementer adstringunt, ita in tertio ordine siccitatis illud rectè recentiores collocent.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen tritum in vino potum acetabuli mensura, dysenteria

*dysentericis ac coeliacis auxiliatur. Rubrum fami-
narum profluvium sistit.*

EX GALENO.

*Limonii semen utpote auferum, coeliacis, dysen-
tericis & sanguinē fluentibus cum vino exhibent.
Iuvat & profluvium muliebre. Satis autem est ac-
cetabuli mensura.*

EX PLINIO.

*Huius folia ambustis vitilia, guttantia adstringunt.
Semē acetabuli mensura dysentericis prodest.
Aquæ è radice coctæ maculas vestium cluere di-
cuntur, itēque membranarum.*

EX RECENTIORIBVS.

*Pyrolæ decoctum interna & externa vulnera
potum sanat. Item fistulis ac aliis malignis vlceris
bus medetur.*

DE LAMIO. CAP. CLXXVII.

Lamiū vrtica alba à flore vulgo dicitur.

NOMINA.

L Amium Plinio lib. xxi. cap. xv. & lib. xxij.
cap. xiiij. vocatur. Vulgo vrtica incers & mor- Archange
tua. Sunt qui albam Vrticam nominant, & Ar- lica.
changelicam. Officinis inusitatum, Germa. Todt- Vrtica
nessel, oder Taubnessel (Gallicè Oritie mor- mortua
te, ou oritie blanche) dicitur. Incers & mortua quare di-
cognominata, quod foliis non mordentibus sit, & sta.
mitissima.

GENERA.

Vrtica

PLANTARVM HISTORIAE

Vrtica mortua tria inueniuntur genera. Vnum albis, quod propriè *Lanium* dicitur: alterum luteis, & tertium purpureis floribus constat. Nos, quia solis floribus differunt, nec in eorum foliis aliquod discrimen apparet, vna icone omnia tria complexi sumus genera. FORM A.

Foliis constat *Vrtica* pungentis, minoribus, simbratis, candidioribus, lanugine nequaquam mordaci, caule quadrangulo, flore albo, luteo, aut purpureo, radice ex internallis cincinnis capillata. Gravi odore tota fragrat. Innoxia est & morsu caret. Semen in caulibus per intervalla copiosum & nigrum profert. LOCVS.

Passim circa semitas & sepes nascuntur.

TEMPVS.

Vere primo, Maio potissimum mense, floribus abundans, & tota ferè æstate.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est *Lanium*, veluti etiam alia *Vrtica* genera, id quod ex gustu, eiusq; facultatibus deprehenditur.

VIRES. EX PLINIO.

Medetur cum mica salis contusis incusisq; inustis et strumis, tumoribus. podagris, vulneribus. Album habet in medio folio, quod ignibus sacris medetur. Quidam è nostris tempore discreuere genera. Autumnalis *Vrtica* radice alligata in tertianis, ita vt agri nuncupentur cum eruitur ea radix, & dicatur

dicatur quæ, & cui, & quorum filio eximatur, liberari morbo tradiderunt. Hoc idem contra quartanas pollere. Idem radice vrticæ addito sale, infixæ corpori extrahi. Foliiis cū axungia strumas discuti, vel si suppurauerint, erodi compleriq;.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores hac inerti Vrtica vtuntur sistendo. ruentis è naribus sanguinis impetu, imæ ceruici vel scapulis alligando, inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum. Vlcerebus denique, putredinibus & fistulis mirificè conferre, ac mederi tradunt.

DE LINO. CAP. CLXXVIII.

NOMINA.

Lινον Græcis, Linum latinis & officinis, Germanis Lein, oder Flachsz (Ga. Du Lin) appellatur.

FORMA.

Herba est tenui caule, foliis angustis, oblongis, et in summo acuminatis, floribus cæruleis, speciosis, quibus decidentibus folliculus enascitur in quo semina continentur fulua.

LOCVS.

Gaudet pingui solo & modicè humido. Agris autem noxiū est, deteriores enim eos facit, id quod in carminibus in Georgicis significauit Virgilius: Linum
agris noxiū.
Vrit enim lini campum seges, vrit auena,
Vrunt letheo persusa papauera somno.

K TEM.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Vellitur æstate vbi maturitatem consecutum fuerit, quæ sane duobus argumentis intelligitur, intumescente semine, vel flavescente colore.

TEMPERAMENTVM.

Est in primo ordine calidum, ac humiditatis & siccitatis quodammodo in medio situm.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen Lini eandem Fœnogræco facultatem obtinet. Omnem intus forisq; inflammationem discutit & emollit, cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie crudum, varosque cum nitro & sicis illitum. Cū lixiuia autem parotidas, duritiesque discutit. Herpetas in vino decoctum, & fauos purgat. Ungues scabros cum pari modo Nasturtii & mellis eximit. Cum melle vice eclegmatis sumptū, ea quæ in thorace sunt educit. Tussim lenit. Venærem stimulat si cum melle & pipere mixtum pro placenta largius sumatur. Huius decoctum intestinorum utriq; erosionibus iniectum medetur, adq; excrementorum eductionem prodest. Ad vuluæ inflammationes in desessionibus haud aliter quàm Fœnigræci perquam vtile est.

EX GALENO.

Lini semen esum flatuosum est, etiam si frigatur, adeo sanè excrementitia humiditate plenum est. Visceribus tamen quæ circa hypochondria sunt, vt
si quid

si quid aliud, gratum existit. Quidam hoc tosto instar opsonii non secus ac factitiosale cū garo vtuntur. In vsu est & melle conspersum. Inserunt nonnulli panibus quoque. Stomacho & concoctioni repugnat. Tenuiter corpus alit. Quod spectat ad deiectionem, nec laudandum, nec vituperandum, perexiguam tamen vim mouēde vrinae tenet, quae in tosto efficacior est. Idem quoque aluum magis sistit. Rustici saepenumero torrefacto adiecta portione mellis vtuntur.

EX PLINIO.

Lini semen cum aliis quidem in vsu est. Et per se mulierum cutis vitia emendat in facie. Oculorū aciei succo adiuvat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum myrrha. Cum vino sedat parotidas. Cum melle, aut adipe, aut cera, stomachi solutiones inspersum polēta modo. Anginas in aqua et oleo decoctum, & cum aniso illitum. Torretur vt aluum sistat. Celiacis & dysentericis imponitur ex aceto. Ad iecinoris dolores estur cū vua passa et ad phthisim vtilissimè. Semine fiunt & ecligmata. Musculorum, nervorum, articulorum, cervicū duritias, cerebri mēbranas mitigat farina seminis, nitro aut sale, aut cinere additis. Eadem cum fico item concoquit ac maturat. Cū radice verò cucumeris sylvestris extrahit quaecūq; corpori inhaerent. Sic et fracta ossa. Serpere vlcus in vino decocta prohibet. Eruptiones pituitae cū melle emēdat. Ungues scabros

PLANTARVM HISTORIAE

cam pari modo Nasturtii, & testium vitia, & ramices cum resina & myrrha, & gangrenas ex aqua. Stomachi dolores cum Fœnogræco sextariis utrisque decoctis in aqua mulsa. Intestinorū et thoracis pernicioſa vitia, clyſtere in oleo & melle.

DE LICHENE. CAP. clxxix.

NOMINA.

Hepatica
Lichen
quare di-
cta.

Λειχένυ Græcis, Lichẽ latinis, officinis & herbariis Hepatica, Germ. Stein, oder Brunnenleberbraut dicitur. Lichena autem Græci & latini nominauerunt, quòd contra Lichenas omnibus remediis anteponatur: aut à re ipsa nomen dererunt, quoniam saxa quibus hæret lingua modo lambat. Hepaticam verò recentiores vocarunt, quòd iecinorum fibris similis conspiciatur.

Hepatica
quare.

FORMA.

Folio succi pleno, crasso & oblongo constat, rorulentis petris adherente, sub quo cauliculi, pediculorum forma, capitula stellata habentes, exeunt.

LOCVS.

Nascitur in roscidis & grauitèr olentibus saxis.

TEMPVS.

Iulio mense ea qua picta est forma decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Abstergentem ac modicè refrigerantem facultatem, utranque verò resiccantem habet. Abstergentem quidem atque exiccantem à petra, refrigerantem autem ab aqueo humore.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Lichen illitus sanguinis eruptiones sistit, et inflā-
mationes compescit. Impetigines sanat. Inunctus
cum melle regio morbo affectis prodest. Oris & lin-
guæ defluxiones arcer.

EX GALENO.

Lichen qui in petris nascitur, est veluti muscus
quidam, sed rectè ex plantarum genere censi pos-
test. Sic nominatus videtur, quòd lichenas seu impe-
tigines curet. Extergentem & mediocriter frigidā
facultatem obtinet. Porrò quòd ex talibus substan-
tiis componitur, aduersum esse inflammationi ni-
hil mirum est. An verò sanguinis eruptiones sistat,
vt Dioscorides ait, id neutiquam dicere queo.

EX PLINIO.

Sanguinem sistit vulneribus instillatus, & col-
lectiones illitus. Morbum quoque regium cū melle
sanat ore illito & lingua. Stigmata etiam delet.

DE LINOZOSTE. CAP. CLXXX.

Λινόζωσις, ἢ ἑρμού βοτάνιον, ἢ πῶα Græ- Mercuria
cis, Mercurialis latinis & officinis dicitur. lis.
Germanis Bingelkraut, Mercuriuskraut, oder
Kuurtz, (Gallis Mercurialle) Mercurialis dicta Mercuria
est, quòd à Mercurio inuenta sit. lis cur di-
cta.

GENERA.

Duo eius genera, mas & foemina, quæ facilè ex
eorundem descriptionibus discerni poterunt. Folia
verò maribus nigriora, foeminis candidiora.

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Mercurialis folia Ocimo similia habet, ad Helxines foliorum figuram accedentia, minora tamen. Ramulos geniculatos, alarum caua multa & densa habētes. Fœmina semen fert racemosum & multum. Mas verò iuxta folia exiguum, rotundum, geminorum testiculorum modo connexum. Totus frutex dodrantalis, & nonnunquam maior.

LOCVS.

Nascitur in campestribus cultis, vinetisq; aliquibus locis tam copiosa & efficax, vt sapore suo vina etiam inficiat, & bibentibus ingrata reddat.

TEMPVS.

Augusto mense semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam in primo ordine esse asserūt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtraque aluum mouet olerum modo comesta. Cocta in aqua & epota aqua, bilem & aquosa ducit. Creduntur præterea fœminæ folia trita & pota, aut post purgationem pudendis apposita, vt fœminæ concipiantur efficere. Mascula verò similiter adhibita, mares progenerare.

EX GALENO.

Mercuriali omnes duntaxat ad ventris purgationes vtuntur. Verum enim verò si quis eius facere periculum volet in cataplasmate, sanè digerentis admodum facultatis esse experietur.

EX PLINIO.

Mirum est quod de utroque eorum genere proditur: ut mares gignantur hunc facere, ut feminae illam. Hoc contingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturve folia decocta ex oleo et sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eā in nouo fictili cū heliotropio, & duabus aut tribus speciebus, donec decoquatur. Decoctum dari iubent & herbam ipsam in cibo altero die purgationis mulieribus per triduum, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum vsu prædicauit illas. Easque ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille eas vuluæ cum melle, vel rosaceo, vel irino, vel lirino admonuit. Item ad ciendos menses, secundasque. Hoc idem præstare potu fotūque dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitque cum vino vetere. Aluo folia imposuit, epiphoris, stranguria & vesica. Decoctum eius dedit cū myrrha & thure. Aluo quidem soluenda, vel in febris, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextariis aquæ ad dimidias, bibitur sale & melle admixto: necnon cū vngula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui utranque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum ledunt.

DE LIBANOTIDE CORONARIA. CAP. CLXXXI.

K iij Rosina

PLANTARVM HISTORIAE

Rosmarinum coronariam tantum pingit,
quod passim luxuriet.

NOMINA.

Rosmari- **Libanotis**, Græcis, Rosmarinus latinis &
mus. officinis, Germanis Rosmarin, (Gallis Ros
marin) appellatur. Libanotis verò dicta est, quod
Libano- odorem thuris reddat. Libanotida autem non eam
tis cur di- quæ simpliciter sic nominatur à Græcis intellige,
Et. 1. sed eam quæ cum adiectione, coronaria Libanotis
Libanotis appellatur. **FORMA.**

coronaria. Rosmarinus qua neſcentes coronas vtuntur, vir-
gas habet tenues, circa quas sunt folia tenuia, cre-
bra, oblonga & gracilia, intus candicantia, exterior-
re autem parte viridia, grauiter odorata. Florem,
quod Dioscorides omisit, in candido cœruleum, ra-
dicem nigram, multis fibris capillatam.

LOCVS.

Hodie passim in hortis & fictilibus vasis plāta-
tur. In Narbonensi autem Gallia sua sponte proue-
nit tam copiosè, vt eius incolæ aliud lignum non
vrant.

TEMPVS.

Carpitur Maio mense & deinde vsque ad Sep-
tembris medium. Florétque bis annuatim, vere
& autumnno.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod ex gustu & viribus
conicere quisque poterit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cal.

Calfacit. Regium morbum sanat, si quis eam in aqua decoxerit, & ante exercitia bibendam dedecerit, dein post exercitia lauerit, & vino potauerit. Miscetur etiam acopis, & musto oleo.

EX GALENO.

Libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quâ Romani Rosmarinum nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adiuvat. Omnes enim Libanotides abstergentis & incidentis facultatis sunt participes.

APPENDIX.

Recentiores Rosmarinum suffitu tuſſim & deſtillationem ſedare tradunt. Et quod in primis nobile, tutam præſtare in peſtilentia domum crematam, nidore improbam aeris diluentem perniciem. Adiiciunt & alias facultates, eas nempe: Roſmarinus corroborat cerebrum, ſenſus interiores, memoria & cor. Succurrit tremori, reſolutioni q̃; partiſſi. Loquelam amiſſam reparat, & alia multa poteſt, quæ commemorare ſuperuacaneum eſt.

DE LIGUSTRO. CAP. CLXXXII.

Ligustrum tronia officinis dicitur.

NOMINA.

Ligustrum Plinio aliſſque latinis nominatur. Officinis inuſitatum, Germanis Beinholtzlin, Mundtholtz, Rein oder Schuluueidem, (Gallis Du Troefne) dicitur. Quo autem nomine Græcis appellatum ſit, nondum certo nobis conſtat:

Ligustrū stat: neque enim vt fere omnes hodie putant Cy-
nō est Cy-pros est, quæ Plinio lib. xij. teste, semen habet Co-
pros.riandri, peregrināque existit arbor. At Ligustrum
 semen non Coriandro simile, quod rotundū ac sub-
 flauum est, sed potius atrum, & altera parte latius
 modicēque concanum in racemis, profert. Nec ar-
 bor est peregrina, sed sponte in sepibus & senticetis
Phillyrea ubique prouenit. Mea tamen sententia Phillyrea
videtur potius apud Dioscoridem erit, quod hæc Cypro cō-
 esse Ligu- gener ac similis sit, easdēque quas Ligustrum fa-
strum.cultates habeat. Iudicium tamen penes prudentem
 lectorem esse volumus.

FORMA.

Ligustrum arbor est parua, foliis Oleæ similibus,
 floribus parvulis, candidis & odoratis, racematim
 florentibus, fructibus initio virentibus, processu tē-
 poris nigris, vuarum more congestis.

LOCVS.

Nihil frequentius Ligustro in vepribus occur-
 rit, nihilq; crebrius in dumetis inuenitur, ita vt hoc
 nomine contemptui habeatur. Quapropter huc res-
 piciens Virgilius in Bucolico carmine, eius flores
 negligi à pastorib. ac inutiliter perire canit, dicēs:
 Alba ligustra cadunt, vacinia nigra leguntur.

TEMPVS.

Maior mense floret, autumno autem cum maturis
 baccis nigrescit.

TEMPERAMENTVM.

Etsi forma nonnihil à Cypro distet Ligustrum, temperamento tamen eodem est præditum. Eius enim folia & surculi mixta qualitate constant: discutiens enim quiddam cum aquea substantia, modicè calida, & quiddā etiā adstrictoriū ex terrena substantia frigida, & sine morsu sic cātē, obtinent.

VIRE. EX PLINIO.

Succus eius nervis, articulis, algoribus, folia ubique veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationibus prosunt. Acini contra phthiriasim, itē contra intertrigines, foliāve. Sanāt & Gallinaceorum pituitas acini.

APPENDIX.

Recētiores Ligustri succū vlcera oris, veretrique sanare tradunt. Idem etiam posse folia in vino decocta adiiciunt: vt hinc euidentissimū sit, foliis Ligustri, haud secus atque Cypri aut Phillyreæ, adstrictoriam inesse vim, propter quā cōmanducata & decocta, oris potissimum vlceribus opitulantur.

DE LVNARIA MINORE.

CAP. clxxxiii.

Lunaria minor inuentu hic rara, quam nomen herbariis prope omnibus in ore est frequens, tum eius, tum etiam maioris.

NOMINA.

DIu multumq; de huius herbe nomenclatura fuimus solliciti, at utcūq; multos iterrogauerimus,

PLANTARVM HISTORIAE

rimus, tamen aliud nomen quàm idipsum quo nunc appellamus expiscari haud potuimus. Vocetur itaq;
Lunaria minor. *Lunaria minor* donec certiore appellacionem habere contigerit. Germanicè Klein Monkraut, ut sit ad Latinam nomenclaturam allusio quaedã, nuncupetur.

FORMA.

Rotundo est caule, cui folia utrinque septē annexa, cordis ferè humani formam habētia: in summitate caulis semen Beta simile profert.

LOCVS.

Nascitur in montibus. Copiosissimè autem Tuinga in pede montis Austriaci provenit. Prope hanc nunquam non Ophris, de qua suo dicemus loco, invenitur.

TEMPVS.

In fine Maij & Iunio mense invenitur, dein statim evanescit.

TEMPERAMENTVM.

Terrestre quid præ se fert gustata, atque parum adstringit, ut hinc mediocriter frigidam & siccam esse verisimile sit.

VIRE S.

Vis foliorum eius haud dubiè vulneribus efficax. glutinadi nanque facultate prædita est. Chymicorum nugas, quibus eius herbae usus frequentissimus est, lubens prætereo. Constat autem experientia, ad suppressendos menses, & album muliebrem profuvium, mirificè conferre hanc herbam.

DE LEPIDIO. CAP. CLXXXIIII.

Lepidium iam in hortis frequens, tritum
olet sinapi, & illius ac piperis est acrimo-
nia. NOMINA.

Lεπίδιον Græcis, Lepidium Latinis appella-
tur. Vulgus herbariorum Piperitim nominat. Piperitis
Quam denominationem sequentes Germani nostri
Pfefferkraut, (Gallorum vulgus Pafse rage) vo-
cant. Nomen verò hoc à pipere traxit, cuius acrimo-
niam herba hæc gustata refert. Diuersa est ve-
rò, vt obiter parum attentos moneam, ab ea planta
quam Plinius Piperitim nuncupat, de qua suo loco
dicemus copiosè. Sūt qui Lepidiū alio nomine Ra-
phanum nomenclant, quod non alia fit ratione, quam
quòd herba hæc quòd ad folia attinet, Raphano syl-
uestri, què Amoraciam alio nomine dicunt, admo-
dum similis sit. Lepidium verò appellatum, quòd
Λεπίδιος, hoc est, squamas & maculas in facie
deleat & repurget.

Rapha-
nus cur di-
catur. Lea-
pidium.
Lepidium
vnde di-
ctum.

FORMA.

Fruticosum est, in cubitalē altitudinem surgēs,
foliis laurinis, sed mollibus, & maioribus. Sic quidē
Lepidion depingit Plinius & Paulus. Vnde sole cla-
rius fit, herbam cuius picturā damus esse Lepidion:
cubitalis enim & interdum bicubitalis est, caule so-
lido & rotundo, foliis oblongis & laurinis, maiori-
bus tamen & mollioribus, gustu piper referentibus
& acris, magnopereq; linguam villicatibus, flo-
ribus

PLANTARVM HISTORIAE

ribus candidis, exiguis admodum, semine paruo, radice oblonga. In summa, forma totius herbae Raphano, vt diximus, syluestri similis est.

LOCVS.

In hortis potissimum prouenit, in quibus viuacitatem suam vsque ad multos annos prorogat.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, deinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

In ordine quarto calefacit, vt Nasturtium, excicat autem ipso minus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Salgamorum more, sale cum lacte conditur. Foliolorum vis acris & exulceratrix est. Quapropter ischiadicis presenti remedio illinitur, tritum cum radice Inulae, & quarta vnius horae parte positum. Similiter & lienosis prodest. Lepras idē pellit. Radix collo adalligata, dentium dolorem leuare creditur.

EX GALENO.

Facultate Nasturtio simile est.

EX PLINIO.

In facie cutem emendat exulcerando, vt tamen cera & rosaceo facile sanetur. Sic lepras & psoras tollit semper facile, & cicatricum vlcera. Tradunt in dolore dētium adalligatum brachio qua doleat, comescere dolorem.

APPENDIX.

Lepidion crassos & glutinosos cibos & humores extenuare, & incidere valet: ideoq; culinaria est herba, & salsamentis idonea.

DE LEVCOIO. THEOPHRA-
STI. CAP. CLXXXV.

Leucoion Theophrasti à Massario in lib. ix. Plinii deprehensum est, quod nobis circa natalē Christianum etiam summis frigorib. floret passim in syluis, & nūc quoque in hortis quibusdam.

NOMINA.

Lευκόιον Theophrasti hoc loco describimus, quod planè diuersum est à Leucoio Dioscoridis, quod suprà depinximus, id quod tamen plerique etiam docti viri non animaduertunt. Latinis Viola alba dicitur. Germanicè Vucisz Hor Viola alnungszblumē, oder Mertzzenblumē (Gallicè ba. Violette, ou Giroflée.) Non autem ab re Viola Viola alba dici cœpit: flos enim huius herbæ colorem alba curdizum, & Violarum odorem refert. sta.

FORMA.

Folia habet Porro similia, tenuiora tamē & molliora, ex radice bulbosa prodeuntia. Pediculū etiā profert dodrantalem, tenuem ac serè iuncum, in quo candidus flos est, in medio croceus, Violarum purpurearum odorem referens, quo decedente, capitula Nucis auellanae quantitate erūpunt, in quibus semen Sinapi haud dissimile continetur. Quod
si ad

si ad hanc descriptionē adhibeas ea quæ de Viola alba Theophrastus libro sexto, & septimo de stirpium historia tradit, certè sole manifestius erit herbam hanc cuius picturam damus esse eam, quam

Theophrasti alba viola. *λευκῶδιον* Theophrastus vocat. Nā hæc prima florum se ostendit. Emicat vbi cælum clementius, statim, etiam non hyeme exacta; vbi verò immittius, postea. Celeriter quoque evanescit. Radicem denique bulbosam & florē odoratum obtinet. Quæ singula etiam de hac nostra herba verè dici possunt.

Flos Februarij vocatus. Prima siquidem florum, hyeme etiam nondū exacta, Februario nimirum mense, & die diuo Valentino sacro, vbi cælum clementius fuerit, apparet. In Aprili, vbi appropinquare iam creperit Maius, evanescit. Flos item eius, Violarum purpurearum prorsus odorem refert. Radix etiam ad Bulbi similitudinem orbiculata existit, vt hoc nomine nemini dubium esse debeat, quin sit Viola alba Theophrasti.

LOCVS.

Prouenit in vmbrosis syluis & locis, qualis est non procul à Tubinga paulò suprā & infra monasterium Bebenhusum vocatum, vbi copiosissimè nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis.

TEMPVS.

In Februario statim hæc erumpit, vt diximus, herba, & inter initia Martij ad perfectionem venit. Semen in Aprili ostendit in capitulis, vt in altera pictura vides.

TEMPERAMENTVM.

Folia ferè qualitatis omnis expertia: radix autem dulcis & glutinosa est, vt hoc nomine adstringat & exiccet, vt reliqui bulbi.

VIRE S.

Digerentem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut reliquos bulbos, habere ex iis quæ commemorauimus satis constat. Tamè nunc nullus, quòd sciam, eius stirpis vsus est.

DE LITHOSPERMO.

CAP. CLXXXVI.

NOMINA.

Λιθοσπέρμον Græcis, Lithospermũ Latinis, officinis & medicis hodie omnibus Miliũ so- Miliũ so- lis appellatur. Germanis Meerhirs, oder Stein- lis. fomen (Gallicè du Gremil.) Nomẽ à lapidea seminis duritia accepit: neque enim Lithospermon Lithosper aliud sonat Græcis, quàm lapideum semen. Quum mon vnde itaque semina tanquam calculos ferat, candore & dictum. rotunditate margaritarum, duritia verò lapidea, commodissima voce Lithospermon dictum est. Milium verò solis recentioribus nominatũ puto, quòd semen eius candore solis & lucis splendore fugeat.

FORMA.

Folia habet Oleæ similia, longiora tamè & latiora, & quæ in ima parte sunt, humi iacent. Ramulos verò rectos, tenues, crassitudine Iunci acuti, solidos, lignososq;. In quorum cacumine b. f. di. diuina

L ricatiq;

PLANTARVM HISTORIAE

vicatig; exortus, cauliculorum speciem exhibet longa habentes folia, inter quæ semen lapideum, rotundum, paruum, eruo æquale. Plinius graphicè cādore & rotunditate margaritas referre dixit. Nostrū autem Lithospermon multo minus quàm Dioscorides & Plinius tradiderunt semen profert, quod soli diuersitati acceptum referendum erit. Radix etiam Lithospermi, quod adiiciendum esse arbitror, exteriore sui parte rubore perfunditur.

LOCVS.

Lithospermō asperis & sublimibus locis gaudet. Satum etiam in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, eoque tempore semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Lithospermi, cuius maximè vsus est, candidum & siccum esse facile ex eiusdem facultatibus coniicitur. Omnia siquidem urinā cientia, Galeno libro v. de simpl. medicam. facult. cap. xij. teste, calida & sicca sunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen cum vino albo potum, calculos frāgit, & urinam ducit.

EX PAVLO.

Semen cum vino albo potū, calculos conterit, & urinas pellit.

EX PLINIO.

Lapillis

Lapillis eius drachmæ pōdere potis vino albo cal-
culos frangi pelliq; constat, & stranguriã discuti.

DE LYSIMACHIA. CAP.

CLXXXVII.

Lysimachia officinis nomen non habet.

NOMINA.

υσιμαχιον Græcè, Lysimachia Latine,

A vulgò Salicaria, Germanicè Vueiderich (Gall. Cornelle, ou soucy deaue

ou Pellebasse) nominatur. Lysimachia verò ab Lysimachio
eius inuentore Lysimacho appellata, aut quia vis chia vnde
tanta herbae, vt iumentis discordantibus imposita dicta.
iugo, asperitatem cohibeat. Quare à dissoluēda dis-
sidetium pugna, non ineptè Lysimachia videbitur
nominata. Salicaria verò quòd folia salicis, aut Salicaria
quòd inter salices nascatur, dicta est.

GENERA.

Lysimachia duo esse genera ex Dioscoride & Plinio
satis liquet. Plinij enim purpureum florem ha-
bet, hinc nos illam purpuream appellauimus. Germa-
nicè braun Vueiderich. Dioscoridis verò ru-
fos, hoc est, aureos, vt ipsemet interpretatur, flores
obtinet, ideoq; luteam nominauimus, Germanicè
geel Vueiderich. Et hæc quidē altera magis ad-
stringit, inq; vsu medico hoc nomine eidē præfere-
nda.

FORMA.

Caules profert cubitales, aut etiam maiores, te-
nues, fruticosos, quorū à geniculis folia exeunt gra-

Lij cilia,

PLANTARVM HISTORIAE

cilia, salici similia, gustū adstringentia, flores rufos, aut ad auri colorem declinantes. Ex qua pictura nulli non notum sit, plantas quas pictas damus esse *Lysimachias*. Caules enim emittunt cubitales, & multo quoq; longiores, tenues & fruticosos. Folia etiam habent salicis cum lentore quodam adstringentia. Flores hæc rufos, illa autē purpureos habet, ut nō contemnendus autor est *Plinius*. His accedit locus natalis, & alia quæ referre non attinet.

LOCVS.

Nascuntur palustribus locis, & prope aquas, potissimum ubi salices proueniunt.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent, ac subinde purpurea in siliquis oblongis semen producit, lutea verò decidentibus floribus, semen exiguum, *Coriandro* haud dissimile profert, quod gustum non secus atq; folia adstringit.

TEMPERAMENTVM.

Superantem adstrictoriam qualitatem, adeoque exiccatoriam vim obtinent.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius, cui adstringendi facultas est, ad sanguinis excreationes, & dysenterias potus & infusus confert. Sistit & mulierū fluxum appositus. Contra erumpentē è narib. sanguinem herba ipsa vtiliter inseritur. Vulneraria etiam est, & sanguinē compescit. Incensa acerrimū habet fumū, ut serpentes

Serpentes quidem abigat, & muscas enecet.

EX GALENO.

Vulnera glutinat, erumpentemq; ex narib. sanguinē emplastri modo illita sistit: quin & reliquas sanguinis eruptiones compescere tum ipsa, tum succus eius multò magis potest. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebrem fluxum sanat.

EX PLINIO.

Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Pota vel illita, vel naribus indita, sanguinis profluvium sistit. Vulneribus iis priuatim quæ calceamento facta sunt, contrita & arida infricata efficax est.

DE LAGOPO. CAP. CLXXXVIII.

Lagopus in tritico messibus frequens hic inuenitur.

NOMINA.

Λ*αγώπῳς Græcis, Leporinus pes Latinis, Trifoliū humile & Trinitas à tribus foliis herbariis dicitur. Officinis nostris ignota est herba. Germanis Hasenfusz, oder Katzenklee, oder Katzle (Gallicè Pied de Lieure) nominatur. Sic verò Græci atque Latini hanc herbam appellarunt, Lagopus quòd Leporino pedi similem paniculam habeat. cur dicta.*

FORMA.

A nullo, quòd sciam, Lagopus describitur. Herba autē quā pro eo exhibemus, caules habet rotundos, hirsutos, folia Loto trifolia quæ in pratis gignitur

L iiij *similia,*

PLANTARVM HISTORIAE

*similia, semen in paniculis muscosis lanuginosisq; , le-
porino pedi similibus admodū adstringētis gustus.*

LOCVS.

*In segetibus, Plinio etiam authore, & in horto-
rum areis, vt testatur Dioscorides, gignitur.*

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus potissimum apparet.

TEMPERAMENTVM.

*Exiccandi facultatem obtinet, Galeno teste, La-
gopus.*

VIRES. EX DIOSCORIDE.

*Vim habet Lagopus herba sistendi aluum cum
vino pota. Febriētibus autem cum aqua dāda. Al-
ligatur eadem contra inguinum inflammationes.*

EX GALENO.

Fluxus alui probè exiccat.

EX PLINIO.

*Lagopus sistit aluum è vino pota, aut in feбри ex
aqua. Eadem inguini adalligatur in tumore.*

APPENDIX.

*Ex iis omnibus abūdè constat, herbam cā quam
depictam damus esse Lagopum, siquidem & nomē
& forma illi aptissimè respondent. Locus etiā con-
uenit: nascitur enim copiosissimè in segetibus. Nec
temperamentum abhorret, quod illi est adstricto-
rium & exiccans. His omnib. accedunt vires, vul-
gò enim omnes hac planta in dysentcria, & alui
profluuiio vtuntur.*

DE LARICE. CAP. CLXXXIX.

Larix in alpihus delphinum frequens, folia eius in noſtrate manna ſunt plurima, quòd ex hac arbore ferè decutiatur.

NOMINA.

Ἀρίξ græcis, Larix & Larex latinis, offici- Larix ſeu
 A nus & vulgò Larga, Germanis Lorch- Larex.
 baum (Galliçè Vn arbre retirant a vn
 Pin, ou Sapin) appellatur.

FORMA.

Larix arbor eſt magna, Piceæ ſimilis, craſſior, lenioriꝫ cortice, folio villoſo pectinum modo, pin- gui & denſo, molliꝫ flexu, materia præſtanti, ru- bente odore, acri. Hinc erumpit nonnihil liquoris melleo, Dioſcoride ac Plinio teſtibus, colore atque lento, nunquam dureſcentis. Eſt autem reſina quam Larignam, aut certè Laricinam vel Lariceam vo- Resina la-
 cant, qua hodie omnes ferè officinæ pro terebinthi- ricina ho-
 na, non ſine errore vtuntur. Terebinthina enim cā rebinthi-
 dida eſt, pellucida, & in modum coloris vitri cœ- na vtūtur
 rulea & odorata. Lignum eius propemodum igni- officinæ.
 bus inuictum, neque flagrat, neque in carbones re-
 cidit, nec alio modo ignis vi conſumitur, quàm ſax-
 um in fornace ad calcem coquendam adhibitum,
 quod quidem nec flammam recipit, nec carbonem
 remittit, ſed longo ſpacio tardè comburitur. E ramis
 eius panicularū modo nucamenta dependent, quod
 pictura affabrè oſtendit.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Larix, vt autor est *Vitruuius*, circa ripam fluminis Padi, & litora maris Adriatici nascitur. Copiosissimè autem in Silesia provenit, vnde illustrissimus

GEORGIUS Princeps GEORGIUS Marchio Brandenburgensis, dominus meus clementissimus, plurimas res arbores Onoltzbachium transferre curauit, à Brandenburgo sanè hanc etiam cuius hìc damus picturam adburgensis. me Tubingam transmisit. In Silesia ex eius arboris ligno hypocausta construuntur, tantus illius ibidem proventus est.

TEMPVS.

Larix nullo exhilaratur flore, sed turgens tantùm adit germina.

TEMPERAMENTVM.

Minimum in eius temperamento ignis & aeris, humoris autè terreni plurimum. Hinc cum nò habeat spacia foraminum quàm possit ignis penetrare, fit vt eius vim, què admodum paulò antè diximus, reiiciat, nec patiatur ab eo citò ladi. Adstrictorià itaque facultatem, haud secus atque picca, eius folia & cortices, vt statim dicemus, obtinent.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cortex eius adstringit, ac intertriginibus tritus & illitus prodest, & vlceribus summam cutem occupantibus ambustisq; cum lithargyro & manna thuris. Vlcerà in teneris corporibus cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. Tritus cum atramento.

mento sutorio, serpentia cohibet. Fœtus & secundas
 suffitu eiicit. Potus aluum sistit, & vrinam mouet.
 Folia eius trita illitaq; inflammationes leniunt, &
 vulnera ab inflammatione vindicant. Trita verò
 & in aceto cocta, calida collutione dentium dolo-
 rem mulcent. Resina eius vt omnes aliæ, emollit,
 calefacit, discutit, expurgat. Tussientibus ac tabi-
 dis in ecligmate per se aut cū melle conuenit. Tho-
 racis vitia expurgat. Vrinam etiam cit, maturat,
 & aluum mollit. Pilos in palpebris glutinat. Cōtra
 lepras cum erugine, atramento sutorio, & nitro in-
 ungitur. Auribus saniem stillantibus cum melle &
 oleo, & in genitalium pruritu. Miscetur etiam em-
 plastris, malagmatis & acopis. Lateris doloribus
 per se inuncta & imposita auxiliatur.

EX GALENO.

Cortex eius vincentem habet adstrictoriam fa-
 cultatem vsque adeò, vt & intertrigines bellissimè
 sanet, & ventrem potus sistat. Sed & ambustis ci-
 catricem inducit. In foliis arboris, vt quæ multo
 sunt cortice humidiora, vis inest vulnerum glutina-
 toria. Resina eius desiccet & calefacit.

EX PLINIO.

Laricis folia trita & decocta in aceto, dētiū do-
 lori profunt. Cinis corticum intertrigini & ambu-
 stis medetur. Potus aluum sistit. Vrinā mouet. Sus-
 fitu vulnus corrigit. Resina larigna tussi efficax
 habetur, polletq; contra viscerum vlcera.

PLANTARVM HISTORIAE

DE MELISSOPHYLLO.

CAP. CX C.

Vulgari Melissophyllo affricant apiaria rustici, vt illuc apes alliciant, nec infelicitèr.

NOMINA.

Melissá . **M**ΕΛΙΣΟΦΥΛΛΟΝ, ἢ μελίφυλλον Græcis, **Apiastrū** siue Citrago latinis, officinis Melissa dicitur. Germanis Melissen, Melissenkraut, Honigblum (Gallicè de la Melisse.) **Melissophyllum** non alio nomine appellatum est, nisi quòd apes eius folio magnopere delectentur: neque enim **μελισόφυλλον** aliud quàm apum folium significat. **Meliphyllo** verò, qua voce Nicander vsus est, mellis folium indicat. Sic itaque nominari cœpit, quod hinc apes mellis materiam colligant. Pari ratione Latini **Apiastrum** haud dubiè dixerunt, quòd ea herba apes plurimū lætetur, adeò vt si ea aluearia cōfricentur perunganturve, detētū in eis examen non fugiat. Citraginem autē ab odore Citri: nares enim si cōsulantur Citrium mālū olebit.

GENERA.

Duo sunt ex vulgariū herbariorum sententia **Melissophylli** genera. Vnum verum, alterum adulterinum, quod Germani **Vuantzenkraut** nominant, vt paulò pòst dicemus.

FORMA.

Folia & cauliculi veri Melissophylli, Balloti seu

Marrua

Marrubio nigro similia sunt, maiora tamen & tenuiora, nec ita hirsuta, citri mâli odore. Perperam hodie officina pro vera **Melissa** vtütur herba passim in hortis proueniente, quam Germani, vt diximus, quia cimices olere videtur, **Vuantzenkraut** nominât. Fœdus itaque cüm huius herba odor sit, non est cur apes ea delectentur, neque ei florenti insident, sed eam potius fugiunt. Contrâ illa quam pro vera pictam damus vnicè oblectantur, quòd illius tam gratus odor sit, vt in edibus strata, eas gratissimo odore compleat.

LOCVS.

Nascitur in syluis verum, adulterinum autem in hortis.

TEMPVS.

Carpitur æstate, Iunio potissimum mense, quo floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Melissophyllon ex secundo ordine calsfacientiũ censetur, desiccat verò non aequè, sed ipsum quispiã in hoc primi ordinis esse posuerit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia cum vino pota aut illita, contra scorpionũ phalangiorum, canumq; morsus prosunt. Decoctum eorundem, si eo perfundantur, idem potest. In infestationibus ad ducendos menses vtile est. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis iniectum prodest. Fungorum strangulationibus, folia cum

nitro

PLANTARVM HISTORIAE

nitro pota succurrūt. Torminibus auxiliantur. Dantur in eclegmate orthopnoicis. Illita cum sale strumas discutiunt. Vlcera purgant. Articularios dolores illita mitigant.

EX GALENO.

Melissophyllon Marrubio facultate simile est, sed plurimum ab eo vincitur : quamobrem nec utitur illo quispiam. Supernacaneum siquidem foret praesente Marrubio, cuius tantus est vbique terrarū proventus, velle uti Melissophyllo. Caterum si cui fortè ad manum quandoque Marrubium non fuerit, illo ad quaecunque uti licebit, modò quāto ab hoc exuperetur cognitum habuerit.

EX PLINIO.

Melissophyllo siue Melittana si perungantur aluaria, non fugient apes: nullo enim magis gaudent flore. Copia istius examina faciliè continentur. Idem praesentissimum est contra ictus earū vesparumq; & araneorum, item scorpionum, remedium. Item contra vuluarū strangulationes addito nitro. Contra tormina è vino. Folia eius strumis illinuntur, & sedis vitiis cum sale decocta. Succus foeminas purgat, & inflationes discutit, & ulcera sanat. Articularios morbos sedat, canisq; morsus. Prodest dysentericis veteribus, & coeliacis, orthopnoicis, liecnibus, vlceribus thoracis. Caligines oculorum succo cum mellè inungi eximium habetur.

EX SIMEONE SETHI.

Ad stomachi ex frigidityte morsus, & à nigra-
bile tristitias & timores qui sine ratione ex illa
sunt, confert. Hilaritatem efficit, & ad melancho-
licum ac pituitosum humorem prodest. Fertur quòd
industriam afferat, & quòd ante somnum sumptum,
bona somnia faciat, cōtraria ratione cum Brassica,
quæ mala insomnia affert. Bubones lēdit.

DE MARATHRO. CAP. CXCI.

NOMINA.

Mάραθρον Græcè. Fœniculum Latinè, offi- Maras-
cina antiquum & Latinū nomen retinuc- thrum cur-
runt, Germanicè Fenchel (Gallicè du Fenouil) appellatū
dicitur. Marathrum Græcis dictum putant à mar-
cescendo, quòd ad condienda plurima cum inarue-
rit commendatissimum sit. Fœniculum autem dici Fœnicus
existimant, quòd satum magno cum fœnore se- lum.
men reddat.

FORMA.

Fœniculum ferulacei generis est, hominisq; ple-
rumq; proceritatem superat, caule geniculato, fun-
gosa intus medulla, leui exterius cortice & herba-
ceo, folio Abrotoni, sed longiore mollioriq;, iucundo
odore, umbella rotunda, ampla, lutea, in orbem ra-
diatim circinato, in qua semen nudum dependet,
radice candida, longa & odorata.

LOCVS.

Passim in hortis satum prouenit. Sua etiam spō-
te interdum seu Anethum nascitur.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Colligitur caule turgescente. Floret Iunio & Iulio mensibus. **TEMPERAMENTVM.**

Foeniculum tam valēter excalfacit, vt ex tertio ordine excalefacientium censi possit. Exiccat vero non aequē, sed ipsum quisspiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat, quod, si admodum desiccaret, non sanē efficeret.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Foeniculi herba comesta mammae lacte replet. Idem potest semen potū, aut decoctū cum ptisana. Comae decoctū subditum impositūve, renū & vesicae vitiiis vtile: quippe quod urinā ciere potest. Cōtra serpentium ictus in vino potum prodest. Mēses ducit. In febris nauseam, & stomachi ardorē ex aqua frigida potum, sedat. Radices contritae & cum melle illitae, morsibus canum medētur. Succus caulibus & foliis expressis in sole siccatus, medicamentis quae ad excitandam oculorum aciem consiciuntur, vtiliter adiicitur. Extrahitur etiam succus ex semine viridi, foliis, ramulisq; ad eadē vtilis. Radix in prima germinatione exprimitur. In occidentali Iberia liquorem gummi similem reddit. Caulē medium dum herba floret incolae demerunt, igniq; admovent, quo facilius vi caloris exundans gummi remittat. Hoc efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

EX GALENO.

Feniculum lac procreat. *Suffusus* auxiliatur. *Vri*
nas mensesq; cit. In condimentis assiduus *Anethi*
vsu, *Feniculi* verò & in opsoniis. Apud nos in hoc
reponunt, nō secus ac *Pyrethrum* & *Terebinthum*
condientes, vt in totum annum vsui sit, quemadmo
dum & cepas & rapas, & alia huiusmodi quædã
in solo aceto, alia in oxalme asseruantes.

EX PLINIO.

Ad scorpionum ictus & serpentium, semine in
vino potu valet. Succus & auribus instillatur, vero
miculósque in his necat. Id ipsum condimentis pro
pè omnibus inseritur. *Oxyporis* etiam aptissimè.
Quin & crustis subditur panis. Semen stomachum
dissolutum adstringit. *Nauseam* ex aqua tritū se
dat. *Pulmonibus* & *iecinoribus* laudatissimum.
Ventre[m] sistit cum modicè sumitur, *vrinam* exci
tat, & tormina mitigat decoctum, lactisq; defectu
potum mammae replet. Radix cum ptisana pota
renes purgat, siue decocto succo, siue semine sum
pto. Prodest & *hydropicis* radix ex vino cocta: itē
convulsis. Illinuntur folia tumoribus ardentibus
ex aceto. Calculos vesicae pellunt. *Genitura* abun
dantiam quoquo modo haustum facit. Verendis a
micissimum, siue ad fouendum radice cum vino co
cta, siue contrita in oleo illitum. Multi tumoribus
& sugillatis cum cera illinunt. Et radice in succo
vel cum melle contra canis morsum vtuntur. Et cō
tra multipedem ex vino.

EX SI

PLANTARVM HISTORIAE

EX SIMEONE SETHI.

Lac procreat, & suffusus remedio est. Vrinam cit,
& menses ducit.

DE MELANTHIO. CAP. CXCI.

Melanthium nigella Romana officinis,
nobis est semine nigro ex rure & Cartu-
sianis. semine item rufo quibusdā odora-
tior, nobis est donatum à Claudio Dauis-
de medico & optimo & doctissimo.

NOMINA.

Nigella.

MΕΛΑΝΘΙΟΥ Græcis, Papauer nigrum, Nigella
& Gith Latinis dicitur. (Gallicè Nigelle,
ou Poiurette.) Officina omnes Nigellam ap-
pellant. Melanthion autem & nigella, à nigro semi-
nis colore hæc herba haud dubiè dicta est.

Melanthio
vnde di-
ctum.

GENERA.

Etsi apud Dioscoridem aliósque veteres vna dū-
taxat Nigellæ species reperiatur, nobis tamen do-
mesticas & hortenses tres videre contigit, quarum
duæ quidem habent semina nigra, tertia verò sub-
flauum. Inter eas quæ habent semina nigra, primā
schuuartz kommich Germanicè appellauimus,
alteram autem schuuartz Coriander, quòd fo-
lia eius Coriandri foliis non dissimilia sint. Tertia
quòd ad folia & flores attinet, primæ per omnia
similis est, in semine tantum quod flauescit, vt di-
ximus, diuersa. Herbarij huius temporis Nigellam
citrinam nominant. Præter has tres iam cōmemor-

ratas

ratas est quarta, quæ sylvestris Nigella dicitur, quòd scilicet sua sponte in aruis nascatur. Germanis Vuildschuuartzer Coriander nominatur. Videtur autem esse potius tertium genus Cumini sylvestris.

FORMA.

Melanthion frutex est pusillus, ramulis tenuibus, altitudine palmorum duorum vel amplior, foliis parvis, Senetionis herba similibus, multo tamè exilioribus, capitulo in cacumine exiguo cœu Papaueris, oblongo, intercurfantibus internè distinctionibus loculosis quinque aut sex, in summitate extrinsecus corniculatis, quibus semen nigrum, acre, odoratum includitur. Sylvestre alteri hortensi ferè simile est, folia siquidem anethi habet, flores primo similes, nisi quòd colore sint elegantiores. Capitulum planè Aquileia respondet, atque in se semina nigra & odorata continet.

LOCVS.

Melanthion domesticum non nisi in hortis satum provenit. Sylvestre autem, ut dictum est, in agris sua sponte provenit.

TEMPVS.

Melanthion floret Iunio mense, Iulio autem & Augusto semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Melanthiū excalefacit atq; desiccatur tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Capitis doloribus illitum fronti Melanthium, &

M

incipiens

PLANTARVM HISTORIAE

incipientibus suffusionibus cum irino tritum & naribus infusum prodest. Tollit lentigines, lepras, œdemata vetusta duritiesq; cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum vetere vino impositum. Dentium doloribus cum aceto & tēda decoctum, si eo colluantur, succurrit. Rotundos ventris lumbricos expellit, ex aqua vmbilico illitum. Tritum autem & in linteo colligatū & olfactum, destillatione laborantes adiuuat. Pluribus diebus potum, vrinam, menses & lac prouocat. Difficultatem spirandi cum vino potum finit. Phalangiorum morsibus drachmæ pondere cum aqua haustū auxiliatur. Suffitu serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

EX GALENO.

Tenuium est partiū Melanthium, vnde destillationes sanat calidū in linteo admotū, atque assiduò olfactū. Quinetiam si intrò in corpus sumatur, vel maximè flatus extinguit. Hinc constat essentia ipsam esse tenuis, & ad vnguē à caliditate elaborate. Propterea sanè etiā amarum est. Itaq; mirum non est si lūbricos interimat non esum modò, sed etiam foris impositū. Neque sanè etiā mirandum si lepras, clauos, myrmecias eiiciat. Sic verò etiam orthopnceam iuuat, & menses prouocat, qui ob crassitiem aut viscedinem retēti fuerint. In summa, vbi incisione, extersione, desiccatione, excalcificatione est opus, præstantissimum id remedium est.

EX PLINIO.

Mclanthion medetur serpentium plagis & scor-
pionum. Illini ex aceto & melle reperio, incensq;
serpentes fugari. Bibitur drachma contra araneos.
Destillationem narium discutit tusum in lintcolo ol-
factum. Capitis dolores illitum ex aceto, & infu-
sum naribus mitigat. Cum irino oculorum epipho-
ras & tumores lenit. Dentium dolores coctum cum
aceto. Ulcera oris tritum & commanducatum. Le-
pras & lentigines ex aceto tritum emendat. Diffi-
cultates spirandi addito vino potum. Duritias tu-
moreſque veteres & suppurationes illitū. Lac mu-
lierum auget continuis diebus sumptum. Colligitur
succus vt Hyoscyami. Oculos purgat, vrinam &
menstrua ciet. Similiter largius venenum est, quod
miremur, cum semen gratissimè panes etiam con-
diat. Quinimo lintcolo alligatis tantum granis tri-
ginta, secundas trahi reperio. Aiunt & clavis in fe-
dibus mederi tritum in vrina. Culices suffitu neca-
re: item muscas.

EX SIMEONE SETHI.

Est tenuiū partium, lūbricos in ventre necat, fla-
tus discutit, pituitamq; incidit. Ad orthopneas &
defluxus capitis facit odoratū, præsertim postquam
calefactum fuerit. Dicitur verò quòd si teratur, &
cum aceto ventri imponatur, etiam sic lumbricos
necare. Et si cum melle fermentetur, & calida a-
qua hauriatur, calculos in renib. & vesica minuit,
M ij vrinam.

PLANTARVM HISTORIAE

urinam cit, menses ducit, & veluti remedium contra venena est, si quis ipsum ieiunus assumat.

DE MALACHE. CAP.

CXCIII.

NOMINA.

Malua
quarc di-
eta.
μαλάτ-
τηρ.

Mαλάχη Græcè, Malua Latinè, Officinis latinum nomē retinuit, Germanicè Pappel, (Gallicè Maulue) dicitur. Malua autem Græcis ab emollicenda aluo nomē traxit: μαλάττει enim mollire significat. Quinetiam Latinis Varro Maluā quasi moluam, quod aluū molliat, dictam esse contendit. Antiqui enim ea utebantur in acetariis cū Lactuca ad subducendam aluum. Vnde Martialis libro decimo ait:

Exoneraturas ventrem mihi villica malas.

Attulit, & varias quas habet hortus opes.

GENERA.

Hortensis Maluarum genera esse duo Dioscorides & Gale-
Malua. nus tradunt. Vna enim hortensis, altera sylvestris. Malua dicitur. Hortensis, quæ in hortis sata proce-
nit, Germanis Römische Pappel, vel Ernsz, quod scilicet messis tēpore floreat, vel Herbstrosz nominatur. Huius iterum varia sunt genera: alia siquidem rosas purpureas, & has vel simplici vel multiplici foliorum textura constantes, vt pictura mōstrat: alia candidas & iterum foliorum textura differentes producit. Nos vna pictura quatuor
Sylvestris hac hortensis Malua genera complexi sumus. Syl-
vestris.

uestris non quæ in syluis, aut asperis locis, sed quæ in incultis locis sua sponte nascitur, intelligi debet: id quod Græca vox $\chi\delta\rho\sigma\alpha\iota\alpha$, qua Dioscorides vtitur, maximè docet. Hæc enim Græcis incultâ & inelaboratam terram significat, qualis in semitis, pratis, aliisq; huiusmodi ruris & agri partibus est. Erratica hæc seu syluestris Malua itidē in duas distribuitur species: quædā enim pumila est, & humi *Pumila.* serpēs, hanc Germani Genszpappel, Rasz oder Hasenpappel vocāt. Quædā altius attollitur, & ferè arborescit, hanc Germanicè Roszpappel nominant. *Arbore scens.*

FORMA.

Hortensis Malua grandescit in arborem, cuiusq; Hortensis scapus tanta magnitudine proficit, vt baculi vsum præbeat. Folia huic ampla, circinata rotunditatis, multis in ambitu segmentis. Caudex simplex, luxuriose proceritatis attollitur, à medio ferè ad verticē pulcherrimis floribus decoratus, breui admodū pediculo dependentibus, qui venustate rosas non cedunt, & si suppeteret odor, de principatu certarēt. Colore constant purpureo, vermiculatove & cādido. Capitula quædam breuibus innixa petiolis, & leuiter in mucronem fastigiata primū è caule prosiliunt, iisq; paulatim intumescuntibus, prægnantia florū inuolucra fatiscunt, in quibus dehiscences rosæ sese pādunt, & explicantur in folia quinque, interdum structili quaddā serie, vt diximus, numerosa, calycibus apices paucos complexis, qui lutei mediis

M ij emicant,

PLANTARVM HISTORIAE

emicant, quibus decidentibus erumpunt purpureæ
stamina. His factus succrescit multipliciter tunica-
tus, atq; in umbilici formam numerofo semine coa-
gmētatus, in quib. cum decussa sunt folia, reliqua

Sylvestris rum Maluarum modo semina recluduntur. Sylve-
pumila. stris pumila & humi repens, folio rotundo, pingui,
& in ambitu serrato constat: caule magno, floribus
Sylvestris ex candido purpurascētib; radice cādida. Syl-
procerior. uestris altior folio magis laciniato nascitur, floribus
ex cœruleo purpureis, radice candida.

LOCVS.


Hortensis in hortis sata provenit. Sylvestris autē
locis incultis, pinguib; potissimum, & humidis.

TEMPVS.

Hortensis floret Iulio & Augusto præsertim mē-
sibus; neque enim flos is vt rosa fugax est, sed diu
vigor vitaq; durat. Sylvestris pumila per totā æsta-
tem, & in maximam autumnī partem durat. Ar-
borescens autem Iunio & Iulio mensibus, floribus
quam maximè abundat.

TEMPERAMENTVM.

Malua sylvestris digerentis paululū, & emollien-
tis leuiter est facultatis. Hortensis verò quāto plus
habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecil-
lior est. Fructus eius tāto validior est, quāto et sic-
cior. Inter Lactucā, Betam, & Maluā id est discris-

Sylvestria minis, nempe quòd sicciora sint sylvestria, satina hu-
satiuis sic midiora. Permistum est Maluæ succo aliquid glutin-
ciora.  nosum,

nosum, quo Lactuca caret. A refrigerandi facultate manifestè abest, vt ante sumptionē cernere licet, si ex ambobus particulatim oleribus, quemadmodum factitare homines consueuerunt, cataplasma ad calidum quempiam affectum, qualis est erysipelas, cōponas, molliuscula folia diligēter tundens donec ad leuorem redacta sint exactissimum. Tum nanq; cognosces Lactucam manifestè refrigerare, Maluam verò modicum, et quasi tepidum quendam calorem obtinere. Facile hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidū est, sed etiam quia glutinosum. Si horum trium olerū succos inter se compares, tenuis & abstersorius Beta, crassior glutinosiorq; Malua, in vtriusque medio Lactuca statuetur. Hæc Galenus lib. ij. de Alimentorum facultatibus.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Esi aptior hortensis multò quàm syluestris. Stomacho noxia, aluum bonam efficit, præsertim cauales, intestinis & vesicæ vtilis. Folia cruda illita, & cum modico sale addito melle commāducata, egilopas sanant. Verum in inducenda cicatrice, ea sine sale vtendum est. Contra apum vesparumq; ictus illita prodest. Et si cruda tritaq; cum oleo antea se inunxerit aliquis, non feritur. Achoras, furfurēsque cum vrina illita sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia tritaq; vtiliter cum oleo imponuntur. Eius decoctum vulnus in seissione mollit. Prodest earosionibus intestinorum, vulnæ sedisque clystere

M iij

infusum.

PLANTARVM HISTORIAE

infusum. Ius decocta cum radice sua omnib. letalibus venenis auxiliatur, si continuo à bibentib. reuomatur. Contra phalangiorū morsus remedio est. Lac proritat. Semē eius admixto Loti sylvestris semine potum cum vino vesica dolores lenit.

EX PLINIO.

Malua contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, præcipuè scorpionum, vesparum similiumq; & muris aranei. Quin & trita cū oleo qualibet earū peruncti antè, vel habētes eas non feriūtur. Folium impositum scorpionibus torporem affert. Valent cōtra venena. Aculeos omnes extrahūt illita cruda, aut cum † anetho pota. Decocta verò cum radice sua, leporis marini venenarestringunt: & vt quidā dicūt, si vomatur. De eisdē mira & alia tradūtur, sed maximè, si quotidie quis succi ex qualibet earū sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis curturum. Vlcera manantia in capite sanant, in vrina putrefacta lichenas, & vlcera oris cū melle. Radix decocta furfures capitis & dētium mobilitates. Eius quæ vnū caulem habet, radice circa dentē qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas et parotidas panosq; addita hominis salina, purgat citra vulnus. Semen in vino nigro potum, à pituitis & nauſeis liberat. Radix mammarū vitiis occurrat, adalligata in lana nigra. Tuſſim in lacte cocta, & sorbitionis modo sumpta, quinis diebus emēdat. Stomacho inuitiles Sextus Niger dicit. Olympias Thebana,

† aliās
aceto.

Thebana, abortiuas esse cum adipe anseris. Aliqui purgari fœminas, foliis earum manus plenæ mensura, in oleo & vino sumptis. Vtique constat parturientes substratis foliis celerius solui, protinus à partu reuocanda, ne vulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Quin & semen tritū adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoq; eæ Veneri nascuntur, vt semen vnicaulis aspersum genitali, fœminarum auaritates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta adalligatas, tenasmo & dysentericis vtilissimè infundi. Item sedis vitiis, vel si foucantur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & insanientibus quaternis. Decocta comitialibus hemine succi. Hic & calculosis, et inflatione, & torminibus, aut episthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus & ambustis decocta in oleum folia imponuntur, & ad vulnerum impetus cruda cum pane. Succus decocta nervis prodest, & vesicæ, & intestinorum rosionibus. Vuluas & cibo & infusione mollit i oleo. Succus decocta pori meatus suaves facit.

EX SIMEONE SETHI.

Ventriculum facile subit, non solum propter humiditatem, verum etiam glutinositatem, atq; imprimis si cum oleo & garo offeratur, vino quo editur tempore irrorata. Vesicam, thoracem, pulmonemq;
innat,

PLANTARVM HISTORIAE

iuuat, & raucam vocem lenit. Syluestris malua, vt ferunt, comesta, dolores ex vesparum morsu tollit. Si quis morsus à vespis aut apibus, succo Maluæ, præsertim syluestris, perungatur, confestim dolore leuatur. Dicitur etiam quod huius decoctum potum, lapides conterit, somnum conciliat, facilemque partum præstat, si mulier ea crebrius vtatur. Illita inflammationes lenit, eaque quæ indurata sunt emollit. Illud Maluæ peculiare est, vt imposita ictibus vesparum & apum, dolores leuet.

DE MYRICE. CAP.

CXCIIII.

Tamarix in Gallia Narbonensi luxuriat, nunc etiam in hortis reglis quos fons bellicæ aquæ irrigat, & in hortis Reuerédi Bellaij Parisiensis episcopi & Cardinalis, Posterorum memoria, & nostra omnium veneratione dignissimi, vt qui nullis parcit sumptibus, quo partem medicinæ plantariam reddat illustriorem & certiore.

NOMINA.

Tamariscus.

Myrice Græcis Myrice & Tamarix Latinis, officinis Tamariscus, Germa. Tamarisk. & Porst (Gallis Bruyere) nominatur.

GENERA.

Dioscorides duo Tamaricis genera facit. Vna enim syluestris est, qualis est ea quæ in plerisque Germaniæ locis provenit, quam hic pictam damus.

Altera

Altera satina, quæ priori in cæteris similis est, nisi quòd fructifera est, & minimè, vt illa, sterilis.

FORMA.

Sylvestris arbustum frutèxve humilis est, ramis ex herbaceo fuluòq; colore variegatis, foliis Sabinae aut Ericæ, fiore muscoso, qui demum in pappos euolat. Satina cætera similis est sylvestri, fructum tamen gallæ non dissimilem profert, qui gustu inæqualiter adstringit.

LOCVS.

Proxime paludes, resides stagnantesq; aquas nascitur, Sylvestrisq; copiosa in Germania ad Rhenũ & Isarum, insignes fluuios, prouenit. Satina in Syria & Aegypto, vbi procerissimas æquat arbores, gignitur.

TEMPVS.

Perpetua coma frondet.

TEMPERAMENTVM.

Myrice abstergentis est ac incidentis facultatis, absque perspicua desiccatione: habet verò etiã adstrictionem nonnullam. Cæterum fructus & cortex non paucam sortita est adstrictionem, adeò vt gallæ omphacitidi seu immatura proxima sint, nisi quòd acerbitas euidentis est in galla, sed Myricæ fructui temperatura inest inæqualis: immista est enim naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis abstergendi, quod sanè gallæ haud inest. Porò Myricæ combustæ cinis admodum desiccatoris facultatis,

PLANTARVM HISTORIAE

facultatis est, plurimam abstergerendi facultatē habens, pauxillam adstringendi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fructu vice gallæ in oris oculorumq; medicamentis vtuntur. Cruentis sputis in potu, coeliacis, foeminarum fluxionibus, morbo regio, & phalangiorum morfibz prodest. Oedemata illitus reprimit. Cortex eadem quæ fructus potest. Decoctum foliorum cum vino potum lienem minuit. Ad dolorem dentium in collutionibus salutare est, & mulierum fluxionibus in defectionibus. Aptè his in quibus pediculi & lendes abundant circumfunditur. Cinis lignorum eius appositus profluvium ex utero suppressit.

Calices E trunco eius nonnulli potorios calices fabricantur ex cant, quibus in lienosis pro poculo vtuntur, quò datruncus in iis potus proficiat.

maticis.

EX GALENO.

Myrice prodest admodum lieni indurato, decoctis cum aceto aut vino radicibus, siue foliis, siue extremis ramulis. Sanat verò etiam dentium dolores.

EX PLINIO.

Lenaus sanari ea carcinomata in vino decocta tritaque cum melle dicit. Ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in vino bibatur. Adeoque mirabilem eius antipathiam contra solū hoc viscerum faciunt, vt affirmant, si ex ea alucis faclis bibant sucs, sine liene inueniri. Et idcò homini quoque splenetico cibum potumq; dant in vasis ex ea factis.

Etis. Lignum & flos & folia & cortex in eisdem
 vsus adhibentur, quanquam remissiora. Datur san-
 guinem reicientibus cortex tritus, & cōtra proflu-
 uia fœminarum, cœliacis quoque. Idem tusus impo-
 situsque collectiones omnes inhibet. Foliis exprimi-
 tur succus. Ad hæc eadem & in vino decoquuntur:
 ipsa verò adiecto melle gangrenis illinuntur. Deco-
 ctum eorum in vino potum, vel impositum cum
 rosaceo & cera sedat. Sic & epinyctidas sanāt. Ad-
 dentium dolorem auriūque decoctum eorum sa-
 lutare est. Radix ad eadem, similiter & folia. Hæc
 amplius ad ea quæ serpunt, imponuntur cum polen-
 ta. Semen drachmæ pondere aduersus phalangia
 & arancos bibitur. Cum altilium verò pingui fœ-
 runculis imponitur. Efficax & contra serpentium
 ictus, præterquam aspidum. Nec non merbo regio,
 phthiriasi, lendibúsque decoctum infusum prodest,
 abundantiamque mulierum sistit. Cinis arboris ad
 omnia eadem prodest.

DE MEONE RHOEADÆ.

CAPVT CXCV.

NOMINA.

Mήλον ροιδῆς Græcis, Papauer rhœas, hoc
 est, fluidum aut erraticum Latinis, Papas-
 uer rubrum officinis & herbariis. Germanis à stre Papauer
 pitu quem ludentes pueri harum foliis concano pu rubrum.
 gno impositis, altera palma incussa adunt, Klap-
 perrolen, quasi dicas crepitaculares rosas, &
 Glitschen,

PLANTARVM HISTORIAE

Glitschē, & vuild Maen, ac Kornrosen, (Gal.

Rhœas Coquelicoc, ou Ponceau) appellāt. Rhœas au-
unde di- tem à flore, qui ei protinus decidit, dictum est.
ctum.

FORMA.

Folia Erucæ, aut Cichorio similia, & incisa ha-
† aliās iū- bet, lōgiora tamen & aspera. Caulcm † lanugino-
ceum. sum, rectum, asperum, cubitalm. Florem puniceū,
 & aliquando cādidum, similem syluestris Anemo-
 nes flori. Caput oblōgum, minus tamen quā Anes-
 mones. Semen rufum. Radicem oblongam, subalbā,
 minoris digiti crassitudine, amaram. Ex qua deli-
 neatione omnibus perspicuum sit, herbam quā Pa-
 pauer rubcum hodie vulgò nominant, esse Rhœa-
 da, quòd sit folio Erucæ, laciniato, scabro & lōgio-
 re: caule lanuginoso, recto, aspero, cubitali: flore syl-
 uestris Anemones puniceo, nonnunquam albo, ob-
 longo capite: semine rufo, radice longa, subalbida,
 minoris digiti crassitudine, gustu amara. Errant i-
 taque qui Anemonem esse arbitrantur, quòd folia
 eius, quæ Coriandri sunt, euidentissimè reclamēt.
 Nos Rhœadis vtriusque picturas damus. Vnius at-
 que adeò primi, quod Erucæ folia habet, alterius
 quod Cichorij.

Papauer
rubcū non
est Ane-
none.

LOCVS.

Nascitur in aruis & segetibus passim.

TEMPVS.

Vere & æstate dum frumenta messcm appetūt,
 floret: quo etiam tempore decerpitur.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat, vt alia genera Papaueris.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius Papaueris quinque ſexve capita cum tribus vini ciathis decocta donec ad duas reducatur, potui dabis quibus ſomnum accerſere volueris. Semen acetabuli meſura cum aqua mulſa potum, aluum leniter emollit. Ad idem preſtandum mellitis & dulciariis immiſcetur. Folia cum calycibus illiſta inflammationes ſanant. Eorundem perfuſione & fotu ſomnus allicitur.

EX GALENO.

Papauer quoddā Rheas nuncupatur, quod ſcilicet celeriter flos eius defluat. Huius ſemen valiedius refrigerat, ita vt nequaquam eo quis innoxie ſolo vti poſſit, veluti ſatiuo melli admixcens. Admodum verò ita ſumpſum ſomnum conciliat. Sed & puſillum eius inſpergunt iis quæ ex melle conficiuntur bellariis, placentis & panibus.

EX PLINIO.

Aluum exinaniunt capita quinque decocta in vini tribus heminis: pota ſomnum faciunt.

EX RECENTIORIBVS.

Sacro igni medetur. Mulierum menſtrua profluua compeſcit. Sanguinem è naribus fluentem iccori impoſitū ſiſtit. Lingua ex decocto eius lota, ardorem faucium ſanat. Pudēdorum tumores detumefcere facit. Tēporibus illitum, phreneticis ſomnum conciliat.

PLANTARVM HISTORIAE

conciliat. Calidos oculorum dolores linteo impositū mitigat. Vnde rursus omnibus liquet, Papauer hoc rubrum nō esse Anemonem, quōd scilicet hac ipsa contrarias planē facultates obtineat.

DE MECONE SATIVO.

CAP. CXCVI.

NOMINA.

Mήκων ήμβρος græcè, Papauer sativum latinè dicitur. Officina antiquum nomen retinuerunt. Germanicè Magfomen oder Man, (Gallicè Du Pauot) vocatur. Dictū autem Græcis μήκων à μήν & γειν, hoc est, non ministrando, quōd suis fungi muniis vescentes non patiatur.

Mecō qua
re appelle
tur.

GENERA.

Sativi Papaveris duplex genus, album videlicet cuius flos & semen candidum: & nigrum, quod semine nigro constat. Nos utrunque genus vna pictura complexi sumus.

FORMA.

Foliis constat longis, per ambitum serratis, nullōque pediculo cauli adherentibus: floribus vel candidis, vel ex candido leniter purpureis: capitibus oblongis, in quibus semen atrum vel candidum.

LOCVS.

Pasim in hortis satum prouenit.

TEMPVS.

Aestate floret, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat.

Refrigerat, sicut omnia alia Papaueris genera, in quarto ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Communis ipsis refrigerandi vis est: proinde folia & capita in aqua decocta fotu somnum accerunt sunt. Bibitur & decoctum contra vigilias. Capita trita & cum polenta cataplasmatibus mixta, ignibus sacris & inflammationibus prosunt. Oportet autem viridia ipsa tundere, & in pastillos conformare, siccatosque reponere ac uti. Capita per se etiam ad dimidias in aqua decocta, dein iterum cum melle dum humor densetur crassescantque decocta, eclegma medicamentum efficiunt, dolorem mitigant in tussi, fluxionibus arteria, & celiacis affectionibus. Efficacius redditur adiecto Hypocistidis succo & Acacia. Papaueris nigri semen tritum cum vino bibitur contra fluxiones alui & foeminarum profluvia. In peruvigiliis fronti temporibusque cum aqua illinitur. Eiusdem liquor plus refrigerat, inspissat, siccantque. Erui quantitate sumptus dolorem leuat, somnum conciliat & concoquit. Tussi atque celiacis affectibus auxiliatur. Maiori autem copia haustus nocet, lethargicos efficiens, & interimit. Ad dolores capitis cum rosacco perfusus facit. Aures dolentibus cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. In oculorum inflammationibus cum tosto oui luteo & croco. Igni sacro & vulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulieris & croco,

PLANTARVM HISTORIAE

se di pro balano subditus, somnum allicit.

EX GALENO.

Sativi Papaveris semen panibus vtiliter ceu dulciarium inspergitur, nō secus ac Sesamum. Candidius nigriore praeſtat, vimq; refrigerandi habet, ideoq; somnificum est. Si verò liberalius sumatur, soporem etiam inducet, ægreq; concoquetur. Tussim præterea ex thorace & pulmone compescit. Cōfert aduersus tenues ex capite destillationes. Corpori nullum notatu dignum exhibet nutrimentum.

EX PLINIO.

Cādidī semen tostum in secunda mensa cū melle apud antiquos edebatur. Calyx ipse teritur & bibitur somni causa. Semen elephātis medetur. E nigro Papauere lacteus succus scapo inciso exprimitur, qui dēſatur, & in pastillos tritus in umbra siccat, non vi soporifera modò, verum si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum: opion vocant. Semine eius trito in pastillos, è lacte vtuntur ad somnum. Item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum his aurium dolori instillatum. Podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic & foliis ipsis vtuntur ad sacros ignes. Item vulnera cū aceto. Ego tamen damnauerim, collyriis addi, multoq; magis quas vocant lexicpyretas, quasq; pepticas & cœliacas. Nigrum tamen cœliacis in vino datur.

EX SIMEONE SETHI.

Melius est albū quàm nigrum. Somnificam vim habet,

habet, & difficilis est cōcoctionis, parūq; nutrit. Si autem cū melle edatur, semini genitali adiicit. Prodest & thoraci, & asperæ arteriæ, ac tussi. Vē- trem sistit, etsi quidā falso putauerunt ipsum mouere, cū contrariam habeat vim. Ledit caput, si copiosius sumatur, itemq; aggrauat. Sunt qui ipsum conterunt, & vigilantium fronti imponunt, in hoc vt somnum conciliet. Cæterum nigrum Papauer frigidius est, & magis somniferum, adeo vt si quis coimmodicè vtatur, somno profundo similiter lethargicis capiatur. Cum rosaceo impositum capiti eiusdem dolores à calore ortos sanat. Dicitur etiā quòd illitum cum lacte muliebri & croco, padagricos iuuat. Huius lachryma venenum est. Nigri autem succus est vocatum opium.

DE MECONE CERATITE.

CAP. CXC VII.

In Papauere corniculato mirum cur Dioscorides omiserit rictum, ceu colubri in summa siliqua conspicuum, notam planè illusorem.

NOMINA.

Mήκων κρητῆτις Græcis, Papauer corniculatum Latinis, officinis Papauer cornutum, Papaxen Germanis Gelbolmagen appellatur. Corniculatum à fructu quem producit, cornu modo inflexo, nominatum est.

FORMA.

N. ij. Folia.

PLANTARVM HISTORIAE

Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, per ambitū Papaueris sylvestris modo serrata: caulem etiam similem, florem luteum pallidum ve, fructum paruum vt cornu inflexum, fœnigræci corniculo similem, vnde & nomen inuenit. Semen pusillum, nigrum quale Papaueris. Radicem in superficie terra hærentem, nigram, crassam.

LOCVS.

Dioscorides in maritimis & asperis locis prouenire ait. In Germania tamen nostra non nisi satum fuerit, nascitur.

TEMPVS.

Iunio floret mense: Semen autem circa messes legitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse facultates eius, & in gustu nitrositas, satis ostendunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix ad dimidias cocta in aqua & pota, ischiadas, & iecinoris affectus sanare potest. His etiam qui crassas & araneosas faciunt vrinas prodest. Semen acetabuli mensura cū aqua mulsa positum, aluum leniter purgat. Folia præterea floresq; cum oleo illita crustas emarginant. Eadem inuncta iumentorum argema ac nubeculas emendant.

EX GALENO.

Papauer corniculatum nominatum quidem est à fructu leuē inuersionem habente, veluti & fœnumgræcum,

numgracum, vt bouis cornu simile esse videatur. Vim habet incidendi & abstergendi. Proinde radix herba in aqua decocta ad dimidium, iecinoris affectus adiuuat. Folia & flores, sordida admodum & maligna vlcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet vlceribus iam purgatis: adeò enim abstergere valent, vt & pura quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc facultatum robore nò sordes duntaxat, sed & crustam vlceribus detrahit.

EX PLINIO.

Semen aluum purgat dimidio acetabulo in mulso. Folia trita cum oleo, argemas iumentorum sanant. Radix acetabuli mēsurā cocta in duobus scxtariis ad dimidias, datur ad lumborū vitia & iecinoris. Carbunculis medentur ex melle folia.

DE MORO. CAP. CXCVIII.

NOMINA.

Mορέα, ἢ συγαμνία Gracis, Morus Latinis, officinis & vulgaribus herbariis Morus celsi, Germanis Maulberbaum, (Gallis Vn celsi. Meurier) appellatur.

FORMA.

Morus arbor notior est quàm vt describi desideret. Folia autem rotunda ferè habet, nisi quòd in summo sint acuminata, & extremitatibus serrata, et ad Mēthæ hortensis primi & secundi generis folia accedentia. Flores lanugineos, fructum statim ab ortu candidum, cùm pubescit rubrum, vbi maturuit

PLANTARVM HISTORIAE

atrū. Non est certè silentio transeundū, quòd Mori
 foliis quadraginta ferè diebus à Vergiliarum exor
 Seres verò tu vsq; ad solstitium pasti vermiculi, qui ὄψες græ
 miculi vn cis, latinis bombyces ac Seres nominantur, sericeum
 de nutriā vellus, quo turget vterus, pedibus explicantes cōfi
 tur, & co- ciunt: nulla enim in re alia natura sagacior depre
 rūdem mi hēditur, nec ars aliquid ab iis accepisse videbitur,
 rāda me- in quo ingeniosius laborauerit, si tam multas dū id
 tamor= vellus perficitur naturæ mutationes, & artis dū ad
 phosis. vitæ vsum disponitur, labores astimemus. Appetens
 te siquidem vere oua, pisciū ouis haud dissimilia,
 linteolo chartæuē adhaerescencia, quæ proximo au
 tumno produxerunt, radiis solis exponuntur, aut ca
 lido in loco, hypocausto nimirum, seruātur. Quo fit
 vt vermiculi excludantur exigui, qui mox Mori fo
 liis nutriuntur, quoad grandiores facti fuerint: tum
 statim penulæ cuiq; chartaceæ, vel potius inuolu
 cra conficiūtur, quibus inclusi mirabili naturæ opes
 re lanitio sese inuoluunt, ac congesto glomeri se cō
 dentes, postquam suū nendi obierūt munus emoriū
 tur, adcò vt semestris tantum illis apud nos vita
 sit. Mortuis testacea subinde tunica inducitur,
 qua aliquot diebus obducti reuiuiscunt, ac ascitis
 sibi alis in volucres papiliones degenerant, qui as
 siduè inuicem incidentes cocuntēsq; tandem re
 lictis ouis milij forma & colore, quibus sua rediui
 ua proles sequente anno renascitur, iterum moriun
 tur, atque adcò cū nullius præterea sint vsus abiis
 ciuntur.

ciuntur. Oua autem ad veris vsque initia seruatur. Hanc mirificam metamorphosin quàm non rarò summa cum admiratione ac delectatione sum contemplantus, non potui non commemorare, quò studiosis vermiculorum istorum qui Mori foliis pascuntur natura prorsus perspecta esset.

LOCVS.

Nascitur in hortis quibusdam. Amat autem in primis loca calida sabulosaq;. Gaudet fossione & stercore.

TEMPVS.

Novissima urbanarum germinat, nec nisi exacto Morus frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Proinde sapientissimi cū hanc germinare viderimus, frigus minimè timendum erit.

TEMPERAMENTVM.

Immaturus Mori fructus ubi exaruerit admodū adstringit. Maturus autē mediocriter adstringit. Cortex radice arboris amaritudinis cuiusdā et purgantis facultatis particeps est. Folia & germina quodammodo media temperie inter adstrictiorem & purgatoriam facultatem sunt prædita.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Mori fructus aluum soluit. Facile corrumpitur. Stomacho inimicus est. Præstat hoc idem eius succus. Decoctus autē areo vase, aut isolatus, magis adstringit. Admixto mellis exiguo. ad fluxiones, nomas & tōsillarū inflāmationes facit. Augetur vis eius adiecto scissili alumine, galla, croco & myrrha, itē

ramaricis semine, iride & thure. Mora verò immatura sicca tusaq; Rhois vice opsoniis miscentur, & celiacos inuant. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum soluit. Latos ventris lumbricos expellit: iis quoq; auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita & cū oleo illita, ambustis igne medentur. Decocta in aqua celesti cum vitis & nigra fici foliis capillos tingunt. Succus foliorum cyathi mensura potus, phalangiorum morsibus auxiliatur. Corticis & foliorum decocto colluuntur utiliter in dolore dentes. Colligitur per messem succus, circumfossa & secta radice arboris: inuenitur enim postridie concretus, qui in dolore dentium utilis est. Tubercula discutit, & aluum purgat.

EX GALENO.

Mori fructus maturus ventrem quidem subducit: immaturus arefactus medicamentum fit satis constringens, adeò vt ad dysenterias & celiacos affectus, aliosq; omnes qui ex fluxionū sunt genere efficax sit. Cōtunditur autem & opsoniis miscetur, veluti Rhois fructus: aut si cui ita videatur, ex aqua aut vino bibitur. Porro quòd maturorum succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam videlicet qua inest illi adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia cōplura particularia, quæ mediocrem poscunt adstrictionem, cōpetit. At immatura præter acerbitalatem aciditate etiam participant. Tota quoque arbor in omnibus suis partibus mistam

mistam aliquam obtinere facultatem ex constringente & purgante compositam videtur. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo, vt & latum lumbricum interficiat. In aliis autem partibus constringens vincit. In foliis tamen & germinibus media quodammodo cōprimētis & subducentis facultas est. Caeterum mora vbi in ventriculum purum, & prima fuerint ingesta, citissimè per intestina transcunt, et aliis cibis suo veluti ductu viam struunt. Verum secundo loco assumpta, aut prauum in ventre humorem inuenientia, celerrimè aliis vnà cum cibis corumpuntur, extraneam quandam atque inexplicabilem corruptelam inducētia similiter Cucurbitis. Tametsi enim fugacibus hæc omnia sint esculentis innocētiora, corruptione tamen nisi velociter deorsum concedant, non secus ac Pepones, vitiantur. Porro quando ventriculi os squalidum calidumq; erit, tum sicut peponibus, ita & moris vtendum. Tale nāque iecur etiam tunc esse necesse est. Immatura Mora ab arbore decerpta, siccataq; in hyemen reponunt, vt sibi medicamen ex ijs parent, vtile ad dysenteriam, aluiq; diuturnum florem persanandum. Quod quidem facile descendant fortè eis vsuuenit sola substantiæ humiditate & lubricitate, fortè etiā admistione acrioris facultatis, quæ stimulanda ad excretionē aluo sit satis. Nam adstringens qualitas adeo nihil ad deiectionem opitulatur, vt etiā reprimere

reprimere stipareq; sit nata. Proinde Moris exigua
quandam eius facultatis portiunculam inesse cōi-
cio, cuius permagna in purgantibus medicamentis
habetur: quæ facit non solum vt facile deiciantur,
verumetiam vt diutius morata in ventre corrumpantur.
Quod si corruptionē effugiant, omnino qui-
dem humectant, sed non planē refrigerant, nisi fri-
gidā accipiantur. Parcissimē corpus alunt, simili-
ter vt Pepones, haud tamen vomitum cient, nec
stomacho vt illi aduersantur.

DE MYRRHIDE CAP. cxcix.

Myrrhis etiam in segetibus nobis frequēs.

NOMINA.

Cicutaria **M**ύρρη, ἢ μύρρα Græcis, Myrrhis latinis,
vulgaribus herbariis Cicutaria, quod scili-
Error de cet caule & foliis Cicutæ similima sit. Hac simili-
duplici tudine quidā decepti, veram esse Cicutam putave-
Cicuta. rūt, cū tamē ab ea, viribus potissimum, diuersissi-
ma sit. Germanis Vuilderkorffel appellatur.

FORMA.

Cicutæ caule & foliis similis est, radicē obtinet
longam, teneram, rotundam, odoratam, in cibo non
insuauem. Hæc tota Dioscoridis delineatio, nulla
prorsus reclamante nota, herbæ cuius effigiem da-
mus pictam suffragatur. Siquidem caule striato, fo-
liis & flore Cicutæ similima est, adeo vt eam non
nulli à Cicutâ discernere nesciāt. Radicem etiā ha-
bet longam, teneram, rotundam, cibo iucundam &
odoratam.

LOCVS.

Paſſim in hortis & pratis nonnullis prouenit.

TEMPVS.

Maio mense loca in quibus nascitur huius floribus quasi candicant.

TEMPERAMENTVM.

Ex secundo est ordine excalfacientium, adiuncta partium tenuitate.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Phalangiorum morsibus radix Myrrhidis succurrit cum vino pota. Menses purgat & secundas educit. Cocta in sorbitione tabidis utiliter datur. Ferunt præterea aliqui eam bis terte die potam ex vino in pestilentialibus constitutionibus, à morbo seruare incolumes.

EX GALENO.

Radix eius menses mouet, quæq; in thorace & pulmone sunt expurgat.

EX PLINIO.

Cit menstrua & partus cum vino. Aiunt quoque eandem potam in pestilentia salutarem esse. Subuenit et phthysicis in sorbitione. Aniditatem cibi facit. Phalangiorum morsus restringit. Vlcera quoque in facie aut capite succus eius in aqua triduo maceratus sanat. DE MELILOTO. CAP. CC.

Ab utraque tua Meliloto nostra est diuersa, & odoris gratia nobis iucundissima, ut etiam cubicula præsertim dum recens est,
aut

PLANTARVM HISTORIAE

aut etiam dum cœlum fit æstate pluuium,
odore grato repleat.

NOMINA.

Mελίλωτος Græcis, Melilotus, Sertula cam-
pana, & Corona regia latinis dicitur. Meli-
loti nomen officinæ retinuerunt. Sertulam verò di-
cur dicta. xerunt, quod flos eius coronamentis dicatus sit, &
quia ex ea antiquitus corona &serta factitata
sint. Coronam autem regiam, quoniam luteis flori-
bus supernè coronetur.

GENERA.

Vulgaris Tria Meliloti hodie faciunt genera. Primum vul-
Melilo- garem, statim à radice fruticosam, cubitalem folio
tus. scenigræci minuto ac lentè simbriato, flosculo lu-
teo, odoris suauis, tereti per ramos diffuso semine.
Primum Hoc quanquam tertio generi, quod nos verum esse
genus non putamus, foliis & floribus simile sit, tamen cū nul-
est vera lam gustu præ se ferat adstrictionem, quàm summè
Melilotus. requirunt Dioscorides, Galenus, & alii veteres me-
dici, & præter amaritudinem hand exiguam acri-
moniam habeat, sit vt inter Melilotos, meo quidem
iudicio, rectè cōnumerari non possit. Hinc est quòd
nos infra, hanc alio nomine dignati sumus, Saxifra-
gamq; luteam appellauerimus. Alterum aspectu ca-
no, Croci flore, foliis Trifolii, minutissimis, vt paulò
post fusius dicemus. Hoc sanè genus nos Melilotum
germanicam vocauimus, quòd illa, & non prior in
Germania nostra pro vera Meliloto sit vsurpanda,

ob adstrictionē illā manifestam quam gustu præfert. Accedūt folia quæ pingua sunt, & flores Croci colorem referentes, quos Dioscorides requirit. Sētentiam nostram cōfirmat antiquus manuscriptus herbarius, qui hanc pro Meliloto pingit. Neq; obstat quòd hæc herba non admodum odorata sit: faciemur enim non esse laudatissimam Melilotum, sed eam quam Germania nostra profert. Nam quum Plinio lib. xxi. cap. xi. teste, Melilotus vbique nascatur, suam quæuis habeat ferè regio necesse est. Nihil igitur mirum si huic herbæ non adsint singulæ notæ, quas illi veteres græci & latini attribuūt. Satis autem est ei mistam quandam, nempe adstringentem & digerentem inesse facultatem, haud secus quàm optimæ. Germani hanc herbā nominant Unser frauuen schuchlin, vel Vuilden klee (Galli Du Melilot.) Tertium genus nos optimam & legitimam esse arbitramur Melilotū, quā nos maioris discriminis causa Italicam nuncupamus, quòd mos sit patrius Germaniæ nostræ omnia ferè peregrina vocare Italica. Germa. itaque haud ineptè Vuelicher Steinklee nominabitur.

FORMA.

Vulgaris Meliloti descriptionem inuenies suo loco. Germanica, herba est humilis, palmi altitudine, folio pratensis Trifolii, pingui & cano, flore pisi, minore tamē, luteo, semine in siliquis, radice rufa. Italica, quam è Campania allatam in Germaniā arbitror,

PLANTARVM HISTORIAE

bitror, caulem habet subrusum, rotundum, foliū fœnigraci, in ambitu serratum, flore luteo, odorato, semine in siliqua lunata, vt pictura luculenter ostendit. Tota etiam herba odorata est, vt hinc etiā conuicere liceat veram esse Melilotum.

LOCVS.

Germanica passim in pratis Germania, montosis potissimum, nascitur. Italica in Germania, nisi sata fuerit, non. prouenit. In Campania verò circa Nolam, Dioscoride teste, copiosè nascitur.

TEMPVS.

Floret ferè per integram æstatem, vtrumque genus. Siliquas tamen in fine Iulii & Augusto mense proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Mixta est facultatis: habet enim quiddam adstringens, sed & discutit & maturat: copiosior enim in ea est substantia calida quàm frigida.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Melilotus adstringendi facultatem obtinet. Molit omnes inflammationes, præcipuè autem oculorum, vteri sedis & testium in passo decocta & illita. Aliquando autē addito oui luteo assato, aut fœnigraci farina, aut lini semine, aut polline molario, aut capitulis Papaueris, aut Intybo recentes meliceridas per se cum aqua, & achoras cū creta Chia, et vino aut galla illita sanat. Stomachi dolorem cum vino cocta, & cruda cum antedictis le-

nat.

*Sedat. Aurium etiam dolores crude expressus succus,
& cum passo instillatus sedat. Capitis dolorem le-
nit, cum aceto & rosaceo inspersa.*

EX PLINIO.

*Melilotos oculis medetur cū lacte, aut cum lini
semine. Maxillarū quoq; dolores lenit, et capitis cū
rosaceo: itē aurium ē passo, quāq; in manibus intumes-
cunt vel erumpunt. Stomachi dolores in vino de-
cocta, vel cruda tritaq; Idē effectus est ad vulvas.
Testes verò & sedē procidua, quāq; ibi sunt vitia,
recens ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosa-
ceo illinuntur ad carcinomata. Deferuescit in vino
dulci. Peculiariter & cōtra meliceridas efficax.*

DE MANDRAGORA. CAP. CCI.

NOMINA.

Mανδραγόρας, ἢ νερναία Græcis, ἀνθρω-
πόμορφος Pythagoræ, Latinis canina aut
terrestris mālus, officinis Mandragora Germanis Circea.
Alraun (Gal. Mandragore) dicitur. Qui Cir- quare di-
cāā vocarunt, nomen illi à Circe fecerūt, quoniā ēta Man-
creditur radix eius ad amatoria cōducere. Pythago dragora.
ras haud dubiē ab humana forma, quā radix ē. Anthro-
pōus referre videtur, Anthropomorphon appellauit. morphos
Hinc sumpta occasione, agyrta & impostores illi cur nomi-
cū foranei radices humana effigie insignitas cir- nata.
cū ferunt, quas Mādragoras esse testātur, cū tamē Agyrtarū
cōstet eas esse fictitias, & manu factas ex cānarū comētum.
radicibus humana specie sculptis, postea plātatis.

Nascuntur.

PLANTARVM HISTORIAE

Nascuntur autem subinde radiculæ parvæ, quæ res præsentant capillos, barbâ, pectinis pilos, & ex terra eum acquirunt colorem, ut radices esse appareant. Sunt & alia multa quæ nebulones illi fabulantur, ut pecuniam ab imperitis extorqueant, quæ commemorare in præsentia nihil attinet. Terrestrẽ mælum Romani dixerunt, quòd mæla proferat, nec in altum ut reliquæ arbores surgat.

Terres-
tris mæl-
lus.

GENERA.

Duo Dioscoridi & Plinio Mandragoræ sunt genera. Mas candida est, μῶριον Græci vocant. Huius hic effigiem, citra tamen poma, quæ habere non potuimus, damus. Fœmina nigra, Græcis θριδάκ=

Fœmina. κίος à similitudine foliorum appellata. Theophras-
tus tamen li. vi. de historia plantarum, ca. i. tertium
Theophras quoddam genus Mandragoræ constituere videtur:
sti expli= cuius fructus sit μέλας, καὶ ῥαχῶδης, καὶ οἰνώ-
tu diffici= δης τῷ χυμῷ, hoc est, niger, acinosus, & sapore
lis. vinosus. Et nisi hoc genus à prioribus diuersum esse
statuas, discrepare inter se non leuiter Theophrastum
& Dioscoridem necesse est fatearis. Nam Dioscori-
des palàm asserit poma priorum duorum generum
vitellis onorū esse similia, & pallida: contrà Theo-
phrastus nigra, acinosa, ut diximus, & sapore vino-
sa esse tradit. Accedit quòd idem Theophrastus eos-
dem loco Mandragoræ caulem tribuat, perinde at-
que Plinius, quem Dioscorides penitus aufert: ut
hoc nomine necesse sit hæc omnia ad tertium hoc
genus

genus *Mandragoræ* referre, quod nos tamen infra inter *Solanigenera* recensēbimus, ubi etiam eius p*er* eturam offendes.

FORMA.

Fœmina angustioribus & minoribus quàm La Fœmina.
Eluca foliis est, grauit̃ odoratis & virosis, per ter
ram sparsis, iuxtaq; folia pomis vitellis oui similib.
pallidis, odoratis, in quibus semen quale pyri, radis
cibus magnis, binis ternisve, sibi inuicem implici
tis, in superficie nigris, intus candidis & crassi cor
ticis. Caule verò nō fct. Maris folia sunt magna,
candida, lata, lenia vt Betæ. Mâla duplo maiora
quàm fœmina, croci colore, cū aliqua grauitate odo
rata, quæ comedētes pastores quadantenus soporan
tur. Radix supradictæ similis, maior tamen candi
diorq; Orbata & hæc est caule.

LOCVS.

Prouenit in syluis & vmbrosis locis. Nunc in hor
tis etiã plātatur.

TEMPERAMENTVM.

Mandragora vincentem habet facultatem refri
geratoriam, adeò vt tertii sit ordinis refrigerantiũ.
Veruntamen nonnihil etiam caloris inest, & in poz
mis humiditatis. Radicis cortex non tantũ refrie
gerat, sed & desiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus colligitur è cortice recentis radicis tuso &
prælis subiecto, quem insolatum cū iam concreue

rit, in fictili vase reponere oportet. Colligitur itidem è pomis succus, ignauior tamen. Delibratur radice cortex, & traiectus lino ad vsum suspēditur. Quisdam Mandragoræ radices in vino ad tertius decoquant, & traiectum per columbus seruant, vtētes cyathi vnius mensura in periculis, & dolorib. & in his quos sine doloris sensu secare aut vrere voluerint. Potus obolorū duorum pondere cum mulsâ aqua Mandragoræ liquor, pituitam, nigramq; bilem veratri modo purgat. Verū maiore copia potus vitam adimit. M̃scetur medicamentis ocularibus, & iis quæ dolores finiunt, pestis quoq; emolliētibus. Per se semioboli pondere appositus, menses & fetus trahit. Sedi pro balano subditus somnum facit. Radix ebur emollire fertur, si senis horis cū eo decocta sit, & in quā voluerit aliquis formam fingi & formari facilem reddere. Folia recentia, oculorū & quas vlcera excitant inflammationibus cum polenta illita prosunt. Discutiunt eadem omnem duritiē, abscessus, strumas, tuberculaq; quinq; aut sex diebus leniter confricata. Stigmata sine ulceratione delent. Folia condita sale seruantur in eisdē vsus. Radix autē trita ex aceto ignibus sacris, & serpentium ictibus ex melle aut oleo medetur. Strumas atque tubercula ex aqua dissicit. Articulorum dolores cū polenta sedat. Cōficitur citra coctionem vinū è cortice radice. Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, iis qui se-

cari,

cari, aut vri debent, vt ante dictum est. Siquidē nullo tunc afficiuntur dolore, eò quòd somno quodam pressi torpescant. Mâla olfactu, & comesta soporē afferunt. Potest idem & eorum succus. Nimiis tamen eorundē vsus obmutescere facit. Semen malorū potū vterum purgat, appositumq; cum sulphure ignem non experto rubra fœminarum profluvia sistit. Colligitur ex radice liquor, ea scarificata mul-
tifariâ, & eo quod erūpit, in cauū vas recepto. Est autē liquor succo efficacior. Sed nō ferunt omnibus locis liquorem radices, idq; experientia ostendit.

EX GALENO.

Soporem conciliandi vim habent Mandragoræ poma. Radicis cortex valentissimus est, reliquum quod intus est imbecillum existit.

EX PLINIO.

Succus fit & è mâlis et è cau'e, deciso cacumine, et radice pūctis aperta aut decocta. utilis hæc vel surculo. Concisa quoque in orbiculos seruatur in vino. Succus non vbique inuenitur, sed vbi potest, circa vindemias quaritur. Odor grauis eius, sed radicis & mâli grauior. Mâla matura in sole siccantur. Succus ex iis sole densatur: item radicis tusæ, vel in vino nigro ad tertias decoctæ. Folia seruatur in muris efficacius, aliàs recētū succus pestis est: sic quoque vires noxiæ. Grauedinem afferūt etiam olfactu, quanquam mâla in aliis terris mandantur nimio tamen odore obmutescunt ignari. Potu quidē
O ij largiore

PLANTARVM HISTORIAE

largiore etiam moriuntur. Vis somnifica pro viribus bibentium. Media potio cyathi vnius. Bibitur & contra serpentes, & ante sectiones punctionesq; ne sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnum odore quæsisse. Bibitur et pro Elleboro duobus obolis in mulso. Ad strumas radix Mandragoræ ex aqua bibitur. Articulis prosunt folia cū polenta, vel radix recens tusa cum cucumere sylvestri, vel decocta in aqua. Cum cerato apostemata & vlcera tetra, folia Mandragoræ recentia sanant. Radix vulnera cum melle aut olco.

DE MALIS INSANIS.

CAP. CCII.

Poma amoris etiam hodie vulgò dicuntur, mala hæc insana.

NOMINA.

Qua mæla insana hodie appellatur, et à Neapolitanis Melæxana, ab aliis amoris poma, à Germanis verò Melantzan (Gallicè Pomes d'amours) num veteribus cognita fuerint asseuerare non ausim. Non latet tamen Hermolaû in Corollario suo in ea esse sententia, vt putet esse tertiam Mandragoræ speciem, quâ Morion vocat.

Mæla insana Quam tamen sententiâ cur non probẽ, facit impropria nō sunt mis Theophrastus qui lib. vi. de historia stirpium tertia Mæ ca. ij. eius fructum esse nigrum, acinosumq; scribit, dragoræ qualia mæla insana non sunt. Dein quod Morii frus species. Etus letalis sit, mæla verò insana minimè, vt paulò

pòst dicemus. Mala autem insana dicta sunt, non Mâla in-
quòd letalia sint, sed quòd difficulter concoquâtur. Sana cur
Amoris autem poma, quòd propter elegantiam & dicta.
pulchritudinem digna sint quæ amentur. Amoris
poma quæ

G E N E R A.

Duo sunt malorum insanorum genera. Aliqua e- re vocata.
nim purpurea ferè tota, aliqua verò lutea, aut can-
dorem aliquem præ se ferentia. Primi generis poma
Germanicè braun Melantzan, alterius autem,
geel Melantzan vocantur.

F O R M A.

Mala insana in frutice nascuntur, qui Personatiâ
propemodum caule & foliis refert. Differunt autē
huius folia à Personatiâ, quòd longiora, magisq; la-
ciniata sint. Flores habet purpureos, speciosos, sex fo-
liis è calathò stellatim radiatis, fructus oblògi ma-
li forma & magnitudine, in quibus semen siliqua-
stro non dissimile. Radicem multis capillatam fi-
bris luteâmq;.

L O C V S.

In hortis apud nos seruntur, sed frequenter in fi-
etilibus & pensilibus fenestrarum hortis. Et eodē
cultu quo cucumeres & melones gaudent.

T E M P V S.

Floret Augusto & Septembre mensibus, ac sub-
inde fructum profert.

T E M P E R A M E N T V M.

In his malis haud dubiè ut in cucumere esculen-
to aut fungo, frigida & humida temperies superat.

PIANTARVM HISTORIAE

VIRE S.

Nullū, quòd sciā, in medicina vsum habent. Edū-
tur autē à nonnullis ex oleo, sale & pipere fungorū
modo cocta. Alii vbi paululū inferbuerūt igni, in or-
biculos vel taleolas digerunt, & in acetariis ex o-
leo, vel pipere & aceto comedunt. Salgamariū in
muria acida seruant, cibo per hyemē & ver ori gra-
to, sed tamen qui agrius cōcoquatur. Quid multa?
delicatorū & omnia digustare volentiū cibus est
malū insanū. Quare qui sanitatis studio aliquo te-
nētur, ū statim nomine ipso territi, vsum illorū cui-
tabunt. DE NYMPHAEA. CAP. CCIII.

NOMINA.

Nenu-
phar.

Nyme-
phæa cur
dicta.

Nυμφαία Græcis, Nymphaea latinis, officio
nis Nenuphar barbara voce nominatur. Ger-
manis Seeblum, Vuassermahen (Gallicè Blac
d'eau, ou Iaulnet d'eau.) Nymphaea autem no-
men sibi vendicasse videtur, quòd aquosa amet lo-
ca: vel, vt ex veterib. aliqui fabulati sunt, à Nym-
pha, quæ xelotypia Herculis intabuit & mortua
est, inq; palustrem hanc plantam mutata.

GENERA.

Candida.

Lutea.

Duo eius genera. Vna enim à flore candido, Lilyj
simili, candida appellatur. Germa. Vueliz See-
blumen. Altera itidem à floribus, qui lutei sunt, lu-
tea nominatur, Germanicè geel seeblumen. Pos-
sent etiam radicibus discerni, cū prior nigra, alte-
ra verò candida constet, ad eò vt hoc nomine prima
candida

candida, altera autem nigra diceretur. Mu'tò vero conſultius eſt à floribus, quam radice diſcrimen ſumere, quòd illi nunquam non oculis expoſiti ſint, radices autem non niſi effoſſæ intueri poſſint.

FORMA.

Prima, folia Ciborio ſimilia habet, minora tamẽ & longiora, quadantenus ſuper aquam emiñetia, aliqua tamen etiam ſub aquis, plura ab vna radice prodeuntia. Flos candidus, Lilio ſimilis, in medio quòd crocẽ ſit obtinẽs Hic cũ deſloruerit rotũdus, & m̃lo circaferentia, aut Papaueris capiti ſimilis, colore niger ſit. In quo ſanẽ ſemen clauditur nigri, latũ, denſum, guſtu glutinoſum. Caulis illi læuis, minime craſſus, niger, Aegyptiæ fabæ ſimilis. Radix nigra, aſpera, clauæ perſimilis. Hæ ſingulæ notæ alteri Nenuphari vocato quadrat. Folium enim conſpicitur orbiculato, læui, herbaceo, amplo, in ſtagnantibus aquis ſupernatante: flore candido, Lilio ſimili, in medio croceum habente, & cũ deſloruerit capite Papaueris, in quo ſemen latum, amarũ, pingue. Caulis gracilis eſt et læuis. Radix nigra & ampla, dulcis, nodofa, clauæ formam rebræſentans. Altera folia antedictæ ſimilia habet, ſed radicẽ albam & aſperam: florẽ luteũ, ſplendentem, roſæ ſimilem. Quæ itidem notæ in vniuerſum omnes alteri Nenuphari, quæ luteis eſt floribus, reſpondent.

LOCVS.

Nascitur in paludibus, & aquis ſtagnantibus.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Flores in fine Maij & Iunio mense colliguntur,
Radices autem in autumnno effodiuntur.

TEMPERAMENTVM.

Nymphæa tum radix, tum semen refrigerandi
& citra morsum desiccandi vim obtinet.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Radix prioris sicca cum vino pota, coeliacis &
dysentericis prodest. Lienem absunit. Stomachi ves-
sicaq; doloribus illinitur. Alphos ex aqua exterit. Alo-
pecias cum pice imposita sanat. Eadē contra Ve-
neris insomnia bibitur, siquidem ea compescit. Pau-
cis diebus, si quis cōtinuò bibat, genitale infirmat.
Idem semen potum efficit. Alterius quæ lutea dici-
tur, radix & semen contra muliebria profluvia ex
vino nigro bibuntur.

EX GALENO.

Nymphæa radix & semen, vëtris profluvia cohi-
bēt, semenq; genitale siue per somnia, siue alio pacto
immodicè profluens retinent. Iuuant dysentericos.
Caterum Nymphæa quæ candidā radicem habet,
potentioris est facultatis, vt & muliebri profluvio
medeatur. Verum & hæc, & ea quoque quæ atrā
habet radicem, ex vino nigro austero bibitur. Porro
nonnullā etiā abstergendi vim obtinent, ita vt al-
phos & alopecias sanēt. Ad alphos verò macerātur
aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hæc aptior
est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

EX THEOPHRASTO.

Nymphæa trita plagæ imposita sanguinem sistere traditur. Vtilis et ad difficultates intestinorū pota.

EX PLINIO.

Venerē in totū adimit Nymphæa, semel in qua draginta dies pota. Insomnia quoq; Veneris à ieiunio pota, et in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inhibet non solū Venerē, sed effluentia genitura: ob id corpus alere, vocemq; dicitur. Semen cum vino potū dysentericis auxilio est. Tenebris radix eiusdem ex vino bibitur. In vino quoque pota lienem consumit. Dolores vesicæ sedat ex vino. Manantia sanat vlcera. Maculas omnes emēdat. Trita plagis imponitur. Vlceribus, priuatim iis quæ calceamento facta sunt, prodest arida infricata.

DE NAPY. CAP. CCIIII.

NOMINA.

Nάπυ, ἢ σίνυσι Græcè, Sinapis & Sinapī Latine vocatur. Officina nomē retinuerunt. Officina
rū error.
Perperam tamē faciunt, quòd altero genere pro Eruca, quam suo loco depinximus, vtuntur. Germanicè Zam oder Gartensenff (Gallicè Seneue) nominatur. Sinapis autem nomen è Græcia venit Sinapis in Latium, censetq; dictum Athenæus libro nono vnde di-
Dygnosoph. Sinapi, ὅτι σίνεταί τῆς ὥπας ἐν ἑτα.
τῇ ὀδμῇ, hoc est, quòd olfactum luminibus offi- Napy cur
ciat. Pleraque Græcia Napy nominat, quasi Na vocatum.
phy, vt idem eodem in loco interpretatur, quoniam

PLANTARVM HISTORIAE

non sine natura sit, sed acri & proinde incommoda donetur. Alii Napy per priuationem videlicet *υή-τωlov*, quasi immite dici volunt, quoniam acrimonia vehementis particeps sit.

GENERA.

Sinapis duo inueniuntur genera, foliis, floribus & semine distantia. Primum siquidem genus rapi-
tiam frondem exprimit, floremq; luteū obtinet, ac
semen album profert. Nos à floribus luteis Germanice *geelē Gartēienff* nominauimus. Alterum in
Eruca folium laciniatur, florēque albicante, &
semine vesco pulloque constat. Nos genus hoc ab
albicantibus floribus *Vueffen Gartensentff* ap-
pellauimus, vt esset huius aliqua ab Eruca nomen-
clatura diuersitas, quam Germani simpliciter *V-
ueissen Senff* vocant.

FORMA.

Primum caulem habet hirsutum, longum, ramo-
sum, folia rapi, minora tamen & asperiora, flores
luteos, siliquas rotundas ac hirsutas, plenas semine
candicante. Alterū genus itidem hirsuto caule præ-
ditum est, minore tamen, foliis Erucae, maioribus ta-
men ac latioribus, laciniatis floribus albicantibus,
crucisq; effigiem referentibus, siliquis teretibus &
oblongis, semine pullo rufescente ve refertis.

LOCVS.

Vtrumque in hortis satum prouenit. Et quamuis
nullo cultu plerunque germinet, terram tamē aras-

tam

tam & congestitiam magis amat.

TEMPVS.

*Floret vtrūque Iunio ac Iulio mensibus, eodē
que tempore semen in siliquis suis profert.*

TEMPERAMENTVM.

Sinapi calefacit & desiccāt quarto ordine.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

*Calfaciendi, extenuandi & extrahendi vim ha-
bet. Commanducatum capitis pī uitam elicit. Succus
eius hydromeliti mixtus contra tonsillarū præ-
duros tumores, ac veterem callosamq; arterie sca-
britiem conuenienter gargarizatur. Tritum nari-
bus admotū, sternutamenta ciet. Comitibus quo-
que auxiliatur. Feminas vulua stragulatū oppressa
excitat. Lethargicis, deraſo capite, illinitur. Fi-
cis ammiſtum & impositum donec rubescat locus,
ad coxendicū cruciatus, lienes, & omnis generis
diuturnos dolores confert, cū permutandæ paſſio-
nis causa ex alto in cutis superficie aliquid trahere
voluerimus. Alopecis illitum medetur. Faciem
purgat. Sugillata cum melle, aut adipe, aut cerato
delet. Ex aceto contra lepras, & feras impetigines
perungitur. Aridum contra febrium circuitus bibi-
tur, aut potui polentæ modo inſperſum. Extrahē-
tibus emplaſtris, ſcabiēmq; extenuantibus vtiliter
ammiſcetur. Grauitati aurium & ſonitui, tritum
cum ſico impositum prodeſt. Succus ad hebetudines
oculorum & palpebrarum ſcabritiem illinitur.*

Expria

PLANTARVM HISTORIAE

Exprimitur autem ex viridi adhuc semine succus,
& in sole siccatur.

EX PLINIO.

Synapi Pythagoras principatum habere ex his,
quorum sublime vis feratur, iudicauit: quoniā non
aliud magis in nares & cerebrum penetret. Ad ser-
pentium ictus & scorpionum tritum cum aceto il-
linitur. Fungorum venena discutit. Contra pitui-
tam tenetur in ore donec lique scat, aut gargariza-
tur cum aqua mulsa. Ad dentium dolorem mandi-
tur. Ad vnam gargarizatur cum aceto & melle.
Stomacho vtilissimum contra omnia vitia, pulmo-
nibusque. Excreationes faciles facit in cibo sum-
ptum. Datur & suspiriosis. Item comitialibus tepi-
dum cum succo cucumerum. Sensus atque sternu-
tamenta capitis purgat, aluum mollit, menstrua &
vrinam ciet, & hydropicis imponitur. Cum fico &
cumino tusum ternis partibus comitiali morbo. Et
vuluarum conuersionem suffitum excitat odore a-
ceto mixto. Item lethargicos: & si vehemētior som-
nus lethargicos premat, cruribus aut etiam capiti
illinitur cum fico & aceto. Veteres dolores thora-
cis, lumborum, coxēdicum, humerorum, & in qua-
cūque parte corporis ex alto vitia extrahēda sunt,
illitum caustica vi emendat pustulas faciendo. At
in magna duritia sine fico inpositum: vel si vehe-
mentior vrigo timeatur, per duplices pannos. Vtū-
tur ad alopecias cum rubrica, psoras, lepras, phthi-
riases,

riases, tetanicos, opisthotonicos. Inungunt quoque scabras genas, aut caligantes oculos cum melle. Succusq; tribus modis exprimitur in fœtili, calefcitque in eo in sole modicè. Exit & è cauliculo succus lacteus, qui ita cum induruit, dentium dolori medetur. Semen ac radix cum immaduere musto, contesuntur, manûsque plenæ mensura sorbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput sensuq; omnes. Mulierum etiam lassitudines, saluberrimo medicinæ genere. Calculos quoque discutit potum ex aceto. Allinitur & liuoribus sugillatisq; cû melle & adipe anserino, aut cera Cypria. Fit & oleû ex semine madefacto in oleo expressoque, quo vtuntur ad neruorum rigores, lumborumque & coxædicum perfrictiones.

EX SIMEONE SETHI.

Sinapi vim habet dissoluendi & discutendi humiditates quæ in capite & stomacho sunt. Confert etiã lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt: ad hæc & podagris à pituita factis. Officit verò visui, & calido capiti, ac iecori. Adiuvat concoctionem & distributionem ciborum crassarum partium. Minuit quæ in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris, eas in melius mutat. Linguas etiam humiditate grauatas siccatur. Si cum melle sumatur, tussis resoluit. Cum caricis verò ischiadicis illitum, & lienosis vtile est: trahit enim
que

PLANTARVM HISTORIAE

quæ intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum
verò & incensum, serpentes fugat.

DE NERIO. CAP. CCV.

NOMINA.

Nήριον, ἢ ῥόδον ἀφύη, ἢ ῥόδον ὁδονδρον *græ-*
cæ, Nericon & Rhododendron latinis, offi-
Oleāder. cinis & barbaris Olean ler, Germanis Olander,
Rhododa (Gallis Rosage, ou Rosagine) dicitur. Rhododa
phne cur phnen autem Græci dixerūt à rosæ floribus & lau-
dicta. ri folius, quæ fruticis huius præcipue sunt nota. Nec
refert quòd Dioscorides amygdalæ foliis eius folia
comparauerit, lauro enim & amygdalæ non dissimilis
magnopere foliorum figura est. Fecit idem ros
Rhododē= sa flos & arbor, ut eadem gens Rhododendrum no-
dros qua= minauerit.

re.

FORMA.

Notus frutex, amygdalæ longiora & crassiora
folia habens, florem rosarum figura, fructum amy-
gdalæ similem, veluti cornu, qui dehiscens lanca na-
tura plenus est, pappis acanthinis simili. Radix illi
est acuminata, longa, lignosa, gustanti salsa.

LOCVS.

Nascitur in hortis, maritimis, & secundum a-
mnes locis.

TEMPVS.

Quo mense floribus & fructu prægnans sit Ne-
rion, non satis constat: neq; enim vel flores vel fru-
ctus eius nobis videre licuit. Hinc est quòd etiam
pictura

pietura quam exhibemus iisdem careat.

TEMPERAMENTVM.

Nerium Arabes calefacere in principio tertij ordinis, & in secundo siccare tradunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Flores & folia canes, asinos, mulos & quadrupes pedes plurimos enecant: hominum verò cum vino pota contra venenatorum morsus præsidia salutaria sunt, præsertim si ruta cõmiscueris. Infirmiora verò animantia, vt oves, caprae q; , si aquam biberint in qua folia eius maduerint, moriuntur.

EX GALENO.

Nerium aut Rhododaphne notus omnibus est frutex. Foris quidem illius discutiendi vim obtinet. Intrò autè in corpus assumptus, perniciosus ac venenosus non tantum hominibus, verumetiam plebisque pecudibus.

EX PLINIO.

Rhododendros ne nomen quidem apud nos inuenit Latinum: Rhododaphnen vocant, aut Nerium. Mirum, folia eius quadrupedum venenum esse, homini verò contra serpentes præsidium, ruta addita, & è vino pota. Pecus etià & caprae si aqua biberint in qua folia ea maduerint, mori dicuntur.

DE OXYACANTHA. CAP. CCVI.

NOMINA.

O Ξυάνθη Græcis, Oxycantha Latinis, Officinis Berberis, Germanis Paisseloeer, Berberis. Saurich,

PLANTARVM HISTORIAE

Saurich, Erbsel, Versich, (Gallis Espine vinete, ou du Berberis) vocatur. Haud dubiè Græci

Oxyacan= à spinarum acuminatis cuspidibus Oxyacantham
tha vnde dixerunt.

dicta.

FORMA.

Sylvestri pyro similis arbor est, sed minor & nimis spinosa. Fructum fert Myrto similem, plenum cōfertūmve, rubetē, fractu facilem, intus nucleos habentem. Radicem multifidam & altam. Huius delineationis nota, nulla prorsus reclamante, arbori quam vulgò Berberim barbara voce nomināt, ad-
amūssim respondent. Nanque arbuscula est pyri sylvestris aspectu, sed humilior, ramis ex intervallo spinosis, folio lentè per ambitum aculeato, acinis rubentibus, in pediculo iuxtà & racemo pendulis, gustu acido & subaustero, duobus intus granis, radice numerosa.

LOCVS.

Multis nascitur locis, sylvis nempe, frutetis, campestribus, montanis, siccis & aquosis.

TEMPVS.

Germinat ineunte vere, ab occasu autem Vergiliarum fructifera. Per Septēbrem itaq; ac Octobrē menses carpitur, campos sylvasq; exornans.

TEMPERAMENTVM.

Oxyacantha astringit & desiccatur, atque adeò quorundam sententia frigida & sicca in secundo est ordine. Fructus tamen tenuium est partium, &
paululum

paululum quiddam incisium habet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

*Huius fructus potus & comestus, alui profluuiū,
& muliebrē fluxū sistit. Radix trita & illita acu-
leos & spicula extrahit. Abortum facere tradūt, si
sensim venter ter radice feriatur aut perungatur.*

EX GALENO.

*Oxyacanthus arbor vt pyro sylvestri similem ha-
bet speciem, ita & facultates minimè dissimiles.
Quin & ipsi fructus Pyri quidē sylvestris prorsum
atque absolutè austerus est, Oxyacāthes autem te-
tissimum partiū est, & modicè incidit. Porro arboris
huius fructus, pyri sylvestris similis nō est, sed Myr-
ti potius fructui, rubēs scilicet & rarus. Habet ve-
rō & nucleos. Caterū nō tantū esus, sed & bibitus
omnes fluxionum affectus cohibet atque sistit.*

EX RECENTIORIBVS.

*E baccis vinum exprimitur eodem fere vsu, quo
vinum ex mālō punico. Condiuntur item acini vel
melle vel saccharo ad restringendam sitim, depellē-
damq; febricitātium malaciam, quorum morosum
nimis palatum cibum ferre quemcūque respuit. E-
lāguescēs appetentiā grato huius acore recreatur.*

DE OSYRIDE. CAP. CCVII.

NOMINA.

Oξύς Græcis, Osyris Latinis, officinis Linæ-
ria, nonnullis herba vrinalis appellatur. Ger-
manicè Fläschszkraut, Lynkraut, Harnkraut,

+ & σπὸς
videtur le-
gēdum, vt
est apud
Dioscori.

Linaria Vnser frauuen flachsz; Vuild flachsz, kros-
tenflachsz, Nabelkraut. *Linariam autem di-*
quare dis xerunt recentiores à foliis quæ lini faciem referre
cta. videntur.

FORMA.

Virgultum sarmentumve nigrum est Osyris, te-
nues virgas lentasque habēs. In quibus foliola sunt
terna, & quaternā, modò quina, interim & sena,
ceu Lini nigra initio, dein colore mutato subrube-
scentia. Iam si rem diligenter expendas, nullam
delineationis notā Osyridi traditam, in *Linaria* di-
cta hodie deesse reperies. Siquidem hæc cauliculis
fruticat nigricantibus, & qui ob suum lentore hauri
facile franguntur, tenuibus, atris quæque foliis, Li-
ni facie. Concolori denique semine tantisper dum
maturescit, postquam ematurrit rubescente. Senes-
centes quoque ramuli nigritiā in ruborem vertūt.
His accedit antiqui & manuscripti herbarij testa-
monium, qui *Linariam* eam esse herbā tradit, quæ
Dioscoridi Osyris dicitur, floremq; habere luteū in-
quit. Respondet etiam per omnia pictura,

LOCVS.

Passim in campatribus prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate tota & autumnō.

TEMPERAMENTVM.

Osyridi amara inest qualitas, & obstructions
aperiendi, adeoque vt calida sit necesse est. Amara
nanque,

nāque, Galeno lib. iij. cap. x. de simpl. medicamēto. facult. teste, qualitate prædita, omnia calida sūt. Sic etiam eodem authore lib. v. cap. xi. eiusdem tractationis, singula quæ poros & meatus expurgant, ab infractuq; liberant medicamēta, calida sunt & tenuium partium. Vehementer itaque errant, qui Linariam frigidam & humidam esse asserunt. Et certe præter ea quæ iam dicta sunt, vel hoc vno argumento erroneam illorum sententiam confutare omnium maximè licetbit. Cum etenim Linaria urinam mouendi facultatem inesse scribant vulgares etiam herbarij, colligitur illam nō esse frigidam & humidā, quando Galeno libro iam citato cap. xij. attestante, omnia quæ urinam ducunt ex acriū atq; que ad eō calidorum & siccorum sint genere.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius decoctū potū morbo regio affectos inuat.

EX GALENO.

Osyridi, ex qua medicamenta ad extirpandam leuigandamq; cutem, Græci κρηματα vocant, fieri solent, amara inest qualitas, & obstructions expellendi facultas. quare & in iecmore consistētes obstructions adiuvat.

κρηματα enim non solum scopas, vt qui Additio.
dam arbitratur, verum etiam κρηματα. Suida & Phauorino testibus, hoc est, com-
ptoria & venustantia faciem medicamenta

PLANTARVM HISTORIAE

Græci dixerunt : è quorum sanè numero Osyris est , quæ cùm amara sit, extergere etiam quæ sunt in corpore, facie potissimum, maculas potest . Hinc rectè Plinius ex eius foliis mulieribus, vtpote quæ plus aliis comere & venustare faciem solent, smegmata fieri tradit.

EX AETIO.

Osyris est herba subfruticosa, tenuibus virgulis, fractioni renitentibus, foliis Lino similibus , nigris primo, postea subrubescens, gustu amaris , unde regio morbo conferunt.

EX PLINIO.

Smegmata mulieribus ex Osyridis foliis faciunt. Radicum decoctum potum, sanat arquatos. Eadem priusquam maturescit semen concisa, & sole siccata, alui sistunt. Post maturitatem verò collecta, & in sorbitione decocta, rheumatismis ventris medentur, & per se trita ex aqua cœlesti bibuntur.

DE OCIMO. CAP. CCVIII.

NOMINA.

Oκίμω Græcis, Ocimum Latinis, recentioribus Græcis βασιλινδὼν, id est, regium appellatur, quod nomen apud omnes nostræ ætatis herbarios & officinas vsurpatur. Sunt tamen quibus Ocimum gariophyllatum nominetur . Germanicè Basilien, vel Basilgram, (Gallicè du Basilic) dicitur . Ocimum autem quibusdam à nascendi celeritate

celeritate dictum est. siquidem à sutu tertio statim die emicat. Quod verius Ocimo videtur cōuenire, quod pabuli & farraginis quoddam genus est, sic nominatum ab ὄκως Græca dictione, quæ citò significat. Proinde sunt qui significantius per x scribendum ducant Oximū, ab ὄζω, quod redolere denotat, quoniam herba tota suauissimum spiret odorem. Ab eodem odore, quòd basilica & regia domo dignum sit, Basilicum hodie nuncupatur.

Oximum
cur dictū.

Basilicū.

GENERA.

Sunt qui duo Ocimi cōminiscātur genera: vnum latiora folia habens, quod priuatim Basilicum: alterum angustiora, quod Ocimum gariophyllatum appellant. Nos tria tibi exhibemus ex vno promiscuè semine nobis nata. Primū maioris discriminis ratione Ocimum exiguum, Germanicè Klein Basilien, nominauimus. Alterum mediocre, Germanicè Mittel Basilien. Tertium magnum, Germanicè grosz Basilien vocauimus. Neq; enim nisi foliis solis distare videntur, quæ in primo genere exigua admodum sunt, in altero verò paulò latiora, in tertio primi respectu latissima. Odor autē omnibus tribus vnus idemq; est.

FORMA.

Ocimum pedali altitudine prosilit, surculis, ramulis rotundis, folio Mercurialis, diluti viroris. Floret particulatim, primò parte inferiore, demum superiore: flosculo candido, semine pullo nigro,ve,

PLANTARVM HISTORIAE

cui cortex obducitur. Radix vna descendit in altitudinem, crassior & lignosa, cætera à lateribus funduntur exiles ac prolixæ.

LOCVS.

Passim in figulinis vasis mulieres extra fenestras adium fouent Ocimum. In hortis etiam satū provenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mētib. floret, dein semē producit.

TEMPERAMENTVM.

Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, cum excrementitia quadam humiditate.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Copiosè comestum oculorum aciem hebetat, aluum emollit, flatus mouet, vrinam cit, lac euocat, ægreq; in ventre mutatur. Illitum cum polenta farina, rosaceo & aceto, inflammationibus, mariniq; draconis & scorpionis ictibus auxilio est. Per se autem cum vino Chio oculorum doloribus. Oculorum caligines succus eiusdem abstergit, corundemque fluxiones exiccat. Semen potum quibus atra bilis gignitur, difficultati vrinae, inflatisque conuenit. Olfactus per nares attractum, copiosa sternutamenta mouet. Quod idem herba efficit. Porro instante sternutamento oculos comprimere oportet. Sūt qui Ocimum cauent minimeq; comedūt, quandoquidē manducatum, & in sole positū vermes gignat. Libyes autem adiecerunt, quòd si feriantur à scorpione qui Ocimum ederint, nullo dolore conflictari.

EX GALENO.

Ocimum excrementiam humiditatem habet, proinde nec commodum est quod in corpus sumatur. Caterum foris illitum, ad digerendum & concoquendum utile est. Plerique hoc etiam ut opsonio utuntur, ex oleo & garo offerentes. Vitiosioris autem succi est. Admentiuntur ob hoc quidam dicentes, si tritum fictili nouo indatur, celerrimè intra paucos dies scorpiones gignere, præsertim ubi quis quotidie ollam soli expositam calfecerit. Sed hoc sanè à vero abest. Id porro verè de eo dixeris, præui succi, stomacho inimicum, & concoctu pertinax olus esse.

EX PLINIO.

Ocimum Chrysippus grauiter increpuit, inutile esse dicens stomacho, vrinæ, oculorum quoque claritati. Præterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris vitia, ideoq; capras id aspernari: hominibus quoque fugiendum censet. Adiciunt quidam, tritum si operiatur lapide, scorpionem gignere: commanducatum, & in sole positum, vermes afferre. Alij verò, si eo die feriatur quispiam à scorpione, qui ediderit Ocimum, sanari non posse. Quinimò tradunt aliqui, manipulo Ocimi cum cancris decem marinis vel fluuiatilibus trito, conuenire ad cum scorpiones à proximo omnes. Diodotus in empiricis, etiam pediculos facere Ocimi cibum. Secuta atas alacriter defendit, nã id esse capras, nec minus quã

PLANTARVM HISTORIAE

mētham & rutham scorpionū terrestrium ictibus, marinorūque venenis mederi cū vino, addito aceto exiguo. Vsu quoque compertum, deficiētibus ex aceto odoratum salutarem esse. Item lethargicis, et inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris impositum ex vino. Stomacho quoque esse vtile, inflationes & ructum ex aceto dissolvere sumptum. Aluum sistere impositum. Vrinam ciere. Sic & morbo regio & hydropicis prodesse. Chole-
ras eo & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiā coeliaci Philistio dedit, & coctum dysentericis & colicis Plistonius. Aliqui & in tenasmo, & sanguinem excreantibus, in vino. Contra duritiā precordiorum illinitur mammis. Extīguit quoque lactis prouentum. Auribus vtilissimum infantium, præcipuè cum adipe anserino. Semen tritum & haustum naribus, sternutamenta mouet, & destillationes capiti quoque illitū. Vulusas purgat in cibo ex aceto. Verrucas mixto atramento sutorio tollit. Venerem stimulat.

EX SIMEONE SETHI.

Basilica ocima olfacta cor & caput iuuant. Si aqua irrigantur, humidiora fiunt, & somnum conciliant. Semen eorum cardiacis affectibus succurrit. Animi mœrorem ex atra bile ortam, in hilaritatem & letitiam mutat.

APPENDIX.

Vides

Vides in referendis Ocimi facultatibus non parum inter se dissentire Dioscoridem, Galenū & Plinium, ita vt vix pugnantes illorum sententias conciliare possis. Quare consultum erit vt hic, quem ad nodum in aliis etiam, Galeni amplectaris opinionem, qui quodammodo inter hos medius interiectus, commendat exteriorem eius vsum in iis quæ σύμπτῃς, καὶ διαφόρῃς, id est, concoctionē & discussionem desiderant: damnat verò internū ob excrementitium humorem quo grauat & ledit interanea. Et ad hunc etiam scopum respiciens, plerasque alias Dioscoridis & Plinij contradictiones tollere poteris.

DE ORIGANO. CAP. CCIX.
NOMINA.

Oρίγανος Græcis, Origanus vel Origanū Latinis, officinis nomen suum retinuit, Germanis Vuolgemut, Dosten, Braūdostē, vel bergmuntz, (Gallis Marioleine d'angleterre) nominatur. Origanum verò quod montibus gaudeat Origanū appellationē apud Græcos inuenit, ἀπὸ τοῦ ὄρους, vnde dictum id est, monte, & χαρῆς, gaudio. Herodianus quod etiam visum exacuat nomē duxisse testatur, ἀπὸ ὅς γ' ἔστιν ὁρίζω clarifico, quasi aciem oculorum illustrans. Theodorus grammaticus nomen ex aduerso datū putat, ἀπὸ ἰγῶ, quod est algeo, fieri ἰγῶνον, quasi rigens, censet, & tandem ascita litera princeps, o, in Origanum esse confectum, contrario tamen sensu,

PLANTARVM HISTORIAE

sensu, quòd minimè refrigeret.

GENERA.

Heracleoticum. Origani genera seu rectius cognomina quatuor esse constat. Est enim Heracleoticum, Onitis, Tragoriganum, & sylvestre. Primū ab Heraclea Ponti dictum, cætera à pecoribus cognomenta desumpserunt. Onitis, quòd ab asinis impeteretur, ac in cibo gratum esset. Tragoriganum, quasi hircinum ganum. Origanum, non alia forsitan ratione quàm quòd sylvestre. eius pabuli voluptate animal hoc carperetur. Sylvestre, quòd sine cultura, & sua sponte proueniat, cognominatum fuit. Cæterum quum in tanta cum nomenclationum, tum historiæ ambiguitate varietatēq; tam Græcorum quàm Latinorum non facillè sit quicquam in solidum de his statuere, satis sit vnum genus, sylvestre nimirum & vulgare, pro omnibus pictum exhibere, quòd, vt Paulus ait, vt cūque nominibus distinguantur, vna tamen omniū sit facultas, adeoq; in re admodum incerta, multū operæ aut laboris temerè insumere minimè necessarium putari.

FORMA.

Vulgare. Origanū vulgare fruticu'us est, tam foliis quàm ramis Serpyllo sylvestri similis, comæ inter supra cacumina umbella, in qua flores haud secus quàm in Serpyllo in albo purpurei, odore iucundo præditi emicant. Ex qua sanè delineatione satis liquet, Origanū hoc vulgare, Tragoriganū, vel saltem eiusdē speciem

*speciē quandā esse, quod hoc ut Dioscorides refert,
foliis & ramulis sylvestri Serpyllo simile existat.*

LOCVS.

*Montibus cliuosisq; locis gaudet Origanum nos-
trum, passimq; in his propter sepes nascitur.*

TEMPVS.

Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

*Omnes Origani species, Galeno & Paulo testi-
bus, calefaciunt & exiccant in tertio ordine.*

VIRE. EX DIOSCORIDE.

*Heracleoticū excalfacit, vnde decoctum eius cū
vino potum venenatorum morsibus prodest: cum
passo autem iis qui cicutam, aut meconium: cum o-
xymelite iis qui gypsum aut ephemerum hauscrūt.
Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico manditur.
Aridum acetabuli mensura potum cum aqua mul-
sa, atros humores per aluum ducit, mensesque ciet.
Linclum ex melle tuſsibus medetur. Prurigines itia-
dem, scabies, regiūque morbum, decoctum eius cū
in balnea descensum est, iuuat. Succus eiusdem ad-
huc virentis, tonsillas, columellas, orisque vlcera
sanat. Per naves cum oleo irino infusus trahit.
Cum lacte aurium dolores mitigat. Conficitur ex
eo & cepis, & rhu opsomorum vomitorium medi-
camentum, omnibus iis in are Cyprio sub Cas-
nis ardenti aestu per quadraginta dies insolatis.
Herba verò substrata serpentes fugat. Onitis
eadem*

PLANTARVM HISTORIAE

eadem quæ Heracleoticum Origanum præstat, non
tamen eadem efficacia. Sylvestre priuatim foliis et
floribus cum vino potis, venenatorum morsibus auxi-
liatur. Omnia autem Tragorigani genera calefa-
ciunt, urinam mouent, bonam faciunt aluum, si de-
coctum eius bibatur: biliosa enim deiiciunt. Lienos-
is cum aceto pota utilia: cum vino autem his qui
Ixiam hauserunt. Menses ducunt. Tussientibus, pe-
ripneumonicis, ex melle in eclegmate dantur. Est et
efficax potio, quare cibum fastidientibus, & stoma-
cho male affectis, & acida ructantibus datur. Item
† aliàs res iis quibus † à maris iactatione nausea, & hypo-
pletione. chondriorum calor excitatur. Oedemata cum polenta
illita discutiunt.

EX GALENO.

Origanus Heracleotica efficacior est Onitide.
Sylvestris verò utraque valentior. Omnes autem in-
cidendi, extenuandi & calfaciendi facultatem ob-
tinent. Tragoriganus quippiam etiam adstrictionis
assumpsit.

EX PLINIO.

Origani priuatim vsus contra torsiones stomachi
in tepida aqua, & cruditates. Contra arancos scor-
pionesque in vino albo. Luxata & contusa in aceto
& oleo & lana. Tragoriganum urinam ciet, tumo-
res discutit, contra viscum potum viperæque ictum
efficacissimum, stomachoque acida ructanti & præ-
cordiis. Tussientibus quoque cum melle datur, &
pleuriticis,

pleuriticis, & peripneumonicis. Heraclium serpentes fugat. Percussis esui datur decoctum. Potu vrinam ciet. Ruptis, conuulsis medetur cū Panacis radice. Hydropicis cum fico, aut cum hyssopo, acetabuli mensuris decoctum ad sextam. Item scabiem, pruriginem, psoras, in descensione balnearum. Succus auribus infunditur cum lacte mulieris. Tonsillis quoque & vis medetur. Capitis ulceribus. Venena opii & gypsi extinguit decoctum, si cū cinere & vino bibatur. Aluum mollit acetabuli mensura. Sugillatis illinitur. Item dentium dolori, quibus etiam & candorem facit cum melle & nitro. Sanguinem narium sistit. Ad parotidas decoquitur cū hordeacea farina. Ad arterias asperas cū gallo & melle teritur. Ad licnem folia cum melle & sale. Crassiores pituitas & nigras externat coctū cum aceto & sale sumptum paulatim. Regio morbo tritum cum oleo in nares infunditur. Lasi perunguntur ex eo, ita vt ne venter attingatur. Epinyctidas cum pice sanat. Furunculos aperit cum fico trita. Strumas cum oleo & aceto & farina hordeacea. Lateris dolores cum fico illitum. Fluxiones sanguinis in genitalibus tusum ex aceto illitū. Reliquias purgationum à partu.

DE ORCHI. CAP. CCX.

NOMINA.

Oρχις ἡ κυνὸς ὄρχις Græcis, Orchis et Cynos = Testiculus
 orchis Latinis, testiculus canis officinis, Ger = canis.
 manis

PLANTARVM HISTORIAE

Orchis manis Knabenkraut, (*Gallis Du Satyrium*) vocur dicta. *Orchis dicta* hac herba est, quod radices si-
Cynosor= bi inuicē haud secus atque duo testiculi cohæreāt.
chis. Cynosorchis verò, quod canum testiculis similem
radicem habeat.

GENERA.

Orcheos duo esse genera animaduertimus, mas-
rem nimirum & feminam. Mas in vniversum ma-
ior quàm femina proceriorque est, vt pictura ipsa
pulchrè declarat. Estq; duorum generum. Vnum la-
tioribus foliis & candicantibus ferè floribus, quod
Orchin marem latifoliam vocauimus. Alterum
quod angustioribus foliis, & maculosis magis, flo-
ribusque purpureis constat. Nos maioris discrimi-
nis rationem habentes, Orchin marem angustifo-
liam nūcupauimus. Femina itidem duorum est ge-
nerum: vna enim maior, altera minor est, vt pictu-
ra satis demonstrat.

FORMA.

Folia habet circa caulem & ima eius parte per
terram strata, oleæ molli similia, angustiora tamē,
lexia & longiora. Caulem dodrātalī altitudine, in
quo purpurei flores. Radicem bulbo similem, oblon-
gam, duplicem, in modum oliuæ angustam, superio-
rem alteram, inferiorem alteram: & hanc quidem
mollem ac rugosam, illam verò plenam.

LOCVS.

Nascitur locis, Dioscoride autore, petrosis et are-
nosis.

noſi. In Germania certè noſtra in hortis & pratis,
locisq; ſabuloſis copioſè provenit.

TEMPVS.

In Maio & Iunij principio carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius maior calida & humida eſt, guſtan-
tibusq; dulcior eſſe apparet. Minor admodum ela-
borata eſt, ad calidius ſicciusq; tendit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix editur vt bulbus cocta. Fertur de ea, ſi
maiores edat viri, mares generari: minore verò fœ-
mine, fœminas. Addunt etiam in Theſſalia mulie-
res parvam cum caprino lacte bibendam dare, vt ad
venerea excitent: aridam verò ad inhibenda atque
diſſipanda. Alterum etiam alterius potu reſolui.

EX GALENO.

Radix maior Orchios multam videtur habere
humiditatem excrementitiam & flatuoſam: quæ
propter pota Venereæ excitat. Altera verò, minor
videl: cet, cōtrà non modò non ſtimulat ad coitum,
ſed planè cohibet ac reprimi. Eantur bulborum
more aſſa.

EX PLINIO.

Tumores & vitia partiũ earum erumpetia, cum
polenta illita radix ſedat, vel per ſe trita. Eadẽ ex
lacte ouillo nervos intendit, & ex aqua remittit.

DE ORCHI SERAPIADE.

CAP. CCXI.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Oρχις ὀρχιδίαις, ἢ τριόρχις, Paulo & Actio testib. Gracis dicitur. Orchis sine testiculus Serapias Latinis. Officinæ eius cognitionē non habet. Germanicè Raguurtz, (Gallicè Espece de Satyrium qui a trois racines bulbues)

Serapias dicitur. Serapias autem ab Andrea medico ob multosradicis vsus, ut inquit Dioscorides, appellata est. **quare dicta.** Sunt qui à Sarapi Alexandrinorum deo nominatam velint, propter lasciuia impudentem, qua is deus Canopi, ubi tēplum & cultu & religione excellens habebat, colebatur: de quo Strabo in xvij.

Triorchis suæ geographiæ libro. Triorchis verò, manifestò ex **cur dicta** ea appellatione argumēto, quod non duabus, sed tribus testiculatis radicib. in terra nitatur. **tur.** Qua una quidē re faciliè à priorib. discriminātur Orchibus.

GENERA.

Duo esse Orchis Serapiadis seu Triorchis genera, res ipsa satis monstrat. Etsi enim in foliis ac radicibus nihil aut parum discriminis habeant, tamen in floribus manifestè differre videntur. Nam alterum genus, quod nos marem vocauimus, florib. constat purpureis, & parumper albicantibus. Alterum verò, quod nos ut certius à priori discerneretur, fœminam nominauimus, flores obtinet diuersis coloribus distinctos, purpureo videlicet, candido, viridi ac nigricante, inferioreq; parte fuci planè effigiem exhibent.

FORMA.

Folia habet Porro similia, oblonga, latiora & pin-
guia in alarum cauis inflexa. Cauliculos dodran-
tales, subpurpureos flores. Radicem minimis testis
culis similem.

LOCVS.

Prouenit in pratis & campestribus.

TEMPVS.

In fine Maii mensis & initio Iunij hoc genus ap-
paret, dein nusquam inueniri potest.

TEMPERAMENTVM.

Valentius quam primo ordine exiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix illita tumores disiciendi vim obtinet, atq;
vlcera expurgat. Herpetas cohibet. Fistulas abolet,
inflammatione laborantia illita mitigat. Sicca no-
mas compefcit, vlceraq; putrescentia & maligna or-
is sanat. Cum vino pota aluum sistit. Feruntur de
hac etiam quaecunque de Cynosorche dicta sunt.

EX GAIENO.

Orchis Serapias ad Venerē non similiter accom-
modus est. Oedemata illitus discutit, & vlcera sor-
dida purgat, & herpetes sanat. Siccatus multo ma-
gis desiccat, adeo vt & putrescentia contumaciaq;
vlcera sanet. Habet etiam quippiā subadstringens,
ac proinde ventrem in vino potus sistit.

EX PLINIO.

Eius radices sanāt oris vlcera, thoracis pituitas,
aluum sistunt ē vino pota.

PLANTARVM HISTORIAE
DE OENANTHE. CAP. CCXII.
NOMINA.

Saxifraga rubra, **O**υνάνθη, ἢ λευκάνθη Græcis, Oenanthe Latinis, Filipendula officinis, & Saxifraga rubra Oenanthæ, Germanis Rot Steinbrech nominatur. Oenanthæ autem dicta hæc dubiè est quod cum vino floreat, Leucanthemum verò à floribus quos producit Filipendulæ candore. Filipendulam à numerosis illis & rotundis in radice capitibus tuberibusve, quæ quasi ex filo quodam pendere videntur, appellatam esse constat.

FORMA.

Folia Pastinacæ sylvestris habet, flores candidos, caulem crassum, dodrantalem, semen Atriplicis, radicem magnam, multa habentem capita rotunda. Ex qua descriptione palam apparet, Oenanthem esse herbam, quam ætas nostra Filipendulam vocat, quod nulla prorsus sit nota quæ illi non conveniat. Foliis enim Pastinacæ erratica est, quæ planè eius herbæ quæ vulgò Petroselinon hodie appellatur foliis similia sunt. Hinc est quod in vulgaribus herbariis scribatur folia Petroselino similia habere: quamvis Staphylino legendum esse putem. Manuscriptus etiam herbarius Filipendulam folia Dauci agrestis habere tradit. Flores denique illi albi, caulis crassus, dodrantalis, Atriplicis semen. Radices quoque multa, quinque interdum aut sex, nonnunquam etiam plura capita rotunda, tanquam à filo pendentia, ut ait antiquus herbarius,

rius, habentes: ita vt hinc esse Oenanthen abundè constet. Sed demus non esse, nihil tamen inde periculi erit, quòd scilicet Oenanthe easdem quas Filipendula, sicut ex paulò pòst dicendis patebit, facultates obtineat.

LOCVS.

Nascitur in petris & montibus asperis. Tubinga certè in monte Austriaco nominato copiosissimè prouenit, & in sylua non procul ab arce eius oppidi distante.

TEMPVS.

Iunio mense floret, quo sanè tempore, quia facile ex floribus agnoscitur, carpi potest. Radices tamen inter autumnii initia colligendæ erunt.

TEMPERAMENTVM.

Amara ad nodum est Filipendula, ita vt non temerè hanc recentiores calidam & siccam in tertio ordine statuant.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Oenanthes semen, caulis & folia cum mulsò ad secundas eiiciendas bibuntur. Radix cum vino contra stranguriam conuenit.

EX PAVLO.

Oenanthe secundas eiicit, vrinae stillicidio, morboque regio medetur.

EX PLINIO.

Caulis eius & folia cum melle ac vino nigro pota, facilitatem pariendo præstant, secundasque pur-

PLANTARVM HISTORIAE

gant. Tussim è melle tollunt. Vrinam crient. Radi.:
vesicæ vitiis medetur.

EX RECENTIORIBV \$.

Filipendula in lotij stillicidio & vrinae remora-
tu, neque non renum doloribus, atque lapide corun-
dem, cõuenit. Eadem stomachi inflationes discutit,
medetur & suspiriosis & anhelantibus, & omni-
bus morbis quos causa frigida concitauit. Farinam
eiusdem cibus comitialium inspergunt.

DE OXY. CAP. CCXIII.

NOMINA.

Trifoliũ
acetosum.
Alleluia.
Panis cu-
culi.
Oxys qua-
re dicta.

Oξὺς Græcè, Oxis Plinio & Latinis, Trifoliũ
acetosum & Alleluia officinis, vulgò Panis
cuculi, vel quòd cuculus auis eo vescatur, vel quia
hoc erumpete, cuculus vocem suam edere incipiat
Germanis Saurerklee, Buchklee, Buchápffer,
Buchbrot, Gauchklee, Guckgauchklee et Ha-
senklee (Gallis Pain à coquu) appellatur. Oxys
verò ab acido sapore dicta est.

FORMA.

Humilis herba est, longis tantum pediculis, tria-
summatim folia perinde atque Trifoliũ proferens,
exigua, & in cacumine laciniata, sapore acido. Flo-
rem habet candidum, in simplici stylo inter folia
prosiliens: rufum in lunatis siliquis semen. Radi-
cem in transversum longam, geniculatã ac rufam.
Antiquus et manuscriptus herbarius putat hãc her-
bam esse Lotũ sativam, cuius certè sententiã, què d-

à Dioscoride nō describatur Lotus, neque probo neque improbo. Cur tamē non sequa, facit quòd herba quam Alleluya barbari vocant, non sit sativa, sed passim in syluis & aliis locis vmbrosis nascatur futurae tempestatis prænuncia. Siquidem appropinquante aliqua tempestate, arrigitur contrà tanquā tempestati colluctatura.

LOCVS.

Multis locis prouenit: nā in syluis circa petrosa et aquea loca nascentē cōspeximus. Nullibi autem copiosiore quā Tubingæ in primo statim cōscensu mōtis Austriaci ad dextram prouenire vidimus.

TEMPVS.

Aprili atque interdum Maio mense floret, dum scilicet cuculi vox primū exauditur, atque hinc Cuculi panem dictam esse puto, vt dictum est antea. Obseruatum autem est à nobis, atque adeò multorum aliorum experiētia cognitum, quòd eius herbae copiosi flores, crebras illius anni pluuias, & aquarum inundationes certò portendant: pauci contrà siccitatem.

TEMPERAMENTVM.

Quum acidū in gustu saporem præ se ferat, idē cum Oxalide habere temperamentum, frigidum nempe & siccum, euidentissimum est.

VIRES. EX PLINIO.

Datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocælen habent.

PLANTARVM HISTORIAE

EX RECENTIORIBVS.

Vlceribus, vulneribus & fistulis, potissimum autem oris, medetur. Sitim arcet, & vt summam dicam, easdē quas Oxalis, acetosam nostri nominant, facultates obtinet.

DE OPHRI. CAP. CCXIII.

Ophris vulgò Elleborus alb⁹ dicitur, prætēsis herba quæ præcedūt, aut nobis sunt, aut nomen retinent, ob id à nobis omisſe.

NOMINA.

Ophrin hanc herbam nominare placuit, quòd inuenerim plantam binis duntaxat foliis cōstantem hac appellatione insigniri. Germanicum nomen nullum extorquere potuimus: neque enim ea est quæ Durchuuachs, hoc est, Perfoliata vocatur, idēque hanc à geminis foliis Zuueyblatt nominauimus.

FORMA.

Caulē à radice singularem ac rotundū emittit, per bina quæ tantūm habet folia penetrantē, à cuius medio ad summū vsque calyculi multi sunt, & in his veluti linguae dissectæ nutantes flosculi. Radix verò illi subest tenuis, adnascentes sibi radicales multas, obliquas & odoratas obtinens.

LOCVS.

Nascitur in mōtibus, & nullibi maiori copia quā Tubingæ in pede montis Austriaci provenit.

TEMPVS.

Maio

Maio & Iunio mensibus floret, dein statim euas-
nescit. Quapropter hoc potissimū tempore colligen-
da.

TEMPERAMENTVM.

Gustāti glutinosa esse apparet, & quodammodo
dulcis, ideoq; calidā & siccam esse conicere licebit.

VIRES.

Iuxta dictarum qualitatum misionem contra-
hendi & constringēdi facultate præditam esse ne-
mini non constat. Hinc est quod ad rupta, & vul-
nera conglutinanda hac herba commodè vtantur
recentiores.

DE ORMINO. CAP. CCXV.

Orminū oruale quod aurū valet, & toute
bonne ab insigni virtute Gallis dicitur.

NOMINA.

Oρμινὸν Græcis, Orminum & Geminalis La-
tinis, Gallitricū officinis, Germanis Schar- Gallitricū
lach (Gallicè Asperge faulvage, ou Oruale)
appellatur. Orminon autem Græcis haud dubiè di- Orminon
ctum est, quia Venerem extimulat. cur dictū.

GENERA.

Ormini duo sunt genera. Vnum satium, quod
Gallitricum simpliciter nominant, & Germanicè
Scharlach. Alterum sylvestre, quod alio nomine Salvia syl-
Saluam Sylvestrē herbarij vocāt. Germani Vuil- uestris.
den Scharlach, oder Vuilde Salbey.

FORMA.

Orminum satium herba est foliis Marrubio si- Orminon

Q iij

milis, satium.

PLANTARVM HISTORIAE

milis, caule quadrangulo, semicubitali, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, ad radicē versus nutantes, in quibus semen est. Ex qua delineatione abundè liquet herbam quam hodie Gallitricum vocāt, esse Orminum satium: hæc enim foliis Marrubio similis est, nisi quòd sunt maiora & mirificè odorata: caule semicubitali, quadrangulo, ab imo rufescente, calyculis circa caulem siliquarum effigie prominētibus, & ad radicē deorsum spectantibus, in quibus semen nigrum & oblongum includitur: flosculis in candido purpureis, aut in dilutum

Sylvestre. ruborem inclinat. Sylvestre priori non admodum dissimile est, foliis satis ad Saluiam accedentibus, rugosaq; asperitate præditis: caule sesquipedali, leniter hirsuto, in quadrangulum striato: floribus è cæruleo in purpureum vergentibus, ad aquilini rostri effigiem falcatis, calyculis pluribus in terram inclinat, in quibus ad summum quatuor semina, parua, rotunda & fuluescentia reperiuntur.

LOCVS.

Satium nusquam non in hortis satum prouenit. Sylvestre autem passim omnia prata exornat, suaq; sponte in iis nascitur.

TEMPVS.

Vtrunque Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Orminū calidū & mediocriter siccū est, id quod amaritudo

amaritudo atque adstrictio in gustu satis monstrat.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Creditur semen satiui cum vino potum Venerē stimulare. Cum melle argema & oculorum albugines purgat. Illitum cum aqua cedemata discutit. Surculos extrahit. Herba ipsa illita eadem potest. Sylvestre vehementiorem facultatem habet, quare vnguentis miscetur.

EX PAVLO.

Orminum Venerem stimulat, oculorū crassities cum melle repurgat, cedemata discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domestico est valentius.

EX PLINIO.

Semen ad Venerem stimulandam, & ad oculorū argema & albugines valet. Vtroque genere tusso extrahuntur aculei ex corpore, per se illito ex aqua. Folia ex aceto imposita, panos per se vel cum melle discutiunt. Item furunculos, priusquam capita faciant, omnesq; acrimonias.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores etiam easdem facultates suo Gallico tribuunt: potissimum autem conferre ad albugines & oculorum caliginem tradunt, vt hinc etiam colligi possit, herbam hanc Orminō esse Dioscoridis.

DE OROBO. CAP. CCXVI.

Eruum prius semine in cunei modum figurato, cicercula magis videtur.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Oροβοσ Græcis, Eruum Latinis dicitur. Officina Græcam appellationem retinuerūt. Germanis Eruen (Gallis noer Vesse, ou des ers) ad imitationē Latini nominis, appellari possunt.

GENERA.

Duo sunt genera Erui: vnum enim candidū, alterum autem rufum inuenitur. Nec inter se nisi floribus & radicibus differūt, quemadmodum pictura affabrè monstrat. Rufum verò sylvestre est, suāque sponte in aruis, & inter dumeta prouenit.

FORMA.

Exiguus frutex est, tenuis, angustis foliis, floribus vel candidis, vel in candido cœruleis aut puniceis, seminibus in siliquis sine septo cylindraccis, quæadmodum pisa, se inuicem tangentibus.

LOCVS.

Latatur loco macro, non humido, quia plerunq; luxuria corrumpitur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, iisdemq; semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat quidem Eruum excessu secundo intenso, calefacit verò primo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Capitis gravitatem facit Eruum, ventrē turbat, sanguinemq; per vrinam ducit si comedatur. Coctū
tamen

tamen appositum boues saginat. Farina eius bonam facit aluum, vrinam cit, corporis colorem commendat. Frequentior in esu aut potu sanguinem cum torminibus per aluum & vesicam ducit. Vlcera cum melle purgat, & lentigines, & aspreddinem cutis in facie, eiusdemque maculas & reliquum corpus. Nomias, gangrænasq; cohibet, & mammarum duritias emollit. Fera vlcera, carbunculos, fauosq; rum-
pit. In vino macerata canum, hominum, viperarūq; morsus illita sanat. Cum aceto autem difficultates vrine, tormina & tenesmos lenit. Prodest etiam iis qui cibo non nutriuntur, nucis magnitudine frixa & cum melle sumpta. Decoctum eius fouendo per-
niones, & in corpore pruritus sanat.

EX GALENO.

Orobis quatenus amaritudinis est particeps, ea-
tenus incidit, extergit, atque obstructions expe-
dit. Caterum si sumatur copiosè, sanguinem per
vrinas euocat. Hominum cibus prorsus hoc semen
damnatur: est enim & insuauissimū & prauū suco-
ci. Eruo autem instar lupini preparato ex melle
vtimur, vt medicamēto crassos pulmonis thoracisq;
humores expurgante. Candidum minus est medi-
camentosum, quàm id quod ad flauum aut palli-
dum colorem tendit.

DE ORE OSELINO.

CAP. CCXVII.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

περοσέλινον, ἢ πετροσέλινον ἄγριον Græ-

O cis. Sylvestre Petroselinum, & Apium mon-

tanum latinis, officinis & barbaram sectan-

Petroseli- accidisse puto, quòd lingua Græcæ inscitia, Oreoselinum offi- selinum dictionem in Petroselinum mutauerint: cinarum vel quia simpliciter enunciauerint quod cum ad Petroseli- iectione nominandum erat Petroselinum sylvestre, num syl- ad differentiam nimirum Macedonici, quòd verè vestre. est Petroselinum veterum. Germani Peterhilgen vocat. Nos teutích Feterhilgen, oder Peterlin

(Galli du Persil des montaignes) nominamus, vt discerneretur à Macedonico, de quo suo dicemus loco. FORM A.

Caulem habet vnum dodrantalem à radice tenui exeuntem, circa quem ramuli & capitula Cicutæ similia, multò tamen tenuiora. In his semen oblongum, acre, tenue, odoratum, Cumino simile. Ex qua sanè descriptione sole clarius apparet, Petroselinum officinarum esse Oreoselinum veterum: caule enim vno prouenit dodrantali ex radice per tenui, qui per ambitum ramulos spargit capitulis Cicutæ, tametsi multò tenuioribus: in iis semen, acrimoniam gustu præferens, odoratum, tenue, Cu-

Dioscori- mino proximum. Neque obstat quòd in plerisque dis locus exemplaribus Dioscoridis capitulorum Papaueris emēdatur fiat mentio: error enim hand exiguus subest, quòd scilicet

scilicet non $\mu\eta\eta\omega\nu\iota\omega$ $\tau\omega\alpha\rho\epsilon\mu\phi\epsilon\rho\eta$, hoc est, *Papau* veri similia, sed $\kappa\omega\upsilon\epsilon\iota\omega$, id est, *Cicutæ* legendum sit. Id quod in primis confirmant ea quæ scribit *Plinius* libro decimonono capite octauo, in hunc modum: *Oreoselinum* est *Cicutæ* foliis, radice tenui, semine *Anethi*, minutiore tamen. Quod si tamē hæc sententia minus arriserit, nihil moror quin dicas *Petroselinum* germanicum, cum forma parum admodum à vero *Petroselino* distet, ut palam sit utriusque picturas intuenti.

LOCVS.

Nascitur in locis petrosis & montanis, unde etiā nomen accepit. In *Germania* verò nostra in hortis passim plantatur.

TEMPVS.

Iunio & *Iulio* mēse floribus & semine prægnās est. TEMPERAMENTVM.

Calidū est in secundo gradu extenso, siccum verò in medio tertii.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen & radix in vino pota vrinam cient. Menses etiam ducunt. Miscetur antidotis, necnon medicamentis vrinam cientibus & excalfaciētibus. Nō hallucinari nos oportet, existimantes *Oreoselinum* esse quod in petris prouenit: aliud enim ab hoc est *Petroselinum*.

APPENDIX.

Vtunque autem diligenter hoc monuerit *Dioscorides*,

PLANTARVM HISTORIAE

scorides, tamen cauere non potuit quin posteritas medicorum Oreoselinum esse Petroselinum certò crediderit.

EX GALENO.

Oreoselini similis Apio vis est.

EX PLINIO.

Oreoselinum vrinae & menstruis efficax. Eo etiam purgantur faeminae è vino.

DE OIS. CAP. CCXVIII.

NOMINA.

Sorbus. **O**H Græcis, Sorbus Latinis, est arbor cuius fructus Græcis ὄξα καὶ κύα, Gale. teste, Latinis verò Sorba appellantur. Officinæ Latinam nomē claturam retinuerunt. Germanis Speierling, vel Sporopffel corrupta puto voce pro Sorbopffel (Gallijs Vng Coimier) nominatur. Vel sic ab austeritate vocata sunt, quasi mæla austera.

Sorba.

GENERA.

Duo sunt genera Sorborum duo genera tradit Theophrastus lib. iiij. de historia stirpium, cap. xii. fœminam fructiferam, & masculā sterilem. Differre quoque fructibus idem scribit, quòd al. & o. biculatum, aliæ ouatum ferant. Fructus autem orbiculati dulciores sentiuntur, ouati sæpenumero acidi, minusq; odorati.

Sorborum Plin. lib. xv. ca. xxi. in Sorbe quatuor differentias latinos nosse memoriæ prodidit: aliis enim eorū ait, rotunditas mæli est, aliis turbinatio pyri, aliis oua-

Theophrasto.

Plinius quatuor

ta species ceu mâlorum. Quartum genus tormina differens
le appellant. Nos picturâ eius generis damus, quod tias Sor=
turbinatum pyri instar fructum adit, qui Germa=
borum po
nis Sporbirn corrupta voce pro Soribirn aut nit.
quasi austerum pyrum dicitur.

F O R M A.

Sorbus arbor est procera, recto caudice, cortice le
ui, pinguiusculo, colore ad flauû albicâte, cuius fo
lia pediculo singulari prolixo, uernaceoq; in versus
condita, ale modo à lateribus exeuntia, tanquam
ex omnibus unum fiat, ad neruû vsque laciniatû,
verum ampliusculo intervallo distantia. Omnibus
ramulis in extremo pediculi folium impar promi
net, cuius accessione impar numerus efficitur. Figu
ra laurum tenuifoliam imitantur, verû ambitu
ferrata, breuioraq; sunt, nec in extremum acutum
mucronata, sed in rotundius orbiculata. Flos racē
matim singulari petiolo, è multis minutis & candi
dis constans. Fructus vel orbiculatus, ut dictû est,
vel ouatus, vel pyri instar turbinatus. Radices
haud multas, nec altè descendentes, validas tamen
& crassas & incorruptibiles agit.

L O C U S.

Loca amat humida, montana & frigida, eodem
Theophrasto autore.

T E M P V S.

Autumno fructus suos Sorbus ostentat.

T E M P E R A M E N T V M.

Adstring

PLANTARVM HISTORIAE

Adstringentem obtinet qualitatem Sorbus, sed multò imbecillio rem quàm Mespilus.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Sorba malorum colorem referentia, necdum maturefcentia, dissecta & in sole siccata, cum madetur aluum sistunt. Farina eorum cum mola teritur, polenta loco in eundem usum sumitur. Potest idem & decoctum eorum.

EX GALENO.

Sorba quidem adstringunt, sed multo fortius Mespila quàm Sorba. Quamobrem aluo fluenti in cibo accommodatissime exhibentur. Sorba maiori cū voluptate sumuntur: prorsus enim initio nihil acerbū uti Mespila habent, sed succus eorum citra acerbitatē duntaxat: austerus est. Illud porrò neminē puto latere, hæc omnia parcē, non largē ut ficus, vanaq; esse comedenda. Nequaquam enim eis ut cibis, sed magis ut medicamentis egemus.

DE OPHIOGLOSSO. CAP. CCXIX.

NOMINA.

ὄφις
γλωσσ
σου cur
dicta.

Herba hac appositissima voce Gracē ὄφις-
γλωσσου appellari potest, non quòd sic eam
veteres aut recentiores Græci nominauerint, sed
quòd cū Germanica nomenclatura optimè qua-
dret. Neque enim certò constat an Græcis, & sub
quo nomine herba illa cognita fuerit. Quapropter
ut nouam ei inderemus appellationem necessum eo-
rat: meliorem verò hæc ipsa quam retulimus, inue-

nire

nire haud potuimus. Latine Ophioglossum, aut lin *Lingua*
gua serpentina dici potest: Germanice enim *Naz* *serpentina*.
terzunglin (Gallice *Langue de Serpent*) voca-
 tur, a forma & figura quam refert. & singulis nana-
 que foliis singulari pediculo prodit, quod ligulam
 serpentis formam suam referre videtur, ut pictura as-
 fabre monstrat. **FORMA.**

Folium vnicum obtinet pingue, digiti longitudine
 Plantagini aquatica vocata haud dissimile, è cu-
 ius sinu inferiore pediculus exit, cui quippiam her-
 bacei coloris insidet, quod serpentinae linguae voca-
 ti lapilli similitudinem refert.

LOCVS.

Copiose in monte prope Tubingam Austriaco no-
 minato prouenit. Amat & alia prata in montanis
 sita. **TEMPVS.**

Maior mense reperitur, subinde autem euanescit,
 ac nusquam apparet.

TEMPERAMENTVM.

Citra caliditatem insignem exicitat, id quod gu-
 stus satis docet. **VIRES.**

Vulneraria est herba, maligna siquidem & cu-
 ratu difficilia vulnera sanat. Tumores etiam dis-
 cutit, & ferè Symphyti facultates obtinet.


DE XANTHIO. CAP. CCXX.

Xanthium ad portam Antoninam fre-
 quens, cancerorum ardori extinguendo
 efficax.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Lappa
i nuerfa.
Xanthion
vnde di-
ctum.

 ὀνδιον, ἢ φάσγανον Græcè, Xanthium La-
 tine nominatur. Ab herbariis nostræ tēpesta-
 tis Lappa minor et Lappa inuerfa vocatur. Germa-
 nicè Bettlersleusz, oder Bubenleusz. Xanthion
 dictū, quod ξανθὸς, hoc est, flauos capillos faciat.

FORMA.

Caulē habet cubitalem, pinguem, angulosum,
 & in ipso alas multas. Folia Atriplici similia, in-
 cisuras habentia, odore Nasturtii. Fructum rotun-
 dum cœu grandem oliuam, aculeatum. ut Platani
 pila, contactu vestibus adherentem. Ex qua quidē
 delineatione nemo non videt herbam cuius pictu-
 ram damus esse Xanthion, quod illi omnes notæ ad
 amussim respondeant. Caulē enim est cubitali, pin-
 gui, anguloso, crebras fundente alas, foliis Atriplici-
 cis incisuras habentibus, Nasturtiū manifestissimè
 olentibus, fructu magnæ oliuæ modo, rotundo, ut
 Platani pila spinoso, contactu vestes apprehenden-
 te. Nucleus qui in echinata pilula clauditur à pue-
 ris estur dulci & grato cibo.

LOCVS.

Nascitur letis & pinguibus locis, & lacubus pa-
 ludibūsve exiccatis.

TEMPVS.

Fructus autumnō maturescit, quo sanè tempore
 colligi debet.

TEMPERAMENTVM.

Cūm

Cum discutiendi vires habeat, facile colligitur temperamēto esse calido & sicco præditum, id quod ex sapore etiam, qui est amarus & subacris, deprehendi potest.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Potest fructus antequam penitus inarescat collectus, tusus, & in fictili vase reconditus, capillos flavos reddere, si quis cum vsus exigit, tryblū pondus ex eo sumens, tepidāque aqua madefaciens, vitro prius capite præparato illinat. Alij cum vino tusum ipsum reponunt. Fructus etiam comedere tumoribus illinitur.

EX GALENO.

Xanthion vocatur etiam Phasganion. Fructus discutiendi facultatem obtinet.

DE XYLO. CAP. CCXXI.

NOMINA.

Xylon & Gossipium Plinio & aliis Latinis dicitur. Græci, quod sciam, eius nusquam meminērunt. Barbaris ac Arabibus Cotum & Bōbax seu Bombasum, Germanis Baumuuoll, Gallicis Plante cotonier) appellatur. Linum eius cottonium vulgò vocatur, sicut lanugo ipsa cottonum. Ab huius generis planta vestes xylinæ, & lina xylinā nominata sunt. Iurisconsulti lanam hanc ligneam nuncupant.

Gossipium.

Cotum.

Cottoniū.

Cottonū.

Xylinæ

vestes.

Lana lignea.

FORMA.
Frutex est exiguus, folio vitii, sed minore, floribus

R. ij

lbs

PLANTARVM HISTORIAE

bus luteis in medio purpurascens, fructu barbata nuci simili, lanugine pleno, quæ netur in linum candidissimū, molliissimūq;. Nux autem ipsa cum hiascens fatiscit, lanuginis globos representat.

LOCVS.

Superior pars Aegypti in Arabiam vergens, Plinio lib. xix. capite primo teste, fruticem hunc gignit. In Creta etiā nascitur, & in Apulia, ac Malta prope Siciliam insula. Nunc in Germania nostra hortis plantatur, vt plurima alia peregrina, nobis antea prorsus incognita.

TEMPVS.

Tam fertilis hic frutex est, vt simulatque adoleuit, quod duorum mensium spacio accidit, nūquā desinat florem & fructum proferre, donec asperitate & inclementia hyemis impediatur.

TEMPERAMENTVM.

Arabes, vt annotauit Serapion, fruticis huius lanuginem calidam & humidam esse statuunt.

VIRE. EX ARABIBVS.

Foliorum succus medetur infantium alui profluvio atque torminibus. Semen tussi & thoracis vitis. Oleo seminis emaculantur lentigines & faciei pustula. Semen etiam eius genitale semē procreat.

DE PARTHENIO. CAP. CCXXII.

NOMINA.

Παρθένιον, ἀμάρακον, χαμαίμηλον Græcis: Parthenium, Amaracum, Solis oculus, Millefo-

Millefolium Latinis: *Thuscis Cauta*, officinis & *Cauta*. herbariis *Cotula foetida* dicitur. Germanis *Krottē* *Cotula* dill, *Hundszblum*, *Vuuld Chamillen* (Gallicè *foetida*. *Espergoutte*, ou *Matricaire*.) Caterum cogitant hoc loco studiosi, *Amaracum* de quo nunc agimus diuersum esse ab eo què alio nomine *Sampsychon* Græci vocant, vt suo loco fusius dicemus.

FORMA.

Folia Coriandro similia habet tenuia. Flores per ambitum candidos, in medio luteos, odore graui & subuiroso, gustuq; amaro. Hæc Dioscoridis descriptio pulchrè et per omnia herbæ illi quæ hodie vulgò Cotula foetida nominatur, respondet. Siquidem ea foliis est Coriandri tenuibus, flore per ambitum albo, intus luteo, odore graui, & sapore amaro. Foliis autem Coriandri, non quidem iam erumpentis & paulò antè enati, necdum maturescentis, quæ sunt quadantenus lata & subrotunda, atque in extremitatibus incisa: sed maturi, cuius quidem in alto folia ad Chamæmeli aut Fœniculi foliorum formam accedunt, capillataq; sunt, constare scias. Sic enim vtriusque folia similia sunt, vt Coriandrum Parthenij, & rursus Parthenium Coriandri prorsus referre folia videatur. Quod vt disertè innueret Diosco. Φύλλα λεπτά, id est, folia tenuia dixit, vt scilicet hac voce latiora, quæ in infima sunt Coriandri parte, secluderet. Quod autè de ijs foliis Dioscorides locutus sit, ex tractandi ordine abundè licet.

R. iij quet.

quet. De tribus siquidē herbis, Chamamelo, Parthenio & Buphthalmo, quæ sanè inter se congenere, atque foliis admodum similes sunt, ordine agit, quod nunquam fecisset, si nulla inter has similitudo intercederet foliorum, adde etiam florum. Buphthalmum tamen foliis ad Fœniculi formam propius quam reliquæ duæ accedit. Sententiam hanc nostram confirmat, quòd aliqui Parthenium, ob similitudinem quam habet cum Anthemide, Chamamelon dixerint. Tam similis enim est Chamamelo, ut frequenter etiam ab imperitis pro illa capatur. His accedit & hoc, quòd ob foliorum tenuitatem nonnullis Millefolium appellatū sit Parthenium, quod fieri minimè potuisset si ad latiora Coriandri folia Dioscorides respexisset. Præterea esse

Cotula Parthenium Cotulam, nomen quod illi Thufci in-
 vox unde diderunt satis declarat: Cautam enim appellauerunt, unde diminutivum Cautula deductum est, & tandem corrupta voce Cotula. Fœtidam autem esse, gravis odor qui in ea omnium maximè sentitur, euidēter declarat. Nequaquā itaque ea esse herba potest, quam Matricariam vulgò vocant, ut Heronius non molaus, & alij multi docti viri hūc sequētes putāt: est Matricaria. quòd huius folia latiora sint, quàm ut cū Chamameli, Buphthalmi aut Coriandri tenuibus foliis comparari queant, tātū abest ut similia sint. Huc accedit, quòd omnium maximè euertere videtur aduersariorum sententiam: nemo vnquam ex recentioribus

tioribus Matricaria herba bilis & pituita per inferna tractricem facultatem tribuit, quam tamen Parthenio Dioscorides, Paulus, & alij veteres assignant, vt etiam hoc nomine Parthenium nō possit esse Matricaria herba dicta vulgò.

LOCVS.

Nascitur inter segetes & iuxta semitas, intermixta ferè semper Chamæmelo. In hortorū etiam sepibus, Plinio teste, prouenit.

TEMPVS.

Primo statim vere, Maio potissimum mense, erūpit, ac totam æstatem durat.

TEMPERAMENTVM.

Haud instrenuè, Galeno autore qui Amaracū vocat, calefacit, nō autē vehemēter desiccāt. Itaq; in caliditate tertij est ordinis, in siccitate verò secūdi.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Sicca cum oxymelite, aut sale pota, non secus atque Epithymum bilem atram & pituitam per inferna ducit. Asthmaticis & melācholicis prodest. Herba ipsa floribus dēptis à calculosis & asthmaticis vtiliter bibitur. Decoctum eius ad incidēdum prodest in vuluæ duritia & inflammatione. Illinitur cum floribus sacris ignibus, & inflammationi.

EX PAULO.

Parthenium aridum in potu sumptum atram bilem per inferna deducit.

EX PLINIO.

R. iij

Sicca

PLANTARVM HISTORIAE

Siccatum cum melle & aceto potum, bilem trahit atram. Ob hoc contra vertigines utilis & calculosis. Ad insidendum decoctum in duritia vulvarum & inflammationibus. Illinitur & sacro igni, item strumis cum axungia inueterata. Magi contra tertianas sinistra manu cuelli eam iubent, dicuntque cuius causa vellatur, nec respicere: dein eius folium agri linguae subiicere. vt mox in cyatho aqua deuoretur.

Supersticio-
sissimum.

DE POLYGONATO.

CAP. CCXXIII.

NOMINA.

POLΥΓΩΝΑΤΟΝ Græcis, Polygonatum Latinis dicitur. Officinis, item herbariis & vulgo, Sigillū Salomonis, Germanis Vuciszuuritz, (Galemonis. lis Signet de Salomon) hoc est, radix alba nominatur. Polygonatum autem à radice geniculorum tum cur frequentibus nodis ex interuallis tumente appellatum. lauerunt.

GENERA.

Duo eius genera damus. Vnum verum, latioribus foliis: alterum multò angustioribus, quemadmodum pictura graphicè ostendit. A foliis vtrique nomina sunt indita.

FORMA.

Frutex est cubito altior, folia lauro similia habēs, latiora tamen & leuiora, sapore mali cotoneæ aut puniceæ: gustatum enim adstrictionem quandam

dam resipit. Per singulos foliorum exortus cādidos flores promit numero maiore quàm folia, supputa-
 tione à radice facta. Radicem habet candidam,
 mollem, longam, geniculis plenam, densam, graueo-
 lentem digiti crassitudinem obtinentem. Iam si sine-
 gulas Salomonij sigilli notas libeat perscrui, or- Sigillum
 mnes, ne vna quidem reclamante, adesse cōperies. Salomon-
 Nanque in montibus gignitur, frutice cubito pro- nium.
 ceriore, foliis lauri latioribus, & leuioribus, quæ gu-
 stata quendam mālī cotoneæ aut punice saporē
 referant cum aliqua adstrictione. Flores per singu-
 las foliorum eruptiones exiliunt candidi, qui folia
 numero longè superent, à radice ad cacumen suppu-
 tata. Siquidem bini, terni, aut plures ab vnoquoque
 foliorum sinu produnt. Radix illa candida, molo-
 lis, longa, crebris nodis articulata, densa, grauiter
 olens, digitali crassitudine. Floribus excussis bacca
 pisi ferè magnitudine dependent, ex viridi nigri-
 cantes, & in quendam ordinem digestæ.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

TEMPVS.

Maior mense floret, quo etiā tempore carpi debet.

TEMPERAMENTVM.

Polygonatum mistam habet qualitatem. Est eo-
 nim in eo adstrictionis pariter & atrimonia quipa-
 piam, necnon fastidiosa cuiusdam amarissimis ex-
 plicatu difficilis.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix illa vulneribus auxiliatur. Quinetiam vultus maculas delet & aufert.

EX GALENO.

Radice[m] Polygonati quidam vulneribus illinūt. Sunt etiam qui illo naevos maculasque in facie detergant.

APPENDIX.

Hodie quoque mulieres sigillo Salomonis sibi faciem extergunt & fucant, ut planè nullū subsit dubium, quin Polygonatum esse constanter credamus.

DE POLYPODIO. CAP.

CCX XIII.

NOMINA.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΥ Græcè, Polypodium, Filicula Latine, officinæ Græcam appellationem retinuerunt, Germanicè Engelsufz, Baumfarr, Dropffuriz, (Gallicè du Polypode) vocatur. Polypodio nomen à radice quæ polyporum modo cirros obtinet, inditū est. Filiculam autem Latini à similitudine foliorum cum Filice nuncupaverunt.

Polypodiu vnde dictum.
Filicula.

FORMA.

Herba est palmi altitudine, Filici similis, subhirsuta, incisuris diuisa, non tamen adeò tenuibus. Radix illi est hirsuta, cirros polyporum modo habens, minimi digiti crassitudine. Derasa hæc intus viridis est, acerba, gustu subdulcis. Parte auersa folia fulvis maculis notata, sine semine.

LOCVS.

Gignitur in muscosis petris, & in agrestibus quercuum truncis.

TEMPVS.

Radix in fine Augusti carpenda.

TEMPERAMENTVM.

Polypodium dulcem simul & austeram habet vincentem qualitatem, vt facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

*Purgandi vim obtinet. Coquitur autem cū gala-
lina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua ad purga-
tionem. Arida aquæ mu'sæ insparsa, bilem & pi-
tuitam ducit. Radix trita & illita luxatis cōfert,
& ad fissuras quæ inter digitos sunt.*

EX PAULO.

*Polypedium exiccat admodum citra morsum, &
potum per inferna purgat.*

EX PLINIO.

*Radix in vsu. Exprimitur succus aqua madesa-
cta, & ipsa concisa inspergitur oleri, & Betae, &
Maluae, vel salsamento, vel cum pultrícula coqui-
tur ad aluum leniter soluendam vel in febris. De-
trahit bilem & pituitam. Stomachum offendit. A-
rida farina indita naribus Polypum consumit. Il-
lita luxatis medetur.*

DE PRASIO.

CAP.

CCXXV.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Marrubiū
Paſſium.

Π **Ράσιον** Græci, Marrubium Latinis, Praſiſum officinis vocatur. Germanis Andorn das vueiblin, Vueiſz Andorn, Marobel, Gottſzuergeſz. (Gallis du Marrubium.)

FORMA.

Frutex eſt ab vna radice ramosus, ſubhirsutus, albicans, virgis quadrangulis. Folium pollicis æquale, ſubrotundum, hirsutum, rugosum, guſtu amarū. Semen per intervalla in caulibus eſt Flores aſperi verticillorum figura. Hæc delineatio adamuſſim

Marrubiū Marrubio hodie dicto reſpōdet. Siquidem ſingula-
ri radice, anguloſis ramulis fruticat, lanuginosum: foliis ferè orbiculatis, pollicis magnitudine, incanis, hirtis, amaris, lacteo flore, verticillato cinctu caulem ex intervallo amplectente, cui ſuccreſcit teres & aſperum ſemen.

LOCVS.

Nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera

TEMPVS.

Colligitur herba in æſtate, Iulio potiſſimū menſe, dum ſemine eſt prægnans.

TEMPERAMENTVM.

Marrubium in caliditate quidem ſecundi ordinis iam completi eſt, in ſiccitate verò tertij medij, aut completi.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius folia arida cum ſemine decocta in aqua,

aut viridium expressus succus, datur cum melle asthmaticis, tuſſientibus & tabidis. Crassa è thorace cum iride sicca ducunt. Datur mulieribus quæ non purgantur, vt menstrua & secundas pellant. Item difficile pariëtibus, his qui à serpentibus morſi sunt, & qui letale quid biberunt. Vesica tamen & renibus nocent. Folia cū melle illita sordida vlcera purgant, pterygia nomasq; cohibent. Dolores laterum mitigant. Ad eadem pollet ex foliis contritis expressus succus & sole coactus. Cum vino & melle illitus, oculorū claritatem exacuit. Morbum regium per nares expurgat. Aurium doloribus perse, aut cum rosaceo instillatus prodest.

EX GALENO.

Prasum vt gustu amarum est, ita si quis vtatur consentientem huic saponi actionem habet, iccur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemque expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum, detergit ac discutit. Succo eius cum melle ad aciei oculorum claritatem vtuntur. Quinetiam & per nares morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus utique obstructionem dissicere, meatumq; ipsum & explanationes membranarum expurgare necesse est.

EX PLINIO.

Huius folia semenq; cōtrita prosunt cōtra serpētes, pectorum & lateris dolores, tuſsim veterem. Iis qui sanguinem eiiciūt eximiè vtile, scapis eius cum
panico

PLANTARVM HISTORIAE

panico aqua decoctis, vt asperitas succi mitigetur. Imponitur strumis cum adipe, Sunt qui viridis semen, quantum duobus digitis capiant, cum farris pugillo decoctum, addito exiguo olei & salis, sorbere ieiunos ad tussim iubeant. Alij nihil comparant. In eadem causa Marrubij & Fœniculi succis ad sextarios ternos expressis, decoctisque ad sextarios duos, si cochlearij mensura in die sorbeat in aqua cyatho. Virilium vitiis tussim cum melle mirè prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruptis, conuulsis, nervorum contractionibus salutare. Potum aluum soluit cum sale & aceto. Item menstrua & secundas mulierum. Arida farina cum melle ad tussim succam efficacissima est. Item ad gangrenas & pterygia. Succus verò articulis, & e naribus morbo regio, minuendæq; bili cum melle prodest. Item contra venena inter pauca potens. Ipsa herba stomachum & excreationes pectoris purgat. Cum iride & melle urinam ciet. Cauenda tamen exulcerata vesica, & renum vitiis. Dicitur succus claritatem oculorum adiuuare.

DE PERISTEREONE.

CAP. CCXXVI.

NOMINA.

Verbenaca.

Verbena.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ, ἰσὶ δὲ ΒΟΤΑΝΗ Græcè: Verbenaca, Verbena, Columbaris seu Colubina, herba Sagminalis Latine, herbariis & officinis Verbena vocatur. Germanicè Eisenkraut, vel Eisenhart,

fernhart, (Gallicè Veruaine,) hoc est, ferraria, quod nomen vt olim, sic hodie quoque habet. Peri Peristeeon nomen inditum à columbis, qui in ea versa= reon curri plurimum delectantur. Hierobotane autem, hoc dicta. est, sacra herba ideo dicta, quòd ea olim apud Ro= Hierobo= manos domus purgabatur, familia lustrabatur, lo= tane. uis mensa ad sacrificium & epulas verrebatur, & fœciales in sacris legationibus illa coronabatur, vel vt Dioscorides inquit, quod in expiationibus suspē= sa & alligata mirè utilis sit. Sagminalis verò, quòd Sagmina inter sagmina, hoc est, gramina ex loco sacro, præ= lis. fertim arce Capitoli, cū sua terræ euulsa, primum hæc honorem haberet.

G E N E R A.

Duo Verbenacæ & Græci & Latini fecerūt genera. Dioscorides & alij Græci à planta habitu rectam & supinam. Plinius à sexu marem & fœminam. Recta Dioscoridis, est Plinij mas, alioq; nomine Crista gallinacea, à serratis foliis quæ gallinacæ Crista gal cristæ formam referunt, dicitur. Recta autē nomi= linacea. nata est, quòd rectis ramulis assurgat. Supina autē Dioscoridis, apud Plinium fœmina est, Romanisq; Cincinnalis vocatur. Supinam verò vocarūt, quòd semper humi supinè procumbat. Germani etiā per sexum genera illa distinguunt, vocantque rectam Verbenacam Eisenkraut das menple, supinam verò das Vueible.

F O R M A.

Recta

Recta. Recta siue mas herba est altitudinis palmi, aliquando etiam maioris. Folia huic incisa, subalbida, è caule prodeuntia, qui ei vnus est magna ex parte, quemadmodum & radix vna. Flos luteus, quo solo ferè à femina differre videtur. Hac descriptio pulchrè Verbenacæ mari respondet: est enim herba doctoralis, interdum verò procerior, quemadmodum ea est quæ in Germania nostra provenit: nunquam enim aut rarissimè palmi altitudinem nō excedit. Folia habet incisuris diuisa, albescentia, erumpentia è caule. Singularis denique illi, vt plurimū, caulis & radix vna.

Supina. Supina seu femina ramos profert cubitales, aliquando etiam maiores, angulosos, circa quos folia sunt per intervalla quernis similia, angustiora tamen & minora per ambitum incisa, colore subcæsis. Radicem habet oblongam, tenuem. Flores purpureos, tenues. Cuius iterum delineationis notæ, Verbenæ femina adamussim conueniunt. Siquidem multis statim à radice angulosis coliculis constat, coma subtus incana, folio querno nō dissimili, nisi quòd minus est & angustius, multis per ambitum incisuris, flosculo ex albore & purpura versicolore. Quibus omnibus manuscripti codicis, qui Peristereon interpretatur Verbenam, accedit testimonium, & cōmunis omnium consensus, à quo sine manifestis coniecturis & rationibus nūquam est discedendum.

LOCVS.

Vtraque

Vtraque in planis & aquosis locis prouenit.

TEMPVS.

Mas citius quàm fœmina apparet. Colligi debent, potissimum fœmina, circa Canis ortum, nam hoc tempore floret.

TEMPERAMENTVM.

Vtraque desiccat & adstringit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Rectæ Verbenacæ folia cum rosaceo, aut adipe suillo recenti apposita, vuluarum dolores finire putantur. Ignem sacrum cum aceto illita reprimunt. Putrescentia vlcera cohibent. Vulnera glutinant, veteraque ex melle ad cicatricem perducunt. Supina autem folia & radix in vino pota illitaq; aduersus reptilia serpentesve faciunt. Eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina, quadragenis diebus ieiuno contra regium morbum bibuntur. Vetera œdemata, & inflammationes illita mitigant. Sordida vlcera purgant. Tota autem herba in vino decocta tōsillarum crustas abrumpit, & oris nomas gargarissata cohibet. Fertur sparsa aqua triclinio qua maduerit, latiores cœuiuas fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum cum adiacētibus foliis quartanis, quartum.

EX GALENO.

Vim habet adco desiccantē vt vulnera glutinet.

EX AETIO.

S

Verbenacæ

PLANTARVM HISTORIAE

Verbenaca recta ad capitis dolores summo praesidio esse testatur Archigēes, si ea coronetur patiens, aut si teratur cū aceto & rosaceo & illinatur, aut oleo decoquatur, ac foueatur caput. Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoque fluentes compescit. Radicis decoctum calidum ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisq; ulceribus medetur. Ad colicos radices semicontusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato: efficacissimum id esse experientia compertum est. Facit & ad calculos atq; ad inchoantem elephantiasim, si cum melle propinetur. Vtere itidem ad epilepticos, & ad quotidiana, quartanave febre laborantes. Ad podagricos vero & coxedicum morbo affectos, vino decocta exhibetur. Succus radice expressi collutio ad fistulas commodissima est. Et si mororum liquori ac melli mixtus exuratur, et acidus illinatur, fistulas sanat. Potest etiam melle assumi, & fistula tanquam collyrium iniici, ac mirum in modum prodest.

EX PLINIO.

Aiunt si aqua spargatur triclinio qua maduerit Verbenaca, latiores conuictus fieri. Aduersus serpentes conteritur ex vino. Omnibus visceribus medetur, lateribus, pulmonibus, iecinoribus, thoraci, peculiariter autē pulmonibus, & quos ab iis phthisis tentat. Dysenterias emendat ex aqua data caerentibus febre, aut ex vino aminaeo cochlearibus quinque,

quinque additis in cyathis tribus vini.

EX SIMEONE SETHI.

Verbenaca recta facit ad capitis dolores & defluentes capillos inuncta. Dentium dolores sedat, & motos atque concussos confirmat. Oris vlcera sanat. Decoctum eius colicos & calculosos iuuat. Pota iis qui primum elephantia laborare incipiunt, & comitiali morbo affectis succurrit. Item quotidiana & quartana laborantes similiter iuuat. Podagricos verò & coxendicis morbo captos, vulneratosque illita sanat.

DE PTERIDE. CAP. CCXXVII.

NOMINA.

ΠΤΌΡΙΣ, ἢ ΠΤΌΡΙΟΝ Græcis, Filix Latinis dici-
tur. Officinæ Latino nomine vtuntur. Ger-
manicè Valdtfarr, (Gallicè Feuchiere.) Pteris Pteris cur
autem & pterion ab alis auium, quarum formā in dicta.
ramulis disposita eius folia referūt, Græcis dicitur:
pennatus enim, & pennati foliis frutex Filix est.

GENERA.

Duo Filicis sunt genera, mas scilicet & femina.
Mas Græcis simpliciter ΠΤΌΡΙΣ Latinis Filix mas, Pteris.
Germanis Vualdtfarr mennle dicitur. Femina
Græcis ΘΗΛΥ ΠΤΌΡΙΣ, Latinis Filix femina, Germanis Thelypte-
nis Vualdtfarr Vucible appellatur. ris.

FORMA.

Filix mascula folia habet sine caule, sine flore, si-
ne semine, ex vno pediculo cubitali longitudine cula.

S ij

excutia,

PLANTARVM HISTORIAE

excurrentia, incisa, alarum autem modo explicita, odore subgrauia. Radicem in terrae superficie foris nigram, crassam, oblongam, adnascantias appendicesve multas habentem. Ex qua siquidem descriptione satis constat hanc quam sub hoc nomine pictam damus herbam, esse Filicem masculam: haec enim neque caulem (quod enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem obtinet) neque florem, neque semen habet: folia ex vno pediculo cubitali à terra statim, aut ex stipite eius exeunt, utroque latere pinnata, subgravi odore. Radix denique illi est per summa cespitum nigra, & ut Theophrastus ait, crassa, oblonga, multis adnatis & capillamentis fibrata, atque, ut summam dicam, omnes illi notae adamussum respondent. Filix foemina folia priori similia obtinet, non tamen vno singulari; pediculo ut illa haerentia, sed adnascentes ramulos multos altioresque habentia. Radix illi longa, obliqua, in nigro colore subflaua, aliquando verò rubescens. Quae descriptio iterum per omnia cum ea herba cuius picturam exhibemus ita conuenit, ut nulla prorsus sit nota quae illi non respondeat.

Filix foemina.

LOCVS.

Nascuntur ubique, sed maximè in montibus, syluis & saxosis locis.

TEMPVS.

Effodiuntur Vergiliis occidentibus, hoc est, autumnis.

TEM-

TEMPERAMENTVM.

Amara sunt Filices, paululum habentes adstrictionis, vt euidentissimum sit has calefacere & exsiccare posse.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Filicis mascula radix pellit latos lumbricos pōdere drachmarum quatuor cum aqua mulsa pota. Melius autem si cum Scammonia, aut veratri nigri quatuor obolis detur: veruntamen oportet sumētes allia præsumpsisse. Lienosis vt restituantur prodest pota. Radix etiam cum axungia illita contra ictus ab harundine factos utilis est. Eius autē hęc probatio. Peribit Filix quam per ambitū copiosior harundo coronet: & cōtra euanesct harundo, quā obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Fæminæ radices cum melle in eclegmate sumptæ, latos lumbricos pellunt. Cum vino autem pondere triū drachmarum pota, rotundos lumbricos eiciunt. Mulieribus datæ sterilitatem faciunt. Et si prægnans sumat, abortum. Sicca & in farinam trita, humidis & iis quæ difficulter sanantur vlceribus insperguntur. Medentur iumentorum cervicibus. Folia eius nuper prodeuntia olerum modo elixa comeduntur, aluumq; molliunt.

EX GALENO.

Filix mas radicem habet maximè vtilem: latū enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmarum pondere in aqua mulsa sumpserit. Ad

PLANTARVM HISTORIAE

eundem modum foetū quidem viuum necare, mortuum autem eiicere mirum non est. Vlceribus imposita valenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

EX THEOPHRASTO.

Thelypteris seu femina Filix contra lumbricos ventris & latos & graciles utilis est. Contra latos quidem cum melle mixta, contra tennes autem in vino dulci cum polenta data. Quinetiam mulieri si detur, pręgnanti quidem abortum: simpliciter autem foeminis sterilitatem facere affirmant.

EX PLINIO.

Vsus radicis in trimatu tantum, neque ante neque postea. Pellunt interancorum animalia. Ex his tineas cum melle, cętera ex vino dulci triduo potę. Vtraque stomacho inutilissima. Aluum soluit, primo bilem trahens, mox aquam. Melius tineas cum Scammonij pari pondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post vnus dici abstinentiam bibitur, melle pręgustato, contra rheumatismos. Neutra danda foeminis, quoniam grauidis abortū, cęteris sterilitatem facit. Farina earum vlceribus tetris inspergitur. Iumentorum quoque cervicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt, ideo substerni utile est in locis suspectis. Vstę etiam fugant nidore.

APPENDIX.

Falsum

Falsum & commentitium haud dubiè est quicquid neoterici aliqui de Filicis semine fabulantur: Filix se quòd scilicet vna solstitiali nocte floreat, eademque minè pro hora cum defloruit maturum in terram semen ea sus caret. dat, ideoq; nisi quispiã tunc affuerit, nec videri florẽ, nec colligi semen posse, tũ quia incredibilia sunt, tum quòd omnes, Theophrastus scilicet, Galenus, Dioscorides, Plinius, sterilem & sine semine dixerunt. Neque etiã medici vel Arabes vel Persæ, ad magicas vanitates nati, seminis huius meminerũt. Quapropter omnia hæc agyrtarum cõmentata esse videntur humane ignorantia ad quæstum impudenter illudentium, quæ certè vel vna hac ratione abundè satis confutari possunt, quòd cuncta illa fieri & observari natali nocte diui Ioannis Baptistæ præcipiunt, cum natalis ea nox & solstitialis illa duodecim dierum numero nunc inter se distent.

DE PEUCEDANO. CAP.

CCXXVIII.

NOMINA.

PΕΥΚΕΔΑΝΟΣ Græcis, Peucedanus Latinis, of Fœniculicinis et herbariis nostræ ætatis Fœniculus lus porci-
porcinus dicitur. Germanis Harstrang, Seuofen-
chel, oder Schuuefeluurtz, (Gallis Peucedame, ou queu porceau,) quòd lachryma è radice nus vnde
sulphuri aut thuri similis exudet. Peucedanũ autẽ dicta.
nomẽ inuenit à pinu, quæ græcis πόνικον dicitur, cui Pinastel-
folio par est. Hinc posteriores latini Pinastellum lus.

PLANTARVM HISTORIAE

cum vocauerunt.

FORMA.

Caulem emittit tenuem, macilentum, Fœniculo similem comam habet circa radicem copiosam & densam. Florem luteum, radicem foris nigram, intus albam, graui odore, crassam, liquore plenā. Hæsanè omnes notæ, nulla prorsus reclamante, huic

Officina *quam pictam exhibemus herbæ conueniunt. Offi-*
rū Peuce- *cinae, quæ non rarò adulterinas pro genuinis vē-*
danus nō *dunt herbas, Peucedanum ostendunt radice nō suc-*
est genui- *cosa, sed lignosa, nec graui odore, sed incundo: vñ*
na. *de satis constare potest verum non esse.*

LOCVS.

Gignitur in montibus opacis, potissimum in mōte prope Tubingam, cui olim arx imposita fuit, in itinere versus Rotenburgum sito.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, atq; deinceps semen producit. Radix foditur exitu autumnii.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit ordine secundo iam completo: desiccatur verò tertio iam incipiente.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radice adhuc tenera Peucedani cultello incisa liquor effunditur, profluensq; statim in vmbra reponitur: in sole siquidem languescit. Facit cū colligitur capitis dolores & vertigines, nisi quis antea rosaceo nares præungat, & caput irrigat. Radix
assata

assata inutilis fit. Colligitur & ex caulibus & ex radice sicut è Mandragora liquor atque succus. Minus tamen efficax succo liquor, & velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma thuri similis, caulibus radicibusque adhaerens. Ex aceto & rosaceo inunctus lethargicis, phreneticis, vertiginosis, comitialibus, diuturnis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, convulsis: in vniuersumque nervorum affectionibus ex oleo & aceto inungitur. Strangulatu vuluæ laborantes olfactus, soporéque profundo correptos reuocat. Suffitu serpentes fugat. Aurium doloribus cum rosaceo instillatus prodest. Canis dentium crosis inditus eorundem dolores mitigat. Contra tussim in ovo sumptus facit. Difficultati spirandi, torminibus & inflationibus subuenit. Alium leniter mollit. Lienem minuit. Difficiles partus egregiè adiuuat. Ad vesicæ renique dolores & distentiones potus confert. Aperit vuluam. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Sicca trita sordida purgat vlcera, ossiumque squamas detrahit, veteraque cicatrice obducit. Ceratis malagmatisque calefaciendi vi præditi miscetur. Eligi debet recens, non cariosum, solidum, odoris plenum. Succus ad positiones amaræ amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho dissoluitur.

EX GALENO.

Pencedani radice quidem maximè, sed tamen etiam

etiam succo & liquore vtimur. Sunt autem hæc omnia eiusdem specie facultatis, sed valētior liquor, admodum exalfaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa nervos cōsistētibus cōuenire creditur, tū morbis in pulmone & thorace ex crassitudine atque viscositate humorum factis. Et intrò quidem in corpus sumpta, sed tamen etiam olfactu prosunt. Porro quòd incidat atque extenuet, saepe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedauit, quia videlicet est tenuium partium, & exalfactorius. Quinetiam lienes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo & extenuando crassos humores. Sed & radice ad hæc vtilicebit, quæ & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia videlicet validè desiccat, minus tamen quàm succus exalfaciēs. Et vlceribus malignis arida illita optimum est remedium: ipsa enim expurgat, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

EX PLINIO.

Peucedani radices conciduntur in quaternos digitos offeīs cultellis, funduntq; succū in vmbra, capite prius & naribus rosaceo perunctis, ne vertigo sentiatur. Et alius succus inuenitur caulibus adhærens, incisq; manat. Probaturn crassitudine mellea, colore ruffo, odore suauiter grani, feruens gustu. Et hic in vsu & radix, & decoctū eius pluribus medicamētis. Succo tamen efficacissimo, qui resoluitur amaris amygdalis, aut ruta, bibiturque contra serpētes,

serpentes, & ex oleo perſuctos tuetur. Idem peſtoris doloribus ſubuenit. Pituitā & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta lieni & renibus prodeſt. Perungunt & radicem ſudoris cauſa eliciēdi, quoniam cauſtica vis ei eſt. Peucedano ad recentia vulnera tanta vis eſt, vt ſaniem oſſibus extrahat. Cum ſemine Cupreſſi bibitur, ſi ſanguis per os redditus eſt, fluitq; ab infernis. Strangulatus vulua nidoſe uſtum recreat, laxanturq; ſuffocationes eo: ſed quidam amniſcent in vino ſemen Cupreſſi contritum. Potum cum coagulo vituli marini aquis portionibus comitiales ſanat. Succus infantium ramici, & umbilicis eminentibus inungitur. Stranguriæ cum melle medetur. Item ſemine lethargici excitantur, & vt perhibent ex euphorbio naribus tactis Peucedani ſucco.

DE PERSICA ARBORE.

CAP. CCXXIX.

NOMINA.

ΕΡΣΙΝΗ ΜΗΛΕΑ Græcis, *Persica mālus* Latinis: antiquum nomen herbarij vulgares retinuerunt: Germanis *Pferſichbaum*, (Gallis *Vn Pechier*) appellatur. *Persica* forte dicta, quod ex *Perside* primum aduecta ſit. *Persica* cur dicta.

FORMA.

Persica foliis amygdalæ maioribus conſtat: flore ſubpuniceo, pomo carnoſo, ſucculento, foris lanuſginoso, dura intus & ſcabra nuce, in qua nucleus qualis

PLANTARVM HISTORIAE

qualis amygdalis. LOCVS.

Paſſim in hortis, vineis potiſſimū, naſcitur. Gaudet autem aquoſis.

TEMPVS.

Floret primo ſtatim vere, fructus verò eius autumni ferè exitu matureſcit, celerrimè marceſcēs.

TEMPERAMENTVM.

Perſica arbor in germinibus & foliis vincetem amaram qualitatem habet, vt hoc nomine calidā eſſe nemo dubitare poſſit. Fructus eius in ſecundo ordine frigidus & humidus exiſtit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Perſica poma ſtomacho grata ſunt, matura bonā faciunt aluum, cruda verò aluum conſtringūt. Siccata vehementius adſtringūt. Siccorum decoctum hauſtum ſtomachi & ventris fluxiones ſiſtit.

EX GALENO.

Folia Perſicæ trita & ſuper vmbilicum impoſita lumbricos necant. Alioqui ſanè etiam diſcutiens medicamentum eſt. Pomorum verò eius ſuccus & veluti caro facile corrumpitur, omninoq; noxā infert, quapropter haud poſt alios cibos vltimèq; ſicut nonnulli ſolent, illa offerri oportet: nam in ſummo natantia corrumpuntur. Huius verò, quod omnibus commune eſt, meminiffe oportet: quæcunq; vitioſi ſucci, quæ humida & lubrica ſunt, facile que ſcendunt ſeceduntve, præ aliis comedēda eſſe: ſic enim & ipſa celeriter ſubeunt, & aliis præeunt, ac
quasi

quasi iter muniunt. Postremo autem sumpta, vnâ secum alia quoque in corruptionem trahunt.

EX PLINIO VALERIANO.

Persicorum cibus est quidem stomacho inutilis, eò quod citò succus eius inacescat, & caro aque in digestionē vitietur, verum minimè grauis, dum nō diutius in intestinis moratur, et ad ima semper exitu celeri festinat. Persicorum cibus negatur à medicis membra nutrire. Sed & Galenus suadet nūquā omnino post cibum sumere, corrumpi affirmans si cibus ceteris innatent. Persicorum folia trita & imposita ventris animalia perimunt & expellunt. Eadem sicca & in puluerē tusa, recentes plagas cruentorum vulnorum claudunt. Nucleus Persicorum capitis dolori cum oleo & aceto tritus illinitur: quauis quidam cum solo rosaceo terere maluerint. Gummi gutta quam Persici truncus illachrymat, fuenti aluo medetur. Eadem mixta cum vino etiam in vesica lapillos frangit. Trita ex aceto impetigines reprimit. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperam arteriæ canalem leniorē facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstrictos sinus reserat: vitia pulmonis expurgat.

APPENDIX.

Flores Persicæ saccharo conditi, instar rosarum aut violarum, alium haud leuiter mouent atque subducunt.

PLANTARVM HISTORIAE

DE PEPLO. CAP. CCXXX.

NOMINA.

Esula rotunda.

Πέπλος Græcis, Peplos Latinis, officinis & vulgò Esula rotunda, Germanis Teufelsmilch, (Gallis Reueille matin des Vignes) appellatur.

FORMA.

Exiguus frutex est albo liquore plenus: foliis paruis ut Ruta, latioribus tamen. Tota eius coma dodrantalis, rotunda, humi fusa: semine sub foliis paruo & rotundo, minore quàm candidi papaueris. Radice vna, ex qua totus frutex provenit.

LOCVS.

Nascitur in hortis & vineis.

TEMPVS.

Colligitur mæsisibus, siccaturque in vmbra, & continuè vertitur.

TEMPERAMENTVM.

Idem cum Tithymallis habet temperamētum, atque adeò ex quarto calefacientium ordine est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa multos habet vsus, radix verò inutilis. Semen eius tusum, feruidaq; aqua madefactum reconditur. Pituitam & bilem acetabuli pondere cum hydromelitis cyatho potū ducit. Opsoniis mixta herba aluum conturbat. Conditur in muria.

EX GALENO.

Peplos frutex liquorem similem Tithymallis habet, cum in aliis, tum quia purgat ceu illi.

EX AETIO.

Pituitam ac bilem ducit acetabuli mensura cum mulſæ cyatho bibitum Pepli ſemen. Sale etiam herba maceratur, flatuſq; diſcutit, vt Hippocrates aſſerit. Summopere igitur confert flatuoſis affectibus qui in melancholia dominantur, item diuturnis lenis & vteri & coli flatibus, tumefactisq; cedematibus in abdomine.

EX PLINIO.

Semine Pepli potio alius ſoluitur, bilis ac pituita detrahitur. Media potio eſt acetabuli mensura, in aquæ mulſæ heminis tribus. Et cibus inſpergitur opſoniisq; ad molliendam aluum.

DE PILOSELLA. CAP. CCXXXI.

NOMINA.

Quo nomine veteribus Græcis aut Latinis nominata ſit hæc herba, ingenuè fateor me ignorare. Neque enim eſt $\mu\upsilon\delta\varsigma\ \delta\omicron\upsilon\varsigma$ Dioſcoridis. Cùm itaque Græco & Latino nomine deſtitueremur, barbaro vti nobis neceſſe fuit, niſi plane herbam hanc vulneribus glutinandis mirè vtilem, præterire voluiſſemus. Herbarii itaque noſtræ Pilofella etatis à copioſis pilis quibus veſtitur, Pilofellâ, Ger vnde diſmani Meuſzorian, vocant. etæ.

GENERA.

Duo eius herbæ genera reperiuntur, in nullo ferè niſi floribus diſtantia. Vnum genus maioribus for- Maior.
liis, & quæ ſe à ſolo ſuſtollunt, floribusq; luteis, maior
ior

PLANTARVM HISTORIAE

Minor.

ior Pilosella nominatur, Germanis propriè Nagelkraut. Alterum minoribus foliis, in terra sessilibus, floribus purpureis, & quasi in pappum evanescentibus, Germanis Meuszorlin, oder Hasenpfatlin peculiariter appellatur. Sic etiam suam Pilosellam manuscriptus herbarius in maiorem & minorem digessit. **F O R M A.**

Myosotis
no est Pi-
losella.

Herba est foliis in terram graminis modo sparsis, pilosis, albicantibus à terra, supernè vircentibus, floribus luteis aut purpureis, radice in exilitatē multam extenuata. Ex qua descriptione sole clarius sit, eam herbam quæ à Græcis Myosotis, à Latinis auricula muris dicitur, non esse Pilosellam: nam, ut reliqua taceam, neque maior neque minor

Auricula
muris non
est Pilosel
la.

Pilosella ceruleum flosculum velut Anagallis obte-
tinet: ut non parum errent herbarij nostri tempo-
ris qui Pilosellam alio nomine Muris auriculam ap-
pellari tradunt. **LO C V S.**

Nascitur utrunque genus locis montosis & collibus terrenis. Maior autem inuenitur etiam in asperis & incultis agrorum limitibus.

TEMPVS.

Maior & Iunio potissimum mense florent. Minor tamen Pilosella paulò post initia Iunii mēsis disparet, & nusquam subinde inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Esse calidas & siccas Pilosellas gustus palàm declarat: habet enī adstrictionē cū exigua quadā acris

acrimonia cōiunctā, vt hoc nomine ad purificanda
ac subinde glutinanda vulnera sint mirificè vtilēs.

VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Ferunt foliorum farinā vulnera mirum in mo-
dum glutinare. Herba recētis succū exprimunt ad
cohibendos quartana febris horrores. Eodē tingunt
gladiorum aciem, vt omne ferrum aliud domet, se-
cetq; : ferrum enim quod huius succo cōmaduit tā-
tam contrahere duritiam, tamq; magnum induere
robur produnt, vt chalybis aciem ressuat. Has cer-
tè omnes facultates manuscriptus herbarius Pilo-
sellæ adscribit. Recentiores huius herbæ radicē Ma-
io mense effossam, siccata, & in puluerem reda-
ctam, ac subinde potam, aut in cibo datam, effica-
cissimū esse aduersus ramicem remedium tradunt.

DE PIMPINELLA. CAP. CCXXXII.

Neutra ex his Pimpinellis nostram ex-
primit, quæ est odore cucumeris, coliculis
rubentibus, & flosculis in capitello purpu-
rascentibus, quam post sanguisorbam vo-
cat.

NOMINA.

VT appellata sit Græcis aut latinis herba hæc
quam hodie vulgus herbariorum & officinæ
Pimpinellam vocant, nondū nobis certò scire licuit.
Sunt qui Pampinulam & Bipennullam nomināt.
Germani Bibinellē & Bibernellen (Galli Pim-
pinelle, ou Pimprenelle) appellant.

Pāpinula

GENERA.

T

Duūm

PLANTARVM HISTORIAE

Duūm est generum Pimpinella. Vna maior, radice admodum longa, foliis multifariam scissis, Sisaro haud dissimilibus, caulibus angulosis, floribusq; in summo exiguis & candidis. Altera minor, caulibus rufescentibus, foliisque minoribus, & non dissectis multifariam, sed serratis tantum, alias priori per omnia similis.

FORMA.

Herba est folio mucronato, dissecto, aut in extremitatibus serrato, caulibus ab eadē radice binis aut trinis, angulosis, & interdum rubentibus, in quorū summo nascuntur flores minuti & cādidi, & iis decidentibus semen exiguum Oreoselini semini simile. Radice crassa, longa, & subrubente, ascri admodum.

LOCVS.

Lucis & opacis locis minus, in pratis autem marinis, assatim citra cultum erumpit.

TEMPVS.

Aestate in autumnum vsque floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum acrimoniam non exiguam in gustu praeseferat, haud dubiè in secundo ordine calida & sicca erit, imò secundum calefaciendi ordinem excedere credibile est, & ad tertium ferè accedere.

VIREs. EX RECENTIORIBVS.

Pimpinellæ succus bibitur contra serpentium morsus. Ex vino pota calculos terit. Straguriam etiam decocta

decocta leuat. Succus eius potus omne venenū discutit. Aqua eius ignis vi expressa oculorum caliginē discutit. Hæ sunt facultates quas illi antiquus herbarius tribuit. Alii tradunt succum eiusdem faciei maculas detergere posse. Est autē radicis Pimpinellæ tum vsus præcipuus, quum seuiantis populi latim pestilentie contagia arcere conamur: vnicè enim venenis aduersatur, & corpora ab hac lue vindicat, vt adfirmant, si tantum in ore teneatur. Quod certè non potest ea quam hodie Sanguisorbā vocant herba. Quare mirum in modum errant, qui hanc cum Pimpinella confundunt, vt fusius suo dicemus loco.

Sanguisorba non est Pimpinella.

DE PASTORIA BURSA.

CAP. CCXXXIII.

NOMINA.

Quo nomine herba quam vulgus Pastoriam bursam appellat, Græcis & Latinis medicis dicta sit, ignorare me ingenuè fateor. Bursa autem sunt qui peram etiam pastoris nominant, à foliis peraculis in exigua vulgæ similitudinem cōpressis, turbinata cordis effigie. Germanis Deschelkraut & Hirtenseckel vocatur.

FORMA.

Herba raro pede altior, ramosa, Erucae folia habens, at minora. Flores exiguos, candidos. Semen in vulgus minutum & nigrum. Radicem candicantem & oblongam.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur propter vias passim, & in parietinis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus legitur.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & adstringit.

VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Ex aceto trita collectionū inflammationes refrigerat, ac eò confluētes humores cohibet. Imponitur sacris ignibus, & quibus stomachus aestuat. Succus eius purulentis auribus infunditur. Cruenta sanat vulnera. Medetur dysentericis, sanguinem excreantibus, neque non muliebri profluvio. Manuscriptus herbarius addit hanc sanguinem è naribus profluētem sistere mirificè posse. Herbam quoque manu tantum gestatam, mox idem efficere tradit. Quid multa? mirè efficax est in comprimendis omnibus sanguinis eruptionibus.

DE PEDE LEONIS. CAP. CCXXXIII.

NOMINA.

Quam vulgus herbariorum Pedem leonis nominat, non est Dioscoridis Leontopodion, id quod descriptio satis monstrat. Quo vero nomine Græcis & Latinis appellata sit, mihi non est nōdum constat. Sunt ex barbaris qui Alchimillam, Pes leonis alii etiam qui plantam leonis nominant. Sic autē herbario-dicta, quòd folia habeat instar leonini pedis latarum. & rotunda. Germanis Synnau Louentapē, Lo-
uenfusz,

uenfusz, & vnser frauue mantel (Gallis Pied de Lion) vocatur.

FORMA.

Dodrantal est herba, folia lata, crispa & retunda octo serratis incisuris distincta, non tamen ad pediculos vsque, qui statim è radice exeunt, fissi habens. Flores item exiguos & luteos profert. Radicem digito crassiore, & sesquipalmo longiorem, subrubescens.

LOCVS.

Passim in prati, in alto potissimum sitis, nascitur.

TEMPVS.

Maior mense erumpit, ac inter Iunii initia floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & radix adstrictione vehementi participant, atque adeò exiccant. Recentiores id ipsum in secundo efficere ordine tradunt.

VIRESEX RECENTIORIBVS.

Vulneribus glutinandis aptissima est. Decocto enim illius lauantur vtiliter omnia vulnera. Linteu quoque in eo madefactum illis commodè imponitur. Mulierum mammas impensè laxas linteu decocto eiusdem intinctum & impositum, duras solidasq; efficit. Decoctum denique hoc epotum interanea vulnera, rupturasque glutinat. Et quod dictum mirum est, tanta eius plantæ in glutinando vis est, vt ramices intestinorum, in pueris potissimum, sanare possit.

PLANTARVM HISTORIAE
DE POLYGONO MARE.
CAP. CCXXXV.

Polygonum mas herba innocentium vulgò dicitur, quod Parisiis in Cœmiterio Innocentibus sacrato luxuriat.

NOMINA.

Seminalis ολύγονον ἀρρεν Græcè. Proserpinaca, *Seminalis* à seminis multitudine, & *Sanguinalis* à cohibendo sanguine nominatur. *Officinæ* corrigiola & Centumnodia. Germanicè *Vuegggrasz*, *Denngrasz*, *Vuegdritt* appellatur. *Corrigio* = *Polygonon* à geniculorum frequentia, & multitudine dictum est. **FORMA.**

Herba est ramis tenuibus, teneris, copiosis, geniculis intersectis, in terra graminis modo repētibus. Foliis Rutæ similibus, longioribus tamen. Iuxta singula folia semine, unde masculum vocatur. Flore albo aut puniceo. **LOCVS.**

Nascitur passim, quotidieq; pedibus conculcatur, sua sponte in aggeribus & semitis proveniens.

TEMPVS.

Aestate floret, quo etiam tempore legitur.

TEMPERAMENTVM.

Vti adstrictionem quandam obtinet Polygonū, in sanè vincit in eo aqueum frigidum, ut videlicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertii. Est etiam exiccatorium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet adstringendi & refrigerandi succus Polygoni potus. Prodest sanguinem expuētibus, & alui defluxionibus, cholericis & vrinae stillicidio. Vrinam enim euidenter ducit. Cū vino potus venenatorum morsibus auxiliatur. Valet etiā ad febriliū circuitus vna hora ante accessionem sumptus. Muliebri profluvium appositus sistit. Aurium doloribus, & purulentis auribus instillatus confert. Cum vino decoctus melle adiecto, eximie ad genitalium vlcera facit. Folia contra stomachi ardorē, sanguinis reiectionem, herpetas, ignes sacros, inflammationes, œdemata, & vulnera recentia illinuntur.

EX GALENO.

Polygonum iis sanè quibus stomachus aestu feruet extrinsecus illitum auxiliatur: veluti etiā ignes sacros & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cū sit, & fluxiones reprimat, & hac ratione videtur exiccatorium esse. Quare cum herpetum, tum ulcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimū autem inflammatione & fluxione laborantiū partium. Est & cruentorum vulnorum glutinatorium. Sed & aurium ulceribus prodest: & si vel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccet. Easdem ob facultates & muliebri profluvium, & dysenteriam, & sanguinis eiectiones, & vndecunque aliunde immoderatiores impetus sistit. Refert Dioscorides quod & vrinam pronocet exhibitum stillicidio affectis.

PLANTARVM HISTORIAE

Non tamen affectum exactè discriminat in quo dari ipsum expediat.

EX PLINIO.

Succus eius infusus naribus supprimit sanguinē, & potus cum vino, cuiuslibet partis profluvium excreationesq; cruentas inhibet. Vis eius spissare ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, urinam ciet, rheumatismos cohibet: qui si nō fuere, nō prodest. Stomachi feruori folia imponuntur. Vesicae dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorum dolori per se. Dabatur et in febribus ante accessiones, duobus cyathis in tertianis quartanisve præcipuè. Itō cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi.

DE PEGANO. CAP. CCXXXVI.

NOMINA.

Πήγανον καὶ τὸν Græcè, Ruta hortēsis Latine: officina retinuerunt nomen Latinum: Rauten & Vucinrautē Germanicè (Gallicè de la Rue) vocatur. Peganon Græci, Plutarcho libro tertio sui symposii teste, à facultate, quòd calore sic citatēque genituram coagularet, dixerunt: τὸ πῦρ οὐδὲν enim coagulare, & quasi in glaciem contrahere est. Hinc vterum gestantibus inimica etiam coronis inserta putatur.

FORMA.

Frutex est Ruta hortensis grauissimi odoris, semper ferè virens: folio exiguo, penè rotundo, caesi coloris,

Peganon
vnde di-
Ham.

loris, denso, surculosis ramis: flore luteo, angulosis calycibus, in quibus semen album continetur.

LOCVS.

Prouenit passim in hortis, amat aprica & sicca loca.

TEMPVS.

Floret æstate, semē autem Autumno maturescit, quo etiam tempore carpendum venit.

TEMPERAMENTVM.

Gustu non solum acri, sed & amaro est, ex tertio ordine excalfacientium, & strenuē desiccantium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vrit, calfacit, exulcerat, urinā mouet, menstrua que ducit. Alium sistit pota & comesta. Letalium venenorum antidotum est, si semen acetabuli mensura in vino bibatur. Folia per se ante cibum sumpta, & cum nucibus inglandibus, aridisq; sicis, inefficacia venena reddunt. Contra serpentes similiter sumpta prosunt. Genituram tam in cibo quam potu extinguit. Coctum cum anetho sicco, tormina sistit. Facit etiam ad lateris thoracis que dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumq; cruciatus, rigores circuitibus certis repetentium febrium, uti prædictum est, pota. Ad inflationes coli, vteri & recti intestini, decocta cum oleo & infusa. Vulua strangulatu liberat trita cum melle, si à genitali vsq; ad sedem imponatur. Feruesfacta cum oleo & pota, leucoricos excutit. Articulorum doloribus cum melle, aque

PLANTARVM HISTORIAE

aquæ inter cutem, quæ hyposarca dicitur, cum facis illinitur. Eisdem pota auxiliatur, in vino decocta ad dimidias partes, & si ea abstergantur. Cruda, saleq; condita ac comesta, visus aciem exacuit, & oculorum dolores cum polenta illita sedat. Cum rosaceo & aceto capitis doloribus succurrit. Sanguinis narium profluuia trita & imposita sistit. Testium inflammationibus cum Lauri foliis illita, & exanthematis cum myrto & cerato prodest. Cum vino autem, pipere & nitro confrieta, albæ vitiliginis medetur. Cum iisdem illita thymos & myrmecias tollit. Cum melle & alumine imposita lichenibus prodest. Succus in malicorio calfactus & instillatus aurium doloribus succurrit. Oculorū hebetudinib. cum succo Foeniculi & melle inunctus subuenit. Ignes sacros, herpes & achores cum aceto, cerussa & rosaceo inunctus sanat. Ceparum & aliorum acrimoniam commanducata domat.

EX GAIENO.

Ruta incidere atque digerere crassos lentosque humores potest. Ob eam autem vim & urinas mouet. Quinetiam tenuium est partium, flatusq; extinguit. Quare ad inflationes prodest, ac Veneris appetitum cohibet. Discutit atque exiccat strenuè: est enim ex eorum medicamentorum numero quæ valenter exiccant.

EX PLINIO.

Quæcunque Ruta & per se pro antidoto valet,
foliis

foliis tritis & ex vino sumptis. Cōtra aconitū maximè & ixiā. Item fungos, siue in potu detur, siue in cibo. Simili modo cōtra serpentium iētus, utpote quū mustela dimicatur cū his, Rutam prius edendo se muniant. Valēt & contra scorpionū iētus, & araneorū, apum, crabronum, vesparum aculeos, & cātharidas, ac salamādras, canisve rabiosi morsus, acetabuli mēsurā si succus è vino bibitur, & folia trita vel cōmanducata imponuntur cū melle et sale, vel cū aceto & pice decocta. Succo verò perunctos, aut etiā habētes, negāt feriri ab his maleficiis. Serpētesq; si vratur Ruta, nidorē fugere. Efficacissima tamē est syluestris radix cū vino sumpta: cādē adiiciūt efficaciorē esse sub dio potam. Pythagoras oculis noxiā putauit falso, quoniā sculptores & pictores hoc cibo vtūtur oculorū causa. Cū pane quoque vel nasturtio satinae atq; syluestris propter visum. Vt aiūt, multi succo eius cū melle attrito inuncti discusserunt caligines, vel cū lacte mulieris puerum enixa, vel puro succo angulis oculorum tactis. Epiphoras cum polenta imposito. Lenit autem capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si verò sint cephalæa, cū farina hordeacea, vel aceto. Fadē cruditates discutit, mox inflationes, dolores stomachi veteres. Vulnus aperit, corrigitq; conuersas, illita in melle toto vētre & pectore. Hydropicis cum ficu, & decocta ad dimidias partes, potaque ex vino. Sic bibitur & ad pectoris dolores

PLANTARVM HISTORIAE

dolores laterumq; & lumborum, tusses, suspiria, pulmonum, iecinorum, renum vitia, horrores frigidos. Ad crapulae grauedines decoquuntur folia poturis. Et in cibo vel cruda vel decocta cōdītāve prodest. Item torminibus in Hyssopo decocta, & cum vino. Sic & sanguinem sistit interiorem, & narium indita: sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoque in dolore succus infunditur, custodito vt diximus modo. E syluestri vero contra tarditatē & sonitum cum rosaceo, vel cum laureo oleo, aut cum iunone & melle. Succus & phreneticis ex aceto trita instillatur in tempora & cerebrū. Adiecerunt aliqui & Serpyllum, & Laurum, illinentes capita & colla. Dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendū. Dederunt & comitialibus bibendum decocta succum in cyathis quatuor ante accessiones, quarum frigus intolerabile est. Alsiosisq; crudam dari in cibo. Vrinam quoque vel cruentam pellit. Fœminarum etiam purgationes, secundasq; etiam emortuos partus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigropota. Itaque illitam & vuluarum causa etiā suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Et contra ileū decocta farina in oleo, & velleribus collecta. Multi verò & cōtra purulentas excreationes sicca drachmas duas, sulphuris vnā & dimidiam sumi censent. Et cōtra cruentas, ramos tres in vino decoctos. Datur & dysentericis cum caseo in vino contrita.

Dederunt

Dederunt & cum bitumine infriētam potioni propter anhelitum. Ex alto lapsis seminis tres vncias, ex olei libra, viniq̃ sextario. Illinitur cum oleo coctis foliis partibus quas frigus adusserit. Si vrinā mouet, vt Hippocrati videtur, mirum est quosdam dare velut inhibentem potui contra incōtinentiam vrinae. Psoras & lepras cum melle & alumine illita emendat. Item vitiligines vel rugas, strumas, & similia, cum hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Item igneam sacrum ex aceto & oleo, vel psimythio. Carbunculū ex aceto. Nonnulli laſerpitiū vnā illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas purāt. Imponunt & mammis turgētibus decoctā, & pituita eruptionibus cum cera. Testium verò epiphoris cum ramis laureae teneris, adeò peculiari in visceribus his effectu, vt syluestri Ruta cū axūgia veteri illitos ramices sanari prodāt. Fracta quoque membra semine trito cū cera imposito. Radix Ruta sanguinē oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat. Ex reliquis quoque quae traduntur, mirum est, cum feruentem Ruta naturam esse conueniat, fasciculum eius in rosacco decoctum addita vncia aloes, perunctis sudorem reprimere. Itēque generationes impediri hoc cibo, ideo profluvio genitali datur, & Venerem crebrò per somnia imaginantibus. Praecauendū est grauidis, abstineāt hoc cibo, necari enim partus inuenio. Eadem ex omnibus satis quadrupedum quoque

PLANTARVM HISTORIAE

que morbis in maximo usu est, siue difficile spirantibus, siue cōtra maleficorum animalium iētus, infusa per nares ex vino: aut si sanguisugam exhausta serit, ex aceto, & quocūque in simili morborum genere vt in homine temperato.

EX SIMEONE SETHI.

Incīdit crassos & tenaces humores, p̄rque vrinam vacuat, & ad inflationes conducit, appetentiāque Veneris compescit, ac strenuē exiccāt. Ad inflatas aquas inter cutem, & anasarcam, morsus à vipera, succum Papaueris aut aconitum bibentes, colicōsque, pota & iniecta. Traditur quòd comesta visum acuet, ob id antiqui pictores hanc assidue degustabant. Nonnulli & succum eius melli cōmiscientes, medicamentum ad oculorum aciem aciemdam consciunt. Succurrit difficultati vrinae si cum oleo coquatur, & ea vesica foveatur. Item difficulter spirantes cum melle data, confestim inuat. Lethargicis pota, & per clysteres iniecta remediū fit. Intestina corroborat, non solum caliditate, sed proprietate quadā. Fertur etiam quòd si pragnans mulier ex eius succo bibat, abortiat. Et si in dies quindecim folia assumat, idem facit. Obstructiones iecoris & lienis tollit. Si ieiunus quisquam ipsam assumpserit, eò die à veneno non ledetur.

DE POTENTILLA.

CAP. CCXXXVII.

NOMI

NOMINA.

Quo nomine Græci & Latini hanc herbam
appellarint, à nullo, quòd sciam, adhuc pro-
ditum est. Recentiores herbarij Potentilla. Potētilla.
tillam, aliqui ob similitudinē Agrimoniam & Tanacetū
nacetum sylvestre nuncupant. Germani, quòd her- sylvestre.
ba illa anseres in cibo delectētur, Genseich (Gal-
li Tanaisii sauuage) vocant.

FORMA.

Herba Eupatorio, quòd Agrimoniam hodie vo-
cant, haud dissimilis. Caulis ex vna radice multos
profert, humi stratos. Folia Eupatorio similia, su-
perne viridia, inferne candicantia. Flores luteos sin-
gulari pediculo pendentes. Radicem extrinsecus ru-
fescentem, intus candidam.

LOCVS.

Nascitur passim circa semitas & loca aquosa,
atque in fluuiorum ripis ac marginibus.

TEMPVS.

Æstate floret, quo etiam tempore legi debet.

TEMPERAMENTVM.

Quoniam folia eius & radix adstringant, tempera-
mēto, à Pentaphyllo seu Quinquefolio nihil differ-
re videtur. Quare hæc, potissimum autem eius ra-
dix, ex tertio ordine desiccatoria est, minimūque
evidentis caliditatis habet. Errāt itaq; mirū in mo-
dū recētiore, qui hanc humidā esse statuunt, nullo Potentilla.
la alia moti ratione, quā quòd in humidis locis nō est hu-
proueniat: mida.

proueniat: quasi verò Nasturtiū aquaticum, quod Sifymbrium cardamine Dioscoridi vocetur, haud obstante quòd in aquosis nascitur, non etiam in tertio desiccet ordine. Debuisset certè illos ab hac sententia detertere non leuis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim, Galeno libro quarto de simplic. medicament. facult. capite sexto teste, terrena sunt & crassa corporis consistencia, atque adeò sicca.

VIRE S.

Recentiores potentillam fluxionibus & puncturis oculorum prodesse, recentia vulnera glutinare, & exedentia sanare, mulierum menstrua compefcere, artus & membra confirmare, rectè tradunt: nam idipsum posse, adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, abundè docet. Et cū habeat Quinquefolij temperamentum, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentium itaque dolorem finit. Exedentia oris vlcera sanat. Dysentericis & alui profluiis, coxendicis articulorumq; doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliaq; potest quæ à Dioscoride Quinquefolio tribuuntur. Quòd verò addiciunt hanc etiam lūbricos exterminare posse, id

Herbarij minus rectè faciunt. Ea siquidē facultas non huic, Potentillā sed illi inest herbæ quæ verè Tanacetū dicitur, quæ cū Tanacetū quidē est tertia, vt suo diximus loco, Artemisia speculo confusio. Proinde nō sine magno errore, Potentillā cū ea derunt. quæ propriè Tanacetū vocatur herba confuderūt.

NOMINA.

Nondum nobis constat quo nomine hæc herba veteribus. tum Græcis tum Latinis appellata sit. Vulgus tamen medicorum & herbariorum Prunellam nominant. Germani Braunellen oder Gottheyl. Prunella.

FORMA.

Caulces habet in medio striatos, pingues & hirsutos: folia Ocimo similia, coloris herbacei, & acuminata. Flores in summis caulibus spicatos, Lavan-
dula vocata herbæ non dissimiles. Radicem tenuē, multis capillamentis fibratam.

LOCVS.

Nascitur passim in pratis.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidā & siccā esse constat, id quod ex gustu patet: glutinosa enim admodū & modicē amara est.

VIREs.

Vulnerariam esse herbam euidentissimum est. Succum eius cum aceto & rosacco mixtum, vehementes capitis dolores sedare recentiores vno consensu tradunt, si tempora ex eo inungantur. Aphthas & oris vlcera, fauciumque vitia succus eiusdem sanat.

PLANTARVM HISTORIAE
DE PENTAPHYLLO.
CAP. CCXXXIX.
NOMINA.

Π ΕΥΤΑΦΥΛΛΟΝ Græcis, Quinquefolium Latinis & officinis, Germanis Funff fingerkraut, oder Funffblati (Callis Quintes-

Quinque fueille) appellatur. Nomen à numero foliorū has folium vn bet: in vnoquoque enim pediculo quinque esse deprede dictū. henduntur.

GENERA.

Etsi Dioscorides vnum duntaxat Pentaphylli genus faciat, tamen nos ad nostras respicientes terras Maius Pē tria eius genera in vniuersum produximus. Vnum taphyllū. quod maius appellauimus, prorsus ad Dioscoridis picturā accedens, vt hoc nomine verum esse Quinquefolium putemus. Estq; duūm generum: vnum quod pallidos seu candidos flores obtinet, hinc est quod Quinquefolium maius candidum appellauerimus, Germanicè grosz Vueisz Funff fingerkraut. Alterum floribus ornatur auri colorem emulantibus, seu luteis. Nos vt discernercmus à priori, Quinquefolium maius luteum nominauimus. Dioscorides etiā hæc duo genera innuere videtur, cum inquit florem habere vel candidum vel auri emulū. Tertiū minus diximus, quod priori hard dissimile est, non tamen passim vt illud quinquefolia obtinens. Hoc cum nō haberemus aliud nomen quo ipsum appellaremus, inter quinquefolij genera connumerare placuit. Videtur verō Hippocrates etiā

duo

duo Quinquefolij genera nouisse, vnum humilius, alterum procerius, vt hoc nomine nobis etiā liceat minus & maius statuere.

FORMA.

Ramulos habet festucarum instar graciles, dorsales, & in iis semen. Folia Menthae similia, in singulis pediculis quina, raro plura, per ambitū serræ modo incisa: florem in candido pallidū, auri æmulū, Radicē subrubram, oblongā, Elleboro nigro crassiorē. Ex qua sanè descriptione omnibus liquet, **Maius** Quinquefolium esse legitimum. Ex vna si- **Quinque-** quidem radice subrubra & oblonga, ramulos pro- **folium est** fert tenues, ac prorsus festucaceos, & in iis semen, **verū Pen-** folia Menthae, quina in singulis pediculis, per am- **taphyllō.** bitum serræ modo crenata, florem luteum, aut aureum. Quibus accedūt natalis locus (in riguis enim nascitur) & immēsa adstringēdi facultas: quæ quidem singula verum esse Quinquefolium docent. Adeoq; mirari satis nō possum, cur nonnulli adulterina hæc esse Pentaphylla sibi persuaferint.

LOCVS.

Prouenit aquosis locis, & iuxta aqueductus. Interdum etiam in incultis, siccis & arenosis locis.

TEMPVS.

Floret Maio & Iulio mensibus potissimum.

TEMPERAMENTVM.

Vtriusque certè folia, flores & radices vehemēter adstringunt: atque adeo, vt Galenus ait, radix,

PLANTARVM HISTORIAE

cuius multus est vsus, ex tertio est ordine desiccantium, minimum habens euidentis caliditatis.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Radici^s Quinquefolij decoctum ad tertias depressum deductumve, si in ore retineatur, dentiū dolores sedat. Putrescentia oris vlcera collutione sistit. Arteriae asperitates gargarizatum emendat. Contra alui profluvia, & dysenterias auxiliatur. Item articulorum & coxendicum dolores potum sanat. Cocta in aceto & illita, herpetas cohibet. Strumas discutit, duritias, oedemata, aneurysmata, abscessus erysipelata, digitorum pterygia, condylomata, scabiēsq; sanat. Tenerae radici^s succus, contra iecinoris pulmonisq; affectiones & venena prodest. Folia cum hydromelite, aut vino diluta, & exiguo pipere, contra febrium circuitus bibuntur: in quartana quidem quaternorum ramulorum folia, in tertiana verò triū, in quotidiana vnius. Tricenis diebus posita comitiali morbo medentur. Succus foliorum per dies aliquot trium cyathorum mensura potus, celeriter regiam morbum sanat. Vulneribus ac fistulis cum sale & melle illita medentur. Enterocelicis, id est, intestinorum ramice laborantibus succurrūt. Sanguinis eruptiones potum & illitum Quinquefolium sistit. Inciditur ad expiationes lustrationēsq; ve, sanguinis profluvia & castimonias.

EX GALENO.

Pentaphylli radix desiccatur vehementer, minimum

num verò acris est : quare in multo est vsu, velut alia quoque omnia, quæ quum sint tenuium partium, citra morsum desiccant.

EX PLINIO.

Quinquefolium adhibetur purgandis domibus. Strumis medetur, & pectoris vitiis. Idem ischiadicis bibitur & imponitur. Panos sanat. Impositum articulis vtilissimum. Fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle. Phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de Quinquefolio potus cyathis tribus anginae medetur. Idem iecinoris & pulmonis vitiis, sanguinemque reiciētibus, cuiusque sanguinis vitio intus occurrat. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefolium, decoctis in lacte radicibus & potis. Item decoctum ad tertias in vino ictericis dari atque illini vtilissimum est. Eius folia ex aqua comitiales sanant. Item contrita ex vino sumpta triginta diebus in betonica farina pōdo denariorum tredecim cū aceti scillitici cyatho, comitialibus morbis liberant. Celerrimè succus regio morbo medetur, tribus cyathis cū sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pipere ex aqua mulsa.

DE PISIS. CAP.

GCXL.

V iij

NO

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Ἰσὸν, ἢ λέκυθος Gracè, Pisum Latine dicitur.
 II tur. Officinis hoc nomine notum. Germanicè Erbsz, oder Erueyssen, (Gallicè Pisum Pois.) Sic autem a Pisa loco in quo olim copiosissimè nascabatur, nominatum est.
 Etum.

GENERA.

Duo apud nos genera Pisorum reperiuntur. Vnū in aruis caducum, humi serpens, quod genus Germani Klein feld Erueyssen nominant. Huius, utpote vulgaris, picturam haud damus. Alterum in altum scandit, arboribus aut palis quibus accubet adfixis, quibus sese capreolis vinciens illigat. Hoc Germani Grosz garten Erueyssen vocāt. Genus hoc pictum exhibemus.

FORMA.

Caules in terrā spargit concauos, ramososq; præ tenui surculo: folio frequenti præter cæterorum morem longiusculo: flore papilionis forma, circa umbilicum purpureo: siliqua oblonga seu cylindræa: granis rotundis, & ut Plinius lib. xviii cap. xii. ait, angulos multos inæquales habentibus: radice imbecilla: ut mirari satis non possim, unde plerisque suspicio orta sit, ut Pisum nostrum legitimum esse dubitauerint. Scio autem esse qui legumē hoc quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse Cicer arietinum, quod scilicet valvula seu siliquæ eius cornu arietini formam habeant. Quorum certè sententiam probare non possum, quòd, Plinio teste, Ci-

eer arietinum sic non sit dictum, quia valuula cōfigiem arietini cornu exprimant, sed quia legumen ipsum seu granum Ciceris arietino capiti simile sit. Eam autem formam legumen hoc quod Pisum nominamus non refert.

LOCVS.

Apricis gaudet locis, frigorū nanque impatiensissimum. Tepidum itaque locum, & cælum frequentis humoris desiderat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mēsibus floret, & subinde etiam semina in valuulis profert.

TEMPERAMENTVM.

Quum Pisum simile quid tota substantia cum faba, vt testatur Galenus, obtineat, necesse est vt non multum à medio temperamento in refrigerādo & exiccando recedat.

VIRE. EX GALENO.

Simile quid tota substantia cum fabis obtinent Pisa, nec alio quàm illa modo manduntur. In duobus autem euariant. Nō enim similiter ac faba inflant, nec abstergerendi facultatem habent, ideoq; segius quàm illa per aluum secedunt.

EX PAVLO.

Pisum molle quidem & laxum est, non tamen adeò inflat.

DE POLYTRICHO APV-
LEIANO. CAP. CCXLI.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Non temerè adiectum est Apuleū, ne scilicet
 quispian Diascoridis & aliorum Græcorum
 Polytrichon, quod sanè forma ab eo
 chū Apu= quod nunc describimus alienissimum est. Germa=
 leū cur di nicè à colore aureo quam habet, Guldiner Vuir=
 Etom. derthon vocatur. Officinis incognita est hæc her=
 ba. Polytrichon dicta est à ramulis, qui capillorum
 instar tenues sunt.

GENERA.

Duo Polytrichi Apuleiani damus genera. Vnū
 maius, alterum minus neque enim differunt nisi so=
 la magnitudine.

FORMA.

Ramulos habet capillorum instar tenues, colore
 aurum referētes, circumq; hos folia multa capilla=
 cea, in summo capitula lentis aqua icæ ferè forma,
 eiusdem cum ramulis coloris.

LOCVS.

Maius nascitur in pratis humidis & vliginosis.
 Minus in petris ac muris humidis.

TEMPVS.

Mense Iulio vtrunque reperitur.

TEMPERAMENTVM.

In caliditate & frigidityte symmetra sunt: dea=
 ficcant tamen, extenuant & digerunt.

VIREs.

Decoctum eorūdem in aqua aut lixivia capillo=
 rum

rum radices firmat, ideoq; in alopecia caput glabrū capillis vestit. Potum, viscosorum crassorumq; è thora-
 race pulmoneq; excreationibus non mediocriter cō-
 fert: lapides frangit, & vrinas ducit. Morbo regio
 correptis & licnosis auxiliatur. Strumas discutit,
 & in summa eadem quæ Adiantum potest. Recen-
 tiores superstitione quadam ducti illis multa ridi-
 cula & incredibilia tribuunt.

DE PERSICARIA. CAP. CCXLII.

NOMINA.

Non clām me est quām variè à multis diui-
 natum sit, quo nomine Persicaria vocata ve Persica
 teribus sit. Sed mea quicquid sentētia in vniuersum ria.
 omnes coniecturis vsi non satis firmis, decepti sunt.
 Et ego quidem fateor ingenuè, nec mihi constare
 num à veteribus descripta sit, tantum abest vt sci-
 re quæam quo illam appellauerint nomine. Vulgus
 herbariorum vno consensu hodie, quòd folia Persi- Persica
 ca habeat, Persicariā nominant. Germani Floh- ria vnde
 kraut, (Galli Curaige.) dicta.

FORMA.

Folia Persica arboris habet, fusca in medio ma-
 cula plumbaginè ve: caule geniculato, rubente, lon-
 go: flore spiceo, primū cādido, dehinc purpurco:
 semine minuto, radice lutea, numerosa.

LOCVS.

In humidis & palustribus locis frequentius pro-
 uenit.

TEMPVS.

Iulio

PLANTARVM HISTORIAE

Iulio & Augusto mensibus floribus ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Frigidam & admodum siccam esse gustus abundè monstrat: mirificè enim gustata adstringit.

VIRE S.

Vulnerariam herbam esse temperamentum eius satis docet. Rectè itaque iuniores medici in vulneribus, & maximè fistulis curandis vtuntur. Vtilis haud dubiè in dysenteria, aliisq; malis quæ refrigerationem & adstrictionem requirunt.

DE PERFOLIATA.

CAP. CCXLIII.

NOMINA.

AN hæc herba veteribus cognita fuerit Graecis & Latinis, affirmare certò non possum. Ego planè Cotyledonem putarem Dioscoridis, nisi radix in diuersam me traheret sententiam, quæ olinæ instar rotunda non est. Hodie tamen, quòd causa
Perfoliata cur dis-
ta. liata ab omnibus appellatur. Germanicè Durch-
uurchiz, & Bruchuurtz dicitur.

FORMA.

Caulis illi rotundus, rubescens, folia singula penetrās, quæ Pisorum foliis haud dissimilia sunt, tenuia admodum & glabra. In summo coliculi orum capitula, & in iis flores lutei, & semina formā ferè Tithymalli, quam vulgo Esulam nominant, præseferentia. Radix candida, fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in hortis sata, & interdum sua sponte in arenosis locis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, & subinde semina producit.

TEMPERAMENTVM.

Amara modicè est & adstringit, vt hinc colligi liceat calidam & siccam esse.

VIRE S.

Vulneribus et vlceribus tam externis quàm internis curandis aptissima est herba: hæc enim glutinat. Valet autem potissimum ad ramices puerorum sanandos. Auxiliatur etiam exulcerationibus et prominentiis vmbilici. Plurimus huius apud chirurgos vsus.

DE PORRO. CAP. CCXLIIII.

NOMINA.

ῥάσπον Græcis, Porrum Latinis & officin-

π cinis, Germa. Lauch (Gallis Poureau)

appellatur. Porrū autem dictum putant,

quòd porrò eat, & longè latèque grassetur.

Porrū vnde
de dictū.

GENERA.

Porri duo genera signauit antiquitas. Vnum capitatum, sic nominatū quòd eius radix in caput increascit atq; extuberet. Alterum sectium, cui frondens coma super terram eminens aufertur amputaturve. Hoc Germani pulchrè ad nomen Latinum alludētes, Schnittlauch, nomināt, et Bryszlauch.

Capitatu
Porrum.
Sectiuū.

FOR=

PLANTARVM HISTORIAE FORMA.

Capitatum simplici capite ex alba cervicis angustius extuberante constat, fronde super terram carinata, & in angulum oblonga. Sectino verò caulis est longus, intus canus, multis in vertice floribus acervatim collectis, & in speciem absoluti orbis conglomeratis, id quod in bimo accidit: quod etiam semmentescit, sparso per eius cacumen semine, & emoritur. Radix candicans, crassa, multis fibris capillata, ac tunicis quibusdam vestita.

LOCVS.

Leto solo gaudet, odit rigua.

TEMPVS.

Duodenigesimo die à satù prorumpit, bimatumque perfert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & extenuat perinde atque cepa, vt eius facultatibus euidentius innotescet. Simeon Sethi calidum & siccum in secundo facit ordine.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Porrum capitatum inflationem facit. Noxiū succum creat, difficilia insomnia parit. Vrinam ciet. Alio accommodum. Extenuat. Oculorum obscuritatem facit. Menses pellit, vesicam exulceratam, renesq; ledit. Cum ptisana verò coctum & comestum, ea quæ in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in desensionibus ad præclusiones vuluæ & duritias, utilis habetur. Vna & altera

altera aqua coctum, aut aqua frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet. Quare succus eius cum aceto, addito thure aut māna, sanguinem, maxime è naribus prorampentem, sistit. Venerè stimulat. Contra omnia thoracis vitia pro delinctu efficax est, & ad tabem comesium. Purgat etiam arteriam. Sed si assidue estur, visus obscuritate inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, contra bestiarum morsus auxilio est. Idem quoque illitus potest. Cum aceto, thure & lacte, aut rosaceo instillatus, aurium doloribus & sonitui prodest. Varos tollunt folia, cum rhoe opsoniorum illita. Epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis drachmæ binæ cum æquali baccarū Myrti pondere potæ.

EX GALENO.

Corpus calefacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinososq; incidit. Bis tamē aut ter in aqua decoctum, acrimonia spoliatur: quanquam ne sic quidem vim perdit extenuandi.

EX AETIO.

Porri capitati acris saporis veluti & cepe sunt, cuius ratione corpus calefaciunt, crassosq; humores attenuant, ac lentos incidunt, urinam prouocāt, sanguinem purgant. Præstantissimus vsus corū qui bis coquuntur: ita enim acrimoniam deponunt, neque
amplius

PLANTARVM HISTORIAE

amplius deprauatum succum retinent.

EX PAULO.

Porrum mali succi est & acre. Vt autē Dioscorides ait, grauiam facit insomnia, aluumque bonam, urinā cit & extenuat. Habet & abstergendi vim aliquam, cum ptisana: siquidem coctum, ea quæ in thorace sunt educit. Semē verò eius nephriticis miscetur medicamento. Folia etiam nonnihil adstringunt, ob eamq; causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

EX PLINIO.

Porro sectiuo profluvia sanguinis sisti in naribus, contrito eo obturatis, vel gallæ mixto, aut menthæ. Item ex abortu profluvia, potio succo cum lacte mulierū. Tussi etiā veteri, ac pectoris & pulmonis vitiiis medetur. Illitis foliis sanantur ambusta, epinyctides: ita vocatur vlcus aciem hebetans, & angulo oculi perpetim humor emanans. Quidam eodem nomine appellant pustulas liuentes, ac noctibus inquietantes. Et alia vlcera cum melle trito. Vel bestiarum morsus ex aceto. Item serpentium. Aurium verò vitia cum felle caprino, vel pari mēsurā mulsi. Stridores cum lacte mulieris. Capitis dolores si in nares fundatur, dormiturū sive in aurem, duobus succi cochlearibus, vno mellis. Succus & ad scorpētium scorpionumq; ictus in potu bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreantibus & phthificis, destillationibus

bus longis, vel succus, vel ex ipso cibus prodest. Itē morbo regio, vel hydropicis. Et ad renū dolores, cum ptisana succo acetabuli mensura. Idem modus cū melle, vulvas purgat. Testis verò editur & contra fungorum venena, imponitur & vulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietatē discutit. Sed oculorum aciem hebetare traditur, inflationē quoque facere, quæ tamen stomacho non noceat, ventremq; molliat. Capitato maior est ad eadem effectus. Sanguinem reiicientibus succus eius cum caule aut thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, vulvaq; contra Etas aperiri putat. Fertilitatem etiam fœminarum hoc cibo augeri. Contritū ex melle vlcera purgare. Tussim & destillationes thoracis. Pulmonis et arteriæ sanat vitia, datum in sorbitione ptisanæ: vel crudū, præter capita, sine pane, ita vt alternis diebus sumatur: vel si purulenta excrecentur. Sic voci vel Veneri, somnōque multum confert. Capita bis aqua mutata cocta, alui sistant. & inflationes venteres. Cortex decoctus illitusq; inficit canos.

EX SIMEONE SETHI.

Vrinam cit, & mali succi est. Assiduè comestum visus hebetudinē efficit. Difficilia inuehit somnia, & stomacho nocet. Semen genitale calefacit, & capitis dolores excitat. Iecur, renes & vesicam lædit. Cōfert ad hæmorrhoidas. Bis verò aqua coctū, & aceto, & garo & oleo, cuminoq; cōditū, salubre est

PLANTARVM HISTORIAE

iii qui frigido sunt stomacho.

DE PVLMONARIA. CAP.

CCXLV.

NOMINA.

VT veteribus Græcis & Latinis nominata sit hæc herba, nōdum scire licuit. Hodierni temporis medici & herbarij Pulmonariam vocāt, Germani Lungēkraut, (Galli Herbe à Poulmō.) Pulmonaria: Sic i utem haud dubiè appellari cœpit, quòd pulmonaria cur nonnum vitiis, exulcerationibus potissimum eorundē, minata. præsens remedium sit.

FORMA.

Folia mollia habet, inuicem incumbētia, leniter laciniata, cauis multis prædita, superiore parte viridia, inferiore in luteo albicantia, ac veluti punctis aut pustulis quibusdam notata, atque hoc nomine aliquam pulmonis humani formam referentia: vnde etiam Pulmonariam dictam esse coniicimus.

LOCVS.

Prouenit in quercu arbore, & saxosis locis.

TEMPVS.

Tota æstate inuenitur locis iam monstratis.

TEMPERAMENTVM.

Recētiore frigida & humidam esse, mea quidē sentētia, falso statuunt admodū enim adstringit, vt hoc nomine idem cum quercu in qua nascitur habeat temperamentū. Desiccat itaque et paulò infra media calefacit, in genere eorum quæ tepida sunt.

VIRE S.

Desiccandi & adstringendi facultatem obtinet, quamobrem vulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis. Ad incipientes quoque ac crescentes phlegmonas utilis: nam quæ iam vehementes sunt, adstringentia respuunt. Confert autem haud dubiè etiam ad muliebri profluvium, & sanguinis expuitiones, & diuturnos alui fluores.

DE PTARMICE. CAP.

CCXLVI.

NOMINA.

Pταρμικὴ Græcis, Sternutamentaria Latini dici potest. Sunt qui sylvestre Pyrethrū nominent, quòd scilicet Pyrethri modo, quanquam mitius, linguam vellicet. Atque hinc est quòd nonnulli pro vero Pyrethro seducti eius titillante acrimonia, descripserint. Germanis Vuilder Bertram appellari potest. Ptarmice dicta est, quòd flores eius naribus obiecti sternutamenta eliciunt.

Sternutamentaria
a
Sylvestri
Pyrethru

Ptarmice
cur dicta.

FORMA.

Brevis frutex est, parvis, multis, teretibus, & abrotono similibus ramulis, circa quos folia multa, oblonga, oleaginis similia. In summo Chamæmeli capitulum, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, vnde nomen inuenit. Haclenus Dioscorides. Quòd si itaq; naturam atque imaginem eius fruticis rectè expendas, vndiquaque ei planta cuius picturam damus, hæc descriptio quadrabit.

PLANTARVM HISTORIAE

Nā su culis fruticat exiguis, multis, rotūdiis, Abro-
tono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui foliis
frequentibus, longiusculis, olcæ similibus, angustis,
vtrinq̃ue leniter serratis ambiūt, cacumine Anthez-
midis umbellam obtinente, quæ acris suo odore na-
res feriens sternutamentum irritat.

LOCVS.

Inuenitur sæpius in mōtib. altis & saxosis locis.

TEMPVS.

Floret æstate: radix eius extremo effoditur au-
tumno.

TEMPERAMENTVM

Eius temperies est calida & sicca, viridis etiam
num ordine secundo, siccata tertio.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus illita sugillata emendare poss-
sunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent.

EX GALENO.

Ptarmices flores cienda sternutationis vim ob-
tinent, vnde & herba nomen. Sugillata & reli-
quas ecchymosēs discutit.

EX PAULO.

Ptarmices folia sternutamenta mouent. Totus
autem frutex viridis sugillata, liuorēsque alios
disiicit.

DE PYRETHRO. CAP. CCXLVII.

NOMINA.

Πύρεθρον Gracè, Salin iris Latinè dicitur.
Officina Gracā appellationem retinuerūt.
Germanicè

Germanicè Bertram, (Gallicè Pied d'alandri, Pyrethrò ou pied de liandre) nominatur. Pyrethron autē cur dictū à feruido, ac ignis simili, qui in eius radice est sapor Salinaris re, Græci dixerunt. Salinaris verò, quòd mansa vel herba quæ ore tantum detenta eius radix, copiosam salinam re nominat, Romanis appellata est.

FORMA.

Herba est caulem foliaq; sylvestris Dauci, & Fœniculi instar proferens. Umbellam Anetho similem orbiculatam. Radicem pollicis crassitudine, longam, sapore feruidissimam. Hæc Dioscorides. Vbi nobis monendus venit lector, Pyrethrum nostri soli non ex omni parte huic descriptioni respondere. Nō Pyrethrū enim umbellam anetho similem, sed anthemidis nostrum potius orbiculatū capitulū, quod Ptarmici tribuit Ptarmices Dioscorides, habere deprehenditur. Cætera omnia flores ob- ad amussim respondent. Siquidem habet Pyrethrū tinct. caules & folia Dauci sylvestris & Fœniculi, radicem pollicis crassitudine, gustus ardentissimi.

LOCVS.

In Germania nostra, quòd sciam, non nisi plantatum provenit.

TEMPVS.

Floret æstatis maxima parte.

TEMPERAMENTVM.

Excalfacit & siccatur in tertio ordine, vel ut aliqui putant, in quarto.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Xij

Pituitam

PLANTARVM HISTORIAE

Pituitam elicit radix : ideoq; dentium doloribus decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, inuncta ex o'eo, Diuturnis rigorib. efficax. Contra refrigeratas partes corporis ac resolutas eximiè conducit.

EX GALENO.

Pyrethri radice potissimum vtimur vrentem facultatem obtinente, qua vtique dentium etiam refrigeratorũ dolores mitigat. Et ad rigores ante circuitum cum oleo infricatur. Ad hæc stupidos & resolutos adiuvat.

EX PAVLO.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentium qui frigori patuerunt dolores lenit. Item ad febrium rigores ante circuitum infricatur cum oleo. Ad hæc iis quorum corpora ex refrigeratione stupent, & resoluta sunt, efficacissimè adhibetur.

DE PYXO. CAP. CCXLVIII.

NOMINA.

Πύξος Græcis, Buxus Latinis, Germanis Buchszbaum (Gallis Du Bouys) dicitur.

FORMA.

Arbor immortalis coma virens: folio Myrti, exiguo, subrotundo: flore herbacco : semine rufo & retundo, omnibus animantibus inuiso.

LOCVS.

Gaudet frigidis & apricis, plurimaq; vbiq; Buxus.

TEMPVS.

Perpetua

Perpetua fronde viret, neque ei vlllo tempore decidūt folia. Quo nomine potissimum hanc celebrat germanica illa cantilena, eiusdem ac Salicis contētionem continens.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores temperatam eius arboris essentiam esse statuunt, id quod ob multas causas, quas recensere superuacuum est, non videtur verisimile. Haud dubiè verò adstringit, atque adeo exiccat.

VIRES.

Non admodum magnus Buxi in medicina vsus est. Folia eius in lixiuio decocta rufant, aut flavescere efficiūt cupillos. Scobem eius decoctam in aqua alui profluiū sanare tradunt. Somnum capere sub hac arbore, cerebro vehementer incōmodat, quòd eius odor naturæ prorsus aduersetur. Ferunt serpentes vulneratas eius radice degustata, statim sanitatem recuperare.

DE PETASITE. CAP. CCXLIX.

NOMINA.

ΠΕΤΑΣΙΤΗΣ Græcis, Petasites Latinis appellatur. Officinis penitus ignota. Germanis Pestilētzuurtz nominatur, quòd nimirum eius radix præsentaneum sit contra pestilētiales febres remediū. Petasites autem à petaso, quare dipilium significante, dicta est, quòd folium eius pediculo superpositum, petasi modo amplum, vt fungus dependeat.

PLANTARVM HISTORIAE FORMA.

Pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, in quo petasi figura folium magnū, vt fungus dependet. Ex qua sanè descriptione satis perspicuum fit, herbā cuius picturam damus esse *Petasitem*. Hac enim statim inter initia Martii, flores suos in albo purpureos, agg'omeratos, & botri figurā referentes profert, citra quidē folia, quod Dioscorides omisit. Hi marcescētes sine fructu abeunt ac decidunt. Postea purpureos emittit pediculos, cauos, hirsutos, quibus folia superposita sunt magna, pilei ampli figuram obtinentia, supernè viridia, infernè verò candicantia, quæ in tantam crescunt amplitudinē, vt vnum interdū, orbicularem mensam prorsus tegat. Radix illi crassa & longa, intus candida, vehementer odorata & amara. Quibus accedit, quòd vires huius herbæ à viribus *Petasites*, vt ex sequentibus patebit, non discrepent: vt hoc nomine nihil euidentius sit, quàm eam herbam esse planè veterū *Petasitem*. L O C V S.

Nascitur copiosissimè in pratis humidis & iuxta riuulos situs. T E M P V S.

Initio Martii mensis, vt comprehensum est, floribus suis conspicua est herba, qui Aprili imminente statim citra fructum decidunt. Quo facto folia cum pediculis suis prodeunt.

T E M P E R A M E N T V M.

Ex tertio est ordine desiccantium, id quod amaritudo

ritudo eius, quàm gustu deprehendimus, facile monstrat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Facit ad maligna & phagedænica vlcera tritum & illitum.

EX GALENO.

Ad maligna & phagedænica vlcera, ea vtütur. Idem etiam de Petasite tradit Paulus.

APPENDIX.

Experimento comprobatum est radicem hãc misce conferre pesiilentialibus febribus, quòd sudorem vehemèter moueat, si in puluerem redacta cū vino sumatur. Nec minori efficacia bibitur à mulieribus quas vteri tormina & præfocationes exercèt. Valet etiam vnicè ad enecandos lumbricos. Succurrit quoque iis qui spiritus difficultate laborant. Ducit vrinam & menses. Efficax est ad vulnere præhumida, & ad reliquas cutis fœditates Hæc verò posse, amaritudo eius euidentissimè docet, cuius quidem hæ sunt facultates, vt ex iis quæ sæpe iam diximus, & Galenus lib. iiii. de simpl. medica. facul. cap. xvii. fusius docet, manifestum est.

DE PERICLYMENO. CAP. CCL.

NOMINA.

Sylua ma

Pερικλόμενον Græcis, Volucrum maius Lat. ter. tinis, Scribenio Largo Sylua mater, vulgò Caprifolium & Mater sylua, & nonnullis Liliolum. Licet inter spinas dicitur. Germanis Geyßblatt, Speck liu inter
 x iij oder spinas.

PLANTARVM HISTORIAE

Pericly- oder Vualdgilgen, & Zeunling (Gallis Che
menon urefueille.) Sic sanè dictum, quòd circumuoluen-
unde di- do ad se vicinas arbores aut frutices vocet.
ctum.

FORMA.

*Simplex frutex est, ex interuallis folia spargens
 ipsum amplectentia, subcandida, Hederae similia:
 flores candidos, Fabae similes, subrotundos, quasi in
 folium procumbentes: semen durum, & quod diffi-
 cilè vellitur: radicem crassam, rotundam. Ex qua
 quidem descriptione perspicuum sit, fruticem quẽ
 pictum exhibemus esse Periclymenon: siquidem
 caulibus suis vicina amplectitur, gemina per inter-
 ualla umbilicata folia habens, à terra cæsiis, super-
 nè herbosis ad Hederae similitudinem: flores albos,
 Fabae non dissimiles, subrotundos, potissimum ante-
 quam dehiscant, baccas hederaceas aut Rusci, ra-
 dicem crassam.*

LOCVS.

*Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se vici-
 nis fruticibus. Nunc in hortis etiam passim plan-
 tatur.*

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

*Vehementer calefacit & desiccatur, id quod gu-
 stu etiam ipso deprehenditur. Folia siquidem acri-
 moniam quandam præ se ferunt gustata.*

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius semen postquam maturuit collectum, &

in vmbra siccatum, drachmæ pondere datur in vino quadraginta diebus, vt lienē minuat absumatque, & lassitudinem discutiat. Orthopnœæ & singultui prodest. Vrinam cit à sexto die cruentam. Partum accelerat. Habent easdem vires & folia: quæ trigintaseptem diebus pota, sterilitatē facere produntur. In periodicis febribus cum oleo inuncta, earum horrores mitigant.

EX GALENO.

Periclymeni utilis est tum fructus, tum folia, adeò vehementer incidentis, & excalescentis facultatis, vt si plusculum bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant. Principio quidam vrinam tantum mouent: porrò foris cum oleo illita calfaciunt. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est, drachmæ vnius pondus cū vino. Cæterum desiccat quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnino bibentibus afferre. Sunt etiam qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, quemadmodum Dioscorides, qui septem & triginta dies eos tradi refert. Hic quoque cruentam vrinam reddi à sexto die memorat.

EX PLINIO.

Semen eius in vmbra siccatum tunditur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, eumq; vrina cruenta, aut per aluum absumit, quod intelligitur

PLANTARVM HISTORIAE

tur à decimo statim die. Vrinam cient & folia decocta, quæ & orthopnoicis prosunt.

APPENDIX.

Ex iam commemoratis facultatibus nemo non intelligit fruticem hunc esse Periclymenon: cum enim gustu acrimoniam præ se ferat, necesse est omnia hæc quæ veteres Periclymeno tribuunt, possit. Quibus accedit, quod recentiores etiã herbarii suo Caprifolio easdem vires assignent. Exiccare enim ipsum tradunt vlcera humida & sordida, sanare impetigines & alias cutis fœditates, lienem assumere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere, & alia posse quæ non attinet referre.

DE PYRO. CAP. CCLI.

NOMINA.

Triticum **unde dictum.** **Π**υρὸς Græcis, Triticum Latinis dicitur. Officina antiquum latinum nomen retinuerunt. Germa. Vueyssen (Gal. Ble, ou foimēt) appellatur. Triticum vero dicitur, quod tritum ex spicis sit, ut autor est Marcus Varro.

GENERA.

Primum. Tritici summa genera tria observant qui frumētaria rei periti sunt. Primum quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstet, Germanis simpliciter Vueyssen nominatur. Secundum trimestre, & nonnullis Sitanium dicitur. Trimestre quidem, quod tertio ferè satum mense maturescat:

id quod tamen nostro in orbe non sit, in quo Martio mense satum, quinto tandem, hoc est, Iulio mense metitur. Germanis Amelkorn dicitur, haud dubiè non alia ratione, nisi quòd ex hoc genere tritici amyllum optimum conficitur. Eius picluram dare hoc tempore non potuimus. Tertium genus tritici, non vndiquaque notum Germanis Vuellicher V. ueyssen, & Vuelkerkolb dicitur. Tertium

FORMA.

Primum tritici genus culmo est quàm hordecum altiore, tribus geniculis constāte, folio arūdinco, spica à foliis remotiore, incondita, & in nullos versus disposita. Exeritur in area, vt alia quadam frumēta. Alterum culmo, geniculis, graniq; priori simile, nec ab eo differt, nisi quòd spicam multis arīstis vallatam, & in duos versus dispositam obtinet.

Tertium genicula habet quaterna, aliās præcedenti per omnia propemodum simile.

LOCVS.

Passim prouenit Triticum primi & secundi generis. Postremum in Alsatia, & agro Tubingensi gignitur.

TEMPVS.

Floret, vt alia ferè omnia frumenta, Iunio mense: in Iulio autem metitur.

TEMPERAMENTVM.

Triticum vt medicamentum feris impositum, primi est ordinis excalefacientiū, nō tamē nec resiccare, nec humectare manifestò potest. Porro quod ex

PLANTARVM HISTORIAE

eo conficitur amyglū, eo tū frigidius est, tum siccius.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Optimum ad secundæ valetudinis vsum Triticum habetur quod recens & iam perfectè adultū, & colorem mālī refert. Crudum in cibis rotundos lumbricos gignit. Canum morsibus prodest māsūm & illitum. Cōfectus ex eius similagine panis, plus alit quā cibarius, quem Græci στυγομισθόν vocant. E. Sitanii farina panis leniorem cibum præbet, & qui facîle in membra demandetur. Farina eius cum hyoscyami succo illinitur aduersus nervorum fluxiones. Item contra intestinorum inflationes. Lentigines ex oxymelite tollit. Furfures autem acri in aceto elixi & calentes illiti, lepras pellunt. Incipientes etiam inflammationes omnes illiti leniunt. In Rutæ verò decocto elixi, mammas turgentes sedant. Viperarum ictibus auxiliantur, & torminosis prosunt. Confectum ex farina triticea fermentum calefaciendi extrahendiq; vim habet. Priuatim quæ in plantis pedum sunt extenuat. Catevra tubercula, furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitanii farina contra venenatos ictus cū aceto aut vino commodè illinitur. Eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruenta excreantibus succurrit. Contra tuſsim & exasperatam arteriā, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydreleo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & cū melicrato

licrato coctus & crudus inflammationes omnes illitus mulcet, cum emolliat, & quadantenus refrigeret, mixtus herbis succisq; quibusdam. Vetus autem & aridus per se, adiectisq; aliis quibusdam, citam alum cohibet. Recens muria maceratus & illitus, vetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidius cochlearis mensura detur sorbendum.

EX GALENO.

Triticum quiddā lentoris, & obstruentis naturæ habet. Quod verò ex pane fit cataplasma, vim obtinet magis digerentem, quàm quod ex Tritico: nimirum quum & salem & fermentum panis adiungat habeat: quippe cum fermentum vim habet attrahendi digerendiq; ea quæ in alto resident. Plura de Tritico petenda erunt ex capite primo, libri primi de alimentorum facultatibus, quo in loco variæ panis species exponuntur.

EX PLINIO.

Grana Tritici ferro combusta, iis quæ frigus vaserit presentaneo sunt remedio Farina ex aceto cocta, nervorum contractionibus auxiliatur: cum rosaceo verò & fico sicca myxisq; decoctis. Item suppuratis nervis cum hyoscyami succo illinitur. Ex aceto & melle lentigini. Furfures tonsillis faucibusq; gargarizatione profunt. Sex. Pompeius prætorii viri pater, Hispaniæ citerioris princeps, quum horreis
suis

PLANTARVM HISTORIAE

suis venti'andis praesideret, correptus dolore podagra, mersit in Triticū sese super genua, leuatiūque siccatis pedibus mirabili modo, hoc postea remedio usus est. Vis tanta est, vt cados plenos siccet. Paleā quoque tritici vel hordei calidam imponi ramiciū incommodis experti iubent, quāque decocta sunt aqua foveri.

DE POTAMOGETONE.

CAP. CCLII.

NOMINA

ΠΟΤΑΜΟΓΕΪΤΩΝ, ἢ ΣΑΧΥΪΤΗΣ Græcè, Fontalis & Potamogeton Latinis dicitur. Officinis ignota est herba. Germanis Sunkel ut

Potamogeton unde Stachyites.

vocatur. Potamogeton autem quasi fluminibus vicina dicta est: siquidem aquosis & palustribus locis nasci amat. Stachyites verò quasi spicata, ob caulē quē ex se mittit floribus & semine spicatū.

FORMA.

Folium Betæ simile habet, densum, & paulum extra aquam emiens. Ex qua quidem breui admodum delineatione satis intelligi potest, herbā cuius picturam damus esse Potamogetonā. Caulē nāque rotundum habet, geniculis intersectum, è quibus pediculi exeunt foliis Betæ aut Plantaginis vestiti, paulum supra aquam eminentibus. Flores etiā spicatos, Plantaginis instar, profert ac subinde semē. Quid multa? folia huius herbæ planè referunt folium Indum vocatum officinis.

LOCVS.

Nascitur in lacustribus & aquosis locis.

TEMPVS.

Floribus pragnans est Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat, vt gustus etiā abunde docet. VIRES. EX DIOSCORIDE.

Refrigerat & adstringit: pruritibus, vlceribusq; vetustis, & iis quæ pascendo serpunt, confert.

EX GALENO.

Adstringit & refrigerat similiter Polygono, sed essentia eius crassior quàm Polygoni est.

EX PLINIO.

Potamogetō ex vino dysentericis & cæliacis medetur. Peculiariter refrigerat, spissat. Vñ in foliis, cruribus vitiosis utilia, & contra vlcerum nomas, cum melle vel aceto,

DE PEDE ANSERINO.

CAP. CCLIII.

NOMINA.

Quo nomine veteribus tum Græcis tum Latinis sit appellata hæc plāta, nondum cognoscere potui: quapropter nouam vt illi nomēclaturā inderē necesse fuit. Aliā autē & commodiorē non licuit inuenire præter eam, quā alludētes ad germanicā appellationē imposuimus. Nā si fo- *Pes anseri*
lia eius spectes in ambitu laciniata, planè anserini nus cur di
pedis formam ac similitudinē representant. Hinc etia.
apposita

PLANTARVM HISTORIAE

appositissimè Germanis nostris vocata est Gensz-
fusz, oder Genszfusz! e. Quñ verò eadem her-
ba suis inimica admodum sit, atque adeò mortem
inferat, factum est vt à muliereulis etiam sit nomi-
nata Seutod, & Schueinsztod. Etsi verò in
officinis eius herbae nullus sit vsus, tamen quia pas-
sim nascitur, & temerè fortassis à nonnullis vires
eius ignorantibus vsurpari posset, eā silentio trās-
ire nolimus, quò scilicet facultas tam vulgaris
herbae omnibus patefieret.

FORMA.

Caulem profert cubitalem, striatum: folia ad Ha-
licacabi formam accedentia, in ambitu tamen la-
ciniata, atque adeò anserini pedis speciem referen-
tia: flores exiguos rubentes, semē racematim, velu-
ti in atriplice syluestri, singulis ramis insidēs: ra-
dicem obliquam, multasq; adnascantias habētē.

LOCVS.

Passim in hortis, aliisq; locis vbi simum reponi-
tur, nasci solet.

TEMPVS.

Iunio mense potissimum floret.

TEMPERAMENTVM.

Haud dubiè in secundo refrigerat ordine, non se-
cus atque Solanum hortense.

VIRE S.

Suis exitiū affert herba hæc comesta, id quod
experientia cognitum est. In humano corpore idem
potest

potest quod Solanum hortense. Quare facultates eiusdem suo quares loco.

DE PETROSELINO.

CAP. CCLIIII.

NOMINA.

ετρoσέλινov Græcis, Apium saxatile Latine Apium saxatile, & Petroselinum appellatur. Germanicè xatile.

frembder Petersilien Gallicè Persil, ou

Persil des Roches & lieux pierreux) nominari commodè, ad alterius quod Orcoselinum est, ut

suo diximus loco, differentiam, potest. Officinæ eius Officina-herbæ cuius nunc picturâ damus semine pro Amomum utuntur, non tamen sine magno errore, quoniam constat omnibus, modò conferre inter se utriusque historiam non pigeat, Amomum ab ea herba esse diversissimum. Nos ut tandem sciremus à qua stirpe semine hoc decerperetur, terræ illud mandavimus, & hæc

cuius pictura formam ostendit herba erupit, quam nos verum esse Petroselinum, ut paulò post ostendimus, credimus. FORMA.

Petroselinum, inquit Dioscorides, semen Ammi simile obtinet: odoratius tamē, acre, & aroma olēs. Brevis quidem delineatio hæc est, atque imperfecta, ut nihil mirum sit, nos hæctenus quod verum esset Petroselinum nō potuisse cognoscere. Merito itaque hoc loco, ut compluribus etiam aliis, Dioscorides negligentia insimulari potest, ut qui mancas ac des negligenter mutilas plerasque posteritati relinquere stirpiū huius gentia in-

PLANTARVM HISTORIAE

simulatur.

storias voluerit. Si verò quispiam paucas etiā has notas expendat, haud dubie herbam hanc cuius pieturam oculis subiicimus, Petroselinum esse compertiet. Semen enim eius Ammi tam simile est, vt ab eo vix discerni queat: odorati⁹ etiam existit, & acre, ac aroma olet. In summa, nulla est nota quæ illi non respōdeat, vt hoc nomine verum Petroselinum esse credā. Quinetiam tota eius herba forma, quæ nō multū à nostro & Germanico Petroselino abest, atque odor, Selini speciē esse dacent, vt pro Petroselino vsurpare hanc ipsam officinā tutò possint: semē enim quo hodie vtuntur, non Macedonicum Petroselinum, sed Hipposelinū, vt suo diximus loco, existit.

LOCVS.

In Macedonia frequens optimumq; nascitur, hinc Macedonicum dicitur: inque saxis & præruptis potissimum locis, vnde cæpit appellari Petroselinum. Nascitur & aliis in locis, vt lib. i. de antidotis testatur Galenus, at minus laudatum.

TEMPVS.

Floret Augusto mense, atque subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Petroselinum vt gustu acre est cum amaritudine, sic & in operibus calidum. Fucrit itaque & ipsum tertii ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, & menstrua ducit. Stomachi & co-

in inflammationibus auxiliatur, & torminibus. La-
terum quoque, renum & vesicæ doloribus in potu
sumptum succurrit. Miscetur antidotis urinā cien-
tibus.

EX GALENO.

Petroselinæ semen maximè vsui est, quum tota
etiam herba vnà cum radice similem, sed imbecil-
liorem facultatem sortiatur. Incidendi etiam vim
habet: hinc menses & urinas largiter prouocat. Fla-
tus quoque extinguit.

APPENDIX.

Sunt qui hanc herbam quam pro Petroselino dac-
mus, Sisona esse putent: quorum sententiæ cur non
magnopere repugnem, facit in primis Dioscorides,
qui Sisona perinde atque Petroselinum suis notis
haud descripsit. Dein quod viribus non discre-
pent, atque adeò in vsu huius aut illius nullum sit
periculum. Nos tamen nostram sententiam propter
adductas paulò antè rationes deserere, nisi eiden-
tibus conuicti argumentis, non possumus.

DE ROSA. CAP. CCLV.

NOMINA.

Pῶσον Græcè, Rosa Latinè, officinis eodem serua-
to nomine appellatur. Germanicè Rosen (Gal-
licè Rose.) Rhodon autem Græcis, Plutarcho Rhodon
autore, nominatur, quòd largum odoris effluuium cur dictū.
emittat.

GENERA.

Theophrastus libro sexto, cap. vi. de plantarū hi-
Y y storia,

PLANTARVM HISTORIAE

istoria, genera rosarum multa esse tradit, quæ foliorum multitudine, paucitate, asperitate, leuitate, colore & odore differunt. Plinius etiam li. xxi. cap. iij. ex loci diuersitate multa rosarum genera colligit. Nos simpliciter duo duntaxat illarum genera faciemus, syluestres scilicet & domesticas. Syluestres, quæ etiã *Canina rosa* vocatur, asperiores tũ virgæ, tũ folijs sunt, ac odore, colore, magnitudine à domesticis superantur. Germani Heydrosen, & Vuil-drosen vocant. In vtroque verò genere duplices existunt, punicea nimirum & candida. Nos vtrunque genus vna pictura complexi sumus.

FORMA.

Vulgò omnibus nota est rosa. Virgas siquidẽ suis maculis tinctas, & aculeis plenas emittit: folia incisuris diuisa, nigricantia & aspera. Germinat primum inclusa granoso cortice, quo mox intumescit, & in virides alabastrors fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantis complexa luteos apices staminaq; capillamentis insidentia, quæ propriè flores dicuntur. Syluestris spongias etiam producit, quas pleraq; officina Germaniæ nostræ, non sine detestando errore pro Bedegar usurpant: fructum quoque parit rotundum, initio viridem, dein puniceum.

LOCVS.

Domestica passim in hortis prouenit. Syluestris etiã nusquã non in cæpestribus & dumetis nascitur.

T E M P V S.

Rosa vt nouissima inter vernos flores erūpit, ita etiā statim deficit. Decerpēda itaque crit Iunio mēse ubi primū erupit, ne mox nusquam compareat.

T E M P E R A M E N T V M.

Rosarum vis ex aquea calida substantia dualius aliis qualitatibus, adstringenti videlicet & amaræ mixta, composita est. Flos earum magis etiam ipsis Rosis adstringit, ac proinde sanè exiccatorius est.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca magis adstringit. Succus recentibus foliis exprimendus, detracto forfice vngue. Sic appellatur quod cādidū Vnguis. est in folio: reliquū mortario premi & teri debet in vmbra donec densetur, & ita ad oculorū circūlitio nes recondi. Siccantur etiam folia in vmbra crebro versata, ne mucescant. Ex aridis rosis in vino decoctis expressus liquor, ad capitis, oculorū, aurīū, gingivarū, sedis, recti intestini ac vuluæ dolores penna illitus, collutus infususve, cōducit. Eadē sine expressione cōtusa & illita, præcordiorū inflāmationibus, stomachi humiditati, et sacris ignibus medetur. Siccæ ac tritæ femorib. insperguntur. Misceri solent cōpositionib. quas antheras vocant, & vulnerariis antidotis. Vriuntur folia ad honestandas palpebras. Flos qui in mediis Rosis inuenitur siccatus, gingivarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota, aluū profluentē, & sanguinis reiectiones sistunt.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO.

Vsus succi ad aures, oris ulcera, gingivas, tōsillas, gargarizatu: stomachum, vulvas, sedis vitia, capitulis dolores. In febre per se, vel cū aceto ad somnos, nauseas. Folia vruntur in calliblepharum. E siccis foemina asperguntur. Epiphoras quoque aridas leniunt. Flos somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum maximè albas, in posca potus, et sanguinis excreationes. Stomachi quoque dolores, quantū in vini cyathis tribus. Semen his optimū crocinum, nec anniculo vetustius, & in vmbra siccatur. Nigrum inutile. Dentium dolori illinitur. Vrinā ciet. Stomacho imponitur. Item igni sacro non veteri. Naribus subditum caput purgat. Capita pota, sanguinem & ventrē sistūt. Ungues Rosæ epiphoris salubres sunt: ulcera enim oculorum Rosa sordescūt, præterquàm initiis epiphoræ, ita vt arida cum pane imponatur. Folia quidem vitis stomachi, rosionibus, & vitis vëtris, & intestinorum, & præcordiis utilissima vel illita. Cibo quoque Lapatimodo coniungitur. Cauendus quoque in iis situs celeriter insidens. Et aridis & expressis aliquis vsus. Diapasmata inde sunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida abluantur. Sylvestris cum adipe vsino alopecias mirificè emendat.

EX SIMEONE SETHI.

Odorata calidis capitibus prodest, humida verò offendit, eaq; destillationi obnoxia reddit. Sumpta verò

verò ad febres ex flaua bile procreatas iuuat, & roborat stomachum & iccur. Proprietate autem quadam testes lædit, prohibetq; acres exhalationes ne in caput ferantur.

APPENDIX.

Spongiolæ ac fructus Cynorrhodi seu syluestris Rosæ mirificè valent contra calculū, & vrinæ difficultates, si lenigatæ in puluerem exhibeantur.

DE RAPHANO. CAP. CCLVI.

NOMINA.

Ράφανος, ἡ ῥάφανις Græcis: Raphanus, Radix, Radicula Latinis (Gallis Raue, ou Rêfort) dicitur. Hæc autem generis sunt nomina, idcirco que errant non pauci nostra ætatis medici & herbarii, qui Radiculæ nomen ad satium duntaxat Raphanum transferunt. Raphanus autem sibi nomen ἀπὸ τοῦ ῥά φαίειν, id est, quod faciliè appareat, adsciuit: nam die tertio à satū profilit. Radicis verò nomen sibi arrogauit, quod ceteras amplitudine corporis superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat. Etenim plerumque in tantam molem coalescit, vt frigidis locis quibus gaudet, sicut in Germania, Plinio lib. xix. cap. v. teste, infantium puerorum magnitudinem æquet. Et memini me stupendæ magnitudinis Raphanos Erfordia, Turingia celeberrimo oppido, vidisse.

Raphanus unde dictus.

Radix.

GENERA.

Raphani Græci duo faciunt genera, satini & syl-

Y iiij uestris,

PLANTARVM HISTORIAE

Raphanus minor uestris. Satiuus officinis hodie peculiariter **Raphanus minor** dicitur, Germanicè **Rettich**. Sylvestris **Armoracia** Latinis **Armoracia** appellatur. Germani ad vocem Romanam alludentes, **Merretich** & **Kren** nomen. Noſtri hodie herbarii, ſua potius quàm veterum autoritate freti, Radicem ſimpliciter, generis nomine, vocant. Nonnulli **Raphanum** maiorem appellant, propter folia ipſa, quæ ſatiui folia magnitudine ſuperant: aut quia acrimonia maiore, aut viribus efficacioribus præditus eſt.

FORMA.

Satiua radix. Radix ſatiua caudice vno aſſurgit nonnunquam arboreo, radice ad **Rapi** ſimilitudinē, foliis lacinia-
tis, angulisq; horrida: floribus candidis, & ſemine in ſiliquis. Sylveſtris dicta **Armoracia** fronde copioſior quàm corpore, folia ſatiuæ ferè ſimilia habet, magis tamen ad **Lăpſanæ** formam accedentia, longa & acuta: radicē gracilem, mollem, Sinapi inſtar acerrimam, adeò vt caput tentet, & lachrymas incitet.

LOCVS.

Raphanus in hortis naſcitur. Amat autem terrā pinguem, **Palladio** lib. ix. cap. quinto teſte, ſolutam & diu ſubaſtā. Sylveſtris etiam hodie in hortis habetur, ſicq; translatus ad culta, edomita feritate mi-
teſcit meliorq; fit. Creſcit aliàs circa margines itine-
rum, & loca arenosa, inq; pratis nonnunquam ſua ſponte copioſe prouenit, vt fit in prato ad oppidum **Tubingam** ſito, ſacrificorum vocato.

TEMPVS.

Cum frigoris patientissimus sit Raphanus, non solum æstate, verum etiã hyeme colligi potest. Estq; illius vsus quotidianus. Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Raphanis satius excalefacit quidem ordine tertio, desiccatur verò secundo. Sylvestris autem in utroque efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Raphanus satius excalefacit, flatus gignit, oris suavis est, sed stomacho inimicus. Ructus & urinam cit. Bonã facit aluum. Si quis à cibo ipsum sumpserit, distributioni eius magis cõferet. Præsumptus autẽ, cibum subleuat. Prodest ante cibum datus vomituris. Sensus exacuit. Decoctus cõtra veterẽ tußim, & crassitiem in thorace natam prodest. Cortex eius cum oxymelite sumptus maiori efficacia vomitiones citat. Hydropicis utilis. Illitus lienosis etiam confert. Cum melle ea quæ serpendo pascunt sistit. Sugillata tollit. Contra viperarũ ietus auxiliatur. Alopecias pilis explet. Lentigines cũ farina loliacea exterit. His qui à fungis strangulantur subuenit. Menses trahit. Semen eius vomitum proritat, urinamq; mouet. Cum aceto potum lienem extenuat. Coctũ cũ oxymelite calido angina laborantibus vtiliter gargarizatur. Cõtra Cerastris morsum ex aceto potum auxilio est. Cum aceto illitum
gangrenas

gangrenas efficaciter disrumpit scarificatve. Syl-
uestris tam folia quàm radix olerum modo in ci-
bo coquuntur. Excalefacit autem, vrinam cit, & fluo-
sus est. EX GALENO.

Facultas inest Raphano discutiendi, itaq; ad sugilo-
lata, & alios id genus liuores ob eam facultatē con-
ducit. Radix eius ex eorū numero est quæ opsonij
potius quam nutrimenti nomine frequenter come-
duntur. Vis illi extenuatoria, cū qua conspicuē vnā
excalfacit: aquis enim in ea qualitas exuperat. Ver-
no tempore caulem in altum assurgentem produce-
re solet, cū alia quæ nata sunt excaulescere. Hic
elixus estur ex oleo, garo & aceto, vt Rapæ caulis,
Sinapi & Lactuce. Et sanè caulis hic magis quàm
crudus Raphanus nutrit, vt qui acrimoniam in a-
qua deponat: quanquā minimā sanè & ipse alendi
potestatē habeat. Quidā non solum caulem, sed vnā
Raphanos ipsos elixantes comedunt Raparum mo-
do. Caterū cum medicos, tū idiotas illos mirari
subit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuuandæ
gratia edunt. Ipsi quidem se experientia id abundē
compertum habere dicunt, nullus tamen exemplū
illorum sine dāmo imitari potuit. Hactenus Gale-
nus, cuius equidem verba eò libētius recitauimus,
quòd vulgi errorē Raphanos à cœna comedentis le-
pidè notare videātur. EX PLINIO.

Raphani decocti mane poti ad ternos cyathos,
cōminuunt & eiiciunt calculos. Idē in posca deco-
cti,

Et, contra serpentium morsus illinuntur. Ad tussim etiam mane ieiunis prodest Raphanus cum melle. Semen eorum tostum, ipsumq; commaducatum ad lagonoponem: In aqua foliis eius decoctis, bibere vel succum ipsius cyathis binis. Contra phlegmoni ipsos illinire tussos vtile. Inchoantibus autem recentem corticem cum melle, veteriosis verò quam acerrimos mandere. Seménque tostum, dein contritum cum melle suspiriosis. Idem & contra venena prosunt. Ceterum cerasitis, scorpionibus aduersatur, vel ipso semine infectis manibus impunè trahantibus. Imposito Raphano scorpionibus, moriuntur. Salutares & contra fungorum aut hyoscyami venena aequè, vt Nicander tradit. Et contra ixiám quoq; dari duo Apollodori iubent, sed Citicus semē ex aqua tritum, Tarentinus succum. Lienem item extenuant, iecinori prosunt & lumborum dolorib. Hydropicis quoque ex aceto & sinapi sumpti, & lethargicis. Praxagoras & iliosis dandos censet. Plistonicus & colicis. Intestinorum vlcera sanant. At purulenta precordiorū, si cum melle edantur. Quidam ad hæc coquere eos in luto illitos malunt, sic et feminas purgari. Ex aceto & melle sumpti intestinorum animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum poto cum vino enterocælis prosunt. Sanguinem quoque inutilem sic extrahunt. Medius ad hæc & sanguinem excreantibus coctos dari iubet. Et puerperis ad lactis copiam augendam.

Hippoc

PLANTARVM HISTORIÆ

Hippocrates capillos mulierum defluos fricari Raphanis, & super umbilicum imponi, contra tormenta vulvæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoque ex aqua impositum sistit vlcera quæ phagedænas vocant. Democritus Venerem hoc cibo stimulari putat, ob id fortassis voci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis tantum nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Vbi vero acrior Raphani medicina admota sit, Hyssopum dari protinus imperant. Hæc antipathia est. Et aurium gravitati succum Raphani instillant. Nam vomituris, summo cibo esse eos, utilissimum est. Sylvestris urinae duntaxat eiiciendæ utilior.

DE RIBE. CAP. CCLVII. NOMINA.

Ribes.

GRæcis cognitus fuerit nec ne frutex ille, nondum compertum habeo. Mauritanis & officinis hodie Ribes nominatur. Germanis S. Iohannsz treublin, oder Beerlin, quod scilicet circa diuini Ioannis Baptistæ diem fructus eius fruticis ad maturitatem pertingant.

FORMA.

Frutex est nullis spinis horridus, sed topiarius magis, vitis pusillæ foliis, baccis rubentibus ex pediculis longis dependentibus refertus, ut pictura ipsa abunde docet. Vnde manifestum sit Mauritanorum Ribes à nostro diversum esse, quod non vitis, sed laeta potius, magna, rotunda & viridia folia habeat.

Quamquam

Quaquam non lateat Arabes etiam in Ribes descriptione non admodum concordēs esse.

LOCVS

Passim in hortis nascitur, ac eorundem puluinos & areas sepit.

TEMPVS.

Circa diui Ioannis Baptistæ natales ferias, & Iulio potissimum mense, baccis ac vuis rubentibus frutex ille ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Folia & fructus vehemēter adstringūt. Mauritanum frigidum & siccum faciunt in secūdo ordine.

VIRE. EX MAVRITANIS.

Baccæ acido sapore placent. Refrigerant æstuantem stomachum: sitim restringunt, quæ cum alios, tum maximè febricitantes excruciat. Cibi fastidia discutunt, & appetentiam inuitant. Fœdam vētris proluuiem cohibent. Vomitiones sistunt, stomachū firmant. Alui profluuium quod bilis attulit, retinēt: erosiones & vellicationes eiusdem tollunt. Sanguinis feruorem demulcent, & bilis acrimoniam domant. Seplasiarii succum eius fructus condiunt, ad anni totius vsum, Rob de ribe appellantes.

DE RHODIA RADICE.

CAP. CCLVIII.

NOMINA.

Pόδια ῥίζα Græcè, Rodiaradix Latine nominatur. Officinis ignota, Germanicè Rosen-

Rhodia uultu vocatur. *Rhodium* autē tam Græci quā
radix cur Latini dixerunt, quoniam contrita Rosas redolet.
dicta. Quapropter rose, quas Græci ῥόδον nominant, non
Rhodus insula, ut imperiti putant, huic radici no-
 men fecerunt.

FORMA.

Radix rhodia Costo similis est, lenior tamen mi-
 norisque ponderis, & inæqualis, odorem Rosarum
 cum teritur reddens. Reliqua eius facies *Telephium*
 refert, nisi quod flore & semine carere videtur, id
 quod *Galenus* etiā asserit, & in *Corollario* suo au-
 notauit *Hermolaus*. *Dioscorides* etiam illorum nul-
 lam facit mentionem.

LOCVS.

Nascitur potissimum in Macedonia nunc in mul-
 tis Germaniæ hortis plantatur.

TEMPVS.

Radix autumnno effodienda.

TEMPERAMENTVM.

Rhodia radix in calefaciēdo secundi ordinis, aut
 certē tertij incipientis.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Vtilis est capitis doloribus, si madefacta fronti
 & temporibus cum modico rosaceo imponitur.

EX GALENO.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis.

DE SAMPSVCHO. CAP.

NOMINA.

ἀμαρυχον, ἢ ἀμαρυχου Græcis: Maiorana, Maiorana
 rana, Z Amaracus Latinis: officina Latinā
 appellationē retinuerunt, Germanis Ma-
 ioran, vel Meyrā, (Gallis Mariolaine, ou Ma-
 rone) dicitur. Animaduertendum autem nos hic
 de Amaraco ea loqui quæ incūdo placet odore. Dux Duplex
 plex enim Græcis Amaracus est. Vna quæ Diosco- Amaracus
 ridi alio nomine Parthenium dicitur, ingrato prorsus
 & viroso odore prædita, meritòque ea de causa
 hodie Cotula fœtida nominata. Altera de qua hic
 agimus, odorata, quam Sampsuchon Græci prima-
 tim nominant. Id, ne imperitis vox illa τολύση-
 μος imponeret, monendum esse duximus.

FORMA.

Herba est Sampsuchum surculosa, per terrā ser-
 pens: foliis hirsutis & rotundis, Calaminthæ tenui-
 foliæ similibus, admodum odoratis. Hæc delineatio
 ad amussim herbæ Maioranæ vulgò dictæ fauet:
 est enim surculis lentè rubentibus, foliis pilosis, &
 rotundis, incūdo odore, semine copioso, quod bul-
 bulis quibusdam continet: flore candido & exiguo.
 Serpit etiam per terram: verū id non vbique fit,
 interdum enim recta surgit in altum.

LOCVS.

Passim in hortis & scitilib. vasis prouenit. Gau-
 det autem locis vmbrosis, aqua & simo.

TEMPVS.

Aestate

PLANTARVM HISTORIAE

Aestate dum floribus pragnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Sampsuchū tenuiū partiū, & digerentis est facultatis: desiccatur enim & calefacit ordine tertio.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi vim obtinet, & coronamētis apta. Decoctum eius potum, incipiēti aqua inter cutem prodest, & iis quos vrina difficultas, & tormina discruciat. Arida folia ex melle illita, sugillata tollūt. In pessa subdita menses ducunt. Cōtra scorpionis ictum ex sale & aceto illinuntur. Luxatis cera to excepta imponūtur. Similiter & oedematis. Aduersus oculorum inflammationes cum polline polenta illinitur. Miscentur acopis & malagmatis calefaciendi gratia. EX PLINIO.

Sampsuchū scorpionibus aduersatur ex aceto & sale illitum. Menstruis quoque multum confert impositum. Minor est eidem potio vi. Cohibet oculorū epiphoras cum solēta. Succus decocti tormina discutit. Vrinis & hydropicis vtile. Mouet & nariū sternutamenta. Fit ex eo oleum quod Sampsuchinum vocatur, aut Amaracinum, ad excalfaciendos emolliendosq; nervos. Vulvas calefacit. Et folia sugillatis cum melle, & luxatis cum cera prosunt.

DE SPANACHIA. CAP. CCLX.

NOMINA.

Σπινάχια Græcis recentioribus, Spinacia, vel Spinaceum olus Latinis appellari potest.

Arabica

Oleū Amaracinum.

Arabicae factionis principes Hispanach, hoc est, Hispanicum olus nominant. Germani Spinet, oder Spinnat (Gallis des Espinartz.) Spanachiam Spana-
haud dubie ab oleris raritate dixerunt Græci: raro chia cur
enim illo utebantur medici, quod cibo magis forsi- dicta.
tan, quam medicinae nata esset, nec quicquam illu-
stre sortita. Vel, quod etiam simile veri est, ab aliis
nationibus emendicato spinaceo nomine. Spinacia Spinacia
vulgò dicta est ab insigni seminis spiculatorum nota: unde voca-
et si enim herba ipsa glabra & mollis sit, semen ta=ta.
men in spinas occalescit. Hispanicum verò olus no= Hispani=
minauere, forsitan quod inde primum duxerit ori= cū olus.
ginem, ad ceteras tandem nationes translata.

FORMA.

Exit septem diebus à saturo folio primum triangu-
lo, molli, mox intybi, plerumque qua pediculo coha-
ret laciniato, incerti sapore, exigua radice, tenuibus
capillamentis fibrata, caule cubitali, nonnunquam
altiore, intus cauo: floribus in vertice rotundis, ra-
cematim coeuntibus, exiguis: semine spinulis horri-
do.

LOCVS.

Nullum solum respuit, sed vbicunque satum fue-
rit hic latissime prouenit.

TEMPVS.

Seritur Septembri mense, non horrens hyemis
frigora, vt verno tempore cibum suppeditare possit.
Martio etiam mense seritur, Iunio autem & Iulio
mensibus semen & flores profert.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPERAMENTVM.

Spanachia primi refrigerantium & humectantium ordinis est. VIRE S.

Aluum emollit. Melius Atriplice suppeditat alimentum, sed aluo parū hārens facile exigitur. Flatus colligit, & vomitiones concitat, nisi excrementitius humor abiiciatur. Ventrem decoctā ius proluuit. Stomacho inutile. Et ceteras ferē omnes Atriplicis vires sibi fertur arrogasse.

DE SANICVLA. CAP. CCLXI.

NOMINA.

Herba quam omnes hodie *Saniculam* vocāt, à nullo, quod sciam, veterum descripta est, sed à recentioribus inuenta, vt multae aliae vulnearum *Diapēsia*. variae herbae. Sunt autē qui *Diapensiam* nominent. Germanis *Sanickel*, (Gallis *Sanicle*) dicitur. Nos *Sanicula* men *Saniculam* à *Sanandis* vulneribus traxisse cur dicta. vulgò constat.

GENERA.

Duūm est generum. Vna quae propriè appellatur *Sanicula*, ideoq; marem, vt certius esset discrimen, appellauimus Germanicè *Sanickel mennle*. Altera ab omnibus ferē herbariis pro specie *Osteritiū* vulgò vocati habetur, sed falso, quando neq; in foliis, neque in radice vlla appareat acrimonia, sed perinde atque in mare *Sanicula*, amaritudo & adstrictio. Germanis errore etiam quodam die *klein Meisteruurtz* nominatur. Nos eandē cūm & for-

ma & facultate ad veram Saniculam, quam matrem fecimus, proximè accederet, Saniculam feminā nūcupauimus. Germanicè sanickle Vueible.

FORMA.

Sanicula vera, atque adeo mas herba est folio vitis, aut Apij, in quinque partes dissecto, rubentib. in fine sectionum maculis quibusdam: surculis quoque rubris ad radicem, quæ multis ei capillamentis fibrata subest: capitulis in summis coliculis pusillis, herbacei coloris & subnigris. Femina quòd ad folia attinet priori similis, rubentibus tamen maculis caret, itemq; rubris ad radicem surculis, quòd in ea hæc singula candida sint. Flores in summo cãdidos, ac subinde semen striatum & oblongum profert.

LOCVS.

Nascitur in syluis & vmbrosis locis.

TEMPVS.

Carpenda cum suis capitulis Maio & Iunio mē-sibus.

TEMPERAMENTVM.

Non est simplicis naturæ, sed, vt indicio est gustus, adstringit simul & amara est, vt hoc nomine calefactoriam & exiccatoriã esse nulli dubiũ sit. Statuunt autem calidam & siccam ordine secũdo.

VIRE S.

Saniculæ herbæ succum vulneratis in potu mirificè conferre experientia compertum est. Tumores quoque reprimere decoctam herbam impositã, aut

PLANTARVM HISTORIAE

eius succum illitum tam in homine quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud præsentius est auxilium, cùm ad fauces vel pulmones vitium decubuit Et in summa, omnia quæ Symphyton, præstat etiam Sanicula. Potissimum verò sanguinis sputo, dysenteria, renumq; vitis medetur.

DE SONCHO. CAP. CCLXII.

NOMINA.

Σόυχος Græcè, Sonchus, Cicerbita Latine dicitur. Sunt qui Lactucellam & Lacteronem appellent, quòd scilicet caulis eius dissectus copioso diffuset lacte. Germanicè Moß, oder Genßdistel, (Gallicè Latteron, ou Palais au lieure) vocatur. Sonchus autem sibi nomen vindicauit ἀπὸ τοῦ σῶου χέου, cò quòd salubrem fundat succum, utpote qui sua sorbitione stomachi rosiones leniat, & lactis abundantia nutritibus sumministret, genitalibusq; locis collectione laborantibus præsidio sit. Cicerbita tamen vocabulum, quo omnis Hetruria adhuc utitur, recens esse adiectitiumq; , & ex non multo tempore Dioscoridi accreuisse videtur.

GENERA.

Sonchus aspera. Sonchi duo sunt genera. Alterum sylvestrius, aculeatius, & nigrius, quod Genßdistel Germanicè vocatur. Alterum tenerius esculentumq; , ac minus nigrum, Germanis Hasenkol dicitur. Et Apuleio Lactuca leporina, quòd cùm leporem animus defecit astu, hac sibi herba mederi soleat.

FORMA.

Cubitalis & angulosus Soncho caulis est, canus & aliquādo rubescens, & qui fractus copioso lacte manat. Folia habet per intervalla in ambitu scissa. Florē luteum, qui, ut Senecionis, breui digestus abit in pappos, vaneſcitq; in lanugines.

LOCVS.

Vbique ferè in maceriis hortorum, potiſſimum autem in vineis Sonchus provenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio menſibus Sonchus vterq;.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentum eius quodammodo mixtum est: conſtat enim ex aquea terraq; eſſentia, vtraq; leuiter frigida. Nam & adſtrictionis cuiuſdam eſt particeps. Et ſiue cataplaſmatis in morem imponatur, ſiue edatur, manifeſtè refrigerat. Poſtea verò quàm planè reſiccatus fuerit, terreſtre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Vis vtrique Soncho refrigeratoria, modicèque adſtringens. Proinde ſtomacho aſtuanti & inflammationibus illiti proſunt. Succus eorum in ſorbtione datus ſtomachi roſiones morſuſve mitigat, et laetis abundantiam efficit. In lana appoſitus, ſedis ac vuluæ inflammationibus opitulatur. Tam herba quàm radix illita ſcorpionum iccibus ſubuenit.

EX GALENO.

Z iij

Sonchus

PLANTARVM HISTORIAE

Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Ceterum viridis etiamnum & tener estur perinde vt cætera olera syluestria.

EX PLINIO.

† aliàs obo-
lorum.

Albus qui è lacte nitor, utilis orthopnoicis Lactu-
carum modo. Erasistratus calculos per urinam pel-
lico monstrat, & oris graueolentiam commandu-
cato corrigi. Succus trium † cyathorum mensura in
vino albo & oleo calefactus adiuuat partus ita vt
à potu ambulent grauidæ. Datur & in sorbitione.
Ipse caulis decoctus facit lactis abundantiam nu-
tricibus, coloremq; meliorem infantium: utilissimus
iis quæ lac sibi coire sentiant. Instillatur auribus
succus, calidusque in stranguria bibitur, cyathi mē-
sura: & in stomachi resionibus cum semine Cucu-
meris, nucleisque pincis. Illinitur & scdis colle-
ctionibus. Bibitur contra serpentes scorpionēsque,
radix verò illinitur. Eadēque decocta in oleo pu-
nici mālī calyce, aurium morbis præsidium est.
Hæc omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet
vesci, vt morbos faciente, de albo consentiens.
Agathocles etiam contra sanguinem tauri demon-
strat succo eius vtī. Refrigeratoriam tamen vim
esse conuenit nigro, & hac causa imponendum
cum polenta. Zeno radice albi stranguriam docet
sanari.

DE SERIDE. CAP.

CCLXIII.

NO=

NOMINA.

Σ *Épis* Græcis, *Seris* & *Intubus* Latinis vocatur. (*Gallis Chicorée.*) Reliqua quæ illi sunt nomina, in generũ distinctione mox dicemus.

GENERA.

Serin Græci in duo fastigia partiuntur, in *satiuũ* & *syluestrem*. Sic & *Intubum* Latini in duo genera digesserunt, in *satiuum* & *erraticũ*. *Satiuũ*, qui non nisi cultu & humana diligentia provenit. *Erraticum* verò, qui suæ spontis & liber, sub nulla litoris lege vagatur & errat, dixerũt. *Satiuus Intubus*, quem priuatim, *Plinio* lib. xx. cap. viij. teste, *Serin* nominarunt veteres, in duas distrahitur species. Vna latiore folio cõstat, *Lactuca* similior. Hæc corrupta ab *Intubo* voce, In *Hetruria* passim *Endiuia* appellatur. Et debet in omnibus pro vera *Endiuia* vsurpari officinis. Nam qua hodie sub hac voce vtuntur, non est vera *Endiuia*, sed *Lactuca syluestris*, ut suo diximus loco. Germanicè *Endiuien* vocari potest. Altera angustiora folia habet, et sub amara est. Hæc diminutiuo à *Seris* nomine *Scriola* dicitur, quod deinde corrũpentes recentiores *Scariola* fecerunt, Germanicè *Scariol* appellari poterit. *Erraticus* iterum *Intybus* in duas species, *Plinio* loco antea citato autore, degenerat. Vna, quæ Græcis ab insigni amaritudine *πικρὴς*, ἡ *ἄλχησις* nominatur, Latinis autem *Ambuceia*. *Vulgus* herbariorum & officinæ *Cichorcæ* *Cichorea*.
Z iij vocant,

vocant, Germani Vueguarten, quasi viarum custodem, vel Vueguueilz, quod peregrinis quasi viam indicare videatur. Altera, quae latiore folio

Hedypnois.

prodit, Plinio Hedypnois nominatur, haud dubie non alia ratione, nisi quod suauiter dormire, somnūque irrepere faciat. Vel, si paulo durior hac videtur interpretatio, quod flos eius praeter alias Serides suauiter admodum spiret. Theophrasto libro septimo de plantarum historia, capite septimo, & Plinio

Aphaca.

nio lib. xxi. cap. xv. Aphaca alio nomine appellatur: diuersa tamen ab ea quam supra descripsimus,

Dens leonis.

& quae alias Vitia sylvestris dicitur. Vulgo Dens leonis, quod folium sinuatum per lacinias denticu-

Rostrum porcinū.

latum sit, & Rostrum porcinum nominatur. Officinis nostris, quae barbaris delectantur vocibus, Taraxacon, aut Altaraxaco dicitur, Germanis Kork-

Taraxacon.

kraut, Pfaffenrorlin, Pfaffenblatt.

FORMA.

Satiuus

Satiuus Intubus caulem edit magnum, rotundū,

Intubus.

striatum, frequentibus surculis brachiatum. Germinat foliatus statim à radice venoso. Flos illi in ramusculis caeruleus, & nonnunquam etiam candidus emicat. Prima autem eius species, ut diximus folio latiore, altero angustiore constat. Erratici In-

Cichoriū.

tubi genus primum, quod Cichorium vocant, germinat à radice post Vergilias, folio Betae laciniato, ferè semper in solo procumbente: caule magno, festuoso, frangi contumace, multis ramulis brachia-

to, ad

to, ad vinctum quoque lentis flore cæruleo, interdū albo, particulatim vsq; in autumnū erūpente, qui nubilo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper cōpressus, & interdiu hiscēs. Hinc panditur rudissimus quorundam error, qui hanc herbam quam Germani Viegwart nominant, Heliotropium esse contendunt, cū tamen primum folia repugnent, quæ nō sunt Ocimo similia, neque candida, sed nigricantia magis. Deinde non candidum, sed magna ex parte cæruleū florem habet. Radix denique eius, vt Heliotropij, non inutilis, sed, experientia teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cum aliis satiuis intubis similitudo, quæ vna satis docet Intubum esse sylvestrem, & non Heliotropiū. Vt quorundam temeritatem non satis mirari queam, qui contra apertam veritatem, & omnium medicorum consensum, secus pronūciare audent. Alterū, quod Leonis dens nominatur, foliis multis constat, vtrin= Leonis
que denticulatis, in terra sessilibus, cauliculis do= dens.
drantalibus, concavis, leuibus & enodibus, flore luteo, stipantibus in circulum foliolis coronato, qui senescens euanescit in lanuginem, quæ cum aura raptim fertur.

LOCVS.

Satiuus non prouenit nisi in hortis cultu & diligentia humana: haud tamen difficulter vbi satius fuerit, emergit. Erratici prima species passim iuxta itinera

PLANTARVM HISTORIAE

itinerata nascitur. Altera in hortis, & passim ferè etiam sponte sua gignitur.

TEMPVS.

Sativus Iunio & Iulio mensibus floret. Cichoriū eodem ferè tempore incipit florere, & in autumnū vsque durat. Hedypnoidis in Martio erumpunt flores, & in æstatem vsque perdurant.

TEMPERAMENTVM.

Seris olus est subamarum, & magis quod sylvestre est, quod ob id ipsum Picrida quidā nuncupāt, quidam verò Cichorium appellant. Est autem ea sicca frigidaq; temperatura, utrunque secundo abscessu. Porro domestica magis etiam quàm sylvestris refrigerat. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit. Vtraque autem adstringentis qualitatis particeps est.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Omnes adstringunt & refrigerant, & stomachū adiuvant. Alium sistunt coctæ, si cum aceto assumantur. Sylvestres autem stomacho meliores. Comæsti imbecillum & æstuantem leniunt. Cardiacis per se aut cum polenta utiliter illinuntur. Podagris & oculorum inflammationibus succurrunt. Herba & radix illita, percussis à scorpione subuenit. Ignibus sacris cum polenta medetur. Succus eorum cum cerusa & aceto utiliter iis quæ refrigerationē desiderant inungitur.

EX PLINIO.

Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Idemq; cum vino potus, iecinoribus & vesicæ & epiphoræ imponitur. Cichorium refrigerat. In cibo sumptum & illitū collectiones, succusq; decocti vētrem soluit. Iecinori & renibus, & stomacho prodest. Item si in aceto decoquatur, vrinæ tormina discutit. Item morbum regium è mulso si sine febre sit. Vesicæ adiuuat. Mulierum purgationibus quidē decoctum in aqua adcõ prodest, vt emortuos partus trahat. Adiciunt magi, succo totius cum oleo perunctos fauorabiliore fieri, & quæ velint facilius impetrare. Hedypnos stomachum dissolutum adstringit cocta: crudaq; sistit aluum. Et dysentericis prodest magis cū lente. Rupta & conuulsa vtroque genere iuuantur. Item quibus genitura valetudinis morbo effluat. Seris vtraque stomacho vtilissima, præcipuè quem humor vexat. Cum aceto in cibo refrigerant vel illitæ, discutiuntq; & alios quàm stomachi. Cū polenta syluestriū radices stomachi causa sorbentur, & cardiacis illinūtur super sinistram māmam ex aceto. Omnes hæ & podagricis vtilis, & sanguinem reiicientibus. Item quibus genitura fluit, alterno dierum potu.

Hedypnos
idis facul
tates.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonum est Intubum, si cum aceto quis eo vtatur. Postquam decoctum est, aluū sistit. Obstructiones auferendi vim habet vt nullum aliud olus.

PLANTARVM HISTORIAE

olus. Sanguinis feruorem sedat, & inflammationes iecoris discutit, & ictericos iuuat. Iecur proprietate quadam corroborat. Mediocriter somnum inducit. Tradunt quidam post venæ sectionem, aut cucurbitas, si quis cum aceto utatur, iecinoris sanitatem conseruare. Veneris appetentiam extinguunt, & semen genitale in iis qui frigidam habent temperaturam, minuit. Vtile est ad sanguinis excreationem. Huius etiam decoctum iccinori admodum vtile. Semen febres ex flaua bile ortas iuuat: at lieni nocet.

DE STAPHYLINO.

CAP. CCLXIIII,

NOMINA.

ΣΤΑΦΥΛΙΝΟΣ Græcè, Pastinaca Latinè dicitur. Germanicè Pastiney, oder Pastnachē **Pastinaca** (Gallicè Des Pastenades, ou Panetz.) **Pastinaca** verò nomen à pascendo dictum videtur: natura enim ei calens, sapor vehemens, alit corpus, & Venerem cit.

GENERA.

Duplex Pastinaca genus. Vna enim satiuæ est, quæ iterum duorum est generum. Vnū genus quod vulgò Carota dicitur, Germanicè Zem Pastiney, & rot Ruben. Alterum, quod quidam inter Rapa connumerant. Hinc est quod Germani Geel Ruben vocant. Syluestris altera, quæ propriè Staphylinus Græcis nominatur, Germanicè autem Vuild Pasteneay, oder Vogelneß.

FORMA.

Folia Gingidū habet Pastinaca syluestris, latiora tamen & subamara. Caulem rectum, asperūque, umbellam anetho similem obtinentem, in qua flores candidi, exiguum quiddam purpurei in medio habentes, & ferè ad croceum accedētis. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Hortenses syluestribus per omnia similes sunt, nisi quòd flores in medio purpureum quiddā non habeant, & radix vnus in suprema sui parte purpurea sit, alterius autem magis lutea.

LOCVS.

Pasim circa itinera, loca petrosa, & hortorum maceries sua sponte proueniunt erratica. Satius in hortis nascuntur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mēsis flores & semina Dauco similia producit vtraque.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & abstergit vtraque, magis tamen syluestris.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Erratica semen potum aut appositum mēses ducit. Vrinæ difficultatibus, hydropicis, & pleuriticis in potu confert. Contra venenatorum morsus & ictus vtile. Ferūt non lædi à venenatis qui id præsumpserint. Conceptus adiuvat. Radix ipsa urinam cit, & Venerem stimulat. Foetus ex utero pellit appositæ.

PLANTARVM HISTORIAE

posita. Folia trita cum melle imposita vlcera depa-
scentia expurgant. Hortensis Pastinaca cibo aptior
est. Ad eadem, sed minori efficacia, prodest.

EX GALENO.

Pastinaca satina imbecillior, sylvestris ad omnia
potentior. Vrinam mouet, & menses prouocat cum
herba quidem tota, tum maxime semen & radix.
Habet porrò etiam abstersorium in se quippiam:
quamobrem pascentia vlcera quidam foliis eius cū
melle, quò pura reddant, illinunt.

EX PLINIO.

Pastinacæ erraticæ semen contritum, & in vino
potum, tumentem aluum, & suffocationes mulie-
rum doloresq; lenit in tantū vt vuluas corrigat. Il-
litū quoq; è passo ventri carū prodest. Viris verò cū
panis portione aqua tritum. Ex vino potum contra
ventris dolores. Pellit & vrinam, & phagedenas
vulcerū sistit recēs cum melle impositum. Vel aridæ
farinæ inspersam radicem eius Dieuches contra ie-
cinoris & lienis, ilium, lumborum & renum vitia,
ex aqua mulsa dari iubet. Cleophrantus & dysente-
ricis veteribus. Philistiō in lacte coquit, & ad strā-
guriā dat radicis vncias quatuor. Ex aqua hydro-
pici, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis co-
mitialibus. Habētes eā feriri à serpētibus negātur,
aut qui ante gustauerint, non ladi. Percussis impo-
nitur cum axungia. Folia cōtra cruditates mādū-
tur. Orpheus amatorium inesse Staphylino dixit,
fortassis

fortassis quoniam Venerem stimulari hoc cibo certum est: ideo conceptus adiuuare aliqui prodiderunt. Ad reliqua & satina pollet, efficacior tamen syluestris. Semen satinae quoque contra scorpionum ictus, ex vino aut posca salutare est. Radice eius circumscalpi dentes, dolore liberantur.

DE STRYCHNO. CAP.

CCLXV.

Halicacabum peregrinum & Stramonia ex horto sancti Germani pratensis iam vulgaria multis sunt.

NOMINA.

Τρύχvos Græcè, Galeno per vnus litera

abiectionem τρύχvos, Solanū Latine, offi- Solanum.
cinis Solatrum, vulgò Cuculus, Vua lupi-
na, Vua vulpis, Morellaque dicitur. Germanicè Morella.
Nachtschatt. (Gallicè Morelle.)

GENERA.

Quatuor, Dioscoride & Galeno autoribus, Solanum Solanum
ni sunt genera. Primum hortense dicitur, quod scilicet hortense.
licet olim in hortis cum aliis oleribus quæ edendo
sunt, seminabatur. Hodie sua sponte, & inuitis cul-
toribus prouenit. Nigrum alio nomine, à nigris ni-
mirum foliis, aut in extrema maturitate fructu ni-
gro, appellatur. Germanis simpliciter Nachtschatt,
(Gallis Morelle) vocatur. Secundum Halicaca
quod priuatim Halicacabum nominatur. Vesica-
buriam quoque vocant à folliculis quos producit, Vesicaria
vesicarum

PLANTARVM HISTORIAE

vesicarum in animantibus speciem imitantibus,
vel quòd vesicæ calculis medeatur. Officinæ Ara-

Alkakēgi bessecutæ, corrupto Halicacabi nomine, Alkakē-
gi appellant. Germani nostri Iudenhutlin, oder
Docklin, Iudenkirschen, Schlutten, Boberellē,
Rot Nachtschatten. (Galli Baganau des.) Est
præterea alia Halicacabi species nuperrimè inuen-
ta, & aliunde in Germaniā allata, cuius nemo an-
tiquorum scriptorum, quòd sciam, mentionem fecit.
Nos discriminis gratia Halicacabum peregrinum
nominauimus. Germanicè Vuelsch Schlutten nō

Solanum ineptè nuncupauimus. Tertium solanum somni-
ficum ab effectu scilicet nominant. Sunt qui Sola-
trum dormitorium vel marinum dicant, quod ruc-
Solanum pibus non lōgè à mari inueniatur. Quartū Græ-
furiosum. **μαρινόν**, hoc est, furiosum nominatur, officinis
Solatrum mortale.

FORMA.

Hortense. Solanum hortense frutex est esculentus, exilis, a-
las multas habens, folia nigra, Ocimo maiora &
latiora, fructum rotundum, viridem, cū autem
maturuerit, nigrum, aut rufum. Flos huic cādicat.

Halicaca Halicacabum foliis priori simile, latioribus tamē.
bum. Caules eius postquam increuerunt in terram incli-
nant. Fructum fert in folliculis rotundis vesicis si-
milibus, rufum, rotundum, leuem, vuarū acinis si-
milem, quo coronari vtuntur texentes coronas.
Peregrinum, planta est pergulis operiendis aptissī-
ma:

ma: latissimè enim suis clauiculis sese diffundit. Folia habet oblonga, & laciniata. Flores candidos, vesiculas Halicacabo similes, in quibus semen includitur pisis aut ciceribus simile, in cuius medio effigies veluti cordis humani insculpta & incisa apparet. Somnificum frutex est ramos habens multos, Somnificū
 densos & lignosos, difficile fragiles, foliis pinguibus refertos mālī cotonei similitudine, florem rubrum, grandem. Semen in siliquis croceum. Radicem corticem habentem subrubrum, grandem. Furiosum fo Furiosum.
 lium obtinet Erucae simile, maius tamen, satis ad spinam quam Pæderota vocant accedens. Caules à radice proceros decem aut duodecim emittit, vlnarum cubitorumve quatuor altitudine, capitulū effigie oliuæ insidens, sed hirsutum vt Platani pilulæ, maius tamen & latius. Florē nigrum, post hunc fructum racemosum, rotundum, nigrum, denis aut duodenis acinis constantem, Hederæ corymbis similibus, mollibus vt vna. Radicē candidam, crassam, cauam, cubitalē. Cæterum plantatur nunc in hortis Germaniæ herba Italis vocata Stramonia, & pomum spinosum, quam nonnulli inter Solani species numerant, non quòd descriptioni respondeat, sed quòd eius folia opii odorem referre videantur. Quare vt aliis occasionem daremus cogitandi de hac planta, hoc loco eius picturam inferere placuit. Flores huius herbæ suauem Lili spirant odorē. Videtur viribus parum à posterioribus generibus Sc

PLANTARVM HISTORIAE

lani distare. Germa. à pomis appellare libuit,
Stechend oderrauch opffelkraut.

LOCVS.

Hortense passim in opacis locis, & semitis obuiū est. Nascitur & in hortis. Halicacabū in vineis copiosissimè prouenit. Somnificum in saxosis nec procul à mari locis producitur. Furiosum in montanis, ac vento perflatis locis, & vbi Platani nascuntur.

TEMPVS.

Hortense tota ferè æstate floret, autumno autem fructus eius maturescit. Halicacabum vesicas illas suas in fine Augusti, & inter initia Septēbris mensis colore primum viridi, mox paulatim rubescente profert.

TEMPERAMENTVM.

Hortense refrigerat & adstringit in secundo ordine, medium autem absolutè in humectando & exiccando, Galeno lib. v. simp. cap. ix. teste. Idem faciunt Halicacabi folia. Somnificum tertii est refrigerantium ordinis. Manici seu furiosi cortex radicis refrigerat secundo ordine incipiente, & desiccatur in secundo iam completo, & tertio incipiente.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hortense refrigerandi facultatem obtinet, quæ propter folia ignibus sacris, herpetibus cum farina polentæ illita prosunt. Per se autem trita & imposita agilopas, capitisque dolores sanant. Stomacho æstnanti auxiliatur. Parotidis cum sale trita

&

& illita discutunt. Succus eius valet aduersus i-
 gnes sacros, & herpetas, cū cerusa, rosacco & li-
 thargyro. Ad egilopas verò cum pane. Infantium
 quoque ardori, quem syriasin vocant Graci, cum
 rosacco perfusus proficit. Miscetur collyriū pro a-
 qua aut ouo contra acres fluxiones ad inunctiones.
 Aurium dolori instillatus prodest. Muliebria pro-
 fluvia in lana appositus sistit. Succus fuluo galli-
 narum in domibus oberrantium fimo subactus &
 linteo appositus egilopis remedio est. Halicacabū
 vim vsūque hortensis Solani habet, verū non
 comeditur. Fructus eius potus, cō quod vrinam mo-
 uet, regium morbum expurgat. Vtrorumque herba
 exprimitur, & succus siccatus in vmbra reponitur,
 ad eadē utilis. Sōnifici radicis cortex in vino drach-
 mā pondere potus, somnificam facultatem obtinet
 Papaueris succo mitiorem. Fructus vehementer v-
 rinam cit. Corymbi eius fere duodecim hydropicis
 dantur. Plures autē poti ecstasin faciunt. Remedio
 est aqua mulsā copiosa potui data. Succus eius me-
 dicamentis dolorem leuātibus & pastillis miscetur.
 In vino decoctus & in ore retentus dentiū dolori-
 bus succurrit. Radicis succus cū melle inunctus ocu-
 lorū hebetudines tollit. Furiosi radix in vino drach-
 mā vnius pondere pota, nō illepidas neque iniucun-
 das imagines speciesve efficit. Duarum verò drach-
 marum pondere pota, ad tres vsque dies ecstasin af-
 fert. Quatuor autem drachmā hausta interimunt.

PLANTARVM HISTORIAE

Remedio est aqua mulsā maiore copia pota, & vomitione reiecta.

EX GALENO.

Solanum esculentum quod in hortis nascitur, notum est omnibus, utunturq; illo ad ea omnia quae refrigerari & adstringi postulant. Ceterorum verò nō esculentorū vnum quidem nuncupatur Halicabum fructum habens rufum, acino vuae tū figuratum magnitudine ad similem, quo etiam ad coronas utuntur. Alterum autē fruticosum, quod somnificum, & tertium quod furiosum dicitur. Halicabum igitur in foliorum facultate hortensi simile est, fructum habēs ciendae vrinae idoneum: proinde multis compositis facultatibus quae ad iecur, ad vesicam & renes accommodantur, miscetur. Solani verò somnifici cortex radicis si cum vino bibatur, somnum accersit drachmæ pondere sumptus. Sed et ad cætera Papaueris succo persimilis est, nisi quod co-
u-
sque imbecillior est, ut ipse tertii habeatur ordinis refrigerantium, quum hic in quarto sit constitutus. Huius semen urinam mouendi facultatem habet. Si autem plus duodecim corymbis hauseris, dementiam furiamve adsciscet. Porro quod reliquū est ex dictis Solanis, ad medicationes quae intrò in corpus adhibentur, inutile est. Nā si quatuor eius drachmæ sumantur, mortem inferent: si pauciores, insaniam. Vnā certè innoxie offertur, ceterum nec ipsa vtile quid obtinet. Verum si foris corpori illinatur,
vlcera

Ulcera maligna & depascentia curat. Sed ad talia radicis cortex optimus est.

EX PLINIO.

Strychno, quam quidam Trychnon scripsere, uti-
nam nec coronarij in Aegypto vterentur, quos inui-
tat Hederae florum similitudo, in duobus eius gene-
ribus. Quorum alterū cui acini coccinei, granosi fol-
liculi, Halicacabum vocant. Nostri autem vesica-
riam, quoniam vesicae & calculis prodest. Frutex
est surculosus verius quā herba, folliculis magnis
latisq; & turbinatis, grandi intus acino, qui matu-
rescit Nouēbri mense. Tertio folia sunt Ocimi, mi-
nimè diligenter demonstranda. Remedia enim, non
venena tractamus: quippe insaniā facit paruo quo-
que succo. Quanquā & Græci autores in iocū ver-
tēre. Drachmæ enim pondere lusum pudoris gigni
dixerunt, species vanas imaginesq; cōspicuas obser-
uari demonstrantes. Duplicatum hunc modum, legi-
timā insaniā facere. Quicquid verò adiiciatur pō-
deri, representari mortē. Hoc est venenū quod inno-
centissimi autores simpliciter Dorycnion appellauē-
re, ab eo quòd cuspides in præliis tingerentur illo
passim nascente. Quin & alterum genus soporiferū
est, atque etiā opio velocius ad mortem. Laudatum
verò à Diocle & Euenore: quippe præsensancū re-
medium ad dentes mobiles firmandos, si collueren-
tur: huic tamen exceptionem addidit, ne diutius
id fieret: delirationē enim gigni eo. Cōmendatur &

Vesicaria

PLANTARVM HISTORIAE

in cibis tertium genus, licet præferatur hortensis sa-
poribus. Et nihil esse corporis malorum, cui non sa-
lutare sic Strychnos, Xenocrates prædicat. Somnia
fici radicem bibunt qui sunt vaticinandi callentes,
quòd furere ad confirmandas superstitiones aspici
se volunt. Remedio est (id enim libetius retulerim)
aqua copiosa mulsæ calida potui data. Nec illud
præteribo, aspidum naturæ Solanum somnificum in
tantum aduersum, ut radice eius propius admota
soporentur, illud sopore enecante vim earum. Ergo
trita ex oleo percussis auxiliatur.

APPENDIX.

Quod nos somnificum esse dicimus Solanum, ali
qui hortense non sine maximo errore esse putant, plu-
rimùmque suis conferre, ac easdem à letalibus
morbis præseruare asserunt. Nos tamen non labo-
ramus magnopere quomodo suis succurrat, sed
quid in homine possit magis consideramus, quum
constet pleraque aliis animantibus esse cibum, quæ
homini venenum sunt. Experientia verò cognitum
est, geminos pueros statim ex esu acinorū huius ge-
neris Solani mortuos esse. Quod sanè exemplū nos
mouet ut somniferum esse credamus, potissimum
cum in vniuersum ferè illi descriptio quadret, vno
hoc dempto, quòd semen non habet in siliquis cro-
ceum. Sunt autem notæ quædam in hortensis etiam
delineatione quæ illi non conueniunt. Neque enim
exilis est frutex, sed propemodum arborescens: ne-
que

que etiam florem candidum, sed spadiceum obtinet. Quod verò ad flores & fructum attinet, videtur accedere ad historiam Solani furiosi, ut suspicio ferè sit duorum horum generum historias esse confusas: quam quidem auget Theophrastus, qui in eorundem descriptione nonnihil à Dioscoride variat. Quicquid verò sit, certum est Solani esse speciem, quod forma ipsa foliorum abundè docet: atque huic vehementem refrigerandi vim, maxime si paulò copiosius sumatur, inesse, ut hoc nomine pro somnifero Solano eius usus medicis nullo periculo esse queat. Nos vulgi sententiam sequenti, appellauimus Dollkraut. Posset etiam Germanicè vocari Schlaff Nachtschatt. sunt qui Seuera kraut nominant. Quod si tamen hæc nonnullis haud satisfecerint, certè necesse erit Mādragoræ speciem esse fateantur tertiam, quā pingit Theophrastus li. vi. de histo. planta. capite ij. iis verbis: ἰδιος δ' ἐὶ δ' καρπὸς τοῦ μανδραγόρου τῷ μέλας τε καὶ ῥαγώδης καὶ οἰνώδης εἶναι τῷ χυμῷ, hoc est, fructus Mandragoræ peculiaris, quia niger, acinosusque & vinosus suo sapore sentitur. Hæ enim omnes notæ in fructu huius fruticis reperiuntur. Sed plura ea de re in capite de Mandragora diximus.

DE SYMPHYTO MAGNO.

CAP. CCLXVI.

PLANTARVM HISTORIAE.

NOMINA.

ὕμφυτον, ἢ σύμφυτον μέγα Græcis, Sym-
Σ phytū & Solidago latinis, officinis & her-
 bariis Consolida maior, Germanis Vual-

Symphy- turtz, Schuuartzuurtz, Schmeruurtz, grosse
tum cur beyneuell (Gallis de la Consyre) Nomen illi
dictum. apud Græcos Latinosq; egregia constringendi &
 conglutinandi vis fecit. **FORMA.**

Caulē mittit binūm cubitorum, aut maiorem,
 leuē, crassū, angulosū, Sonchi modo inanē,
 circa quem folia sunt non magnis interuallis distan-
 tia, hirsuta, angusta, oblonga, ad Buglosi foliorū fi-
 guram accedentia. Habet caulis secundum angu-
 los eminentias quasdam productas. Folium tenue
 ex singulis alis prodit. Flores lutei, & semen Ver-
 basci. Totus verò caulis & folia quandam lanugine-
 nem modicè asperam, tactu pruritum mouentē, ha-
 bent. Radices in superficie extrāue nigrae, intus can-
 didae & glutinosae, quarum est vsus. Hæc siquidem
 delineatio adamussim huic herbae quæ vulgò Cōso-
Consolida lida maior appellatur, cōpetere videtur, quod nul-
maior. la prorsus sit nota quæ illi non quadret. Sed obtru-
 det quispiam, florum colorem non respondere, quem
 Dioscorides luteum esse dicit, quum in nostra Cons-
Obiectio solida alius sit. Cui ita responsum volo. Coloris ista
diluitur. in floribus diuersitas nō tanti momenti est, vt aliud
 à Consolida maiori Symphytō esse, conuincere pos-
 sit: neque enim vbique terrarum, etiam earundem
 herbas

herbarum, flores similes sunt. Exemplo cōt Buglosum, quod Boraginem hodie officinæ vocant: hoc enim interdū albos, quos nos Norimbergæ & Culmachii sæpe vidimus: magna autem ex parte purpureos producit flores. Sic quoque Symphytum frequenter flore subrubro, vel leniter purpurascēte, vt Onoltzobachii, rarius candido conspicitur. Tubingæ tamē omnia flore albo visuntur. Luteis floribus nullum in Germania vidisse me memini. Quod autem alios quā luteos nonnunquam proferat flores Symphytum, satis docet Apuleius in commentario illo quem de herbis conscripsit, qui illius flores nigros esse tradit, subrubros aut subpurpureos haud dubiè innuēs. Nos vna pictura vtrosque flores exhibemus. Germani candidis floribus Symphytum scēminam, subrubris verò marem appellant. Ceterū non est quod in Symphyti descriptione te perturbet aut remoretur, quòd idem caulis simul leuis & angulosus dicitur: id enim sic intelligendū venit, quòd caulis non perpetuò leuis aut angulosus sit, sed modo hunc, modò illum producat pro soli diuersitate.

L O C V S.

Locis aquosis, palustribusq; abundè prouenit.

T E M P V S.

Per integram æstatem floret. Radix tamen in autumno carpenda venit.

T E M P E R A M E N T V M.

Modicè, ordine scilicet secundo, calefacit, exiccat

cat & contrahit.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Radices trita & pota cruenta expuentibus, ruptisq; profunt. Recentia vulnera illita glutinant. Carnes si vnà coquantur cogunt. Inflammationibus, sedis potissimum, cum Senecionis folis vtiliter illinuntur.

EX GALENO.

Symphytum magnum similem petræo facultatem habet, non tamen gustantibus dulce, neque odorantibus odoratum apparet, sed iis sanè ab illo dñersum est. Cæterum quatenus viscositatem quandam & mordacitatē obtinet, Scilla simile est. Vtitor eo ad omnia quæ petræo. Potest autem petræum collectū in thorace, pulmoneq; pus expurgare. Habet etiam contrahendi vim, qua sanguinis eiectionibus auxiliatur. Enterocœlijs imponitur, & ad cōuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. In vino decoctum ad dysenteriam, & profluiū muliebri rubrum constringendum exhibetur.

EX PLINIO.

Symphyti radix illita, enterocœlas cohibet. Vulneribus sanandis tanta præstātia est, vt carnes quoque cū coquūtur, conglutinet addita, vnde & Græci non men imposuere. Osibus quoque fractis medetur.

SYMPHYTI PETRAEI VIRE S.

Quum Dioscorides & Galenus ad Symphyti facultates

cultates lectorem in Symphyti magni historia allegent remittantq; neesse est, vt illas ordine communeremus more quidem nostro, primū ex Dioscorida de, deinde ex Galeno & Plinio.

EX DIOSCORIDE.

Decoctum ius aqua mulsa & potū Symphytum petraū, qua in pulmone sunt expurgat. Sanguinem reiicientibus & renum doloribus cum aqua datur. Ad dysenteria & rubra foeminarum profluvia in vino decoctum bibitur. Ad cōuulsa & rupta ex aceto mulso sumitur. Cōmāducatum sitim arcet. Gutturis asperitatibus prodest. Recentia vulnera glutinat, & intestinorum ramices illitum coercet. Carnes cum vnā coquitur, conglutinat.

EX GALENO.

Symphytū petraū ex cōtrariis constat facultatibus: habet enim incidēdi vim quampiā, qua collectum in thorace & pulmone pus expurgare potest. Habet etiā quādam contrahendi facultatem, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quādā nō immodicē calida, p̄ quā gustantibus dulce apparet, & odoratu incundum. Mansum sitim extinguit, & arteriae asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarum virium missionē simul digerere abūdē potest, simulq; corpora cōtrahere & cōstringere. Proinde enterocœliis imponitur, & ad cōuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. Caterū qui ipsum in vino decoctum ad
dysenter

PLANTARVM HISTORIAE

dysenteriam, & rubrum muliebri profluuiū exhibent, tanquam desiccante & contrahente vtuntur. Qui verò ad nephritin renūmve dolorem, tanquam expurgante & incidente.

EX PLINIO.

Vtilissimum lateribus, lienibus, renibus, torminibus, pectoris pulmonibus, sanguinem reiicientibus, faucibus asperis. Bibitur radix trita, & in vino decocta, & aliquando superlinitur. Quin & commāducata sitim sedat, præcipueq; pulmonem refrigerat. Luxatis quoque imponitur & conuulsis, lieni, interancis. Aluum sistit coacta in cineres. Detrahis quoque folliculis trita cum piperis nouem granis, & ex aqua pota. Vulneribus sanādis tāta præstantia est, vt carnes quoque cū coquuntur, cōglutinet addita, vnde & Græci nomen imposuerunt. Ossibus quoque fractis medetur.

DE SICY SATIVA.

CAP. CCLXVII.

NOMINA.

Σίκυς, κῦ σίκυος ἡμῶρος Græcis, Cucumis & Cucumer Latinis dicitur. Officina latinā appellationem retinuerunt. Actius angurium etiā vocari tradit. Germani Cucumern (Galli Concombre) vocant. Cucumer autem, vt Varroni placet, dicitur à curuore, quasi Curuimer. Sicyon verò Græci ex aduerso ἀπὸ τοῦ σβένειν & κύνειν, quod Sicys. scilicet appetentiam concumbendi minime stimulet,

let, nominasse videntur. Hinc celebratum Græcis
 prouerbiū est, vt ex Athenæo annotauit Hermo- Adagiū.
 laus: Texens pallium mulier cucumerem deuoret, Textrices
 quod textrices magna ex parte, si Aristoteli credi- magna ex
 mus, impudicæ sint, & opportuna Veneri. Vt ergo parte im-
 iis impetus infrenetur & elanguescat, adagium e- pudica.
 dendos cucumeres textricibus consulebat.

GENERA.

Cucumerum genera sunt Pepones & Melopepo= Pepones.
 nes in quos statim degenerant, figura tantum & Melopepo
 quantitate inter se diffidentes. Siquidem qui ma- nes.
 gnitudine excedunt, aut in longitudinem procedunt,
 quales multis locis nascuntur, Pepones quondam
 vocati fuerunt. Sed qui formam & effigiem mālī
 referunt, & humi rotundantur, Melopepones Græ-
 cis vocantur, factō ex Pepone & mālō nomine: ne-
 que inter Pepones & Melopepones aliud quā quod
 sumitur, ex figura quondam, vt diximus, discrimen
 fuit. Totum hoc genus Palladius Melones, quasi Melones
 μήλωνες, id est, pomeos, à mālōrum figura appella cur dicti.
 uit, quo nomine maior pars hodie medicorum si-
 mul cum officinis vtitur. Sunt itaque in vniuer-
 sum tria Cucumerum satiuorum genera. Pri-
 mum genus absolutè Cucumis, à nostræ ætatis her Cucumis.
 bariis, cum adiectione Cucumis citrinus, hoc est,
 flavus, à colore quem habet cū maturuerit, appel-
 latur. Aetius, quod equidem sciam primus Anguria Anguria.
 vocari tradit, quæ veteribus σίνυα, id est, Cucu-
 meres

meres nominantur. Horum sanè plura sunt genera, nos quatuor potiora commemorabimus, quorum etiam picturas exhibemus. Primi generis est vulgaris Cucumer, fructum obtinens oblongum & maculosum, Germanicè vocatur gemeyn Cucumern. Sunt qui illum priuatim Anguriam appellant. Ad quod sanè nomen alludentes Germani nostri, alio nomine Gurchen nominant. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turcicum nuncupat, priori multò maior ac procerior foliis, floribus & fructu, qui vt in primo nō est maculosus, sed tamen oblongus etiam. Germani Türkisch Cucumern appellant. Fructus eius admodum flavus existit. Hinc est quòd multi eundem priuatim Citrulum & Citreolum, quasi citrinum, hoc est, flavum vocent. Huius semina alba & lata sunt. Tertiij generis Cucumer est qui marinus dicitur, Turcico, quòd ad folia, flores & semina attingit, ferè similis, nisi quòd in hoc omnia sint minora. Fructus verò rotundus, vt pictura monstrat. Vulgus Zucco marin vocat. Germani meer Cucumer. Officinis perinde atque Turcicus ignotus. Quarti generis Cucumer est, quam officinae hodie Citrulum vocant. Folia habet ferè Colocynthidis, multifariam dissecta & incisa: fructum rotundum, herbacei coloris, & in eo semina lata, & colore spadicea, hoc est, in rufo atra. Nos officinas respicientes nominavimus hunc Cucumerem citrulum,

Citreoli
aut Citru
li.

lum, Germanicè Citrullen. Alterum genus Cucu-
meris est, qui nunc simpliciter Pepon, ὁ τὸ τοῦ πεπο-
ποιέμεθα, hoc est, maturefcere dicitur. Is enim
mitis ac tener maturitate flaccescit. Germani Pse-
ben appellant. Tertium genus Cucumeris hodie
Melon ab omnibus vocatur, Germani Melaun non Melon.
minant. A priore forma & suauitate differt: rotun-
dior siquidem & mâli cotonei quasi formam refe-
rens, mitiorq; existit. Discrimen hoc sentientes poste-
riores Græci σίκω simpliciter dixerunt, quem nos
priuatim modò Cucumerem vocamus. Adiecta au-
tem Peponis voce, hūc quem nostra ætas priuatim
Peponem nominat, σίκω τῆς πεπον, id est, Cucu-
merem Peponem dixerunt, mitem scilicet & ma-
turitytate tenerum Cucumim inuuentes. Sub quo cū
etiam, quem à tereti ac rotunda mâli effigie μή-
λων peculiariter dixerunt, complexi sunt.

FORMA.

Cucumis sarmētis viticulisq; prælongis serpit, in Cucumis.
ramósque vitis modo se diffundit, tamen ob caulis
infirmi- tatem humi spargitur, ni propius adsit cui
caducus incumbat: folio anguloso, flore luteo, fru-
ctu cartilagineo, & interdum maculoso, coloris tū
herbacei, tū citrini, tum nigri. Pepo vite serpit præ-
Pepo.
longa, flagellis vltro citroq; reptantibus, vitigineis
ferè frondibus, scabris, flore luteo, fructu cartila-
gineo, orbiculatim striato, prominulis puluino-
rum toris, strigilibus in vertice pomi & umbilico
coeuntis

PLANTARVM HISTORIAE

cocuntibus, ibidemq; stellatim decussatis, cute aspera velut lentiginibus occupata, carne intus suavis, feminibus in vtero liratim digestis.

LOCVS.

Pingui gaudet solo, locisq; apricis vberior prouenit Cucumis. Nascuntur & pepones bene cultis locis, eoque latius si subinde rigentur. Amant tamen aprica loca, & sole irradiata: ideoque cum annus est pluuiosus & nubilus, non aequè ut in siccis annis proueniunt. Libertate etiam gaudent, quia possint ultro vagari. Magna copia Peponum & Melonum apud Norimbergam, celeberrimum Germania nostrae oppidum, prouenit.

TEMPVS.

Aestatis fine, Iulio potissimum mense, maturescunt. Citius tamen Melones quam priuatim Cucumeres dicti.

TEMPERAMENTVM.

In Cucumeribus superat humida & frigida temperies, non tamen vehementer, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humida fuerit natura, sed iam desiccantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Satiuus Cucumis bonam facit aluum, stomachoque accommodatus est. Refrigerat nec corruptionem sentit. Prodest vesicae. Olfactu animo deficientes restituit.

restituit. Semen eius mediocriter urinam cit. Cum lacte aut passo vesicæ exulcerationibus subuenit. Folia eius cum vino illita, morsus canum sanant, cū melle verò epinyctidas. Peponis autem caro comesta urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Superior eius cortex contra adustionem infantium, quam siriasin vocāt, syncipiti imponitur. Frōti vt oculorū fluxiones auertat, imponitur. Mixtus farine, & cum semine in sole siccatus succus, singula fit ad extergendam cutem, & nitorem in facie conciliandum. Radix sicca, & cum hydromelite drachmæ pōdere pota, vomitiones mouet. Quòd si quis modicè à cœna vomere cupiat, gemini uboli satis erunt. Sanat & vlcera in modum favi cōcreta, ceria vocant, cum melle illita.

EX GALENO.

Cucumis esculētus maturus quidē tenuioris essentia est, qui verò immaturus est, crassioris. Sed et abstergend: & incidendi facultate participāt, quare & urinam mouent, & corpus splendidum reddūt: at magis si quis semine arefacto contusoq; atq; cribrato, vice pulueris abstersoriae vtatur. In semine et radice maior abstergend: facultas, quàm in fructus ipsius carne. Vniuersa Peponū natura frigidior cum larga humiditate existit. Habent & quandā abstergēdi vim, idēq; urinā cient, & decorsum expeditius quàm Cucurbita & Melo pepones rapiūtur. Quòd porrò abstergāt, discere licet sordidā cutem BB defricādo.

defricando. Quamobrem maculas etiam solis calore factas, & lenticulas faciem occupantes, & in superficie albos extergere possunt. Semē quod in eorum veluti carne continetur, ad hoc efficacius, adeo ut renibus etiam calculo infestatis sit accommodatum. Gignit in corpore vitiosum succū, potissimum quando non recte concoquitur. Tū verò morbum etiam qui cholera dicitur, inducere consuevit. Etenim priusquam ad corruptionem peruenit, vomitioni quoque idoneus est: largiusque ingestus, nisi quis aliquid eorum quae boni sunt succi supermādet, omnino vomitum concitabit. Melopepones minus humidi quam Pepones sunt, nec adeo prauis succi, segnius item prouocant urinam, tardiusque deorsum descendunt. Ad vomitum excitandum non eandem vim Peponibus obtinent, sicut nec celeriter in ventriculo, quando illic prauus humor coacervatur, aut alia corruptionis causa illum infestauerit, corrumpuntur. Ventriculo haudquaquam ceu Pepones efficiunt. Cucumeres autem urinam mouendi facultatem, perinde atque Pepones habent, sed imbecilliores: minus namque substantia humidi, indeoque non facile, ut illi, in ventriculo corrumpuntur. Inuenias qui hos ceu alia multa, quae bonae hominum parti concoqui non possunt, consiciant, ob totius scilicet naturae cum eis proprietatem.

EX PLINIO.

Pepones qui vocantur, refrigerant, maximè in cibis, &

bo, & emolliunt alium. Caro eorum epiphoris oculorum, aut doloribus imponitur. Radix sanat vlcera cōcreta in modū faui, quæ ceria vocant. Eadem contra vomitiones siccatur, in farina iussa datur, quatuor obolis in aqua mulsa, ita vt qui biberit, quingētos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adiicitur. Cortex quoq; vomitionem mouet, faciē purgat. Hoc & folia cuiuscunque satiuū illita. Eadem cū melle epinyctidas sanāt: cum vino canis morsus. Cucumis odore defectum animi.

EX SIMEONE SETHI.

Anguria, quæ Cucumeres dicuntur, secundū verò communem sermonem Tetrangura ob frigidum & humidum temperamētum noxia sunt, & mali succi. Ex iis autē parua magnis anteferre oportet. Hæc vrinā ducūt, & si in aceto macerētur, in acutis præsertim febribus, mitiorem calorē reddunt. Crebrior verò horū vsus semen genitale minuit, in Venerēque impetum aufert. Semen autem horum desiccatum, caliditatem quandam possidet, contrariāque his actionem efficit, vrinamq; magis prouocat. Pituitā glutinosā Tetrāgura in vētriculo gignūt, quæ cruda per venas diffunditur. Propterea qui his crebrius vtuntur, illi propter humores temporis spatio in venis, & aliis corporis cavitatibus coactos, longis corripiuntur febribus. Semen verò horum vrinam cit, sed minus quàm Peponum, quoniam celerius in ventriculo corrumpuntur. Meliora

PLANTARVM HISTORIAE

in his sunt quæ habent semen exiguum. Calidos autem & siccos stomachos iuuant, & si in ardente febre cū aceto porrigantur, valde prosunt. Proprium verò horum est nauseas ventriculi calore excitationes, sedare. Horum autem interiora esse oportet: nam quæ foris sunt, mali succi existunt, & difficulter admodum concoquuntur, & ferè venenata. Habent verò & alias proprietates vt animo deficientes propter excessentem calorem reficiant. Si autem pituitam in ventriculo nanciscantur, nauseas faciunt, & colicos affectus, & hypochondriacas passionēs.

DE SICY SYLVESTRI.

CAP. CCLXVIII.

NOMINA.

Cucum is **Σ** Ἰκὺς ἄγριος, ἢ ἐλατήριον, sic autem propriè vocatur succus eius Græcis, *Cucumis anguinus*, sylvestris & erraticus Latinis, of *Cucumber* ficinis & barbaris *Cucumber asininus*, Germanis *asininus*. *Vuild Cucumber*, vel *esels Cucumber* (Gallis *Concombre sauuage*) appellatur.

FORMA.

Solo fructu à satiuo Cucumere distat, quem multo minorem habet, glandibusq; longiusculis similē. Folia & sarmenta satiuo similia. Radicem albam & magnam. Totus frutex amarus.

LOCVS.

Ruderibus sabulosisq; locis prouenit. Nusquā tamē

men in Germania, quòd sciam, nisi satus nascitur.

TEMPVS.

Augusto mēse floret, atque subinde autumnò fructum tempestiuum producit, qui seminibus ac succo plenus est, qui decerpto pediculo confestim exsiliare solet.

TEMPERAMENTVM.

Calidus & siccus est Cucumis syluestris, vt ex viribus latius patebit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Foliorum succus instillatus aurium dolori cōuenit. Illita ex polenta radix omne vetus œdema discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Decocta ex aceto & illita podagras discutit. Ischiadicis infunditur eius decoctum, eoque in dolore dentes colluuntur. Arida trita, alphas, lepras & impetiginem abstergit. Cicatrices nigras, & in facie maculas expurgat: Radicis succus sequioboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiiciunt, præsertim in hydropicis. Purgat verò citra stomachi iniuriam. Radicis scilibram accipere oportet, inque duobus vini, præsertim Libyci, sextariis conterere, ac dandi ex eo terni cyathi, donec tumor abundè subsederit. Quod verò Elaterium vocatur, ex fructu huius Elaterii iussu Cucumeris paratur ad hunc modum. Eligito confectio.

Cucumeres qui tacti saliendo succum ex se profundunt, ac nocte vna repositos dimitte. Postridie

cribrum rarius neque crebra foramina habens crateri superposito, supinóque cultro sursum versus acciem habente sigillatim Cucumeres utrisque manibus prehensens diuidito, & per cribrum in subiectum craterem humorem exprimito, simulq; carnosum in eis quod iam cribro adheret exprimito, ut & illud descendat. Quæ expressa sunt in paratam peluim coniecit. Coacervatis autem in cribro quæ antea dissecta fuerunt, ea dulci aqua persundito, & cum expresseris abiicito. Humorem in pelui agitatum & linteo operitum, soli exponito, dumq; steterit totam supernatantem aquam, cum humore concreto, percolato. Facitóque id sæpius donec supernatans aqua subsidat, quam cum diligenter excolaueris, coniectum in mortarium sedimentum terito, &

Vires Elaterij.

in pastillos conformato. Elaterium verò à bimatu ad decennium purgationibus utile. Integra quantitas obolus est, minima semiobolus, pueris chalciduo. Copiosius enim potum, periculum adfert. Pityuitam & bilē per inferna pariter & superna trahit. Optima autem per ipsum difficulter spirantis bus fit purgatio. Quòd si itaque in animo est per aluum purgare: adiecto salis duplo, & stibij quod colorari sufficiat, ex aqua catapotia crui magnitudine dato. Postea cyathus unus aquæ tepidæ sorbeatur. Ad citandas verò vomitiones aqua diluens Elaterium, subiectas linguæ partes penitissimè penna oblinito. Quòd si quispiã difficiliter vomat, oleo

aut vnguento iuino diluito. Somnum inhibeto. Porro iis qui supra modum purgantur, vinū cum oleo mixtum continuò dare conuenit: etenim vomendo emēdantur. Quòd si vomitiones non finiātur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachū densare possunt offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Fœtus enecat in passo subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Diurnos capitis dolores finit. Efficaciter angina laborantibus inungitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

EX GALENO.

Cucumeris sylvestris, et fructus ipsius succus, quē Elaterium vocāt, & nō minimè radicis ac foliorū, ad medicationes perutilis est. Elaterium itaq; menses ciet, & fœtum interimit appositum, ceu alia omnia amara & subtilium partium, maxime si aliquam habeant caliditatem, veluti Elateriū. Sūmè siquidem amarum est, leuiter calidum, vt ex secundo sit ordine calefacientium. Porro tale protinus quoque digerendi vim obtinet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cū melle, aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectis fusum cū lacte in nares. Hoc etiam vsu dolores capitis sanat. Atque Elaterium quidem eiusmodi est. At radicis succus, vt & foliorum, licet similem vim habeat, imbecilliolem tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet, abstergit nanque, digerit atq; emollit. Porro cortex eo potentius desiccatur.

Ex Cucumere sylvestri fit medicamentum quòd vocatur Elaterium, succo expresso è fructu. Cuius causa nisi maturius incidatur, succus exilit, oculorum etiam periculo. Obscuritates & vitia oculorum sanat, genarumque vlcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus vitium, non attingi vnas ab auibus. Radix autem ex aceto cocta podagris illinitur, succoque dentium dolori medetur, arida cum resina impetiginem & scabiem, quam psoram & lichenas vocant. Parotidas & panos sanat, cicatricibus colorem reddit. Et foliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Nullum ex medicamentis Elaterio longiore aëuo durat. Incipit à trimatu. Melius autem quo vetustius erit, quod iam ducentis annis seruatum esse, autor est Theophrastus. Et vsque ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguit. Hoc enim veri experimentum est, si admotum prius quàm extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Efficax est contra scorpionum ictus Elaterium, & ad purgandū vterum, aluumque. Modus portione virium à dimidio obolo ad solidum. Copiosius necat. Sic & contra phthiriasin bibitur & hydropises. Illitum, anguinas & artérias cum melle, & oleo vetere sanat.

DE SMILACE HORTENSI.

CAP. CCLXIX.

NOMINA.

μίλαξ κητώαία Græcè, *Smilax hortēsis*

Ξ Latine, *Officinis inusitata*: recentiores

Græci ac herbarii, & qui Arabum, præ-

sertim Serapionis & Auicennæ, sectantur placita,

Phasiolos vel *Faseolos*. Galenus et alii veteres Græ *Phasioli*.

ci *Dolichos* appellant. Germani *Faselen*, Vuel- *Dolichi*.

sch oder *Vuild Bonen* (*Galli Phasiolæ*) vocāt.

FORMA.

Folia Hederae similia habet, molliora tamē: cau-
les tenues, & capreolos vicinis fruticibus se implic-
cātes, in tantum increscentes, vt tabernacula effin-
gere possint. Fructum Fænogræco similem profert,
longiorem tamen maioremque, in quo semina reni-
bus similia, non vnius coloris, sed ex parte subrusa
continentur. Ex qua certè delineatione sole clarius
fit, Smilacem hortensem Dioscoridis non esse nisi
Phaseolos vulgò vocatos, cum sint foliis Hederae,
mollioribus atque venosis, cauliculis tenuibus, clas-
miculis propinquis fruticibus se implicantibus, ra-
mis incremento suo tentoria & hortorum cameras
fornicesve facientibus, siliquis Fænogræco haud
dissimilibus, longioribus autem & maioribus, semi-
nibus intus versicoloribus, & renib in vniuersum
similibus. Quæ certè vnica nota ad docēdum Smi-
lacem hortensem esse Phaseolos sufficere posset. Ac-
cedit quòd Phaseolorum apud Serapionem descri-
ptio non sit alia quàm apud Dioscoridem Smilacis
hortensis.

PLANTARVM HISTORIAE

hortensis, id quod manifestè patebit vtriusque conferenti. Cæterum etsi duo Phaseolorum videantur esse genera: sunt enim aliqui cædidi, nonnulli verò rubentes, tamen quia in foliis nulla est prorsus diuersitas, & Dioscorides quoque innuat semina hæc nō esse vnius coloris, sed vt Serapion interpretatur, quædam ad candorē, quædam verò ad ruborē accedant, ideo sub vnicâ pictura vtriusque coloris Phaseolos exhibemus: neque enim distant alia ratione, quàm quòd albi producant flores candidos, rubentes verò purpurascens. Licet non ad candidos & ἰσόχροα. rubētes tantū hæc Dioscoridis verba, ἑνὶ ἰσόχροα, referenda esse existimem, sed ad alios etiam: sunt enim nonnulli fusci, alij verò gilui, cœrulei & cæssi, alij maculis & orbibus atris variegati, nisi quis omnes iam dictos colores sub candido & rubro, ex quibus ij commixti esse videntur, complecti velit.

LOCVS

Smilax de qua hic agimus, vt ex nomine satis constat, in hortis sata prouenit, & cum lōgis serpat flagellis, propè poni ridicæ palivē debent, quas capreolis suis, vbi increuerit, complectatur.

TEMPVS.

Aestate florent, ac subinde siliquas & in iis semen producunt.

TEMPERAMENTVM.

Simeon Sethi & Mauritani in primo ordine calidos & humidos esse Phaseolos statuunt. Galenus etiam

etiam in libro primo de Alimētorum facultatibus,
humidiores natura esse asserit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Olerum modo esui apta est siliqua cum semine
Asparagi modo elixa. Vrinam pellit, insomniāque
grauia & tumultuosa facit.

EX GALENO.

Dolichi nō minus quā Pīsa nutriunt, similiter
etiam flatu carent: sed quōd ad suauitatem attinet
& deiectionem, peiores sunt. Alibiles itaque sunt,
nisi quādo integri & etiamnum virides vnā cum
suis siliquis ex oleo & garo ab hominib. ingerūtur.
Aliqui vinum etiā adiiciunt. Sed horum in reposi-
tione, vt Pisorum, nullus est vsus: quippe quum na-
tura sint humidiores, citō corrumpi consueuerunt.
Attamen si quis hos tutō reponere cupiat, siccare
prius diligenter & exactē oportebit. Siquidē eo mo-
do & à putrefactione et à corruptione tota hyeme
vindicanur, eundē quē nobis Pīsa vsum exhibētes.

EX AETIO.

Siliqua seu Lobi qui nunc passim vocātur, apud
omnes antiquos Dolichi & Phasioli appellati, de
genere Pisorum sunt, similes illis quantum ad mi-
nimam flatus generationem: quantum verō ad iu-
cunditatem cibi & egestionem peiores. Peculiariter
autem Lobi dicuntur, quoniam ferē isti tantum
eorum omnium quæ siliqua vestiūtur, cum siliquis
suis comeduntur.

PLANTARVM HISTORIAE

EX SIMEONE SETHI.

Qui ex iis magis rubri sunt, calidiores. Manifesta quoque in iis humiditas, quòd cito putrescant. Humorem generant crassum & pituitosum. Medium locum habent, vt ait Galenus, inter ea quæ facile & difficulter concoquuntur, celeriter & tardè trās- eunt, inflant & non inflant, parum & multum nu- triunt. Ante alios cibos cum sapa sumpti, ventrem proritant. Cum sinapi oblati, plurimum noxæ depo- nunt. Alibi igitur Phasioli crassiores, & difficilio- ris coctionis, ac humidiores sunt quàm rubri. Prop- rietate autem quadam turbulenta somnia facit, sed ad bonam habitudinem corporis conferunt, & vrinas mouent. Et horum decoctum menses mouet.

DE SATYRIO TRIFOLIO.

CAP. CCLXX.

NOMINA.

ατύριον τρίφυλλον Græcis, Satyrium
 & trifoliū Latinis, Officinis nostris incogni-
 tum aut inusitatū: vulgò Testiculus vulpis
 Testiculi aut sacerdoti, Germ. Stendeluurtz, (Gallis Du
 vulpis. Satyrii à trois feuilles) nominatur. Satyrio aut
 Satyrium tamen nomen fecerunt Satyri, qui primi syluestres dij
 unde di- colludētes nymphis per syluas & antra, ad firmio-
 Etum. rem Venerem herbam hanc inuenerunt. Trifoliū
 Trifoliū. Verò, quoniam tria fert folia ad terram versa.

FORMA.

Folia tria fert Rumici aut Lilio similia, minora
 tamen

tamen & rubentia. Caulcm nudum, longum, cubicalem. Florem Lilio similem, album. Radicem bulbo similem, mâli modo extuberantem, foris rufam, intus oui modo albam, gustu dulcem & originatâ. Quod verò hîc dicimus Lilio similem, non sic intelligendum venit quasi quantitate & tota figura Lilio similis flos sit, quando euidentissimum sit Liliû quantitate sua Satyrû florem multis modis superare. Denique nec figura etiam per omnia respondet: quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiã referri potius debet, quæ planè eadem est cum Liliû colore & essentia, id quod conferenti hos duos flores manifestum fiet.

LOCVS.

In montosis & apricis nascitur.

TEMPVS.

In Iunio mense potissimum compâret.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & humidum est, quamobrem gustu dulci apparet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix in vino austero, nigro, ad opisthotonum bibitur. Ferunt etiam hanc impetum ad Venerem excitare.

EX GALENO.

Satyrion excrementitiam & flatuosam humiditatem possidet, quocirca ad Venerem incitat. Hæc verò & herbe ipsius radix præstare potest. Porro vt nonnulli scribunt, cum vino nigro austero potum opisthotonum

PLANTARVM HISTORIAE

opisthotonum sanat.

EX PLINIO.

Radix cū Satyrio gemina sit, eius inferior pars et maior mares gignit, superior ac minor fœminas.

DE SATYRIO BASILICO.

CAP. CCLXXI.

NOMINA.

*Palma
Christi.
Digiti ci-
trini.*

Σ ατύριου βασιλικὸν posterioribus Græcis, Satyrium regium Latinis, Officinis Palma Christi, Arabibus Bucheiden, Auicennæ Digiti citrini, Germanis Kreutzblumen, (Gallis Du Satyrium royal) vocatur. Palmam Christi propter similitudinem quam eius radix cum humana habet manu, dixerunt.

GENERA.

Mas.

Fœmina.

Duo eius sunt genera, quorum alterum mas folia non maculosa floresque purpureos habet. Alterum fœmina maculosis est & paulò latioribus foliis, fioribus in purpureo albescantibus. Radicum etiam in colore est differentia, quæ d maris quidem radix flavescat citra albedinem, fœminæ autem cum albedine. Quam sanè differentiam Auicenna etiam expressisse videtur, dum vnâ ex flavo & albo commistam esse colore, alteram verò ex flavo sine albedine inquit.

FORMA.

Folia cum reliqua superficie Cynosorcho similia sunt. Radix tamen ei subest lutea aut flavescens, in-
star

*star manus.ramosa:modo enim quatuor,modo quinq̃
que,modo sex aut plures radices prodeunt, quæ fe-
rè humanos digitos imitari videntur.*

LOCVS.

Prouenit in montibus, & locis soli expositis.

TEMPVS.

*In Maio & Iunio mensibus inuenitur. Mas qui-
dem Iunio, fœmina verò Maio.*

TEMPERAMENTVM.

*Vtrunq̃ amarum est, magis tamen amarum
quod maculosis constat foliis. Idè que non perperã
censent Auicenna & alij quidam ex recentioribus
medicis, qui calidum esse & siccum in secundo or-
dine tradunt.*

VIRE. EX RECENTIORIBVS.

*Vsus eius ad crugandam cutem, ad nervorum do-
lores, & cõtra noxia medicamenta. Fertur & am-
letum esse radix gustata. Semen ex vino sumptum
nouem diebus, comitiales sanat. in eundẽ effectum
vinum diluitur herbæ decocto. Scobs radieis propi-
natur in vino ad arcendam quartanã, quam & vo-
mitione curat paulò ante accessionem pota. Plura
in præsentia rescire de huius facultatib. non licuit.*

DE SVCCISA. CAP. CCLXXII.

NOMINA.

Quo nomine veteres aut posteriores Græci
appellauerint hanc herbam, cognitãque
illam habuerint nec ne, nobis nondũ con-
stat.

PLANTARVM HISTORIAE

Succisa. *stat. Nonnulli Geum esse arbitrantur. Nos Succisam nominare voluimus, partim quòd id nominis Latinum esset, & pulchrè huic herbæ quadraret, cuius radices circūroscæ sunt, partim quòd antiquus manuscriptus herbarius sic vocaret. Vulgus superstitione quadam motum credit cacodæmonia, tantæ efficaciæ radicē inuidere hominibus, atque hac ratione ubi succreuerit statim eum vndiquaque circumrodere. Hinc est quòd Diaboli morsum appellissent. Quam etiam superstitionem plusquam muliebrem secuti Germani Teuffels abbas, (Galli Mors de Diable) hoc est, præmorsam à diabolo, nominant.*

**Morsus
diaboli.**

FORMA.

Binum cubitorum fastigiatur altitudine, foliis Plantaginis minoris, aut Cirsii leuioribus, solidioribusq; leniter laciniatis. Floribus purpureis. Radicibus subnigris, succisis & circumrosis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis & montanis, saltibus, ac interdum etiam prati & dumetis.

TEMPVS.

In Augusto eius magna est passim in locis iam dictis copia.

TEMPERAMENTVM.

Supra modum amara est, vnde calidam & siccam esse satis constare cuius potest.

VIRE S.

Præsentaneo remedio ad maturandos, atq; adedò sanandos

sanandos carbunculos adhibetur, si herba viridis trita impenatur, aut vinum in quo decocta fuerit bibatur. Radix per se estur, aut vinum eius decocti in vuluæ doloribus bibitur. Hæc manuscriptus herbarius. Hodie, cū habeat facultatem discutienti & incidendi, vtuntur ea ad dissoluendos sanguinis grumos.

DE SCABIOSA. CAP. CCLXXIII.

NOMINA.

ET hæc herba quo nomine Græcis vocetur, fatemur nos ignorare. Sunt qui Actio ἰώεον dictam velint: verum cum nomine tenus cum tantum prosequatur non adiecta descriptione, nihil certi cōstitui potest. Vulgus Scabiosam vocat, quo nomine nobis vtendum erit donec legitimum compertum fuerit, Germani Scabiosen, oder Apstemkraut, (Galli La Scabieuse) nomināt. Scabiosam verò aut à scabro herbæ habitu, aut quod scabiei medeatur, appellatam esse euidentissimum est: id quod etiam Psora vox præterevidetur. Stæben Dioscoridis non esse multis argumentis constat, quæ prætereo.

Scabiosa.

Scabiosa
vnde dicta.Scabiosa
nō est Stæbe.

FORMA.

Folia carnosæ Eruce modo laciniata & multifida habet, subhirsuta, non tamen aculeis horrētia. Flores speciosos, diurnos, coloris ex cæsis aut purpureo albicantis. Radicem crassam.

LOCVS.

CC

Passim

PLANTARVM HISTORIAE

Passim in omnibus, potissimum autem humidis pratis prouenit.

TEMPVS.

In Iunio, antequam gramine denudentur prata, passim floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum sit vehementer amara, calidam & siccam esse nemo nescit, idemque cum Succisa temperamentum habet.

VIREs.

Easdem quas Succisa facultates obtinet. Potissimum autem scabiem & tussim sanat.

DE SMILACE ASPERA.

CAP. CCLXXIIII.

Smilax aspera etiam foliorum ambitu spinoso modo solo stipite in Gallia Narbonensi visitur.

NOMINA.

Smilax et Milax. Σ $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\varsigma \tau\rho\alpha\chi\epsilon\acute{\iota}\alpha$ Dioscoridi, $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\varsigma$ Galeno, *Smilax aspera* Latinis dicitur, officinis nostris incognita, Germanicè Grosz Stechend oder scharpff Vuindt, ab aculeis quos habet, nominari aptè potest.

FORMA.

Folia habet Peryclimeno similia, vel, vt Theophrastus ait, hederacea: ramulos multos, tenues, palistri aut Rubi modo aculeatos. Circumuoluitur arboribus sursum deorsum se circumagens. Florē candidum,

didum, fructum racemosum fert, cum maturuerit
rubentem, gustu leuiter mordentem. Radicē cras-
sam & duram.

LOCVS.

In palustribus & asperis nascitur, Plinio autem
teste in conuallibus opacis.

TEMPVS.

Smilacem quidem asperam nascentem, non vidi:
sicca enim aliunde ad me transmissa est, ita vt cer-
tò indicare quo tempore floreat aut fructum produ-
cat, haud possim. Id quod ideo referre volui, ne nos
calumniadi ansam habeat os peruersus, si non ex
omni parte picturam nativæ ipsius herbæ formæ
respondere viderit. Cogitet enim non viridem, sed
siccā nos pingendam tantum dedisse. Theophra-
stus tamen lib. iij. cap. vlt. de hist. plant. hanc verno
tempore florere scribit.

TEMPERAMENTVM.

Quale sit eius temperamentū, vires satis decla-
rāt, & folia ipsa atque fructus, quæ singula in gu-
stu leuem quandam mordicationem præ se ferunt,
vt calidum esse & siccā haud dubium sit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius folia & fructus si antè & post bibantur
contra letalia venena efficacia sunt. Traditū est,
quòd si quis tritum eorum aliquid nuper genito in-
fanti bibendum dederit, nullum illi postea venenū
nociturum. Conciditur etiam in alexipharmaca.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Milax aspera clauiculis plena est, vt arboribus sursum deorsum diuersimodè circumuoluatur. Folia gustata acrimoniam aliquam habent, & alioqui si illis vtaris, calefaciunt.

EX PLINIO.

Coronā ex ea factam impari foliorum numero, aiunt capitis doloribus mederi. Contra venenata efficacissimi acinorum corymbi, in tantum vt acinorum succo infantibus sæpe instillato, nulla postea venena nocitura sint.

DE SMILACE LAEVI. CAP.

CCLXXV.

Smilax laevis Liset & Liseron à ligandis quibus adnascitur plantis hic pingitur.

NOMINA.

Volubilis maior. Σ $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\varsigma\lambda\epsilon\acute{\iota}\alpha$ Dioscoridi, $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\varsigma$ Galeno, & Paulo dicitur. Latinis *Smilax laevis*. Officiis Funis arborum. *nis* & herbariis *Volubilis maior*, à nonnullis *Camponella*, & *Funis arborum*, Germanis *Vuindenkraut*, glatte *Vuinden*, oder *Vueisz glocken* *Smilax laevis* cur (Gallis des Phasceles) vocatur. *Laevis* autē non nominata. alia ratione, nisi quòd aculeis careat, dicta est.

FORMA.

Hederae similia folia habet, molliora tamen, leuiora et tenuiora. Ramulos supra dicta similes, aculeis carètes. Cōuoluitur & hac arboribus, vt prior. Fructum fert Lupino similem, nigrum, paruum, super

super quem semper flores albi, copiosi, & orbiculati per totam Smilacem exeunt. Aestate tabernacula per ipsam fiunt, autumno autē folia cadūt. Ex qua descriptione planum fit omnibus, herbam hāc quā vulgus herbariorū Volubilem maiorem vocat, esse Smilacem leuem, quod illi scilicet singulæ notæ à nobis commemoratæ conueniant. Id quod etiam pictura Smilacis asperæ, si cum hac cōferas, satis demonstrat, quam vno hoc nomine dedimus, vt ex eiusdem collatione manifestius leuis ipsa agnosceretur. His accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, qui Smilacem leuem, Volubilem maiorem interpretatur. Eius etiam pictura, Volubile quam maiorem appellamus, penitus exprimit.

LOCVS.

Nascitur passim per fruteta, & sepibus sese inuoluit. Amat culta, & in iis etiā potissimū gignitur.

TEMPVS.

Aestate floret, autumno semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Modicam amaritudinem in gustu præ se fert.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius semen cum Dorycnio, & vtrunque trium obolorum pondere potum, somnia multa & turbulenta facere fertur.

EX GALENO.

Milax leuis facultate quodammodo prædictæ similis est.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO.

Nullius est effectus.

APPENDIX.

Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidas vtūtur passionēs, capitis potissimū & oculorū.

DE SISYMBRIO. CAP.

CCLXXVI.

*Sisymbrium alterum seu Cardamine cre-
scio, à crescendi celeritate vulgò dicitur.*

NOMINA.

Σισύμβριον Græcis, *Sisymbriū* Latinis, (*Gal-
lis Cresson*) appellatur. *Sisymbriū* dici pu-
tat Varro à *Sisymbrio*, quæ fuit veteribus comes-
diis meretricula. Coronam etiam Veneris nonnulli
dixerunt, vel quòd ob odoris suauitatē quam præ-
se fert, coiuuentus qua amoribus gaudet coronata,
in comessationibus suis blando odoris oblectamen-
to suas illecebras commendaret. Vel potius, quòd
Sisymbrij caulis articulatim per internodia verti-
cillato florum ambitu concinnè coronetur.

GENERA.

Sisymbrij duo sunt genera. Vnum quod simpliciter *Sisymbrium* dicitur: hoc seplasiarū *Balsamita*,
ter ut manuscriptus etiam testatur herbarius, vulgus
ta. autē *Mētham aquaticam*, Germani *Fischmütz*,
Mentha *Vuassermuntz*, oder *Bachmuntz* vocant. Alte-
aquatica. rum cum adiectione *Sisymbrium* *cardamine* nomi-
Nasturtiū natur. Officinis *Nasturtium aquaticum*, Germanis
aquaticū. *Brunnenkresz.*

Corona
Veneris.

Brunnenkresz. Sic verò dictū, quòd sapore Cardamum, hoc est Nasturtium, imitetur.

FORMA.

Sisymbrium hortensi *Mentha* simile, quadrato *Sisymbrium* caule, quadantenus purpurascēte, foliis *Menthae*, brium. serratis, latioribus & odoratioribus: floribus internodia geniculatim coronantibus, verticillato semper ambitu. *Sisymbrium* cognomento cardamine *Sisymbrium* folia inter initia orbiculata habet, cū autem cre brium cauerint vt *Erucæ* folium laciniatim finduntur. *Cardamine*. le profilit cauo, sesquipedali, ima sui parte pluribus radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarū cauis cirri frequentes sinuatim erumpunt. Flore candido. Semine *Erucæ* instar in siliquis acris & exiguos.

LOCVS.

Vtrunque riguos tractus amat. Primum autem potissimum circa stagna & piscinas nascitur. Alterum nusquam non in aquatilibus.

TEMPVS.

Aestate, potissimum verò Augusto mense, cum *Mentha* florent.

TEMPERAMENTVM.

Sisymbrium primum excalfacit atque resiccat in tertio ordine. Alterum autem quum siccum est, itidem tertij est ordinis excalfacientium & exiccantium: quum humidum & viride, secundi.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Sisymbrium primum vim calfaciendi obtinet.

PLANTARVM HISTORIAE

Semen eius ad strangurias & calculos cū vino potum prodest. Tormina & singultus sedat. Folia temporibus & fronti illinuntur contra capitis dolorem. Aduersus etiam apum & vesparum ictus valent. Vomitiones potum sistit. Alterum cardamine cognominatum calefacit, vrinam ciet. Comeditur quoque crudum. Lentigines & cutis à sole nigriciē & asperitatem exterit tota nocte illitum, mane autem ablutum.

EX GALENO.

Sisymbrium primum tenuium partium est, digerentis, calefacientis & exiccantis facultatis. Semen quoque eius tenuium partiū est & calidum. Quorū circa ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus, & tormina patientibus. Sisymbrium quod quidam Cardaminen vocant, quandoquidem Cardamo, id est, Nasturtio simile quiddam gustu praefert, eadem ferè potest.

EX PLINIO.

Vtrūque Sisymbrium efficax aduersus aculeata animalia, ut sunt crabrones & similia. Sedāt capitis dolorem, item epiphoras. Alij panē addunt. Alij perse decoquunt in vino. Sanat & epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierū intra quartum diem noctibus impositum, diebusq; detractum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendum gravidis nisi mortuo conceptu. Quippe
etiam

etiam impositum eiicit. Mouet vrinā cum vino potum. Syluestre & calculos. Quos vigilare opus sit excitat infusum capiti cum aceto.

DE SIO. CAP. CCLXXVII.

Sio seu Lauer diuersissimam pingit ab ea quam medici & officinæ syllabarum metathesi vocant verlā, & ad nephriticos affectus vti & Cardamine plantam persimilem & congenerem fœliciter vsurpant.

NOMINA.

Σίον, ἡ ἀναγὰλλις ἑνὸς ὄρους Græcis: Sion, Lauer & Anagallis aquatica Latinis dicitur. Officinis ignota herba. Germanis Vuasserpungen, Bachpungen, oder Pungen (Gallis de la Berle) appellatur. Sion autem nomen sibi adscivit à concussu, quod Græci σείειν dicunt: nam excutiendi vim nactum est, utpote quod à renibus calculos pellat, vrinā & menses ducat. Anagallis aquatica, quod flores eius Anagallidis fœminæ floribus per omnia respondeant. Lauer nomen haud dubiè à lauando contraxit, quod sonantibus aquis enatum semper elui gaudeat.

Sion vnde dictum.

Anagallis aquatica. Lauer.

FORMA.

Pusillus est frutex, rectus, pinguis, foliis latis, Olusatro similibus, minora tamē, & odorata. Quæ delineatio prorsus astipulatur huic herbæ quā Germani Vuasserpungen nomināt. Hæc enim riuus lis gaudet, frutex pusillus pinguisq; est, latis foliis,

Hipposelino

PLANTARVM HISTORIAE

Hipposelino similibus, & digitis leniter friata iucundum expirantibus odorem. Floribus caeruleis, Anagallida foeminam referentibus.

LOCVS

Inuenitur in aquis citato lapsu repentibus, aut etiam resedibus. Saepè verò intumescantibus demersum videtur.

TEMPVS.

Iunio mense floribus praegrans est.

TEMPERAMENTVM.

Quia amara admodum sit haec herba, ut calefaciat & exiccat necesse est. Atque hinc iterum colligere licebit, ut patebit ex verbis Aetii, eam esse Sium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Sic folia cocta crudaque comesta calculos comminunt & excernunt. Urinas mouent. Foetus & menses educunt. Dysentericis utiliter comeduntur.

EX GALENO.

Sium quantum gustu odoratum est, tantum etiam calefacientis facultatis est particeps. Digerit autem & urinam mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat. EX AETIO.

Sium quatenus gustu odoratum est, eatenus calefacit, & exiccat. Discutiendi etiam vires habet, urinam mouendi, calculos in renibus dissoluendi, ac menses ciendi.

EX PLINIO.

Prodest urinis, renibus, lienibus, mulierumque mensibus,

mensibus, siue ipsum in cibo sumptum, siue ius decocti, siue semen è vino drachmis duabus. Calculos rumpit, aquisq; quæ gignunt eos, resistit. Dysentericis prodest infusum. Item lentigini illitū, & mulierum vitiiis in facie, noctu illitum momento cutem emendat, & ramices lenit, & scabiem equorum.

APPENDIX.

Veterinarij in hodiernum vsq; diem hac herba in tumoribus discutiendis, & scabie equorū sanāda vtuntur, vt hinc manifestum fiat illam esse Sium.

DE STRATIOTE MILLEFOLIA. CAP. CCLXXVIII.

NOMINA.

στρατιώτης ὁ χιλιόφυλλος Græcis, Stra

tiotes millefolia Latinis, officinis & herbariis, Millefolium, Germanis Garben,

Schafgarben, Schafripp, Taufendtblatt, & Geruuel, (Gallis Millefueille, ou Cumin, ou Aneth faulUAGE) nominatur. Stratiotes verò Stratiotes Græcis, id est, militaris dicta est, quòd vulnera fer vnde di-
ro facta sanet, atque adeo in militia & castris multatus eius vsus sit.

FORMA.

Frutex est exiguus, dodrātalīs & maior. Folia habet pulli auium pennis similia. Sūntque foliorū exortus admodum breues, incisuris diuisi. Breuitate verò & asperitate Cumino syluestri maximè as-
similantur, & etiamnum breuiora. Huius denique umbella densior & plenior: surculos enim in
cacumine

PLANTARVM HISTORIAE

cacumine paruos habet, in quibus Anethi modo umbellæ sunt. Flores illi candidi & exigui sunt.

LOCVS.

Nascitur in agris asperis, & præcipuè circa vias ac semitas.

TEMPVS.

Per integram floret æstatem.

TEMPERAMENTVM.

Nonnihil adstrictionis habet, atq; adeò exiccat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eximiè utilis est herba ipsa ad sanguinis eruptionem, & ad vlcera vetera ac recetia: itē ad fistulas.

EX GALENO.

Vulnera glutinare potest, & vlceribus utilis est. Sunt qui ea ad sanguinis eruptiones vtantur, & ad fistulas.

EX PLINIO.

Hetruria Millefolium appellat herbam in prætis tenuem, à lateribus capillamēti modo foliosam, eximij vsus ad vulnera. Boum nervos abscissos vomere, solidari ea rursusq; iungi addita axungia affirmant.

APPENDIX.

Recentiores ad eosdem vsus millefoliū suum adhibent, ad sananda nimirum omnis generis vulnera, dissoluendum sanguinem concretum, & ad constringendos menses. Vnde à Stratiote millefolia nō esse diuersum omnibus perspicuum sit.

DE SARRACENICA SOLIDA-
GINE. CAP. CCLXXIX.

NOMINA.

QVVM nobis non constet quo nomine veteris
bus nominata sit herba hæc, placuit vsitatã
ac tritam nostri temporis herbariis ap-
pellationem vsurpare, donec veriore comperire
contingat. Non tamen latet à nonnullis corrupta Herba for-
voce Cartasilaginem, vel magis deprauata Filagie tis non est
nem nominari, cùm dicendum esset Ceratophylax Cartasila-
cem, quia nimirum partem oculorum ceratoida, go, seu vt
hoc est, corneam defendat, salutique percussam ac rectius di-
lesam restituat. Cur verò hoc nomine non appel- cã, Cerato-
landam censeam, facit in primis quòd descriptio phylax.
Ceratophylacis illi non conueniat. Dein quòd pi-
Etura eiusdem in manuscripto herbario illi herbe
quam Fortem vocant, prorsus non respondeat. Her-
bam itaque Fortem, vel vt alij habent Sortis, no-
minamus eam quæ Germanis heydnisch Vund-
kraut vocatur, quòd fortè à Sarracenis reperta pu-
tetur. Hinc, ni fallor, à quibusdam Consolida Sar-
racenica dicitur. Fortis verò à vehementi odore.

FORMA.

Caulcm rubescentem, duùm triùmve cubitorum
ac canum habet, è quo prodeunt folia oblonga, in
extremitatibus serræ modo incisa, Saliciq; similia.
Flores luteos in pappos euanescentes. Radicem mul-
tifidam, forisq; rubentem.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur in syluis & in montibus altis. Copiose autem in monte post arcem Tubingensem, quæ Germanico nomine die odenburg vocant, provenit.

TEMPVS.

Augusto mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit, modicèq; amara est, atque adeò siccare euentissimum est.

VIRESEX RECENTIORIBVS.

Vulneraria herba est, id quod Germanica appellatio abundè satis monstrat. Imposita itaq; vulneribus carnem primum generat, dein statim glutinat. Sicca in pulverem trita recentia vulnera, si inspergatur, celeriter sanat. Fistulis etiam medetur, malignaq; vlcera mundificat, ac confestim sanat.

DE SAXIFRAGA. CAP.

CCLXXX.

NOMINA.

Ξ Ἀρξίφραγον, ἢ Σαρξίφραγον, ἢ Ἐμπετρον Græcis, Saxifragon & Saxifraga Latinis. Officinis quibusdam perperam

Capillus Veneris dicitur, ut in Adianto docuimus.

Rectius muraria ruta vocaretur. Sunt qui Saluā

Saxifragam vitam hodie nomenclant. Germanis Mautrauten gon cur di & Steinrauten appellatur. Saxifragon, quòd calidum. Empetron verò, Empetro. quoniam in saxis proveniat. Officinae hodie alias
præter

præter hanc latinorum Saxifragas ostendunt, de quibus suo dicemus loco.

FORMA.

Surculosus frutex saxi hærens, iuncis tenuibus, Epithymi non dissimilibus, nigris, breuibus, foliis Trichomanis, maioribus, interius leuibus, auersa verò parte annexa puncta habentibus, sine flore, sine semine, radice nigra superuacua.

LOCVS.

In saxi & asperis locis prouenit. Ideo eius magna copia inuenitur apud vetusta ædificia, in lapidum commissuris.

TEMPVS.

Vere & æstate inuenitur, potissimum autem Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Satis ex facultatibus eius gustuq; in quo manifesta quedam adstrictio apparet, colligitur hanc herbam calidam & siccam esse.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

In vino cocta & pota, febricitantibus opitulatur, stranguriæ & singultui medetur. Lapides vesicae frangit, & vrinam mouet.

EX PAVLO.

Saxifraga vrinam ciet, & calculos conterit.

DE SILIQVASTRO. CAP.

CCLXXXI.

Siliqua

PLANTARVM HISTORIAE

Siliquastrum & piperitis quę quibusdam piper Indicū dicitur, aliis cardamomi genus putatur, in filiquis Pyramidalibus semen habet rufum, latum, iura croci colore tingens & piperis sapore condiens.

NOMINA.

Siliqua-
strum. **S**iliquastrum conuenientissimo nomine à Plinio
Piperitis. Lib. xx. cap. xvij. dicta est herba hac, à fili-
quis nimirū magnis & oblōgis quas producit. Ea-
dem etiā ab eodē Piperitis, quod semen eius gusta-
tum piperis saporem & acrimoniā prae se ferat, no-
minatur. Alia tamē est ab ea quā vulgò Piperitim
appellant, vt suprà etiā monuimus. Sunt qui piper
Piper In- Hispanū, alij piper Indianum, nonnulli etiā piper
dianum. ex Chalechut vocant. Auicenna videtur appellare
Zingiber Zingiber caninum. Germanicè dici potest Cha-
caninum. lechutischer oder Indianischer Pfeffer.

GENERA.

Maius & minus est Siliquastrū. Maius siliquas
producit maiores, & colore subnigras, aut fuscas.
Minus contrā minores profert, & colore puniceas.
Nos tamen vtrunque genus vna pictura cōplexi su-
mus utq; hiantes duae pingerentur siliqua curau-
mus, nō sanē quod sponte sua sic rumpatur, sed vt
quale intus esset semen cerneretur. Præter hac, ge-
nera alia sunt bina, quorū vnum longissimas & co-
lore puniceas; alterū verò latiores multoq; breuior-
es producit siliquas. Damus itaque quatuor Sili-
quastrū

quastri distincta genera, vt ex pictura manifestissime deprehenditur. Horum primum discriminis gratia maius, alterum minus, tertium longum, quartum latum appellauimus Siliquastrum.

F O R M A.

Herba est caule rubro & longo, crebris geniculis, foliis Lauri, floribus candidis, semine in siliquis oblongis & magnis albo, vel potius flauescente, tenui, gustu Piperis acerrimo. Radice vnica, subalba, capillamentis fibrata. Ex qua nimirum delineatione satis constat herbam cuius picturam damus, esse Plinij Siliquastrum seu Piperitim. Caule siquidem vt ex Castore collegit Plinius, rubro & longo, densis etiam geniculis, vnde folia Lauri foliis similia erumpunt. Semine albo, tenui admodum, gustu piperis. Quibus omnibus etiam Siliquastrum & Piperitidis nomenclaturæ, quæ huic optimè quadrant, accedunt.

L O C V S.

In Germania iam in fictilibus ac testaceis satum passim ferè prouenit. Per paucis antè annis Germanis incognitum fuit.

T E M P V S.

Æstate quidem floret, atque mox decedente flore siliquæ primum herbaceæ, dein puniceæ aut fusci coloris subnascuntur, plenæ semine.

T E M P E R A M E N T V M.

Valèter excalfacit atque desiccatur, id quod seminis immensa acrimonia, & foliorum amaritudo

PLANTARVM HISTORIAE

eidentissimè monstrat: vt certè non temerè plaris
que hoc semine loco veri Piperis vtantur: easdem
enim facultates haud dubiè habet, quas etiam ex
Dioscoride sumptas subiiciemus.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Piper cõmuniter calefaciendi facultatem habet,
vrinam mouendi, concoquendi, extrahendi, discu-
tiendi, & quæ pupillas oculorum obtenebrant exte-
rendi. Prodest rigoribus circuitu certo inuadenti-
bus potum & inunctum. Venenatorum morsibus
succurrit. Fœtus ex utero ducit. Tussi & omnibus
thoracis affectibus in eclegmate & potu sumptum
auxiliatur. Cum melle inunctum angina correptos
iuuat. Tormina cum teneris Lauri foliis potum sol-
uit. Pituitam ex capite purgat cum Staphysagria
commanducatum. Dolores leuat, valetudinemque
tuetur. Appetentiam mouet. Concoctionem adiu-
uat ad intinctus additum. Strumas cum pice exce-
ptum discutit. Cum nitro alphas abstergit.

EX PLINIO.

Siliquastrum vtile gingiuis, dentibus, oris suavi-
tati, & ructibus.

APPENDIX.

Auicenna Zingiber caninum abstergere cutis &
faciei maculas, lentesque tradit. Item strumas a-
liosque tumores, eius semen digerere scribit, vt hinc
etiam easdem cum verò Pipere habere facultates
colligere liceat.

Κόροδον Græcè, Allium Latinè appellatur. Officinæ Latinum nomen retinuerunt.

Germa. Knobloch, oder Knoblauch

(Gallicè Ail, ou Aulx). Scorodon autè dicitur, Scorodon vt nonnullis placet, quasi σκουδον (κόρον, id est, vnde didis Rosa, quòd asperè supra modum redoleat, & ol etum. facientium nares offendat. Latini Allium à Græco Allium. fortassis verbo ἄλλομαι, id est, exilire vocât, quòd nimirum exiliendo crescat.

G E N E R A.

Tria in vniuersum Allij sunt genera. Vnũ hortense Allij hortense & satium domesticumve, quod Germani gar. tenses. ten oder heymlich Knoblauch vocât. Alterũ syluestre quod Græci ὀφιοσκόροδον, id est, anguinum Allij nominant, in aruis ac campestribus spõte Anguinis nascens. Cuius nos duo genera damus, quorum prius Allium. mum Germanis Vuilder Knoblauch dicitur, alterum verò Feldknoblauch. Tertium itidem syluestre, vrsinum cognominant, in syluis proueniens, Vrsinum. Germanis Vualdknoblauch appellatur.

F O R M A.

Allium hortense fronde viret cepitia, caule tere Hortense. ti & inani. In cacumine flores in globũ circumaguntur, in quo semẽ emicat. Radicis bulbus tenuis, ve-

PLANTARVM HISTORIAE

latur membranis, mox pluribus coagmentatur nucleis, & iis separatim vestitis, in cuius vertice complures fibræ cirrorum exēplo crispantur, tædioso habitu & aspero sapore. Sylvestre foliis constat prælongis, teretibus, intus concavis, iūccam speciem representantibus, caule procero, leni, purpureos flores ostendente, cacumine tum colore tum forma conspicio, radice bulbosa & capitata, nucleis spicatim compactilibus intumescēte, summo vertice capillamentis fibrato. Vrsinum odore molli, foliis gradibus, & Ephemeræ non letalis foliis similibus, floribus in summo candidis, capite prætenui.

LOCVS.

Hortense passim in hortis satum & plātatū prouenit. Sylvestre sponte in aruis, vt diximus, & campestribus nascitur. Vrsinum autem in nemoribus.

TEMPVS.

Hortense & sylvestre æstate florent. Vrsinū autem vere, Aprili & Maio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Allia desiccant & calfaciunt quarto excessu.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Facultas Allio est acris, calfacit, flatu excernit, aluum turbat, stomachū exiccat. Sitim efficit. In-

Legēdum flationes permutat alterātve, & summam corporis in Diosco- cutē exulcerat. Eadem potest Anguinū alliū. Com- ride, καὶ estum latos ventris lumbricos expellit. Vrinās δὲ ἐπιφαιεί cit. Contra viperarum morsus & hæmorrhoidum prodest,

prodest, ita vt non aliud magis, si vinum iugiter sumatur, aut in eodem tritum bibatur. Contra rabio-
 forum morsus vtiliter illinitur. Allium ipsum in ci-
 bo sumptum contra aquarum mutationes confert.
 Asperas arterias clarificat. Veterem tussim crudā
 & coctum comestum lenit. Cum origani decocto po-
 tum, pediculos & lendes enecat. Vstum & cū mel-
 le subactū illitumq; , hypopya & alopecias sanat.
 Exanthemata cum nardino vnguento, sale & olco
 curat. Alphos, impetigines, lentigines, achoras, le-
 pras, furfuresq; eximit. Cum teda & thure deco-
 ctum, si in ore contineatur, dentium dolorem leuat.
 Cōtra muris aranei morsus cum ficulneis foliis, &
 Cumino illinitur. Comæ decoctum in infestationibus
 menses & secundas trahit. Eiusdem gratia suffitu.
 Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Græci
 μὲν πωτὸν vocant, vrinam cit, & obstructions a-
 perit. Vtile etiam hydropicis.

EX GALENO.

Excalefacit corpus, crassos in eo humores exte-
 nuat, glutinososq; incîdit. Bis tamen aut ter in aqua
 decoctum, acrimonia spoliatur: quanquam nec sic
 quidem vim perdit extenuandi, verum facultatem
 quandam obscurissimā alendi corporis acquirit, cu-
 ius antea quā coqueretur, nihil prorsus obtinebat.
 Cæterum Allium non modò vt opsonium, verum
 etiam vt medicamentum sanitati accomodū, quod
 obstructa soluere & discutere possit, vsurpatur. Est

PLANTARVM HISTORIAE

autem Allium ex eorum ciborum genere, qui & flatum discutiant, & minimè sitim inferant. Ophiocordos domestico, vel reliqua omnia sylvestria, valentius est.

EX AETIO.

Allium comestum flatus discutit, sitim reprimi-
t. crassos & lentos humores incêdit. Habet tamen
quidpiam virosum, & mali succi, quod amittit si
aqua elixetur. Ab eius assiduo usu præsertim calidæ
temperaturas cauere oportet.

EX PLINIO.

Allio magna vis, magnæ etiam vtilitates contra
aquarum & quorumlibet locorum mutationes. Serpentes
abigit & scorpiones odore: atq; ut aliqui tradi-
diderunt, bestiarum omnium ictibus medetur, potu vel
cibo, vel illitu. Priuatim contra hæmorrhoidas pro-
dest, cum vino redditum vomitu. Ac ne contra araneor-
um murum venenatum morsum valere miremur, aconitum,
quod alio nomine pardalianches vocatur, depel-
lit: item Hyoscyamum: contra canum morsus, inque vulne-
ra cum melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus
potum cum restibus suis, efficacissimè ex oleo illi-
nitur. Attritisque corporum partibus, vel si vesica intus
inuerit. Quin & suffitu eo, secundas partus euo-
cari existimauit Hippocrates: cinere eorum cum
oleo, capitis vlcera manantia sanitati restituens.
Suspiriosis coctum, aliqui crudum id dedere. Dios-
cles hydropicis cum Centaurea, aut in fico duplici
ad

ad euacuandam aluum: quod efficacius præstat vi-
ride, cum Coriandro in mero potum. Suspiriosis ali-
qui & tritum in lacte dederunt. Praxagoras &
contra morbum regium vino miscu t: & contra ileū
in oleo & palte, sic illincens. Strumis quoque. An-
tiqui & insanientibus dabant crudum. Diocles
phreneticis elixum. Contra anginas tritum impos-
ni & gargarizare prodest. Dentium dolorem tri-
bus capitib. in aceto tritis imminuit: vel, si decocta
aqua colluatur, addaturq; ipsa in caua dentiū. Auri-
bus etiā instillatus succus cū adipe anserino. Phthi-
riases & prurigines potum, tusum item in aceto &
nitro. Compescit & destillationes cum lacte coctū,
vel tritum permixtūve casco molli: quo genere et
raucitatem extenuat: vel phthisin, in fabæ sorbitio-
ne. In totum autem coctū vtilius est crudo, elixūm-
que tosto, sic & voci plus cōfert. Tineas & reliqua
animalia interaneorum pellit, in aceto mulso co-
ctum. Tenaismo in pulte medetur. Temporū do-
loribus illitum, elixum, & pustulis coctum cū mel-
le, deinde tritum. Tussi cum adipe vetusto decoctū,
vel cum lacte. Aut si sanguis etiam excreetur, vel
purulēta sint. Et pituitæ sub pruna coctum potum,
& cum mellis pari modo sumptū. Conuulsis & ru-
ptis cum sale & oleo. Nā cum adipe tumores suspe-
ctos sanat. Extrahit fistulis vitia cū sulphure et re-
sina, etiā harundines cū pice. Lepras, lichenas, len-
tigines exulcerat, sanātque cum origano, vel cinis

eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sugillata aut liuentia ad colorem reducit, combustum ex melle. Credunt & comitalem morbum sanare, si quis eo, in cibo vtatur aut potione. Quartanas quoque excutere potum caput vnum cum Laserpitii obolo. In vino austero tussim, & alio modo acceptum. Suppurationes quāta sibi sanat, fracta in coctum fabae, atque ita in cibo sumptum, donec sanitatem restituat. Facit & somnos, atque in totum rubicundiora corpora. Venerē quoque stimulat cū Coriandro viridi tritum, potumq; è mero. Ceterum contra pituitam & gallinae & gallinaccis prodest. Mixtū farre in cibo, iumentis vrinam reddere, atque nō torqueri tradunt, si eo trito natura tēgatur.

EX SIMEONE SETHI.

Commodissimum est crassum & tenacē, aut crudum humorem aggregantibus: cum enim incidit, & obstructions ab eo factas tollit. Habet verò quippiam mali succi, quod decoctum aqua abiicit. In frigidis temperaturis sepe sanitatem praeservat. Temperatura verò calidos laedit, & maximè oculos, caput, pulmonem, & renes eorum. Proprietate autem quadam sitim à salso humore factā sedat, & lumbricos eiicit, & flatus discutit. Et si verò sanum visum offendat, nihilominus tamen eius hebetudinem propter humiditatem ortam sanat. Semen in calidis corporibus exiccat. In frigidis verò & humidis corporibus idē calefacit, Venerēq; excitat.

Est

Est etiā remediū contra venena et morsus venenatorum, perinde atque theriaca: vnde & Gal. hoc theriacam rusticorū vocat. Hoc ipsum fugiunt serpentes, tanquam Rutam. Quapropter Persæ coquinas ipsorum Alliis replent. Non solū autem flatus discutit, sed etiam horum generationem prohibet. Colicos affectus à flatibus ortos, & diurnos coxendicum qui à pituita proueniunt dolores, iuuat. Alimentum & sanguinem extenuat, & faciem rubificat, asperamq; arteriam purgat. Si verò assetur, & corrosis dentibus aut propter humiditatem dolentibus imponatur, prodest. Non solum verò sumptum ad venenatorum morsus confert, sed etiā postquam tritum est, superpositum. Ledit prægnantes & lactentes, mensesq; ducit.

DE SANCTI IACOBI FLORE.

CAP. CCLXXXIII.

NOMINA.

NVM herba hac veteribus Græcis & Latinis cognita fuerit, nondum certò affirmare aut inficiari audeo. Vulgus tamen herbariorum sancti Iacobi florem aut herbam nominat. Officinis incognita est. Germani S. Iacobs blū (Galli L'herbe de S. Iaqués) appellant.

FORMA.

Herba est fruticosa, cauliculis rubente, multifariam striato, foliis exiguis, Erucae instar confectis, floribus luteis, forma Chamameli floribus haud dissimi-

PLANTARVM HISTORIAE

disimilibus, radice adnascantias multas habente.

LOCVS

Nascitur in agrorum marginibus, & aquarum ripis, locisq; arenosis.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Amara est & adstringit, ideoq; calidam & siccam esse constat.

VIRE S.

Recentiorum medicorum experientia, cognitum est, herbam hanc vulneribus mirifice mederi, & ad interanea prodesse. Fistulas quoque iidem curare, & ne ultra serpent prohibere, impositam tradunt. Quae sane omnes facultates pulchre eius temperamento respondere videntur.

DE SELINO HORTENSI.

CAP. CCLXXXIIII.

NOMINA.

ἔλινον ἡ τῶ αἴον Græcis, *Apiū hortense* aut *Apiū hor-* **Σ** *satium* Latinis vocatur. Officina latinū
tense. retinuerunt nomen: Germanis *Epffich*, or
Selinon der *Eppich* (Gallis du *Perfil cultiuée*, ou de
quare di- *Iardi*) nominatur. *Selinon* autem Græci vocant,
Etum. quasi ἔλας σευόμενον, hoc est, paludibus impulsū: paludosis enim gaudet, & in iis enatum lætius exurgit.

FORMA.

Apium hortense sepe cubitalem aequat altitudinem: caule rotundo, tenuiter striato, multisq; ramulis

mulis brachiato: foliis tripartitò dissectis, & leniter crispis, in extremitatibus laciniatis: flosculis candidis, & quibus minores haud temerè reperiās: semine exiguo: radice singulari, longa, capillata. Hæc itaque herba, cuius picturā damus, est verū Apiū, quòd illi omnes respondeant notæ, adeò vt temerè nonnulli putent esse vulgare nostrum Petroselinū.

LOCVS.

In hortis satum prouenit: amat autem loca potissimum aquosa. Hinc est quòd sua sponte nō procul à Canstadio Ducatus Vuirtenbergensis oppido in paludosis proueniat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, ac semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, & siccum in medio tertij.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Ad oculorum inflammationes cum pane aut tenui polenta illitum prodest. Aestum stomachi mulcet. Mammæ grumis induratas dissiicit. Crudum aut coctum comestum vrinam mouet. Decoctum eius radicūque potum, letiferis medicamentis aduersatur, vomitum ciens. Alium cohibet. Semen efficacius vrinam cit. Succurrit & ferarum moribus, & iis qui lithargyrum hauserunt. Inflationes discutit. Miscetur etiā vtiliter medicamentis dolorem leuantibus,

PLANTARVM HISTORIAE

leuantibus, theriacis, & tussi medentibus.

EX GALENO.

Apium vsque adeò calidum est, vt & vrinas & menses cieat. Flatus quoque discutit, & magis semē quàm herba ipsa. Ori, stomachoq; gratissimum.

EX PLINIO.

Rami Apii largis potionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Oculis illitum cum melle, ita vt subinde foveantur feruenti succo decocti, aliisq; membrorum Epiphor- ris per se tritum aut cum pane, aut polenta imposi- tum, mirè auxiliatur. Pisces quoque si egrotent in piscinis, apio viridi recreantur. Verum apud erudi- tos non aliud erutum terra in maiore sententiarum autoritate est. Ad cibos non est admittendum, imò omnino nefas, nam id defunctorum epulis feralibus dicatum existimant. Ipsius quoque visus claritati inimicum. Eos qui ederint sterilescere mares femi- nasq; tradūt. In puerperiis verò ab eo cibo comitia- les qui vbera hauriunt. Innocentior tamen esse marē. Eaq; causa est, ne inter nefastos frutices dā- netur. Mammarum duritiam impositis foliis emol- lit. Suauiores aquas potui incoctum praestat. Succo maxime radicis cum vino lumborum dolores miti- gat. Eodem iure instillato gravitatem aurium. Se- mine vrinam ciet, menstrua ac secundos partus. Et si foveantur semine decocto sugillata reddit color, cum oui albo illitum. Aut ex aqua coctum potumq; renibus

renibus medetur. In frigida tritum oris vlceribus. Semen cum vino, vel radix cū veteri vino vesicæ calculos frangit. Semen datur ex tribus cyathis ex vino albo.

EX SIMEONE SETHI.

Vrinam cit, obstructiones tollit, non inflat, magis verò flatus discutit, & menses ducit, Difficulter autem concoquitur, atque ob eam causam oportet ipsum in medio ciborum sumi. Paululum quid ventrē sistit. Proprietate verò quadam comitiales lædit, & oportet hos omnino abstinere. Sæpe enim quidam qui ferè ex hoc morbo conualuere, parati autem eum incidere, ex eius usu iterum comitiales facti sunt. Offendit etiam testes. Semen autem quàm folia validius & efficacius, et eo radix. Prodest ad singultus à crassis excrementis profectos. Abstergit renes & vesicam. Obstructiones in venis & ateriis factas aperit. Semen præsumptū, ebrietatem arcet. Confert etiam ad bonum † corporis odorem, multiq; crebriore huius usu grauem † corporis odorem abegerunt. Mulieres ad rem veneream promptiores facit. Si in huius decocto calculosi desident, calculos, vt ferunt, eiicit, & difficultatem vrine sanat & renes curat. Lactentes mulieres oportet ab eius usu abstinere: minuit enim lac.

† Alias
oris.
† Oris.

DE S. BARBARAE HERBA.

CAP. CCLXXXV.

NO

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

NEquē huius herbae aliud nomen, quàm quo vulgò appellatur, afferre potuimus. Superstitione enim quidam ducti prioris temporis herbarii, diuā Barbarā herbam nominarunt. Nec nos aliud nomen vtcunque inuestigantes ex herbariae rei peritis extorquere potuimus. Germanis S. Barakraut (Gal. L'herbe de S. barbe) vocatur.

FORMA.

Caulem habet rotundum, solidum, striatum, folia Erucae modo laciniata, flores luteos, siliquas teretes, semine refertos, radicem ex obliquo procedentem, & oblongam.

LOCVS.

Pasim in campestribus nascitur.

TEMPVS.

Maiō & Iunio mensibus floret, ac subinde in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Gustanti primum subacris esse, dein parum etiā adstringere videtur, vt calidam & siccam esse nemo dubitare debeat.

VIREs.

Vulnerariam herbam esse & temperamentum eius & experientia docet. His verò potissimum ulceribus medetur quae impura sunt, & in quibus caro supercrescens fuerit: nam quia valenter siccatur, ideo sordes extergere, & carnes minuere potest.

DE SAXIFRAGA MAIORE.

CAP. CCLXXXVI.

NOMINA.

AN veteribus Græcis & Latinis herba hæc cognita fuerit, nondum mihi constare ingenue fateor. Vulgus herbariorum & officina Saxifragam maiorem, & albam, quod scilicet mirificam in comminuendis frangendisq; calculis vim, ac flores albos habeat, hodie vocant. Germani hohen Steinbrech, vel Voeissen Steinbrech appellat.

FORMA.

Caulē habet lanuginosum, subrubicundum, folia exigua, rotunda, in extremitatibus incisa, flores candidos, radicem exilem, cui granula Coriādi seminis quantitatem referentia adherent, partim alba partim rubea, quibus officina pro semine eius vtuntur.

LOCVS.

In pratis & montibus, potissimā siccis, provenit.

TEMPVS.

Maiō mense floret, dein statim euanescit.

TEMPERAMENTVM.

Quum flores, folia & radix gustanti amara sint, calidam & siccā in ordine tertio esse verisimile existit.

VIRE.

Vrinā mouet, calculos frangit & conterit. Stranguriæ itaque confert: abstergit enim expurgatque, & quæ in venis est crassitiem, sicut omnia alia quæ amara sunt, incidit. Menses quoque cit, crassasq;

PLANTARVM HISTORIAE

saq; ac glutinosa ex thorace educit.

DE SAXIFRAGA LVTEA.

CAP. CCLXXXVII.

NOMINA.

Nomen hoc in praesentia fingere adlubuit cum scilicet aliud quo herbam hanc appellaremus non occurreret, ut hac ratione à priori discerni pos-

Saxifraga cur dicta. Saxifragam autem vocare placuit, quod nimis-
rum calculos frangat. Ad quod sanè nomen alluden-
tes Germani Steinklee nominant, quod idem va-
let, ac si Trifolium frangens lapidem dicerent. Alio
nomine gulden oder geelenklee, &, quod sen-
tentiam nostram confirmat, Steinbrechen, à com-
minuendo lapide appellant. Luteam verò diximus
à luteis floribus, volentes eam ab alba discrimina-
re Saxifraga. Commodissimè itaque germanicè gee-
ler Steinbrech vocabitur. Perperam ea officinae
**Officina-
rū error.** nonnullae pro Meliloto usurpant, ut suo etiam loco
indicauiamus.

FORMA.

Caullem cubiti ferè altitudine obtinet, folia sceno-
græco similia, in quouis pediculo tria: floribus pisi,
multò tamè minoribus, luteis, odoratis, decorsum nu-
tantibus, semine per ramulos diffuso rotundo, radi-
ce subcandida.

LOCVS.

Passim in aruis & segetibus provenit.

TEMPVS.

Floret tota aestate, potissimum autem Iulio mens-
se,

se, in quo semen etiam producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse gustus abundè docet: amara enim & subacris existit.

VIRE S.

Abstergit, expurgat, & quæ in venis est, crassitiè incidit, atque adco obstructions iecinoris & lienis tollit. Vrinā mouet, menses cit, lapidē frangit, & quæ in thorace sunt glutinosa extenuat & educit. Rectè itaq; recetiores in obstructionibus renū & vesicæ, eandemq; partium calculis hac herba vtendum esse docet. Succus etiā eius herbæ ac florū eiusdem ad caliginem oculorum instillatus confert.

DE SISARO. CAP. CCLXXXVIII.

Sisarum pingit quod in hortis hodie est frequentissimum, Panacis nomine à cheruilla dicta diuersum, quæ huic Siser est fatiuum.

NOMINA.

Σ Ἰσαρόν Græcis, Siser Latinis, vulgo Pastie Siser. naca quòd ei congener sit, appellatur. Sunt qui extritis prioribus literis diminutrice forma, Serullum, aut Seruillam, aut Cheruillā, pro Siser = Serullum culo nominent. Germani ad corruptā hanc appellationem respicientes, Gerlin & Geirlin (Gallia Cherny) vocant.

GENERA.

Duo sunt Sisari, Plinio lib. xx. cap. v. autore, ge-

PLANTARVM HISTORIAE

nera. Vnũ satiuũ, quod iterũ duũ est generũ : vnũ enim magnũ dicitur. Germanis groß zam Moren. Alterũ verò minus, quod iidẽ priuatim Geirlin, Vueilz Morelen, klein zam Moren, vel Morchelen nominat. Alterũ erraticũ quod Vuild Moren appellat. Officinis nonnullis Baucias dicitur.

Baucias.

FORMA.

Sisarum
satiuum.

Sisarũ satiuum caulẽ habet angulosum, folia oblonga & in extremitatibus incisa, flores magnũ luteos, minus verò candidos, semen latũ & foliaceũ, radices intus cãdidas, iucũdi gustus, esuiq; gratissimas. Erraticũ caule est bicubitali, foliis Pimpinella, sed maioribus, flore luteo & umbella Anethi, semine lato & rotũdo, vt satiuũ, radice tenui ac lõga.

Erraticũ.

LOCVS.

Copiosẽ in Germania nostra prouenit : gaudet enim frigidis locis. Satiuum quidem in hortis, erraticum verò passim in incultis, vberius autem in apricis pratis.

TEMPVS.

Vtrũq; aestate floret, atq; subinde semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Sisaron Paulus in tertio ordine, Galenus autem rectius in secundo calidum esse statuit. Satiũ autem siccum quidem simul in primo ordine, quãdoque quidem Venerem stimulat: erraticum verò, quoniã adiectam amaritudinem quandam cum lenicula adstrictione, siccus existit.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Sanus

Suanis ori elixa Sisari radix, stomacho utilis, vrinam cit, & appetentiam excitat.

EX GALENO.

Sisari radix cocta, stomacho grata est, & vrinam mouet.

EX PAVLO.

Sisari radix cocta, stomacho utilis est, & vrinam ciēda. Semen tenue est & discussorium validumq;: idcirco iis quos singultus & tormina male habet, cum vino exhibetur.

EX PLINIO.

Sifer erraticum satiuo simile est & effectu. Stomachum excitat, fastidium discutit. Ex aceto lasepitiato sumptum, aut ex pipere & mulso, vel ex garo, vrinam cit, vt Opiō credit, & Venerem. In eadem sententia est Diocles. Præterea cordi conuenire conualescentium, aut post multas vomitiones perquam utile. Heraclides contra argentū vinum dedit, & Veneri subinde offensanti, agrisq; se recoligentibus. Satiui priuatim succus cum lacte capri no potus, sistit aluum.

DE SYCE. CAP. CCLXXXIX.

NOMINA.

ΥΝΗ ΗΜΕΡΟΣ Græcis, Ficus satina Latinis Ficus.
 & officinis, Germanis Feigenbau, (Gal-
 lis Vn Figuier) dicitur.

FORMA.

Ficus satina arbor est non magnopere procera,

EE ij quanquam

PLANTARVM HISTORIAE

quanquam amplissima quaedam inueniantur, vel pyris amula magnitudine, caudice breui, cortice leui, medulla carnosâ, folio perquâ magno vmbrosoq; profundè admodum laciniato, sine flore, pomo quod supra folii pediculum nascitur, tubinato, molli, intus granoso, succo cum maturescit lacteo, postea melleo: radicibus multis, obliquis ac longis.

LOCVS.

Iam in plerisque Germaniæ nostræ hortis plantatur, at in paucissimis fructus maturos producit. Calidiora & aprica loca amat: arbor enim omnium ferè tenerrima & delicatissima, gelicidia & glacies horret.

TEMPVS.

Germinat sub Arcturum post ver, aut paulò ante solstitium.

TEMPERAMENTVM.

Ficus arbor calidæ temperaturæ est, tenuiumq; partium, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum vterque calidus est. Ficus quoque recentes & arida primo ordine completo calefaciunt, aut secundo incipiente: desiccant verò in medio primi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fici maturæ, teneræ recentēsve stomacho noxiæ. Aluum solvunt, sed facilè ab eis contracta fluxio sistitur. Exanthemata & sudores prouocant. Sitim sedant, calorem restringunt. Siccæ nutriunt, calefaciunt,

faciunt, sitim magis afferunt, bonam faciunt aliu.
 Fluxionibus tamen stomachi & vētris inutiles: ar-
 teriæ verò vesicæ & renibus vtilis. Amicæ etiā iis
 quos lōga valetudo decolorauit, asthmaticis, comi-
 tiali morbo laborātibus & hydropicis. Decocta cū
 Hyssopo & potæ, quæ in thorace sunt, purgāt. Ve-
 teritusi, & diuturnis pulmonis affectibus prosunt.
 Aluum molliunt, tusæ cum nitro & croco māduca-
 tæ. Decoctum earum arteriæ & tonsillarum inflā-
 mationibus garg.rizatu cōfert. Cum hordeacea fa-
 rina cataplasmati miscetur, & in muliebria fomē-
 ta cum fenogrecō, aut ptisana. Cū ruta decocta,
 in torminibus infundūtur. Cocta, trita illitaq; , du-
 ritias discutiūt, parotidas ac furunculos emolliunt.
 Panos maturant, maximè iride, nitro, aut calce ad-
 dita. Crude cum antedictis tusæ, eadem efficiunt.
 Cum malicorio, pterygia purgant. Cum atramento
 sutorio difficiles curatu & maleficas tibiæ flu-
 xiones sanant. Quin cum vino decocta, addito ab-
 sinthio & hordeacea farina, hydropicis illita auxi-
 liantur. Cremata & cerato cōmixta, perniones sa-
 nant. Crude & trita sinapi humido excepta, ac au-
 ribus imposita, sonitus & prurigines curāt. Succus
 tam syluestris quàm satiuæ Fici, coaguli modo lac
 coagulat, concretumq; vt acetum dissoluit. Exulce-
 rat corpora, ac venarum ora aperit. Soluit aluum.
 Vterum laxat, cum amygdala trita potus. Mēstrua
 ciet cum luteo oui appositus, aut thyrrhenica cera.

PLANTARVM HISTORIAE

Podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnigræci & aceto utilis. Lepras, lichenas, discolorum à sole cutem, alphas, scabies, acheras, cum polenta expurgat. Instillatum plagæ percussis à scorpionibus, venenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur. Dētiū doloribus lana exceptus prodest, & canis eorum inditus. Myrmeciam tollit cum asdipe circumlita in ambitu carne.

EX GALENO.

Fici arboris liquor, & succus foliorum eius non mordicat tantum, aut absterget vehementer, sed & ulcerat, & ora vasorum reserat, & myrmecias eiicit. Verū & purgare potest. Ficus aridæ tumores duros concoquunt, eosq; statim discutiūt. Atque ipsæ per se illitæ eiusmodi vim obtinent. Sed & decoctū earum eiusdem utiq; naturæ est. Verū ubi magis cōcoquere consiliū est, miscenda est farina triticea: ubi verò plus digerere, hordacea. Panis horum in medio est. In præsentiarum hæc de caricis nouisse sufficiat. Scire verò oportet, quod quæ pinguioribus sunt, magis possunt concoquere: quæ verò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Ceterū quod ex iis plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed & facultate. Porrò Ficus virides comesæ propter admistam humiditatem facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen aliū utraq; tum humidæ tum siccæ. Præterea Ficus comestibiles sunt, & facile

facile in totum corpus peruadunt, penetrantque. Nam & abstergerendi vi pollent haud obscura: cuius gratia commansae, è calculosis renibus arenularum vim propellunt. Caricae licet multiplici utilitate commendetur, si quis tamen crebro largiterque esitauerit, sentiet non esse innoxias. Non admodum enim probum sanguinem gignunt, quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique vim habent, quo nomine alui stimulant ad excretionem, renesque expurgant. Iecori autem licnique inflammatione obsessis officiant, velut Ficus quoque, communi ratione omnium dulcium epularum, non peculiari quadam eximia fascultate. Obstructis autem illis, aut scirrho tentatis, ipsae ex sese propriis viribus nihil prosunt, nec obsunt: sed incidentibus, extenuantibus, & abstergentibus iunctae, non mediocriter auxiliantur: ideoque medici nonnulli in dictis licnis iecorisque affectibus eas longè ante cibum cum thymo, aut pipere, aut zingibere, aut pulegio, aut saturcia, aut calamentha, aut origano, aut hyssopo dare soliti sunt. Ad eundem modum cum alio quouis acrem qualitatem, aut omnino incidendi extenuandique vim gerente caricas assumere, non solum ita affectis, sed sanis quoque ex usu fuerit. Siquidem iecoris meatus, per quos fertur alimentum, patentes apertosque seruari non solis laborantibus, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus extenuante

PLANTARVM HISTORIAE

fale, aceto garoq; conditas vulgò comedunt, experimento id vtile esse compertum habentes.

EX PLINIO.

Fici succus lacteus, aceti naturam habet: itaque coaguli modo lac contrahit. Excipitur ante maturitatē pomi, & in vmbra siccatur ad aperienda vlcera, cienda menstrua, appositus cum luteo oui, aut potus cum amylo. Podagris illinitur cum farina fœnigræci & aceto. Pilos quoque detrahit, palpebrarumq; scabiem emendat. Item lichenas & psoras. Aluum soluit. Lactis ficulni natura aduersatur crabronum, vesparumq;, & similiū venenis, priuatim scorpionum. Idem cum axungia verrucas tollit. Folia & quæ non maturuere Fici strumis illinuntur, omnibusq; quæ emollicnda sunt discutiendæ. Præstant hæc & per se folia. Et alii vsus eorum, tâquã in fricando liene & alopecis, & quæcunque exulcerari opus sit, & aduersus canis morsus. Ramorū teneri cauliculi cuti imponuntur. Idem cum melle vlceribus quæ ceria vocantur, illinuntur. Extrahūt infracta ossa cum Papaueris foliis sylvestris. Canū rabiosorum morsus, folio trito ex aceto restringunt. E nigra ficu candidi cauliculi illinuntur furunculis, muris aranei morfibus cum cera. Cinis earum è foliis, gangrænis, consumendisque quæ excrescūt. Fici maturæ vrinam ciunt, aluum solvūt, sudorem mouent, papulâsque. Ob id autumno insalubres, quoniam sudantia huius cibi opera corpora refrigerant.

gescunt. Nec stomacho vtilis, sed ad breue tempus.
 Nec voci contraria intelliguntur. Nouissima salu-
 briora quàm prima. Medicata verò nonnunquam
 iuuenum vires augment. Senibus meliorem valetu-
 dinem faciunt, minúsq; rugarum. Sitim sedant,
 calorem refrigerant: ob id non negāda in febribus
 constrictis, quas stegnas vocant. Sicca Fici stoma-
 chum ledit, gutturi & faucibus magnificè vtilis.
 Natura iis excalfaciendi. Sitim afferunt. Aluum
 molliunt, rheumatismis eius & stomacho cōtraria.
 Vesicae semper vtilis, & anhelatoribus, ac suspicio-
 sis. Item iccinorum, renum, lienum vitiis. Corpus &
 vires adiuuant, ob id antè athletae hoc cibo pasce-
 bantur. Pythagoras exercitator, primus ad carnes
 eos transtulit. Recolligentibus se à longa valetudi-
 ne vtilissima. Item comitialibus & hydropicis, o-
 mnibusq; quae maturanda aut discutienda sunt, im-
 ponuntur. Efficacius calce aut nitro admixto. At
 coctae cum hyssopo pectus purgant, pituitam, tuſsim
 veterem. Cum vino autem ad sedem, & tumorem
 maxillarum, & furunculos, panos, parotidas deco-
 ctæ illinuntur. Vtilis & decocto earum fouere fœ-
 minas. Decoctæ quoque eadem cū fœnograeco vti-
 les sunt pleuriticis & peripneumoniciis. Cum Ru-
 ta coctæ, torminibus prosunt. Tibiarum vlceribus
 cum aris flore. Pterygiis cum punico mælo. Ambu-
 stis, pernionibus cum cera. Hydropicis coctæ in vi-
 no, & cum absinthio & farina hordeacea, nitro
 addito.

PLANTARVM HISTORIAE

addito. Aluū sistūt māducata. Scorpionū ictibus cū
sale trita illinuntur. Carbūculos extrahunt in vino
cocta & imposita. Carcinomati, si sit vlcere est,
quam pinguisissimam Ficum imponi, penē singulare
remedium est: item phagedæna. Cinis non ex alia
arbore aciem purgat acrior, conglutinat, replet, ad-
stringit. Bibitur & ad discutiendum sanguinem cō-
cretum. Itē percussis, præcipitatis, convulsis, ruptis,
cyathis singulis aquæ & olei. Datur tetanicis &
spasticis. Itē potus vel infusus coeliacis, dysentericis.
Et si quis eo cum oleo perungatur, excalfacit. Item
cum cera & rosacco subactus, ambustis cicatricem
tenuissimam obducit. Lusciosos ex oleo illitus emen-
dat, dentiumq; vitia, crebro fricatu. Produunt etiam
si quis inclinata arbore, supino ore aliquem nodum
eius morfu abstulerit nullo vidente, atque in aluta
illigatum licio è collo suspenderit, strumas & paro-
tidas discuti. Cortex tritus cum oleo, ventris vlce-
ra sanat. Cruda grossi verrucas & thymos nitro fa-
rinaq; additis tollunt, spodiūq; vicem exhibet frutis
cum à radice exeuntium cinis. Bis tostus adiecto
psimmythio digeritur in pastillos, ad vlcera oculo-
rum & scabritiam.

EX SIMEONE SETHI.

Ficus admodum nutriunt, nō tamen adstrictam
& robustam carnem efficiunt, vt panis ac caro, sed
laxam. Ventrem flatibus implent, nisi probè coquā-
tur. Minus verò quàm cætera sopora sunt mali suc-
ci, &

ci, & ventrem proritant, & facilè exeunt. Effatus dignam extergendi facultatem obtinent: proinde a renosa multa si edantur nephreticis excernuntur. Maturæ Ficus nihil ferè obsunt, proximeq; ad caricas accedunt, quæ multa vtilia habent. Malū hoc illis inest, quòd sanguinem non admodum bonū gi- gnunt, vnde & pediculi procreantur. Oportet au- tem post vsum Ficuum, alimētum quod extenuet, ingerere. Ad hæc Fici pulmonē & thoracem iuuāt. Aiunt insuper contra venena facultatem habere, si quis singulis diebus ieiunus iis vtatur. Carica pe- ctus iuuant, & tusses. Vrinā ciunt, satisq; nutriūt, corporis etiam bonam habitudinem efficiunt. Ante cibum sumptæ, ventrem irritant, sed nisi celerius ventrem pertranseant, non bonum sanguinem gi- gnunt. Quapropter si ad satietatem vsque edun- tur, scabiem & pruritum excitant. Cibus autem bonus est, & aduersus venena remediū, si cum nu- cibus aut amygdalis comedantur. Renes expurgāt, & iecoris, lienisq; obstructions auferūt, verū ca- lefaciunt, & sitim inferunt, & flauam in calidioribus temperamentis bilem procreant. Impositæ pa- rotidibus & reliquis abscessibus, emolliunt & con- coquunt, potissimum in iis quibus sunt carnes mola- liores. Podagricis cum scenogrico & aceto imposi- tæ, non parum iuuant.

DE SPARTO. CAP.

CCXC.

• Spartum

PLANTARVM HISTORIAE

Spartū iam Parisiis frequens in calathis
ficuum & vuarum passarum vsu frequen-
tissimum. NOMINA.

Σ πάρτον, ἡ σπάρτιον Græcis, Spartū Ro-
manus vocatur: Officinis incognitum Germa-

Spartum nus Përimmen (Gal. du Genest) appellari potest.
unde di- Sparton verò dixerūt, quòd funiculi ac vinculi v-
ctum. sum in alligandis vitibus præbeat.

FORMA.

Frutex est virgas longas proferens, sine foliis, vas-
lidas, difficulter fragiles, quibus vites ligant. Silis-
quas phaselorum modo fert, & in iis semina lentis
formam habētia. Florem luteum, veluti Leucoion.

LOCVS.

Aridum solum amat, estq; veluti terræ iuncus.

TEMPVS.

Floret circa idus Iunias, ac subinde siliquas
producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse, & gustus & vires in-
dicant. VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sparti semen & flores in aqua mulsa pota quin-
que obolorum pondere, per superna cum intensione
veluti elleborus citra periculum purgat. Semen per
inferna purgat. Quinetiam maceratis in aqua vir-
gis eius, deinceps verò tusis & expressis, si succus
cyathi vnus mēsurā ieiunis bibatur, ischiadicis &
angina laborantibus auxiliatur. Quidam etiam
muria,

muria, aut marina macerantes, ischiadicis clysterē infundunt. Strigmenta autem cruenta elicit.

EX GALENO.

Sparti, quo & vites apud nos alligant, tum semen, tum virgarum succus, non instrenuē trahentis est facultatis.

EX PAVLO.

Sparti, quo vites ligant, & semen & flos cū mulsa pondere quinq̃ue obolorum pota, per superiora purgant veratri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgæ ipsius ad coxendiciū dolores proficiunt.

EX SIMEONE SETHI.

Sparti, quo vites ligantur, semen & flores cum aqua mulsa si bibantur pondo obolorum quinque per superna purgant, vt Elleborus albus, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virgæ verò ischiadicis prosunt.

DE SMYRNIO. CAP. CCXCI.
NOMINA.

μύρτιον Græcis, Smyrnion Latinis, officinis

✠ Leuisticum, Germanis Liebstockel, (Gallis

Leuesle, ou Luesch) dicitur. Smyrnion di-

ctū, quòd huic idē sit odor qui myrrhæ. Errāt qui Smyrnion Leuisticum hodie nominatam herbam, eam esse putant quæ Diosc. Ligusticum appellatur. Neq; enim Leuisticū caulem geniculatum, neque etiam folia Meliloti non est Lī similia profert. Tolerabilior est sententia eorū qui gusticum arbitrantur

PLANTARVM HISTORIAE

arbitrantur secundam esse Dauici speciem.

FORMA.

Caulē habet Apio similem, adnascētiās obtinentem multas. Folia latiora Apio, ad terram confraeta, subpinguia, robusta, cum acrimonia odorata, medicataq; & colore sublutea. Umbellam supra caulem Anetho similem. Semen rotundum, nigrum, sapore acre. Radicem acrem, odoratam, teneram, succosam, fauces mordētem, foris nigram, intus pallidam, aut subalbibā. Caterū si quis singulas has

Smyrniū
esse Leui-
sticum.

notas velit expendere, facile perpendet Smyrniū eam esse herbam quam hodie Leuisticum nomināt. Siquidem ea ut Apium caulem profert concavum, ac stolones multos. Folia quoque Apii, at latiora, ad terram cōfraeta, subpinguia, firma, cum quadam acrimonia odorata, odore tamen medicato, colore in luteum lāgūido: muscarium in capitibus caulium Anetho simile: semen rotundum, nigrum, acris sapore: radicem odoratam, acrem, gustu fauces mordentem, succosam, mollem, foris atram, intus subalbidam, aut pallidam. His accedit quod Leuisticum

Leuisticū forma & odore Apio valde simile est, ita ut nōnulli hac ratione moti putauerint esse Apii speciem quādam: ut congenerem esse herbam, quemadmodum testatur Galenus, nemini dubium esse debeat. Vnde iterum liquidò colligi potest esse Smyrniū, quod certē statim ab Apio Dioscorides, tanquam similem cōgenerēque herbam, id ipsum describat.

Conuicia

Conueniunt etiam vtrarumque herbarum facultates, vt paulò pòst monebimus. Item Dioscorides scribit Pœoniam fœminā folia Smyrnii habere. Quid verò foliis Pœoniæ fœminæ, quàm folia Leuisticæ hodie nominati magis simile? vt nemo dubitare debeat subinde Smyrnion esse Leuisticum.

LOCVS.

Nascitur hodie passim in hortis. Humida autem loca amat.

TEMPVS.

Floret æstiuo tempore.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi facultatem habent radix, herba & semen. Olerum modo comeduntur folia muria macerata, aliuumque sistunt, Radix serpentium moribus pota succurrit. Tusses & orthopneas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Illita recentia cedemata, phlegmonas, & duritias discutit. Vulnera ad cicatricem perducit. Feruescēt & subdita, abortus facit. Semen eius licnis, renum & vesicæ vitiis prodest. Menses & secundas pellit. Commodè datur ischiadicis cum vino. Inflationes stomachi lenit. Sudores & ructus ciet. Potū peculiariter hydropicis, & febrium circuitibus prodest.

EX GALENO.

Smrynion est eiusdem generis cum Apio & Petroselino: fueritq; Apio quidem validius, Petroselino

PLANTARVM HISTORIAE

lino autem imbecillius. Menses itaque & vrinas mouet. Cilices in Amono monte natum Petroselinum vocant. Est quidem & ipsum Smyrnion, minus vero Petroselino & Smyrnio acre est. Proinde & ulceribus imponi potest, quia videlicet sine molestia desiccatur. Sed et digerere quæ indurata sunt, valet. Reliqua facultas eius Apio & Petroselino similis est. Quocirca & semine vtimur ad menses, vrinas et asthmata. Hæc Galenus. Ex iis Galeni verbis li- quidò apparet duplex esse Smyrnion, vnum quod alio nomine Hipposelinon, de quo suo diximus loco, dicitur: alterum autem quod in Amono nascitur monte, de quo hic nobis sermo est.

EX PLINIO.

Vrinam & menses ciunt folia & radix. Aluum sistit semen. Radix suppurationes recentes, & collectiones discutit: Item duritias illita. Prodest contra phalangia, ac serpentes, admixto cachry aut polli- ne, aut apiastro in vino pota, sed particulatim, quoniam vniversa vomitiones mouet, qua de causa nonnunquam cum ruta datur. Partus adiuvat, & secundas pellit. Medetur tussi & orthopnoæ radix vel semen. Item thoracis, lienis, renum & vesicæ vitis. Radix autem ruptis, conuulsis auxiliatur. Sudores ciunt & ructus, ideo inflationem stomachi discutit. Vulnere ad cicatricem perducit. Datur ischiadicis in vino cum crethmo. Exprimitur succus radice, vtilis fœminis, thoracis & præcordiorum desideriis: calefa-

calefacit enim, concoquit, & purgat. Semen peculiariter hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur. Concoctiones facit. Sapore similis api & i, ideo ad opsonia vtuntur cum mulso, oleo & garo, maximè in elixis carnibus.

APPENDIX.

Confer cum iam dictis facultatibus eas quas Leuistico recentiores tribuunt, & comperies prorsus eadem esse. Tradunt enim eius semen mouere menses & vrinas, inflationes tollere, serpentium moribus mederi, calculos confringere, sudores cicere, vulnera conglutinare, licniq; obstructions auferre: adeo vt hinc iterum constet, Leuisticum à Smyrnio non esse, saltem viribus, diuersum.

DE SILPHIO. CAP. CCXCII.

LasERPitium Germanicum in horto diui Germani Pratenfis est multum.

NOMINA.

Ἰλφίου Græcis, Laser & LasERPitium Latinis dicitur. Vulgo & officinis corrupta voce, deflexa tamen quadam à LasERPitio pristini nominis vmbra, Osteritium vocatur. Primum siquidem, vt dictū est, LasERPitium, dein deprauata nomenclatura, Osteritiū, postremo Ostritiū cepit appellari. Qui sanè lapsus facilis admodū fuit. Abiecta nanque prima litera, Asteritium, & dein a mutato in o, Osteritiū, ac postremo magis cōcise Ostritium Ostritium nominare imperiti ceperunt. Veteribus cur dictū.

PLANTARVM HISTORIAE

Germanis haud dubiè Laseruurtz dicta est hæc herba, quā quidem vocē, vtpote semilatinā, posteri non rectè intelligētes, in Meysteruurtz mutarūt. Quā quidē appellatione adhuc hodie omnes vtuntur Germani. (Galli Benioin, ou L'herbe dont prouiet le Benioin.) FORM A.

Caulem ferulæ similem habet, folia verò Apii, aurei coloris, semen latum, foliaceum, radicem quæ corticem nigrum obtinet, à qua liquor etiam modicè rubens, translucidus, myrrhāque redolens, ac odoratus destillat. Ex qua quidem descriptione luce clarius constat, herbam hanc cuius picturam da

Laserpitiū germanicum. mus, esse Laserpitium, saltem germanicum. Caulis enim ei sceniculaceus, seu ferulæ, hoc est, geniculatus, folia Apii in auri colorem languescentia, semen foliaceum & latum, nempe quod figura exile foliolum exprimit: radix crassa & multa, foris nigricans, intus candida, mirāque flagrans iucunditate, quæ si vulneratur, liquor profluit lentus, ac modicè rufus, suauissimūq; spirans odorē, & linguam sua acrimonia vellicās, vt sanè nulla sit prorsus nota quæ reclamare videatur. His accedit quòd facultates Ostritii nominati à Laserpitii viribus non discrepant, quæadmodū ex sequētibus patebit.

LOCVS.

Nascitur in Syria, Armenia, Media & Aphrica. Quod ex Armenia et Aphrica assertur suauissimū odorem habet, præsertim Cyrenaicum, vnde & ὀπὸς,

ὄσος, id est, succus Cyrenaicus appellatur. Nec hoc Succus Laserpitium aliud est quam concretus ille succus, Cyrenais quē officinæ Belzuinū, vel Ben Iuinum vocant. cus. Quod verò ex Media & Syria affertur Dioscoride Belzuinū teste, virosū odorem obtinet, ac putrilaginem re- est Lasersipit, ideoq; videtur esse id quod hodie officinæ pas-pitium. sim Asam fetidam nomināt. Quod etiam hinc col- Asa foetis ligi potest, quod in hodiernum vsque diem ex Syria da. Alexandrina, & hinc Venetias deportatur. Nostrū in montosis locis prouenit, ac in omnibus ferè hor- tis nunc plantatur.

TEMPVS.

Iunio mense flores admodum exiguos ac candi- dos, instar Anisi, profert, atque subinde semen latū.

TEMPERAMENTVM.

Silphii liquor calidissimus est. Verum enimvero & folia, & caulis, & radix sat strenuè excalfa- ciunt. Nostrum etiam Laserpitium in vniuersum calidius atque acrius est pipere ipso, adeoque cale- facit & exiccat in tertio ordine. Radix autem & semen, folia & caulem superant, vt in eo etiam ef- ficacissimus omnium aliarum partium sit liquor, secundo loco folia, postremo caulis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Laserpitii liquor acris est, inflat. Inunctus cū vi- no, pipere & aceto, alopecias sanat. Oculorū aciem exacuit. Incipientes suffusiones cum melle inunctus dissipat. Canernis dentium in eorundem dolore in-

FF ij ditur.

† ὡρον-
τασχα-
σθέντων
legēdum.

ditur, aut cū thure in linteo circumponitur, aut col-
luitur eo os cum Hyssopo, & Ficis coctis in posca.
His prodest, quos bestia in rabiem efferata momora-
derit, vulneribus impositum. Valet aduersus om-
nia animantia quæ virus eiaculantur, venenata
tela, potus aut inunctus. Scorpionum plagis oleo di-
lutus circumlinitur. Gangrenis† antea scarificatis
immittitur. Carbunculisque cum ruta, nitro &
melle, vel per se. Clawos, callósque prius circum-
scarificatos tollit, cerato, aut aridorum Ficuū car-
ne præmollitus. Recentes lichenas ex aceto sanat.
Excreſcentias carnis, polypésque, si aliquot diebus
cum atramento sutorio aut æruginē illinatur. Extu-
berantia cum forſice extrahit. Diuturnis asperæ ar-
teriæ asperitatibus opitulatur. Vocem subito ex-
asperatam irrauceſcentēve, dilutus aqua & ab-
sorptus confestim reſtituit. Vuam cum melle inun-
ctus reprimit. Angina laborantibus ex aqua mul-
sa vtiliter gargarizatur. Coloris bonitatem iis qui
eo veſcuntur auget. In ſorbili ouo datus tuſſi auxi-
liatur, pleuriticisq; in ſorbitiōibus. Suffuſus felle,
& hydropicis cum aridis Ficis vtiliter exhibetur.
Cū pipere, thure & vino potus, rigores ſoluit. Ner-
uorū diſtentione laborantibus, opiſthotonicisq; da-
tur oboli pondere deuorandus. Hærentes gulæ hi-
rudines, gargarizatum cum aceto deiicit. Ad lac-
intus in grumos concretum. Comitialibus ex oxy-
melite ſumptus ſuccurrit. Menſes ciet cum pipere

& myrrha potus. Coeliacos in acino vuae sumptus iuuat. Cum lixiuio potus, repentinis conuulsionibus & rupturis prodest. Ad potiones dissoluitur amaris amygdalis, aut ruta, aut calido pane. Foliorum liquor eadem potest, sed multò minori efficacia. Cum oxymelite manditur ad expediendam asperam arteriam, præsertim amissam vocem. Vtuntur eo cum Lactucis, pro cruca comedentes.

EX GALENO.

Omnes Silphii partes flatulentæ magis sunt essentia, ac proinde concoctu difficiles. Foris tamen impostæ corpori, efficaciores, & omnium potissimū liquor, admodum trahentem facultatem obtinens. Attamen excrescentias imminuendi, & liquandi vim quandam propter iam dictam temperiem habentem. Liquor Cyrenaicus quidem omnes & caliditate & tenuitate exuperat, ac proinde etiā omnium maximè discutit.

EX PLINIO.

Folia Silphii ad expurgandas vuluas, pellendosque emortuos partus, decoquuntur in vino albo odorato, vt bibatur mensura acetabuli à balneis. Radix prodest arteriis exasperatis, et collectionibus sanguinis illinitur. Sed & in cibis concoquitur agrè. Inflationes facit & ructus. Urina quoque noxia. Sugillatis cum vino & oleo amicissima, & cum cera strumis. Verrucæ sedis crebriore eius suffitu cadunt. Liquor eius per se algores excalfacit. Potū nernorū

PLANTARVM HISTORIAE

ritia extenuat. Fœminis datur in vino. Et lanis mol-
libus admouetur vuluæ ad menses ciendos. Pedum
clauos circumscripcatos ferro, mixtus ceræ extra-
hit. Vrinam ciet ciceris magnitudine dilutus. An-
dreas spondet, copiosius sumptum nec inflationes fa-
cere, & concoctioni plurimum conferre senibus &
fœminis. Item hyeme quàm æstate vtilius, verum-
tamen aquâ bibentibus, cauendumq; ne qua intus sit
exulceratio. Ab ægritudine recreationi efficax in ci-
bo. Tempestinè enim datus, cauterium obtinet: as-
suetis etiâ vtilius quàm expertibus. Ad cetera cor-
porum, indubitatas confessiones habet. Venena telo-
rum & serpentium extinguit potus: ex aqua vul-
neribus his circumlinitur. Scorpionum tantum pla-
gis ex oleo. Vlceribus verò non maturefcentibus, cū
farina hordeacea, vel fico sicca. Carbunculis cū ru-
ta, vel cum melle, vel per se visco superlitum vt hæ-
reat. Sic & ad canis morsus. Excrefcentibus circa
sedem, cum tegmine punici mâli ex aceto decoctus.
Clauis pedū qui vulgò morticini appellantur, nitro
mixto, antè subactus. Carnes replet cū vino & cro-
co, aut pipere, aut murium simo et aceto. Perniones
ex vino fouet, & ex oleo coctum imponitur: sic &
callo. Clauis pedum superrasis præcipuè vtilitatis.
Contra aquas males, pestilentes tractus, vel dies.
In tussi, vna, fellis veteri suffusione, hydropicis, rau-
citatibus: confestim enim purgat fauces, vocémque
reddit. Podagras, in spongia dilutus posca lenit.

Pleuria

*Pleuriticis in sorbitione vinū poturis datur, contra-
ctiōibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine cera
circūlitus. In angina gargarizatur. Anhelatorib.
& in tussi vetusta, cum Porro ex aceto datur, atq;
ex aceto his qui coagulū lactis sorbuerint. Præcor-
diorum vitiis, syntecticis, comitialibus in vino, in
aqua mulsæ linguae paralyti. Coxendicibus & lum-
borum doloribus cū decocto melle illinitur. Nō cen-
suerim, quòd autores suadent, cauernis dentium in
dolore inditum cera includi, magno experimēto ho-
minis qui se eadem causa præcipitauit ex alto.*

APPENDIX.

*Laserpitium nostrum ex traditione recentiorum
vnicè venenis aduersatur. Item pestilentie popula-
riter grassantis arcet contagia. Lentitiam pituito-
sorū humorum incēdit ac discutit: quapropter tussi
quam frigus attulit, mœdetur. Crassa quæ in thora-
ce coeūt, discutit. Coloris corporis bonitatem iis qui
eo vescuntur, efficit. Concretum in corpore lac &
sanguinē resoluit. Stomachū esu corroborat. Pitui-
tam ventriculi deiicit, & elanguescentem appeten-
tiam inuitat. Menses & vrinam ciet. Rabiosi canis
morsu, aut serpentis iclu liberat, si cōtrita folia vul-
neri indantur. Hypochōdriorum vitiis auxiliatur.
Item lumborum doloribus. Carbunculos cum polē-
ta tritum & impositum sanat. Cum vino potū ri-
gores discutit. Herba ipsa in vino & aqua cocta
vulnera interna glutinat: & in summa, omnia quæ*

*Laserpitiū
germani-
ci faculta-
tes.*

Angelica vocata herba, & maiori efficacia, potest: ut hinc etiam constet Osteritium à nostris nominatum, easdem habere quas veterum Laserpitium, inefficaciores tamen, facultates. Quare cum metus sit ne Laserpitium adulterinum, aut saltem non optimum ad nos afferatur, præstat nostro uti, quod scilicet exigua admodum pecunia comparari possit, & viribus satis efficax sit. Nam eadem quæ Dioscorides & Plinius Laserpitio assignant, recentiorum testimonio præstare valet.

DE STACHY. CAP. CCXCIII.
NOMINA.

Τάχυσ Græcis, Stachys Latinis dicitur, officinis ignota. Germanis riechender Andorn (Gallis sauge saulauge, ou

Stachys de montaigne) nominatur. Stachys verò dicta, unde dic- quòd verticillato florum ambitu, & orbibus spir-
eta. carum caules cingentibus coronetur.

FORMA.

Frutex est Marrubio similis, sed altior, folia ferès plura, sed rara, hirsuta, dura, odorata, incana. Virgas ab una radice plures emittit Marrubio candidiores. Ex hac descriptione perspicuum fit omnibus, herbam quam pictam damus, esse Stachyn: est enim fruticosa, Marrubijque similitudinem refert, nisi quòd altior est: folia quoque plura, at rara obtinet, item hirsuta, dura, odorata, & albicantia. Virgulas denique, etsi pictura id ipsum non ostēdat, ab una

*vna radice plures emittit, candidiores quàm Mar-
rubium. Quibus omnibus florum purpureorũ ver-
ticillatus accedit ambitus, ac orbes spicarum, qui
caules circundant.*

LOCVS.

Asperis locis, montibus ac collibus provenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

*Stachys gustu acri & amaro est, tertiũq; ordinis
excalfacientium. Vnde iterum liquet hanc herbam
esse Stachyn, quòd gustata acris et amara videatur*

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

*Vim habet excalectoriam & acrem. Idcoq; deco-
ctum foliorum eius potũ, menses & secundas pellit.*

EX GALENO.

Menses prouocat, abortum facit, & secundas ciuit.

EX PLINIO.

Pellit menstrua.

DE SECALE. CAP. CCXCIIII.

NOMINA.

SEcale dicitur Plinio lib. xviij. cap. xvi. & Fara-
rago, Germanis Rocken & Korn (Gallis du
Seigle) nominatur. Magno in errore versantur qui
hoc frumenti genus Siliginem esse existimant. Si-
quidem ex hac, Plinio lib. xviij. cap. ix. teste, lau- Secale nõ
tissimus sit panis, tener, candidus, & primatum te- est Siligo.
pens: ex illo cibarius, ater, & pödere præcipuus, ad
arcendam

arcendam pauperum famem tantum utilis, qui veterascens acorem etiam contrahit. Item Siligo habet spicam erectam, Plinio loco iam citato, cap. x. autore, nec rorem continet, quæ rubiginem faciat: hoc verò procumbentem, & ideo quid imbres retineat, rubigini opportunum. Siligo præterea grano est candido, leui & multipliciter tunicato: hoc contra nigro, striato, & glumis ferè explicito. Denique Siligo sine arista est, hoc verò aristis horret. Postremum ex Siligine pistrinarum opera sunt laudatissima, ex Secale nullum fere tentatum est. His itaque rationibus evidentissimum esse puto, hoc frumenti genus quod Germani nostri Rocken vocant, non esse Siliginem.

FORMA.

Secale frumenti genus vulgò notissimum, stipula est culmo triticeo, graciliore & proceriore, geniculis ut plurimum quatuor, spica innocentioribus aristis horrente, non erecta, sed semper propemodum procumbente, grano glumis explicito, & ob id caduco, tristi, nigricante, strigoso. Plinius cap. xvi. libri xviij. scribit, Secale fecunda, sed gracili stipula esse præditum, nigritia triste, sed potè præcipuum. Quæ singula satis monstrant, frumentum quod Rocken vocant Germani, esse Secalen, & non siliginem.

LOCVS.

Gignitur qualicumque solo, ideoque passim in Germania, præsertim Rhætia, & Vindelica seritur.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, metitur autem Iulio.

TEMPERAMENTVM.

Magis videtur ex calfacere quàm Triticum, minus tamē refrigerare quàm Hordeum. Magis item exiccare quàm Triticum, minus tamen quàm Hordeum aut Zea.

VIRE S.

Habet aliquid lentoris & obstruentis nature. Hinc panis ex eo confectus, potissimum si à fursibus non sit probè purgatus, stomacho grauis esse solet. Reliquæ vires ex capitibus de Tritico & Hordeo colligenda.

DE SIDERITIDE PRIMA.

CAP. CCXCV.

NOMINA.

ΣΙΔΕΡΙΤΙΣ Græcis, Sideritis prima Latinis di Chamæpitytur. Magna officinarū pars hac herba pro tys adul Chamapity vera utitur, non sine errore, cū satis terina. ex forma illius constet, vt paulò pōst mōstrabimus, non esse Chamapityn. Germanis Glidkraut (Gal lis de Lespargoutte, ou apparitoer) appellatur. Sideritis verò nominata, quòd glutinandis vul neribus apta, præcipuum in bello habeat vsum. Sideritis cur dicta.

FORMA.

Herba est folia Marrubio similia habens, longiora tamen, ad saluie aut quercus figurā accedentia, verū minora & aspera. Caules fundit quadratos, dedrara

dodrantales, aut longiores, gustu non iniucundos, alio
quo modo adstringentes, in quibus per intervalla ve
lut in Marrubio verticilli in orbem circumacti, &
in his semen nigrum. Ex qua quidem delineatione
sole clarius constat, herbam cuius hic picturam ex
hibemus, esse Sideritin primam. Siquidem folia Mar
rubij habet, sed longiora ad salviae similitudinem
aspera & rugosa, minora tamen. Caulem quadra
tum & hirsutum, non iniucundi gustus, aliquantulum
subadstringentis, quem per intervalla verticillati or
bes coronant, ut in Marrubio videre licet, in quib.
flores subcandidi ac lutei, & subinde semen nigrum.
Radicem exiguum & subluteam, quod silentio trans

Sideritis
prima.

Sideritis
non est Iua
arthritica

ivit Dioscorides. Non esse verò hanc herbam Iuam
non est Iua arthriticam, nec Chamapityos generibus posse an
arthritica numerari, hinc coniecere licebit: primum, quod non
sit pumila, sed in altum surgat, fruticis verius, quam
herbae specie. Quod verò neque primum neque se
cundum genus Chamapityos dici queat, hinc ma
nifestum fit, quod utrunque foliis Semperuini mi
noris sit, à quibus salvia, qualia hac habet, diuersi
sissima sunt. Neque etiam tertium, quia folia eius
non sunt exilia.

LOCVS.

Nascitur asperis, petrosis & incultis locis.

TEMPVS.

Iunio mense florere incipit, nec desinit nisi in Au
tumni fine.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Sideritis habet quandam abstergendi facultatē, id quod amaritudo eius satis indicat: & pauculam adstrictionē. Plurima tamen eius pars humida est, & mediocriter frigida.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Folia eius illita vulnera glutinare, & inflammationem arcere possunt.

EX GALENO.

Phlegmonem sedat, & glutinandi vim obtinet.

EX PLINIO.

Sideritis tantam vim habet, ut quamuis recenti gladiatoris vulnere illigata, sanguinem claudat.

DE SORGI. CAP. CCXCVI.

Sorgi panicum Indicū Parisiis dicitur.

NOMINA.

Peregrinum est hoc genus frumenti, & ex Italia ad nos allatum, ideoq; Germani Vuelichē Hirs (Galli Ble barbu, ou espece de Paniz) vocāt. Alj Sorgsomen, quòd scilicet in Italia Sorgi nominetur. Neque constat quo nomine veteribus sit appellatum, nisi farris genus sit, quod in Gallia nunc rubrum & barbatum frumentum nuncupāt. Probè enim illi hæc nomenclatura videtur cōuenire, quòd nimirū eius spica rubra et barbata sit. Certò tamen nihil affirmare audemus, nam Panicum etiā referre, quāvis magnitudo repugnet, videtur.

FORMA.

Culmos

PLANTARVM HISTORIAE

Culmos habet quatuor aut quinque altos, crassos, geniculatos, rubicundos, foliis vestitos longis, latis, & in summitate acuminatis, harundini non dissimilibus: spicam quam Panicum maiorem ac densiorem, rufam & barbatam, in qua semen rufum, rotundum, lentis magnitudine, & acuminatum. Florem luteum. Radicem multis fibris capillatam.

LOCVS.

Non provenit nisi satum, & nunc in multorum hortis colitur ac plantatur, non tamen facile emergit.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, flore, ut diximus, luteo, nec nisi extrema ferè autumnii parte ad maturitatem pervenit.

TEMPERAMENTVM.

Semen dulce est, & Panicum planè in gustu refert, ideoque temperamento ab hoc minimè differre putamus.

VIRE S.

Tametsi de illius facultatibus nihil còperti habeamus, tamen quia Panicum gustu refert, easdem illi facultates obtinere existimamus, quas suo loco inuenies.

DE SERPENTARIIS OFFICINARVM. CAP. CCXCVII.

NOMINA.

Quo nomine veteribus medicis Græcis & Latinis appellata sint, nemo hætenus, quod sciam,

sciam, indicare potuit. Recentiores herbarij & officina non sine magno & intolerando errore, Serpē-
 tarias vocant, nō certè quòd in nomenclatura tan-
 tū sit situm, sed quòd forma & viribus plurimū
 ab ea herba quam Græci *Σερπενταριον*, Latini ac-
 tem *Dracunculum* ac *Serpētariam* nominant, pla-
 rimum discrepent, vt suo loco latius demonstrabi-
 mus. Germani nostri has herbas *Nateruurtz* sua
 lingua appellant. **GENER A.**

Duo sūnt *Serpentariæ* recentiorum & officina-
 rum genera, forma non multum variantes. Vnum *Mas.*
 quod lenibus admodum foliis, & radice in se con-
 torta constat. Hinc est quòd herbariis nostri tempo *Bistorta.*
ris Bistorta dicatur. Nos certioris discriminis gra-
 tia marem fecimus, germanicèque *Nateruurtz*
meennle vocauimus. Alterum rugosioribus foliis,
 maiorique radice, & minus intorta, ac multū ca- *Femina.*
 pillata videtur. Vulgares herbarij *Colubrinā* nun- *Colubri-*
 cupant. Nos feminam constituimus, ideòque Ger- *na.*
 manicè *Nateruurtz Vueible* vocauimus. *Serpē-*
tarias verò vtrunque genus dixerunt, propterea
 quòd vbi primum è terra prodeunt, lingue serpen-
 tinæ pelle tenui vestitæ, formam obtinent.

FORM A.

Cauliculo constant tenui ac iunceo, glabrescēte,
 per ima tantū foliato, spicoso florum vertice, qui-
 bus dilutioris purpuræ color inest: folio Rumicis à
 terra cæsis, supernè viridi & herbacco: radice mas
 quidem

PLANTARVM HISTORIAE

quidem draconis modo inuoluta & cōtorta, fœmina verò oblonga, maiore ac capillata, extra nigricante, intus rubescente.

LOCVS.

Nascuntur locis vmbrosis & humidis, pratis potissimum Martianæ sylvæ.

TEMPVS.

Florent Maio mense & Iunio, quo maximè tempore, vt omnes aliæ quæ floribus ornantur plantæ, dignosci ac inueniri possunt.

TEMPERAMENTVM.

Vtriusque radix mirificè adstringit, vt refrigerandi ac exiccandi facultate præditas esse nemini sit dubium. Antiquus manuscriptus herbarius frigidus & siccus esse in tertio ordine censet.

VIRE S.

Radices illarum glutinant vulnera, foetum in utero retinent, vomitum biliosum reprimunt, dysenteriam sanant. Hæc antiquus herbarius. Nostræ verò ætatis medici, aliorum errata impudenter sectantes, ad longè diuersos vsus Serpentariæ vtriusque radices adhibent, nempe ad eos ad quos Dioscorides, Galenus & alij veteres suum Dracontium, cum tamen viribus inter se maximè discrepent, quod gustus etiã abundè testatur, cum Dracontij radix acris sit, illarum verò vehementer adstringat. Vt igitur errorem hunc relinquant, subinde medicos & seplasiarios hortor, nisi fortè perdere magis quàm sanare

sanare in delitiis habeāt: sciantq; Serpentarius suas non alias quā Britānicam habere facultates, adstringendi nimirum, privatim ad ea quæ in ore & tonsillis sunt depascentia vlcera accommodatas, & ad omnia alia quibus adstrictione opus est. Folia etiam in farinam trita labiles dentes confirmant.

DE SCORDIO. CAP. CC XCVIII.

Scordium iam notius est, quā vt sit pluribus declarandum, nomen retinet.

NOMINA.

Σκῶδιον Græcis, Latinis Trixago palustris dicitur. Officinis ferè omnib. incognita. Germanis allusione quadam ad Romanam appellationem aptè Vuarſſerbatenig (Gallis de la Germandrée) nominabitur. Scordiō autem Græcis ab Alliis dicta est herba hac, quod nimirū eius folia affricta, Allii, quod Græcis Scorodon vocatur, odorem referant. Ab hoc mali & ingrati odoris sensu, iisdem etiā δύσσομον appellata est. Vt verò Trixago dicta sit, similitudo fecit: Trixagini enim, quæ Græcis Chamædrys nominatur, similis est. Palustris autem, quoniam humentibus ac palustribus locis nascatur.

Scordion
vnde di-
ctum.

Dysosmō.
Trixago
palustris
cur voca-
ta.

FORMA.

Folia Trixagini seu Chamædryi similia habet, maiora tamē, nec sic in ambitu incisa, odore aliquā tam Allium referentia, gustu adstringentia & amara. Caules quadrangulos, in quib. flos subrubescēs.

PLANTARVM HISTORIAE

Hæc delineatio sic refert herbã hanc, cuius picturam damus, vt ouum oup non sit tam simile. Folio siquidem est Trixaginis, maiore, & per ambitum non ita profundè serrato, & inciso odore aliquatenus Allium reddēte, adstringentis & amari gustus, quadrāgulis caulibus: flore in caulibus, instar Chamedryos et Teucris, subrubro, & minimè in summis caulibus, vt aliqui putant, quemadmodum pictura ipsa abundè docet. Hæc itaque herba in theriacos pastillos inserenda erit, & non syluestre Allium, vt

Seplasia-
riorū cr-
xor. maximo ī errore versentur seplasiarj institores, qui pro re tam salutari atque omnibus putridis marcoribus, Galeno lib. i. de antidotis auctore, aduersante, syluestre Allium vsurpant. Sed indignius erratum, quàm quod multis explodi debeat. In hunc autem eisdem vicinitate vocabulorum potissimum incidisse errorem, libro primo Paradoxorum, ca. xxiiij. abundè monstrauimus.

LOCVS.

Nascitur in mōtanis & hamētibus locis. Nec inter se pugnant Dioscorides & Plinius, dū hic in capis humidis pinguibusq; ille autē in montanis nasci scribit. Vterq; enim verum dixit: in campestribus siquidem & montanis, non tamen omnib. prouenit, sed, quod Dioscorides etiam adiecit, humentib. tantum. Plantatum autem Scordiū non difficulter nascitur, & possunt de vno duntaxat ramo complures prouenire, modò solo humido committantur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, flos tamen nō nisi diem vnum durare videtur, sic continuo vnus alium sequitur.

TEMPERAMENTVM.

Tum ex saporibus, tum etiam facultatibus paulo post exponendis satis constat Scordium calidum esse. Nam, Galeno etiam teste, amarum quid obtinet, & acre.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba vim calefaciendi habet, & urinā cit recens trita & pota. Arida quoque cum vino decocta contra serpentium morsus, & letalia venena bibitur. Ad stomachi rosiones, dysenteria, & urinae difficultatem pondere duarum drachmarum cum hydromelite. Purgat crassa purulenta è thorace. Facit ad veterem tussim, rupta, conuulsa, cum nasturtio, melle & resina in ecligmate arida commixta. Hypochondriorum vetustas inflammationes excepta cerato lenit. Succurrit eadem podagris cum aceto circumlita, aut ex aqua illita. Menses supposita mouet, vulnera glutinat, vetusta vlcera purgat, & cum melle ad cicatricem ducit. Siccata carniū excrescentias reprimit. Succus præterea ex ea expressus ad prædicta vitia bibitur.

EX GALENO.

Expurgat simulq; excalfacit viscera, tum menses urinamq; mouet. Præterea conuulsa ruptaque &

GG ŷ laterum

PLANTARVM HISTORIAE

laterũ dolores ab obstructione & frigore nato, sanat potum. Denique viride illitum magna vulnera conglutinat: verũ sordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum.

EX PAULO.

Scordium varium existit, vt quod amarum, acerbũ & acre sit. Purgat igitur simul & calfacit viscera, vrinas & mēstrua cit, refrigerata omnia rescalfacit, vulnera glutinat, repurgatque, aridum illitum cicatricem inducit.

DE STICHADĒ. CAP.

CCXCIX.

NOMINA.

Stichas
arabica.

Stichas
vnde dicitur
etiam.

Arabica
quare vocatur.

ΤΙΧΑΪS Græcè, Stichas vel Stæchas Latine appellatur. Officinæ cognomento Arabicam vocant. Germanis nominatur

Stichaskraut (Gallis du stechados citrin.) Stichas verò nomē accepit à Stæchadibus ex aduerso Massiliæ sitis Galliæ insulis, in quibus prouenit. Arabæ factionis autores patriam Stichada reliquis omnibus prætulerunt, hinc sequaces illorum gentili cognomento Arabicam nuncuparunt.

FORMA.

Herba est tenuibus ramulis, comam similẽ Thy-mo habens, longiore tamen folio, & gustu acris, & aliquantum subamara. Hactenus Dioscorides, qui flores atque spicam prorsus omisit. Sunt autem flores, vt pictura abundè mōstrat, exigui & cœrulei,
spica

*spica verò flauescit semine referta exiguo, triquetra, & coloris spadicei. Radix illi est tenuis & lig-
nosa.*

LOCVS.

*Nascitur, vt antea est commemoratum, in insu-
lis Galliae è regione Massiliae, quae Stichadesappel-
lantur, à quibus etiam gentilitiam appellationem ac-
cepit. Prouenit etiam in Arabia, aliisq; complurib.
locis, & in multis etiam Germaniae nostrae hortis.*

TEMPVS.

*Floret eo quo Lanandula tempore, nimirum ante
Solstitium aestiuum, hoc est, Iunio mense.*

TEMPERAMENTVM.

*Steechadis qualitas gustu quidem amara est, &
mediocriter subadstringens. Temperamentum verò
compositum ex terrena essentia frigida exigua, vnde
sanè adstringit: & ex tenui, altera, quae terrena
est, copiosiore, à qua vtique amara est.*

VIREs. EX DIOSCORIDE.

*Decoctum eius quèadmodum & Hyssopi, ad tho-
racis vitia efficax est. Miscetur antidotis vtiliter.*

EX GALENO.

*Obstructione liberare, extenuare, extergere, ro-
borareque tum omnia viscera, tum totum corpus est
nata.*

EX PLINIO.

*Menses cit potu, thoracis dolores lenat. Antido-
tis quoque miscetur.*

DE STRUTHIO. CAP. CCC.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Radicula **Σ** $\pi\rho\theta\iota\omicron\upsilon$ Græcis, Radicula, siue Lanaria her
Lanaria. **ba** Latinis, Mauritanis & officinis Condifi,
Condifi. nonnullis herba fullonũ, vulgò Saponaria, Germa-
Sapona- nis Seyffenkraut (Gallis l'Herbe à foulon) di-
ria. citur. Vnde verò Græci hanc herbam Struthium
Struthiũ appellauerint, nõ satis constat, nisi fortè à foliorum
vnde no- positura, quæ auium alas quadantenus imitantur,
minatum nomẽ illi indiderint. Nam gens ea $\pi\rho\theta\iota\omicron\upsilon$ & $\pi\rho\theta\iota\omicron\upsilon$
 $\theta\iota\omicron\upsilon$ passerem, & minores alias aues appellat. Vel
forfitan quòd Venerẽ stimulet. Græci enim, vt di-
ctum est, $\pi\rho\theta\iota\omicron\upsilon$ passerem vocant, & ab eius auis
salacitate lasciuos, & in venerem procliuiores ho-
 $\pi\rho\theta\iota\omicron\iota$ mines $\pi\rho\theta\iota\omicron\varsigma$, quasi passerem vocant. Porro stru-
theum, vt est apud Festum, nuncupant obscenã vi-
rilem partem. Quæ imitatione Martialis & Catul-
lus passerem pro virili mēbro in suis versibus vsur-
passe videntur. Lanariam verò dixerunt, quòd ad
Lanaria candorem & mollitiem lanarum ea vsa fuerit an-
curdicta. tiquitas. Nã cum succidæ lanæ æsypo spurcatæ co-
lores respuerent, prolutæ huius radici succo, ad
quosunque suffectus imbibendos præparabantur,
quibus æsypum erat impedimento. Sic sordescentes
Radicula lanas veteres hac herba eluebant, ad munditiẽ con-
quarc ap- trahendam, quæ primum ab infectoribus quareba-
pellata. tur, sordidis colores aspernantibus. Sic quoq; à præ-
Sapona = cipua & vtiliore parte, Radicula Romanis est ap-
ria cur vo pellata. Saponaria recetioribus dicta est, quoniam
eluen-
dis

elucendis vestimentorum maculis, sordibúsque lanarum expurgandis, saponis vicem exhibet. *Herba* autem fullonum nominata est, quòd ea inter fullonum pollandis vestibus, & mangonio poliendis fullones vtantur.

FORMA.

Struthion herba est caule lanuginoso, foliis olce prodeuntibus ex intervallo quasi geniculatim, plerumque quinis in vnum coccinibus, in summo coliculorum floribus candidis: radice, quam summo cepite non in altum vtrò citròque per longitudinem fundit, magna, tereti & oblonga, quæ conciditur purgandis lanis.

LOCVS.

Nascitur in Asia Syriáque, saxosis & asperis locis præcipuè. Nunc in hortis quibusdam plantatur.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio maximè mense, sed per duos continuos menses floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccū temperamēto, ex quarto quodammodo ordine.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Radix eius acris est, vrinam cit, iecinorosis auxiliatur, tussi & orthopnæis cū melle cochlearis mensura sumpta. Aluū subducit. Eadē cum Panace & Capparis radice sumpta, calculos frāgit, & per vrinam exturbat. Lienem induratum minuit. Subdita mēses elicit, & fœtū manifestè enecat. Cum polēta

PLANTARVM HISTORIAE

Et aceto illita, lepras tollit. Cum farina hordeacea in vino elixa, tubercula discutit. Miscetur praterea collyriis Et malagmatis quæ ad claritatem oculorum conficiuntur. Sternutamenta cit, Et trita cum melle naribus infusa, per os purgat.

EX GALENO.

Struthij radice potissimum utimur, gustu acris quidem existēte. Sed Et abstergit, Et irritat, idcoq; sternutamenta mouet, ceu cætera omnia quæ gustu acria sunt, Et temperamento calida.

EX PLINIO.

Medetur morbo regio ipsa radix decocta, Et ius potum : item thoracis vitiis. Urinā cit, aluū soluit, Et vuluas purgat. Ea Et ex melle prodest magnificè ad tuſsim orthopneæ cochlearis mensura Cum polenta verò Et aceto lepras tollit. Eadem cū Panace Et Capparis radice calculos frangit, pellitq; Panos discutit, cum farina hordeacea Et vino decocta. Miscetur Et malagmatis Et collyriis, claritatis causa. Ad sternutamenta utilis inter pauca. Lieini quoque ac iecinori. Eadē pota denarij vnus pondere ex mulsa aqua, suspiriosos sanat.

DE SCILLA. CAP. CCCI.

NOMINA.

νίλλα Græcis, Scilla Latinis, Squilla, exemplo Varronis, omnibus nūc officinis vocatur. Germanis autē Meerzuibel (Gallis Stipouille, ou Charpentaire.)

F O R M A.

Scilla radix capæ modo multipliciter tunicata corticosaq; ex qua prius, vt in croco, caulis profilit tum ex eo flos in luteo candidus emergens insidit, qui cum senuerit folia demum multis pōst diebus emicant lata, nullo nixa pediculo, capitia quadam specie, & pleraque ex iis in terram deflexa.

L O C V S.

Scilla, vndique, vt capæ & allia, prouenit.

T E M P V S.

Scillam ter florere, tria q; tempora sationū ostendere, Theophrastus libro septimo capite duodecimo tradit. Primum enim florum prouentū, arandi primum tempus significare scribit, secundum medium, tertium nouissimum. Quot enim fuerint isti, totidē & arari tempora fermē occurrunt. Scilla præterea flos, vt est Berytius autor, nigrata specie prosiliens, modò celeriter non emarcescat, largos frugum prouentus, ac vberem annonam nobis promittit.

T E M P E R A M E N T V M.

Admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam, sed secundum hoc eam quispiā secundi ordinis censeat ex calfacientium.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

*Vim acrem & feruentē habet. Assata verò multiplicem obtinet vsum. Pasta aut luto oblita, in cli-
banum coniicitur, aut carbonibus obruitur, donec circumlita pasta sufficienter testa fuerit. Qua amos-
ta, si*

ta, si non emollescat, altera pasta aut luto circumlin-
 nitur, & eadem quæ prius sunt. Nam quæ ita non
 assatur, noxia magis est, præsertim interancis data.
 Torretur item in olla indito operculo, & in clibanum
 coniecta. Sumitur ex ea, adiectis extimis par-
 tibus, quod maximè medium est, quod cōcisum, ef-
 fusa prior aqua, coquitur, nouaq; superinfusa vsq;
 dum nec amaritudinem, neque acrimoniā habeat
 aqua. Siccatur autē in vmbra dissecta, & lino tra-
 iecta, ita vt ne taleolæ inuicem se cōtingāt. Sic igitur
 secta, ad oleū, vinū, acetumq; scilliticū vtimur.
 Ad rimas verò pedum crudæ Scillæ interanea pars
 in oleo feruefacta, aut cū resina liquefacta imponi-
 tur. Decocta in aceto demorsis à vipera cataplas-
 ma est. Assæ eiusdem pars vna tosti salis partibus
 octo subigitur, datūrque ieiunis cochlearis vnius
 duorūve pondere ad emolliendam aluum. Addi-
 tur potionibus & odoramentariis medicamētis, &
 iis cum quibus vrinam ciere voluerimus, hydropi-
 cisq; & stomachis, quibus innatant cibi, & morbo
 regio, torminibus, in vetere tussi, asthmaticis, crue-
 ta reiicientibus. Trium verò obolorū pondus in de-
 linctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur eadem
 cum melle, sumitūrque in cibo ad eadem maximè
 coctionem adiuuans. Strigmentitia per aluum du-
 cit. Cocta & simili modo sumpta, idem potest. Ca-
 uendus Scillæ vsus iis, quibus interaneum aliquod
 exulceratum erit. Prodest verrucis & pernioni-
 bus

*bus assam inungere. Semen eius tritum, cum caris
cis aut melle exceptum, si manditur, aluum emol-
lit. Pro foribus domus suspensa tota amuletum est.*

EX GALENO.

*Præstat assam aut elixam sumere: sic enim vi-
rium eius vehementia exoluitur.*

EX PLINIO.

*Scillarum in medicina alba est quæ masculus, fœ-
mina nigra. Scilla quæ candidissima fuerit, vtilissi-
ma erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquum
è vino est, consutum suspenditur lino modicis inter-
uallis, postea arida frustra in cadum aceti quàm a-
sperrimi pendentia immerguntur, ita ne vlla parte
vas contingat. Hoc fit ante Solstitium diebus qua-
draginta octo. Gypso deinde oblitus cadus, ponitur
sub tegulis, totius diei solem accipiētibus. Post eum
numerum dierum tollitur vas, Scylla eximitur,
acetum transfunditur. Hoc clariorem aciem fac-
cit. Salutare est stomachi laterumq; doloribus, pa-
rum sumptū binis diebus. Sed tanta vis est, vt auis-
dius haustum extinctæ animæ momento aliquo spe-
ciem præbeat. Prodest & gingiuis & dentibus,
vel per se commanducata. Tincas & reliqua vcn-
tris animalia pellit ex aceto & melle sumpta. Lin-
guæ quoque recēs subiecta præstat ne hydropici si-
tim sentiant. Coquitur plurib. modis in olla, quæ cō-
iiciatur in clibanū aut furnū, vel adipe aut luto il-
lita, aut frustatī in patinis. Et cruda siccatur, deīde
concidit*

PLANTARVM HISTORIAE

conciditur, coquiturq; in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vsus sic coctæ ad hydropicos. Ad urinã ciendam tribus obolis cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus innatet cibus. Ad tormina, regios morbos, tuſſim veterem cum suspirio. Discutit & ex foliis strumas, quadrinis diebus soluta. Furfures capitis, & vlcera manantia illita, ex oleo coctæ. Coquitur & in melle cibi gratia, maxime vti coctionem faciat. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo coctæ, & mixta resina. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Pythagoras Scillam in limine ianuæ suspensam, malorum medicamentorum introitum pellere tradit.

DE STAPHIDE AGRIA.

CAP. CCCII.

NOMINA.

τάφισ ἀγρία Græcis, herba Pedicularis et Pituitaria latinis, officinis Staphisagria, Germa. Biszmütz (Gallis de l'Estaphisagrie, ou l'herbe aux Poux.) Pedicularis autē Pituitariaq; Latinis à viribus quas habet, dicta est: erūpentibus enim è corpore pediculis ex oleo inuncta aduersatur, & cōmanducata feruore multam pituitā trahit. **FORMA.**

Folia habet Labruscæ incisuris diuisa, coliculos rectos, molles, nigrosq; flores Isati similes, semen in vasculis

vasculis viridibus similibus Ciccri, triangulum, asperum, in nigro subrufum, intus candidum, gustu acre. Hæc descriptio herbæ huic cuius hic effigiem damus, per omnia quadrat, floribus tantū exceptis, qui minimè Isatis similes sunt, neque in colore, neq; in quantitate. Isatis enim flores lutei sunt, & exigui, huius cōtra subcassii, ac multo maiores, vt hinc ferè suspicer eam herbam non esse quā veteres pingunt Staphidā agrian. Cæterū cum proximè tamen ad picturam accedat, neque viribus distet admodum, inter Staphidis agrias species rectè à plærisque hodie herbariæ rei studiosis cōnumeratur. Folia enim fert plerunque septem, aliquādo etiā paucioribus incisuris diuisa, coliculos rectos, nigros, & in folliculis herbaceis semen triquetrum, in nigro subrufum, intus cādīdum, gustu acre, ita vt illi omnes notæ, demptis floribus, respondeant.

LOCVS.

Nascitur, Plinio authore, in opacis. Ea cuius picturam exhibemus, nūc passim in hortis plātatur.

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Quum vrendi vim habeat Staphis agria, consequitur eandē in quarto ordine esse excalfacientium & desiccantium.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Eius grana quindecim si quis tria in aqua mulsā dederit,

PLANTARVM HISTORIAE

dederit, crassa per vomitum purgant. Sed qui biberint, ambulare debent. Quinetiam assidue attendere oportet, & aquā mulsam potui dare, quòd strangulationis pericula inferant, & fauces deurāt. Trita eadem, & ex oleo inuncta, pediculationi, pruriginì & scabiei auxiliatur. Plurimam cit pituitā commanducata. Decocta in aceto, dētium dolori, si ea colluantur, subuenit. Gingiuarum rheumatismū sistit. Vlcera oris, apthas nominant; cum melle sanat. Miscetur præterea vrentibus malagmatis.

EX GALENO.

Vehementer acrem obtinet facultatem, adeò vt ex capite purget pituitam, abstergatq; valenter. Itaque ad scabiem accommodata est. Sed & vrenti vim aliquam habet.

EX PLINIO.

Nucleis eius ad purgationes vti non censuerim propter ancipitem strangulationem, nec ad pituitā oris siccandam: fauces enim ledunt. Phthiriasi caput & reliquum corpus liberant triti. Facilius admixta sandaracha. Item pruritu & psoris. Ad dētium dolores decoquuntur in aceto. Ad auriū vitia, rheumatismum gingiuarum, vlcera oris manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur. Semen enim abdicauerim, propter nimiam vim odoris. Quidā eam Pituitariam vocant, & plagis serpentium vtiq; illinunt. Item phthiriasi, qua Sylla dictator consumptus est. Nascuntur quoq; in sanguine ipso
hominis

hominis animalia excusura corpus. Resistitur Staphidis agrias succo, cū oleo perunctis corporib. Hæc quidē in aceto decocta, etiā vestes eo tædio liberat.

DE SESELI MASSILIENSI.

CAP. CCCIII.

NOMINA.

ἔσელი τὸ μασσικαλωτικὸν Græcis, Sefeli

Σ Massiliense Latinis, Officinis Siler montanum dicitur. Semen tamen quod à seplatanum.

siariis hoc nomine venditur, non Massiliensis, sed, si amaritudinē respicias, Aethiopici, vel quod magis vero simile est, Peloponesiaci (neutrius enim integram imaginem vidimus) Sefeli semen est: latius enim, odoratius, & carnosius Massiliensi existit. Germanis incognita hætenus planta fuit, ob id Sefel rectè illam appellabunt.

FORMA.

Folia gerit Fœniculi, crassiora tamen. Caulē vegetiorem, umbellam Anetho similem, in qua semen est oblongum, angulosum, & degustanti confestim acre: radicem longam, & odoratam. Ex qua Dioscoridis delineatione satis constat stirpem, cuius pieturam damus, esse Sefeli Massiliense, quod huic nimirum, nulla prorsus nota reclamante, tota descriptio suffragetur. Quid multa? dato etiam quod singula illi non responderent notæ, tamē cū eas quas veteres Sefeli attribuerunt facultates obtineat, citra omne periculum pro eo usurparetur.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Optimū iuxta Maſſiliam, teſte Dioſcoride, Gallia urbem naſcitur, vnde etiam cognominatum eſt Maſſilienſe. Prouenit autem aliis quoque in locis calidioribus, & nūc in plariſque Germania hortis, ſed non niſi ſatum & cultum.

TEMPVS.

Floret æſtate, & ſemen ſubinde producit.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & deſiccat in ſecundo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semē & radix calefaciendi vim obtinēt. Strāguria, orthopnœa, vteri ſuffocationibus & comitialibus pota medentur. Menſes & fœtus ex vtero ducunt. Interaneis omnibus proſunt, & diutinas tuſſes ſanant. Ipſum ſemen cum vino potum coctioni confert, tormina diſcutit, & epialis febribus vtile eſt. Ad arcenda in itinere frigora cum pipere & vino bibitur. Datur capris aliisq; quadrupedibus bibendum, vt partus iuuet.

EX GALENO.

Scſeli & radix & ſemē vſque adeo excalefacit, vt admodum vrinam mouere queat. Sed & tenuium eſt partium, vt & comitialibus, & orthopnœis competat.

EX PLINIO.

Prodeſt homini ad tuſſim veterem, rupta, conuulſa, in vino albo potum. Item opiſthotonicis, & iecinorum

iecinorū vitiis, & torminibus, & stranguria, duarum aut trium ligularum mensura. Sunt & folia vtilia, vt quæ partus adiuvant etiam quadrupedū. Hoc maximè pasci dicuntur ceruæ pariturae. Illinitur & igni sacro. Multum in summo cibo coctionibus confert, vel folio, vel semine. Quadrupedū quoque aluū sistit, siue tritum potui infusum, siue mādendo commanducatum è sale. Boum morbus medetur, vel si contritum infunditur.

DE SANGVISORBA.

CAP. CCCITII.

NOMINA.

QUum ignoraremus quo nomine stirpem hāc veteres Græci & Latini, si modò iis cognita fuit, appellarint, maluimus interea vulgari vti nomenclatura, donec aliud certius nomen inuenerimus. Elatinen tamen esse iudicarem, si folia pusilla, pilosa, & rotunda obtineret. Nūc quum neque pusilla, neque pilosa, neque rotunda, sed mucronata esse videantur, certi statuere nihil possum. Sanguisorba verò dicta est hæc herba, non quòd Sanguisorba cur di-
vulneribus iniecta ferrum & spicula facile & citra sensum doloris exigit, vt nonnulli arbitrantur: Et a.
idipsum enim non posse mirifica quæ illi inest adstringēdi facultas abundè ostendit: sed potius quòd ei insitendo sanguine vndecunque emanarit, mira admodum insit efficacia, adeò vt hunc ipsum quasi absorbere videatur. Erroris autē huius nulla alia

HH causa

Error eorum causa est, nisi quòd hanc stirpem multi cum ea quæ
 rû qui Pîz hodie Pimpinella vocatur, confundant, quæ certè
 pinellam propter caliditatem quam obtinet haud exiguam,
 cum San- quandam etiam trahendi facultatem habere vide-
 guisorba tur, adeò vt infixa corpori extrahere facîle queat.
 cõfundût. Quòd verò cum Pimpinella confuderint non alio
 factum est nomine, quàm quòd huius folia proxia
 mè ad Pimpinellæ folia, quæ itidem vt hæc serrata
 sunt, accedere videntur. Sed hæc confusio nõ ca-
 ret errore, vt paulò pòst dicemus. Germanis hæc
 herba Kolbleskraut, à capitellis quæ ruffescenti-
 bus punctis maculata sunt, dicitur. Nonnulli etiam
 Germanorum Hergots Bartlin nominant, Quis-
 dam etiam à sistendo sanguine Blutkraut.

GENER A.

Duo sunt eius herbæ quæ Sanguisorba vocatur
 Sanguisor genera. Vna enim maioribus constat foliis ac lōgi-
 ba maior. ribus, coliculis tamen tenuioribus, ideoq; ab hac fo-
 Minor. liorum forma maior à nobis dicta est. Altera mi-
 noribus foliis, coliculis autem maioribus esse depre-
 hēditur, quare ab ista foliorum effigie rectè minor
 appellari potest, vt inter eas aliquod discrimen esse
 herbariæ rei studiosi hac ratione animaduertant.

FORM A.

Herba est à radice crassa & longa, statim folio-
 sa, minor potissimum, coliculos habens plurimos ru-
 bentes, folia aspera, in extremitatibus latè crenata
 & serrata, in summo coliculorum capitella ruffe-
 scentibus

ſcentib. punctis maculata, quæ ſi hiant flores exeūt herbacei, in medio croceam comam oſtendentes.

LOCVS.

*Nascuntur locis incultis, aridioribus, & ſoli expoſitis. Vnde iterum colligere licebit non eſſe Elatinen, vtcunque à facultatibus illius non diſcrepet, quòd Dioſcoride & Plinio teſtibus, Elatine in cul-
tis & ſegetibus proueniat.*

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio menſibus.

TEMPERAMENTVM.

Guaſtantibus adſtrictionē haud vulgare ac viſcoſitatem herba præ ſe ferre videtur. Quapropter ſiccā admodum conſiſtentiam nacta eſt, ſimulq; corpora contrahere, & conſtringere poteſt, atque adeò emplasticā, eò quòd glutinoſa ſit, facultatē obtinet.

VIRE S.

Ex iis quæ diximus abundè cōſtat vtranque Sanguiforbam in reſtringendis ac ſupprimendis ſanguinis profluuiis eſſe efficaciffimas, adeò vt nonnulli conſtanter aſſerant, eas etiā manibus geſtatas ſanguinem vndecunque manantem ſiſtere poſſe. Experiencia certè cōpertum eſt ad muliebre profluuium ſanandum, nullum poſſe reperiri præſentius iis ſtirpibus præſidium. Glutinant etiam vulnera illarum folia, carcinomatifque & fiſtulis medentur. Generoſum denique ac ſtrenuum remedium eaſdem eſſe ad dyſenterias, & reliquos vētris fluxus, ſi ex aqua

aut vino bibantur, nemini non notū est. Quid multa? Elatines herba, cuius certè hæc duæ stirpes *Pimpinella* esse videntur, facultates habent. Quare toto cœlo non solo errant qui herbas has, vt suprà etiam cōmemoratum est, cum *Pimpinella* confundunt, quòd hæc ipsa acris admodum sit & multum calida: illa cōtrà sapore, haud secus atque *Elatine*, adstringente. Verū etiam non tantum differunt facultatibus, imò etiam odore, coloreq; foliorum, maximè verò florum diuersitate, vt quiuus ex vtriusque herbae pictura collatione statim deprehendat.

DE SCOLYMO. CAP. CCCV.

Scolymus Artichaut Gallis.

NOMINA.

Carduus. **Σ**κόλυμος *Græcis*, *Carduus* & *Strobilus* *Latinis*, *Columellæ Cinara* dicitur. Sunt qui hodie *Arcocum* corrupta voce nominant, primam vocis syllabam articuli vice præponentes. Alii paulò rectius *Alcocalum* vocant: *Cocali* siquidem nomine, nux pinea, cui *Scolymi capitulum* simile est, venit. Nunc vulgo herbariorū ab articulo statim duabus interiectis literis *Articocalus*, aut expuncta vocali, a, *Articoclus*, vel magis curtato, vt ferè fit, vocatur, *Articoca*, cabulo, *Articols* vel *Articoca* nūcupatur. Germani instar vulgi *Articoca*, (*Gal. Artichaut*) nomina bunt, aut *Strobildorn*. *Strobili* autē Rom. hanc vocem dicta, stirpem non alia ratione dixerunt, quàm quòd eius capitulum, vt diximus, structili nucleorū serie pineam

neam nucem referre videtur. Cinarā verò sunt qui Cinara appellatam putent, quòd satum & cultum cineri: quare apibus gaudeat. Alii à Cinara potius puella, quæ in e: pellata. ius speciei Carduum mutata est, dictam esse volūt.

FORMA.

Folia habet Chamæleontis, & spina alba vocata similia, nigriora tamen ac crassiora. Caulem emittit oblongum, foliosum, in quo capitulum spinosum. Radicem verò nigram & crassam Hæc Dioscorides. Cæterū caput eius & vertex in squarosum extuberat globum, corticosis unguibus turgentem, spicisq; squamatim coagmentatum, quorum orbis exterior viuet, interior nuceo candore nitescit. Flos purpureo rutilat colore, qui tandē euanescit in pappos. Caput vetustate tandē dissilit in corticeas lumninas, semen ostendens Cnici figura. Nos tamen integram Scolymi faciem ac picturam hoc tempore dare nō potuimus, quòd primo anno fructum suum nō ostendat. Curabimus autem alio tempore vt studiosi integram eius habeant picturam.

LOCVS.

Nusquam, quòd sciam, in Germania prouenit Cinarā Scolymus nara, nisi sata et culta. Quare Scolymus qui in hor hortensistis colitur & plantatur, verè Cinara existit. Quod propriè idè monendum esse duximus, quia inter Græcos Cinara esse constat, vt est Paulus & Actius, qui Scolymum dicitur. à Cinara discriminant. Non est autem aliud inter Scolymus eas stirpes discrimen, quàm quòd Scolymus ferus

PLANTARVM HISTORIAE

Cinara. est & syluester, *Cinara* verò domita cultu, ideoq; à
Carduus nonnullis *Carduus* altilis nominatur.
 altilis.

TEMPVS.

Quum Solstitium aestiuum agitur, Scolymi flos
 erūpit, Hesiodo in lib. ij. cui titulus Opera & dies,
 teste, qui ea florente cicadas acerrimi cantus esse,
 & mulieres libidinis auidiſſimas, virosq; in coitum
 pigerrimos, capite, genibus, ac toto corpore præ Si-
 rj aestu areſcentibus, ſcribit.

TEMPERAMENTVM.

Quæ ſecūdam qualitatem editur actio, calidum
 in ſecundo ordine completo, aut tertio incipiente,
 medicamentum indicat, ſiccum verò in ſecundo.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix scolymi illita graueolentiam alarum, &
 totius corporis emendat. Item ſi decocta in vino bi-
 batur. Vrinam etiam copioſam, ſetidamque pellit.
 Herba cū recens naſcitur tenereſcitve, aſparago-
 rum modo in olera tranſit.

EX GALENO.

Scolymi radix copioſam urinam graueolentem
 elicit, ſi quis eam in vino coctam bibat: ideoq; gra-
 ueolentiam ſanat, tum alarum, tum totius corporis.
 Atque hoc ſanè medicamēto ex tota ineſt eſſentia,
 vtpote eius ſucco exiſtente purgatorio. Et in libro
 ſecundo de alimentorum facultatibus: prauī ſucci
 edulium eſt *Cinara*, præcipuè cū iam durior euā-
 ſerit: tum enim bilioſi humoris copia abundat, to-
 tāque

tâque eius substantia durior existit, adeoq; vt ex ipsa melâcholicus, ex succo verò eius tenuis & biliosus humor producat. Proinde coctâ edere præstiterit adiecto coriandro, dein ex oleo, garo, vinoq; sumatur. Si tamen in Patina aut sartagine ad esum præparctur, absque iis comedatur. Plerique enim sic eius veluti cacumina comedunt, quæ spondylos nominant.

EX PLINIO.

Vrinâ ciere Scolymū præcipuè traditur. Sanare lichenas & lepras ex aceto. Venerē stimulare in vino, Hesiodo et Alceo testibus, qui florēte ea cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis avidissimas, virōsque in coitum pigerrimos scripsere, velut providentia naturæ hoc adiuumento tunc valentissimo. Item graueolentiam alarum emendat radicis emedullatæ vncia, in vini falerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balneo ieiuno, itemq; post cibum cyathis singulis pota. Mirum est, quòd Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per urinam effluere.

DE SPHATVLA FOETIDA.

CAP. CCCVI.

Sphatula foetida cū Xiride magis cōuenit.

NOMINA.

HErba quâ officina Sphatulam foetidam vocant, quòd grauem exhalet odorem, quomodo veteribus sit appellata nondum certò scire possum. Nomen quidem ipsum Xiphij seu Gladioli

Sphatula
foetida cur
dicta.

Sphata. Speciem esse docet: *Sphata* siquidem Latinis gladii
Sphatula significat. Non esse autem *Xiphium* radix eius eui-
 foetida nō denter admodum ostendit, quæ non est bullosa, nec
 est *Xiphi-* gemina, ita ut altera alteri insideat, sed capillamē-
um. tis fibrata. Neque etiam *Sparganium* esse partim
 Non est folia eius, quæ in terram non procumbunt, partim
Sparga- etiam semina, quæ non in pilulis, sed folliculis aut
nium. siliquis profert. Non videtur etiam esse *Xyris*,
 Non est quod illa radicem habeat longam & rufam, *Spha-*
Xyris. tula verò foetida nec longam nec rufam, sed rotun-
 dam, albam & capillatam. Tamen quicquid sit gē-
 tilem iis esse foliorum similitudine constat. Ger-
 mani cam *Vuandt leuszkraut*, à necandis cimi-
 cibus appellant.

FORMA.

Folia *Iridi* similia habet, minora tamen & an-
 gustiora. Caulem ex se mittit, in cuius summo folli-
 culos aut siliquas *Pæoniæ* feminae non dissimiles
 profert, quibus dehiscentibus semen in iis apparet
 rotundum & rubrum. Radicem obtinet capilla-
 mentis multis fibratam.

LOCVS.

Circa sepes & dumeta nascitur, frequens in Ita-
 lia, nusquam tamen in Germania, quod sciam, nisi
 sata provenit.

TEMPVS.

Fructum seu siliquas suas autumnō profert, ac
 subinde in iis, ubi dehiscunt, semen ostendit.

TEM.

TEMPERAMENTVM.

Vehementer acrem qualitatem obtinet, ad eò vi gustata, fauces quasi viere videatur. Proinde calidam & siccam admodum esse constat.

VIRE S.

Non multum à Staphidis agria viribus abesse apparet: valenter enim abstergit. Hinc ad scabiem, eius potissimum succus, abigendam utilis est. Surculos etiam & spicula, perinde atque Xiphium & Xyris, sine dolore extrahit. Cimices quoque necat atque fugat.

DE TRICHOMANE.

CAP. CCCVII.

NOMINA.

TΡΙΧΟΜΑΝΕΣ Græcè, Trichomanes, Capillaris Polytrichon Latinè vocatur. Officinis Polytrichon falso chon officina dicitur: id enim nominis Adianto herba, quam hoc cinarum. die Capillum Veneris vocant, Dioscoride & veteribus aliis testibus, debetur. Germanicè Vuiderstodt, oder Abthon (Gallis du Polytrichon) Trichomanes appellatur. Trichomanes autem à facultate sua manes cur Græci nominauerunt, quòd scilicet fluentem capillum dictum. lum expleat, & subnasci faciat: μανὼν enim ea gēs rarum vocant, ΤΡΙΧΑ autem capillum. Hoc etiam Capillaris nomine Capillarem latini dixerunt.

FORMA.

Filici simile est Trichomanes, paruum admodum. Ex vtraque parte ordine quodam folia habet

PLANTARVM HISTORIAE

bet tenuia, Lentis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splendentibus, subnigris & austeris. Cuius equidem descriptionis notæ omnes, nulla penitus reclamante, herba illi quam hodie officina Polytrichon vocant, pulchrè quadrant. Siquidem cauliculis iunceis, quincuncialibus, à radice statim penè foliatis constat, foliis rotundis, lenticula forma, aduersis inter se pediculis ramulis subnigris & nitentibus, sine flore, sine semine.

LOCVS.

Nascitur in palustribus atque vmbrosis locis, humentibus muris, & iuxta fontes, haud secus atque Adiantum.

TEMPVS.

Carpitur æstate & autumnii initio.

TEMPERAMENTVM.

Trichomanes in caliditate quidè & frigiditate Symmetrū est, verūm desiccatur, extenuatur & digeritur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eadem potest quæ Adiantum. Cum itaque Adiantum aliunde in Germaniam sit deportandum, & Trichomanes passim proueniat, licebit hoc in alterius inopia uti. Et consultius multò ut Trichomanes utantur Officinæ, quàm Adianto adulterino. Prodest igitur Trichomanis decoctum potum asthmaticis, dyspnoicis, felle suffusis, lienosis, vrinæq; difficultatibus. Calculos frangit. Aluum sistit. Venenatorum morsibus, & stomachi fluxionibus in vi-

no potum medetur. Menses & secundas ducit, sanguinis autem reiectiones sistit. Crudum illinitur venenatorum morfibus. Alopecias explet, strumas discit. Furfures & achores cum lixiuio exterit. Cum ladano, myrtino, susino, aut hyssopo & vino capillos defluentes continet. Decoctum etiam eius cum lixiuio & vino si eo abstergantur, idem potest.

EX GALENO.

Alopecias densat, & strumas & abscessus discutit, lapidesque frangit potum. Viscosorum crassorumque ex thorace pulmonéque excreationibus non mediocriter confert. Ventris profluvium sistit, nullam tamen manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem.

EX PLINIO.

Calculos è corpore mirè pellit, frangitque, utique nigrum. Qua de causa potius quam quòd in saxis nasceretur, et à nostris Saxifragum appellatum crediderim. Bibitur è vino quantum terni decerpere digiti. Urinam cient. Serpentiū & araneorū venenis resistunt. In vino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex iis sedat. Contra scolopendreae morsus illinuntur, crebrò auferēdi ne pereant. Hoc & in alopecias. Strumas discutit, furfuresque in facie, & capitis manātia vlcera. Decoctū ex his prodest suspiriosis, & iecinori, & lienī, & felle suffusis, & hydropicis. Stranguriæ illinuntur, & renibus cum Absinthio. Secundas cient & mēstrua.

Sanguinem

PLANTARVM HISTORIAE

Sanguinem sistunt ex aceto, aut Rubi succo poti. Infantes quoque vlcerati perunguntur ex iis cum rosaceo & vino prius. Folium in vrina pueri impubis, tritum quidem cum aphronitro, & illitum venter mulierum, ne rugosus fiat, praestare dicitur. Peredices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in cibum eorum additis, pecoriq; esse vtilissimos.

DE TELI. CAP. CCCVIII.

Fœnumgræcum corrupte, Vulgus Senegrec, per S loco F.

NOMINA.

Tῆλιν, κεραιτὶς αἰγὸς κέρως, βούκέρως Græcis, Fœnūgræcum Latinis: officina genuinum nomen retinuerunt: Germanis Bockshorn, oder Kuhorn, (Gallis Fenegrei, ou Fenegrec) dicitur. Magna græcarū appellationum pars à siliquarum quas producit figura desumpta est: hæ enim corniculis similes existunt. Hinc Ceraitis à cornu simpliciter dici cæpit: κέρως enim Græcis cornu est. Aegoceros autem à caprini cornu similitudine, quemadmodum à bubuli Buceros, quod sanè nomen Theophrastus libro quarto de historia plantarum illi imposuit. Cum itaque corniculis similes habeat siliquas, factum est vt illam Columella simpliciter Siliquam nominauerit, Plinius Siliciam, Varro Siliculam.

Ceraitis
cur dicta.
Aegoceros
Buceros.

FORMA.

Cauliculis emicat exilibus, rubicundis, folio pe-

nè Trifolij, flore candido & exiguo, semine in siliis
 quis oblongis, ac cornu instar incuruis fuluo. Radice
 subrotunda & oblonga innititur.

LOCVS.

Satum Fœnogræcum passim ferè provenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mēsisbus floret, & vnà siliquas pro
 ducit. Semen tamen in Augusto maturum legitur.

TEMPERAMENTVM.

Fœnumgræcum calidum est secundi ordinis, des
 siccat primo.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Molliendi & disficiendi facultatem habet fœno
 græci farina. Facit ad inflammationes quæ intus
 forisq; sunt si cum aqua mulsa decocta trita illina
 tur. Lienem cū nitro & aceto subacta & illita mis
 cuit. Decoctū eius in seculo ad muliebria mala, quæ
 cunq; per inflāmationes aut præclusiones consistūt,
 vtile est. Expressus Fœnogræci in aqua decocti suc
 cus, capillos, furfures & achores exterit. Cum anise
 rino adipe pesti vice apponitur, loca quæ iuxta vte
 rum sunt emolliens & relaxans. Viride cum aceto
 imbecillis & exulceratis locis prodest. Decoctū eius
 aduersus tenesmos, & grauitèr olentia dysenterico
 rum excrementa confert. Oleum eius cum myrtino
 capillos & in genitalibus cicatrices abstergit.

EX GALENO.

Fœnumgræcum feruentes inflammationes irri
 tat.

tat. Quæ verò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

EX AETIO.

Fœnumgræcum habet etiam abstergendi vires. Variis modis comeditur, sed copiosius sumptum caput tentat. At cremor decocti Fœnogræci cum modico melle exhibitus, omnes deprauatos intestinorum humores educit. Permodicū esse oportet quod permiscetur mel, ne erodat. In diuturnis verò doloribus qui sine febre thoracem infestant, pingues simul palmulæ elixantur, inde succo expresso melisque admixto suppositis carbonibus rursus decoquantur vsque ad congruam consistentiam. Datur id diu ante cibum, obseruari q̃; oportet ne iis exhibeatur, quibus facile caput dolet: palmulæ enim capiti infestæ sunt.

EX PLINIO.

Vis eius siccare, mollire, dissolvere. Succus decocti foeminarum pluribus malis subuenit: siue duritia, siue tumor, siue contractio sit vuluæ, fouentur, infidunt. Infusum quoque prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impostum medetur. Item ex aceto. Sic iecinori decoctū. Diocles difficile parientibus semen eius dedit acetabuli mensura tritum in nouem cyathis sapæ ad tertias partes bibere, vt qui biberent in calidala uarentur. Et in balneo sudantibus dimidium ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquū, pro summo

mo auxilio. Farinā fœnogræci cum hordeo aut lini
 semine decoctā aqua mulsa cōtra vuluæ cruciatus
 subiecit. Itemq; imposuit imo ventri. Lepras, lentis
 gines, sulphuris pari portione mista farina curauit,
 nitro antè præparata cute, sæpius die illinēs, perun-
 giq; præcipiēs. Theodorus Fœnogræco miscuit quar-
 tā partem purgati Nasturtij acerrimo aceto ad le-
 pras. Damion Fœnigræci semen acetabuli dimidia
 mensura cum sapæ & aquæ nouem cyathis ad mē-
 ses ciendos dedit potu. Nec dubitatur quin decoctū
 eius vtilissimum sit vuluis, interaneisq; exulcera-
 tis, sicuti semen articulis atque præcordiis. Si verd
 cū Malua decoquatur, postea addito mulso potus,
 ante cætera vuluis interaneisq; laudatur: quippe cū
 vapor quoque decocti plurimum possit. Alarū etiā
 graucolentiam decoctum Fœnogræci semen emen-
 dat. Farina porrignes capitis fursurēsq; cum vino
 & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem de-
 cocta addita axungia genitalibus medetur. Itē pa-
 rotidi, podagræ, chiragræ, articulis, carnibusq; quæ
 recedunt ab ossibus. Aceto verò subacta luxatis. Il-
 linitur & lienī decocta in aceto, & melle tantum.
 Carcinomata subacta ex vino purgat, mox addito
 melle persanat. Sumitur & sorbitio è farina ad pe-
 ctus exulceratum, lōgamq; tuſsim. Diu decoquitur
 donec amaritudo desinat, postea mel additur.

DE TELEPHIO.

CAP.

CCCI X.

Telephium

PLANTARVM HISTORIAE

Telephium pingit vulgo Gallorum Orpin dictam herbam, in qua tamē quædam desiderantur.

NOMINA.

TΕΛΕΦΙΟΝ, ἢ ἀείζων ἄγριον Græcis, Telephium & Illecebra Latinis, officinis & vulgo Crassula maior appellatur. Sunt qui Fabā crassam, à foliorum quam cum faba habent similitudine, Fabam crassam, nominant. Germanis Vuundkraut, Knabenkraut, Fottzzuuang, Fottzuuein, (Gallis du Chicotrin) dicitur. Telephium verò dictū est, quod unde di- ulceribus malignis & deploratis, quibus Telephus Elum. Mysia rex ab Achille vulneratus cōsenuit, quæ eā Telephia etiam ob rem Telephia vocantur, auxilietur. ulcera.

GENERA.

Dioscorides duo genera facit. Vnum floribus albis, quod nobis Telephium album nominare placuit, Germanicè Vuundtkraut das vueible. Alterum floribus luteis, quod Norimbergæ me vidisse memini. Damus pro illo Telephium purpurascētibus floribus emicans quod ad differentiam prioris Telephium purpurascens appellare volumus, Germanicè Vuundkraut das mennle. Præter flores qui in primo candidi sunt, in hoc autem purpurascētes, foliorum etiam colore differunt, qui in candido viridis & herbaceus existit, in purpurascente autem paulò pallidior. Cetera omnia in iis similia apparent, folia potissimum, quæ fabacea

fabacea prorsus sunt, nisi quod pinguiora, & crassiora existunt.

FORMA.

Foliis & caule Portulaca similis herba Telephium. Alas binas in singulis foliorum geniculis inherentes habet. Ramuli à radice seni septenive prodeunt, referti foliis cœruleis, crassis, glutinosis, carnosiss: flores illi lutei, vel albi, vel purpurascens radix ima, quod Diosco. omisit, innumeris tuberculis scatet. Nō est autem cur diuersum Telephium hoc nomine ab ea herba, quam herbarij hodie crassulā maiorem nominant, suspicemur, cum omnes reliquæ notæ à Dioscoride commemoratæ, illi adamussim conueniant. Et solenne certè est Dioscoridi ut multas notas, in his potissimum herbis quas ipse nō vidit, atque adeo ex aliorum fide pingit, easq; maxime quidem necessarias omittat, & silentio trāseat. Quibus etiam accedit locus natalis, & facultates Telephij, quæ eadem sunt cum iis quæ Crassulæ maiori recentes herbarij adscribunt. Sunt qui alterum acetabulum esse putent, quorum sanè sententiam non admodum absurdam esse iudico.

LOCVS.

Nascitur inter vites, locis cultis & incultis, humidis.

TEMPVS.

Vere statim profilit, Iulio autem & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

PLANTARVM HISTORIAE

Telephium exiccat ordine secundo intenso, aut certè principio tertij, non tamen insigniter calida, verum in hoc forsan quispiam ipsum primi esse ordinis censeat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia senis horis illita, albas vitilignes sanāt: sed oportet postea hordeacea farina illinere locum. Quinetiam alphos tollunt cum aceto in sole inuncta. Sed ubi inaruerint, absterguntur.

EX GALENO.

Telephium detergendi & exiccandi facultate est præditum: proinde ad putrida vlcera conuenit, & leucas & alphos cum aceto sanat.

EX PLINIO.

Illinitur lentigini, & cum inaruit teritur. Illinitur & vitiligni, ternis ferè mensibus senis horis noctis aut diei, postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

APPENDIX.

Recentiores herbarij sua *Crassula* maiori in curandis vulneribus, & sistendo sanguinis profluvio vtuntur vt eandem esse cum *Telephio* vel hoc saltem nomine nemo dubitare debeat. Magnā autem efficaciam habere in internis potissimum vulneribus & vlceribus, mirificèque herniosis prodesse iidem tradunt.

DE TRINITATIS HERBA.

CAP. CCCX.

Herba

Herba Trinitatis nobis Pensée.

NOMINA.

Quo nomine privatim plāta hæc Græcis aut Latinis appellata sit medicis, ignorare me fateor. Constat tamen Viola inodora genus esse, & mea quidem sententia Iouis florem. Iouis flos. Vulgus à triplici colore floris, herbā trinitatis nominat. Sunt qui Iaceam, & herbam clauellatam trinitatis unam appellāt. Germani Dreyfeltigkeytblumen, & de dicta. Freyschamkraut (Galli Herbe de la Trinité) Iacca. vocant.

FORMA.

Herba hæc folio est initio rotundo, per ambitum serrato, processu tēporis oblongiore, cauliculo triangulo, intus cauo, leniter striato, ex internallis geniculato, prodeuntibus ex alarum sinu pediculis longis, in quibus summatim elucēt flores figura & specie violarū purpurearū, superiore parte purpurei, in medio cādidi, inferiori verò lutei, radiis quibusdam nigris distincti. Quibus decidentibus semina protuberant.

LOCVS.

Sua spēte in aruis interdū prouenit. In hortis tamen vt plurimum plantatur, speciosiorq; nascitur.

TEMPVS.

Vere viola hæc post purpuream emicat, & tota æstate floret.

TEMPERAMENTVM.

Herba in gustu lentorem quendam, atque mordicam acrimoniam cœu mordacitatem præ se fert.

II ij

atque

PLANTARVM HISTORIAE

atque adeò à Symphyti temperamento non admodum abesse videtur, id quod etiam ex facultatibus quas illi recentiores tribuunt facile deprehenditur. Calida itaque & sicca est.

VIRE S.

Quum acrimoniæ ratione incidendi vim quampiam habeat, ideo recte recentiores asthmaticis, pulmonisque phlegmonibus prodesse tradunt: collatum siquidem in thorace & pulmone pus expurgare potest. Hac ratione puerorum etiam comitialibus morbis auxilio esse solet. Caterum non parum ad pruritum & scabiem confert, omniâque cutis vitia emendat, idque mediocris acrimoniæ & siccitatis ratione. Ulcera etiam, quia viscositatem obtinet, glutinare potest.

DE TEUTLO. CAP. CCCXI.

NOMINA.

TΕΥΤΛΟΝ, ἢ σδύτλον Græcis, Beta Latinis appellatur Germanis Mangolt, oder Pissen σδύτλον (Gallis de la Porée, ou de la Iotte.) σδύτλον unde dicitur autem Græci ab impulsu nominarunt, etenim cultus ratione quadam incrementum capeßit arboris, Etum. neque ulli hortensium latitudo foliorum maior. Beta curta nomen sibi adsciuit, quoniam figuram β literæ dicta. græca dū semine turgere referre videtur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtinet. Id quod testatum nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu hortorum ita canens.

Nomine

Nomine tum Graio,ceu litera proxima primæ,
 Pangitur in cera docti mucrone magistri,
 Sic & humo pingui ferratæ cuspidis ictu
 Deprimitur folio viridis pede candida Beta.

G E N E R A.

Eius à colore omnes duo genera faciunt, candi-
 dam & nigram. Candida alio nomine Sicula, vt Candida
 Theophrastus libro octauo de historia plantarum, Beta.
 & Plinius libro decimonono, capite octauo, memo-
 riæ prodiderunt, appellatur. Et nunc extrita litera
 vna ferè omnibus nostri seculi medicis Sicla nomi- Sicla.
 natur. Germanicè Vuiffer Mangolt. Nigra ad a- Nigra Bo-
 trum videtur tendere colorem, & à Germanis ro- ta.
 ter Mangolt vocatur.

F O R M A.

Caulem habet striatum, bicubitalem, foliū ferè
 Atriplicis, flores exiguos luteos, semen in caulibus
 copiosum: radicem vnicam in longum protensam, è
 cuius lateribus aliæ, modò singulæ, modò binæ, non
 nunquam ternæ funduntur, fibris multis refertæ.

L O C V S.

In hortis passim, & cultis locis nascuntur Beta.

T E M P V S.

Iulio & Augusto mensibus floribus & semine
 surgent.

T E M P E R A M E N T V M.

Nitrosa qualitate particeps est. Nigra tamen ad-
 strictionis quippiam adiunctum habet, & magis in

PLANTARVM HISTORIAE

radice quàm in aliis partibus. Simeon Sethi calidam & siccam esse in tertio ordine asserit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Nigra Beta cum lente cocta aluum efficacius cohibet, multoq; magis radix. Cãdida aluo utilis est. Vtraque verò propter nitrosam vim quã habet mali succi est. Vnde succus earũ cum melle naribus inditus caput purgat. Aurium etiam doloribus auxiliatur. Decoctũ radicum & foliorum furfures & lēdes deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis foliis alphos nitro prius perfrictos, alopecias prurientes, atque depascentia vlcera illini prodest. Cocta exãthematis, erysipelatis, & ambustis medetur.

EX GALENO.

Beta nitrofa facultatis est particeps, qua tñ ex-tergit, tum digerit, & per nares purgat. Ceterũ cocta nitrositatem omnem exuit, sitq; facultatis phlegmonis aduersa, leuiter discutientis. Porrò ad detergendum digerendũque validior est Beta alba. Nam nigra adiunctum habet quippiam adstrictionis, & magis in radice quàm aliis partibus. Beta itaque abstersorius inesse succus conspicitur, adeò vt aluum ad excretionem extimulet, & nonnunquam stomachũ demordeat, præsertim iis quibus ille sensilior obtigit: eoque largius commansa: stomachum infestat. Huius ceu aliorum olerũ, exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quàm Malua, aptius accommodatur, magis autem vbi cũ Sinapi

Sinapi estur, aut aceto. Lienosos item similiter māducata, mirificē iuuat.

EX PLINIO.

Nec Beta sine remedio est vtraque. Siue cādida, siue nigra radix recens & madefacta, suspensa siniculo, contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida Beta cocta, & cum Allio crudo sumpta, cōtra tineas. Nigra radices ita in aqua cocta, pruriginem tollunt, atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres & vertigines, item sonitum aurium sedat, infusus iis. Ciet vrinam. Medetur dysentericis iniecta, & morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus. Et contra serpentium ictus valet, sed huius radici duntaxat expressus. Ipsa verò decocta, per nionibus occurrit. Alba succus epiphoras sedat, frōte illita. Aluminis pauco admixto, ignem sacrū. Si ne oleo trita licet, adustis medetur. Et contra eruptiones popularū cocta. Eadē cōtra vlcera quæ serpunt. Illinitur & alopeciiis cruda. Et vlceribus quæ in capite manāt. Succus eius cum melle naribus inditus, caput purgat. Coquitur & cum lēticula addito aceto, vt ventrem molliat. Validius cocta, fluxus & tuationes stomachi sistit & ventris.

EX SIMEONE SETHI.

Eius succus mediocriter abstergit. Hic etiam vētrem ad effluxum proritat, & stomachū aliquādo vellicat, eorum præsertim qui hunc valde sensilem

obtinēt. Quapropter edulium est stomacho infestum, si plurimum comedatur. Exiguum est eius alimētum, sicut ceterorum olerum. Vtilis verò est ad iecoris obstructiones cum aceto comesta. Pari modo si edatur, & lienis obstructionibus bonum fit medicamentum. Constat autem Beta ex contrariis facultatibus. Succus enim eius calidus est, ventrem constringit, & sitim affert. Eius verò corpus crassarū partium, flatuosum, concoctū difficile & frigidum. vētremq; sistit, maximè si qua in aqua coctum est, subinde abiiciatur.

DE TINCTORIO FLORE.

CAP. CCCXII.

NOMINA.

AN herba hæc veteribus cognita fuerit nondum compertū habemus: quapropter ad germanicam alludentes appellationem, Tinctoriū florem interim dum certius nomen nacti fuerimus, nominabimus. Germani Gilb oder Streich oder Ferbblumen, quòd florum illius in tingendis libris & aliis quibusdam vsus sit, nuncupant. Sunt qui Ackerpfrimmen vocant.

FORMA.

Genista nō admodū dissimilis est hæc herba: ramos enim herbaceos, ut illa habet, ac scabros, folia tamē paulò longiora & latiora, ad Hyssopi ferè formā accedētia, florē luteū, Piso similē, semē ī siliquis Lenticulæ hand adsimile, radicem planè ligneam.

LOCVS.

Prouenit locis altis, incultis & aridis, atque pratis nonnullis.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atque deinceps semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Amara est haud aliter quàm Genista, vt caleface re illā & siccare in altero ordine sit euidentissimū.

VIRE S.

Vt forma & temperamento Genista similis est, sic etiam facultatibus haud dubiè eidem respondet. Has igitur suo loco reperies.

DE TORDYLO. CAP. CCCXIII.

NOMINA.

Tὸ τῶδ' ὕλον, ἢ τῶδ' ὕλιον, ἢ σέσελι κρητικὸν
 Græcis: Tordylon & Tordyliō, & Sefeli Cre
 ticum Latinis. Paulus Gordylion appellat. Germanis Beeruurtz (Gallis du Sefeli) dicitur, vt supra in capite de Dauco quoque diximus. Nā cum Dauci semen hirsutum sit, utcumque cætera respondeant, hoc verò minimè, non est cur Daucum esse credamus.

FORMA.

Fruticosa est herbula, semen habens rotundum, geminatū, clypeo simile, subacre, & odoratū. Quæ sanè omnes notæ huic herbae, quæ à Germanis Beeruurtz dicitur, respondent, vt eius pictura, quam
 in capite

PLANTARVM HISTORIAE

in capite de Dauco reperiens, abundè docet. Hæc autem propterea radicum similitudinem inter Daucorum effigies habere locum volumus.

LOCVS.

Nascitur in Amano Ciliciæ monte. In multis etiam Germania nostræ locis copiosissimè provenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calfacit & exiccat, vt ex facultatibus eius abundè colligere licet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Potum eius semen contra vrinæ difficultatem, & ducendis mensibus prodest. Succus verò caulis seminisq; adhuc virentis trium obolorum pondere haustus decem diebus in passo, nephriticos sanat. Efficax etiam radix, cum melle siquidem linctæ, quæ in thorace sunt educit.

EX PAULO.

Cordylon alij Seseli appellant, vrinæ & mensibus ducendis habile. Radix ipsius ex melle linctæ, quæ in thorace hærent, educit.

EX PLINIO.

Combusta potu ciēt menses, & pectoris excretiones, efficacior etiam radix. Succus eius ternis obolis haustus renes sanat. Additur radix eius & in malagmata.

DE TITHYMALIS. CAP.

CCCXIIII.

Tithymalorum genera passim luxuriāt,
Reueille matin Gallis dicuntur, opinor
quòd vrente acrimonia insomnia pariāt.

NOMINA.

Tιθυμάλος, ἡ τιθυμάλου Græcis, Lactaria
herba, & Lactuca caprina aut marina Latini-
nis, barbaris & officinis Esula, Germanis Vuolffs-
milch (Gallis du tithymale, ou herbe à lait)
dicitur. Lactariam autem herbam communi appel-
latione, ob commune omnibus lac, vniuersum hoc herba cur
genus vocauerūt. Lactucā verò ob eādem causam, nominata
quia scilicet ex hac herba haud secus atque ex La Lactuca
Etuca secta lac fluit. Caprinam, quòd capra Tithy caprina
malis vescantur. quare vo-

GENERA.

Septem sunt, Dioscoride & aliis veterib. testibus, cata.
Tithymalorum genera. Primus Characias, id est, Characias
vallaris dicitur, quòd vallis septisq; muniendis ido-
neus sit. Secundus Myrsinites, à Myrti foliorum si- Myrsini-
gura: aut à nucibus, quibus similem fert fructum, tes.
Caryites nominatur. Hunc fructum sunt qui Nucē
vomica, Germanis Kronaglin vocatam, esse pu-
tent. Tertius Paralius, id est, marinus, quòd in ma- Paralius.
ritimis nascatur, appellatur. Quartus Helioscopius, Heliosco-
hoc est, solisequus, quia eius coma ad solis cursum pins.
circūagitur nominatur: germanicè Sōnen vuēde-
de Vuolffsmilch vocari potest. Aliis nominatur,
groß

Cyparissias. groſz Vuolffsmilch. Quintus Cypariſſias à Cypreſſi ſimilitudine nūcupatur. Germanicè cypreſſene Vuolffsmilch nominari poteſt. Sextus Dendroides. droeides, à ramorum copia dicitur. Septimus Platyphyllos. id eſt, latifolius, à latitudine foliorum nominatur. Germanicè Breytblettere Vuolffsmilch, alij groſz Teuffelzmilch vocāt. Nos ex iis generibus tria tantum depiſta damus, quòd reliqua videre nondum nobis licuerit. Proferent for-
tè alij longè plura.

FORMA.

Nos ea tantum genera quorum picturas exhibemus, omiſſis aliis, deſcribemus. Helioſcopius itaq; Helioſcopius. Portulacæ ſimilia folia obtinet, tenuiora tamen atque rotundiora. Ramos autem à radice prodeuntes quatuor aut quinque mittit, dodrātales, tenues & rubentes, copioſo lactis liquore plenos. Caput huic eſt Anetho ſimile, & ſemē veluti in capitulis incluſum. Circumagitur huius coma cum ſole, vnde & Cypariſſias. Helioſcopij nomen accepit. Cypariſſias caulem emittit dodrantalem, aut maiorem, ſubrubrum, ex quo germinant folia pini ſimilitudine, teneriora tamen ac tenuiora. Et in vniverſum pino nuper nata ſimilis eſt, vnde & nomen traxit. Abundat hæc etiam ſucco candido. Platyphyllos. Verbaſco ſimilis eſt, longioraq; reliquis folia habet.

LOCVS.

Helioſcopius in ruderibus potiſſimum, & circa oppida

oppida nascitur. Cyparissias in cāpestribus frequē-
tissimus occurrit. Platyphyllos verò in syluis.

TEMPVS.

Semen Tithymalorum autumnno legitur, succus
verò incipiente pomorum lanugine.

TEMPERAMENTVM.

Vincentem habent acrem calidamq; facultatem,
ineſt verò & amaritas. Ex quarto itaque caleſa-
cientium sunt ordine, & valenter deſiccant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Characia liquor lacteus aluum per
inferna purgandi, pituitā, & bilem ducens, duorū
obolorum pondere ex poſca ſumptus. Cum melicra-
to autem vomitū cit. Appetente vindemia lacteus
colligitur liquor. Depilat liquor hic recens ex oleo.
in ſole inunctus, renaſcentesq; flauos & exiles effi-
cit, tādēq; omnes deſtruit. Cauernis dentiū indi-
tur, leuatq; dolores: ſed cera dentes oblinendi, ne ef-
fluens fauces aut linguam vitiet. Idē inunctus myr-
mecias, acrochordonas, thymos & impetigines tol-
lit. Valet etiā aduerſus pterygia, carbunculos, pha-
gedanas, gangranas, fiſtulāſque. Semē & folia ea-
dem lacteo ſucco præſtant, dimidiꝝ acetabuli pōde-
re pota. Radix drachma pondere cum hydromeli-
te inſperſa & pota per inferna purgat. Decocta cū
aceto, colluto ore, dentium dolori auxiliatur. Helio-
ſcopius eandem priori vim habet, non tamen vſ-
que adeò intentam. Nec diuerſam facultatem obti-
nent

PLANTARVM HISTORIAE

nent *Cyparissias* & *Platyphyllos*.

EX GALENO.

Validissimus *Tithymalorū* liquor est. Secundum locū tenet semen & folia. Sed & radix earundem facultatum particeps est, sed nō ex aequo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maximè qui illis erosus proueniunt. Ad liquores vt qui valentio- rem vim habeant, in foramina quidem ipsa den- tium induntur. Ceterū si aliam corporis partem contigerint, continuò adurunt, vlcérantq;: quapro- pter foris illis cera circūlinitur. Sic pilos quoq; suc- cus inunctus tollit. Porro quum vehemētior sit, oleo miscetur: & si id saepe fiat, tandē prorsus radices pi- lorum adustæ corrumperuntur, corpusq; depile redder- tur. Eadem facultate *myrmecias*, *acrochordonas*, *pterygia* & *thymos* auferunt, detergentq; *licheras* & *psoras*, quia scilicet abstergendi illis facultas in- est, propter amaritudinem. Præterea vlcera *pha- gedænica*, *anthracode* & *gāgranode*, quia valēter calefaciunt & abstergūt, si in tēpore & moderatè quis vtatur, iuuare poterunt. Verumenimūero & fistularum callos, eadem facultate adimunt. Porro hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius ta- men & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos vti as- solent. Celerrimè nāque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem ferun- tur. Ceterū quū septem sint eorum genera, valen- tissimus

tissimus est quem Characiam nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur ad modum arboris: deinceps qui verbasco adsimilis est, & Cyparissias: post Paralium, denique Helioscopium. Proportione verò comprehensa illorū facultatis & cinis & lixivium erit.

EX PLINIO.

Tradunt toties purgari hydropicos fico sumpta, quot guttas lactis Characiæ exceperit. Est & semē in usu cum melle decoctum ad catapotia solvenda alui gratia. Semen & dentium canis cera includitur. Collauntur & dentes succo radicis decoctæ in vino aut oleo. Illinunt & lichenas succo, bibuntque eunt ut purgent vomitiones, & aluo soluta, aliās stomacho inutilem. Trahit pituitam sale adiecto in potu, bilem aphronitro. Si per aluū purgari libeat, in posca: si vomitione, in passo aut aqua mulsa. Media potio tribus obolis constat. Ficos à cibo sumpsisse melius est. Faucesurit leniter. Est enim tam feruentis naturæ, ut per se extra corpori impositū, pusillas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Helioscopium trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo. Ceteri usus qui Characiæ. Cyparissiae eadē vis quæ Helioscopio aut Characiæ. Platyphyllos pisces necat, alium soluit, radice vel foliis, vel succo in mulso, aut aqua mulsa drachmis quatuor. Detrahit priuatim aquas.

DE TRIPHYLLO.

CAP. CCCXV.

NOMINA.

Tριφυλλον Græcis, *Trifolium odoratum* Latinis, officinis simpliciter *Trifolium* dicitur. *Trifolium odoratum* Germanis Sibengezeit, propterea quod singulis diebus septies odorem suum habeat, & toties etiam amittat, quandiu in horto creuerit. Decerptum enim & exiccatum, odorem suum perpetuò retinet. Qui certè pluuiosa temporis constitutione ac tempestate instantè multò vehementior est, sic sanè ut totas ædes, in quibus hæc herba reposita est, odore suo compleat. Potest etiam appellari cōmodissimè *Vuolriechender Klee*.

FORMA.

Frutex est cubito altior, virgas habēs tenuēs, nigras, iuncea; q̄; adnascentiis multis præditas, in quibus folia Loto arbori similia sunt, terna in singulis germinationibus. His recens enatis odor *Ruta* inest, auctis verò iam, bituminis. Florem emittit purpureum, semen modicè latum & subhirsutum, ex altero extremo apicem obtinens. Radix illi tenuis, longa, valida. Ex qua quidem delineatione satis constat herbam, cuius picturam damus, esse *Trifolium odoratum*: siquidem cubito altior est, caules tenuēs obtinens, vnde ramusculi multi nigricantes quodāmodo, ac iuncea oriūtur, qui singuli terna folia producunt odorata. Flores etiam habet in purpureo cœruleos. Semen quoque *Milio* hand dissimile in folliculis modicè latis, pilosis, & in summitate aculeum

leum habentibus, profert. Radicem denique longam, candidam ac validam habet, vt prorsus nihil sit quod descriptioni non respondeat.

LOCVS.

Sponte sua in Germania non prouenit. Satum verò nulla difficultate prodit.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est & siccum in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen & folia in aqua pota lateris dolore laborantibus, difficultati vrinae, comitialibus, incipienti aqua inter cutem, vuluaq; strangulationibus auxiliantur. Menses etiam ducunt. Oportet autem seminis tres, foliorum verò quatuor drachmas dare. Succurrunt & venenatorum morsibus folia trita cum oxymelite & pota. Referunt quidam, si totius fruticis radicis & foliorum decocto foveantur fausti ex serpentium morsibus dolores, eos mitigari. Si verò alius vlcus habens eodem illo decocto quo quispiam sanatus fuerit foveatur, eadem sentit quae morfi à serpentibus. Dant quidam etiam in tertianis bibenda folia eius tria, aut totidem semina cum vino, in quartanis autem quatuor, veluti quae circuitus solucere possunt. Miscetur verò eius radix & antidotis.

EX GALENO.

KK

Triphyllum

Triphyllum potum laterum dolores ab obstru-
ctione natos iuuat, vrinam & menses prouocat.

EX PLINIO.

Trifolium scio credi praualeare contra serpentium
ictus & scorpionum, ex vino aut posca. seminis gra-
nis viginti potis, vel foliis, & tota herba decocta,
serpentesque nunquam in *Trifolio* aspici. Praterca
celebratis autoribus contra omnia venena pro an-
tidoto sufficere vigintiquinque grana eius.

APPENDIX.

Debet eius *Trifolij* odorati vsus esse subinde in
omnibus officinis, quod mirifice venenis aduersetur
& ad vlcera malefica sananda perquam vtile sit.

APPENDIX ALTERA.

Non latet hanc herbam propè accedere ad descri-
ptionem *Loti sylvestris*. Caudem nanque fert bica-
bitalem, & aliquando maiorem, numerosis alarum
cauis. Folia *Trifolio* quod in pratis nascitur simi-
lia: semen *Foenograeco* ita respondens, vt nisi minus
esset, vix ab inuicem discerneres: sapore item me-
dicato. Tamen non minus accedit etiam ad *Trifo-*
lij acuti picturam. Frutex enim verius esse quam
herba videtur, cubito maior, virgas habens tenues,
nigras, iuncosu adnata obtinentes, in quibus sunt
folia *Loti* in singulis pediculis tria, in ambitu cus-
pidibus serrata, vt hinc commodissime dici merea-
tur, ὀξύφυλλον. Hæc etiam odorata sunt vehemen-
ter, vt nonnullis caput offendant: & ad bituminis
certè

certè odorem proximè accedunt, sed non parum tamen suauior & iucundior est. Florem præterea ex se mittit purpureum, hoc est, ad purpurea colorem nonnihil accedentem: ex a. bo enim purpureus, aut subcæruleus est. Semen etiam modicè latū, & subhirsutum, ex altero fine veluti cornu obtinēs. Quod ego non de ipso quidem nudo semine, sed de eius potius folliculo, quod in cacumine planè aculeatum ac veluti cornutum existit, intelligendum puto. Radix denique illi longa, gracilis, & tenax existit, nihilque est in tota descriptione quod ei aptissimè nõ quadret. Accedit præterea amaritudo quæ in semine non est obscura, pulchrè sibi etiam Trifolij odorati facultates vendicans: mouent enim quæ amara sunt vrinam, menses ducūt, comitialibus prosunt, aliæque quæ Dioscorides Trifolio huic adscribit efficere possunt. Quare iis rationibus motus, à concepta sententia discedere nondum quæo, nisi contingat nobis aliam intueri stirpem, cuius semina, atque adeò grana ipsa hirsuta, & cornuta existant. Quanquam non lateat parum admodum referre vtram sententiam, nostram aut aliorum amplectaris, cum Lotus & Trifolium facultatibus non multū aut ferè nihil distent. In hoc tamen semine, quod nos Trifolij odorati esse contendimus, nulla inesse apparet adstrictio, quā tamen in Loti semine Dioscorides requirit. Quod pro confirmanda nostra sententia adicere volumus.

PLANTARVM HISTORIAE
DE TRIFOLIO PRATENSI.
CAP. CCCXVI.

NOMINA.

Tριφυλλον ἢ χορὸν ὀπωρίοις γυνώμενον
Græcis, Trifolium pratense Latinis dicitur.
Officinæ Latinum nonien retinuerunt, & simpliciter Trifolium vocant. Utendum verò illis esset odorato Trifolio, quemadmodum altero ab hinc capite diximus. Germanis Vuysenklee (Gallis Trefle) nominatur.

GENERA.

Tria genera Trifolij inueniuntur fastigia, quorum primum à floribus purpureis, Trifolium pratense purpureum, Germanicè braun Vuysenklee, alterum itidem à floribus suis candidis, Trifolium pratense candidum, Germanicè Vucisz Vuysenklee, & tertium luteum, Germanicè geel Vuysenklee appellauimus. Quod ad folia ipsa attinet, non admodum differunt: quoduis enim horum generum tribus constat foliis, quæ in primo sunt latiora & herbacea, in secundo autem longiora & angustiora, magisque pallescunt candicantiæ uel. In tertio sunt minora & rotunda, atque ad Fœnigræci folia accedentia. Sunt qui hoc genus Lagopum esse putent. Sed de Lagopo suo diximus loco.

FORMA.

Caulem rotundum, cubitalem obtinent, ramos
exiles,

exiles, folia per interualla tria: flores in summo aut purpureos, aut candidos, aut luteos: radicem longam & lignosam.

LOCVS.

Scatēt iis prata omnia, vnde etiam nomē nacta.

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Adstrictoria cuiusdam qualitatis sensum in gustu præ se ferunt, non tamen multum admodum, vt nihilominus sint tenuium partium & exiccatoria, quādoquidem etiam exigua quasi acrimonia prædita videantur.

VIRE S.

Haud dubiè mediocriter concoquendi & exiccandi vim possident, vt non temere quidam ex recentioribus herbariis tradant, Trifolia hæc albo muliebri profluvio mirificè conferre. Eadem etiam inflammationibus imposita, eas concoquunt, & ad maturationem perducunt.

DE TRAGOPOGONE.

CAP. CCCXVII.

NOMINA.

Ἐγρόπωρον, ἢ κομὴ Græcis nominatur, Latinis Hirci barba, & Coma: of=Hirci barficinis ignota est herba. Germanis Bo- ba. eksbart & Gauchbrot (Gallis Barbe de Bouc dicitur. Hieronymus herbarius Braunschweigens

PLANTARVM HISTORIAE

sis magno errore hypocisthida in hac herba nasci putauit. Sic autē eam Graci vocarunt, quòd à ca-

Tragopo = lyce eius promissæ pēdcat barba, vel rectius quòd
gon cur lutei illius flores in volucres barbudas euanescent.
dicta.

FORMA.

Caulem habet exiguum, longum tamen, & bicu-
bitalem interdū, geniculatum, folia Croco similia,
radicem longam & dulcem, supra caulem calycem
magnum, & in eius summo semen nigrum, florem
luteum, qui in canescentes barbudas fatiscit. Hac ca-
tiam cū carpitur lacte manat.

LOCVS.

Sua sponte in pratis nascitur.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedo quæ in radice ac tota ferè planta appa-
ret, satis monstrat eam esse caliditate tepida prædi-
tam, & modicè humidam.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba & cruda & cocta edendo est.

APPENDIX.

Ex recentiorum traditione, & temperamenti ra-
tione, æstuanti stomacho utilis est herba, thoracis
& iecoris vitiis, renum item & vesicæ malis. Suc-
cus eiusdē mirificè laterum doloribus auxiliatur.

DE TYPHA. CAP. CCCXVIII.

Ty-

Typha in stagnis frequens, Marteau quibusdam dicitur, quòd flos dura densitate longus, mallei formam & pondus imitetur.

Cætera omisimus, quòd vel essent medicis nota, vel nomen vulgo & officinis non haberent, aut saltem non aliud quàm quod à Fuschio diligentissimè scribitur: Cuius doctis & magnis laboribus gratia imprimis est habenda, quos in plantis non solum describendis, sed etiam affabrè pingendis, in studiosorum gratiam insumpsit: Longè interim valere iussis, qui omnia calūniari, nihil vtile meditari solent.

NOMINA.

Tύψη Græcis, Typha latinis, officinis inusitata. Germa. Mosz, oder Narrëkolb (Gallus Plante semblable aux masses de Beaux) dicitur. A nonnullis Knospen vnd Lieszen.

FORMA.

Folium profert Cyperidi simile, caulem leuè, eodem, cuius in summo capite flos obducitur densus, euadens in pappum seu lanuginem. Quæ descriptio huic plāte sic quadrat, vt nulla sit nota quæ reclamet. Folio siquidem Cyperidis erumpit, caule alto, leui, plano, enodi, cuius cacumen densa florum congerie stipatur, & veluti spissa cingitur lanugine, quæ in pappos tandem euanescit.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Gignitur in palustribus & stagnantibus aquis.

TEMPVS.

Iulio mense caulis lanosa floccorum densitate obducitur. Augusto autem in pappos abit, & ea uanescit.

TEMPERAMENTVM.

Quantum ex viribus eiusdem colligi potest, non euidenter, potissimum eius flos, calefacit & refrigerat, modicèque abstergit, aque adè exiccat. Quum enim ambustis medeatur, & ambusta, Paulo libro quarto, capite xi. teste, medicamenta quæ mediocriter citra insignem caliditatem aut frigiditatem abstergunt, requirant, sequitur hoc quale diximus temperamentum obtinere.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Flos eius cum suillo adipe vetusto cloto exceptus ambustis medetur.

DE TURCICO FRUMENTO.

CAP. CCCXIX.

NOMINA.

Hoc frumentum, vt alia multa, ex eorum est genere quæ aliundè ad nos translata sunt. E Turcicum Græcia autè & Asia in Germaniã venit, vnde Tur frumentũ cicum frumētum appellatum est: Asiam enim vniscur dictũ uersam hodie immaniſſimus Turca occupat. Germani etiã ad loca vnde assertur respicientes, Turckisch korn, (Gal. Ble de Turquie) nominant.

G E N E R A.

Quatuor huius frumenti reperiuntur genera. Quoddam enim grana rufa, quoddam verò purpurea, aliquod lutea, aliquod subcandida grana profert. Spicarum seu panicularum etiam in iis est diuersitas: etsi enim omnes mutica sint, tamen alia candidos, alia luteos, alia purpureos, prout scilicet grana colorata erunt, flores obtinet. Aliàs, quòd ad formam attinet, in iis nulla est differentia.

F O R M A.

Culmum habet crassum, rotundum, altum longumve, infima eius parte purpureum, geniculis intersectum: folia oblonga & harundinacea, in summitate paniculas, aut spicam muticam, & granis vacuam, instar secales florentem nunc luteo, nunc candido, nunc purpureo colore, prout fructus quem profert coloratus est. Fructum verò & grana triangula, diuersis iam commemoratis coloribus tincta, in foliacis, rotundis ac crassis membranis ac vaginis, quæ è lateribus geniculorum ferè singulorū prodeunt, contenta obtinent, coacervata ac penitissimè iuncta, inq; octo aut decē versis ordine digesta. E fastigio vaginarum capilli tenues, iam cādido, iam luteo, nunc purpureo colore maculati dependent, vt pictura satis ostendit, quæ vnica quidē tibi omnia genera representabit. Hæc in vna vagina quatuor tibi granorum colores monstrat, cū tamen quauis vnus duntaxat coloris grana, nēpe aut lutea, aut purpurea,

PLANTARVM HISTORIAE

purpurea, aut rufa, aut subcandida omnia habeat.
Quod nos, ne aliquem pictura deciperet, monen-
dum esse duximus.

LOCVS

E Græcia vel Asia, vt dictū est, primū ad nos
peruenit. Nunc autē passim in omnibus hortis pro-
uenit.

TEMPVS.

Seritur mense Aprili, nec nisi sub finem Augusti
& initia Septembris ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedinem & lentorem quandam grana gustu
præ se ferunt, vt haud dubiè idem cum Tritico ha-
beat temperamentum.

VIRE S.

Cū idem cum Tritico habere videatur tempe-
rumentum, easdem etiam obtineat facultates ne-
cesse est. Grana itaque teruntur in cādidissimā fa-
rinā, quæ in panificia subinde cogitur. Panis tamen
ille lentoris quiddam & obstruentis naturæ habet.
Hinc est quod in Asia & Turcia illius nullum in
cibo vsum esse, nisi cū annona premit inopia, di-
cunt. Cæterū foliorum succum refrigerādi facul-
tatem obtinere tradunt, hinc ad crysipelata vtilem
admodum esse coniiciunt.

DE THYMO. CAP. CCCXX.

NOMINA.

Serpyllū
Romanū.



ῥμος Græcis, Thymus latinis, herbariis vul-
garibus Serpyllū Romanum, haud dubiè ab
odore

odore quē cum Serpyllo communem habet, dicitur. Officinæ antiquum nomen retinuerunt. Germanis Thym, & Romischer quēdel (Gallis du Tin, Thymus ou Thim) vocatur. Thymus autē Græcis ab exci vnde distando, quod θυΰν dicunt, nomen inuenit. Nonnullis Etus. potius hoc placet etymum, vt Thymos quasi thymos, hoc est, sanguinem impellens dicatur.

FORMA.

Thymus surculosus frutex est, minutis multis & angustis foliis circumdatus, in summo capitula floribus purpureis referta habens. Ex qua sanè delineatione omnibus conspicuum fit, herbā cuius picturā damus esse Thymum. Dodrantalis enim & surculosus frutex est, foliis exiguis, flosculis ex purpura candicantibus, suauissimi odoris, capitella specie complicatarum formicarum, radice lignosa, enascentias virides multas obtinente, quibus in terra radiscatur.

LOCVS.

Nascitur petrosus & tenuibus locis: neque enim locum pinguem, neque stercoreatum, sed apicū desiderat. Nunc in hortis multis Germaniæ provenit.

TEMPVS.

Floret serò, quod Theophrastus etiam libro sexto de historia plantarum, capite secundo testatur, circa Solstitia, cum & apes decerpūt, & augurium mellis est.

TEMPERAMENTVM.

Thymus vehemēter calefacit. Itaque in calefaciendo

PLANTARVM HISTORIAE

ciendo & exiccando in tertio ordine statuendus est.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Potus cum sale & aceto, pituitam per aluum ducit. Decoctum eius cum melle orthopnoicis & asthmaticis prodest. Lumbricos vëtris, menses, foetus & secundas pellit. Vrinam ciet. Mixtus melle in eclegmate, excreabilia efficit thoracis vitia. Recentia oedemata cum aceto illitus discutit. Sanguinis grumos dissoluit. Thymos & verrucas pensiles tollit. Ischiadicis cum vino & polenta impositus auxiliatur. Hebetibus oculis in cibo sumptus opitulatur. Vtilis etiam pro condimento in sanitatis vsu.

EX GALENO.

Thymus incidit, & calefacit manifestè: ob id & urinam & menses pronocat, foetum euellit, & viscera potus expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert.

EX AETIO.

Hac experimentis de Thymo. cõperta sunt. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho. Bilem enim reliquosque humores atque acrem saniem euacuat. Facit & ad vesica mala. Ventre inflatis, vbi intumescere cõeperint, drachmã vnã dato ieiunio cum cochleari aqua mulsa. Ad lumborum coxendicũque dolorem, laterisq; & thoracis, ac hypochondriorum suspensiones, ac inflationes, pondere trium drachmarum cum oxy-
melite

melite temperato, mensura cochleari ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timoreq; detentis drachmas tres cum oxy melitis temperati cochleari præbeto. Dato item ieiunis & ante cenam aduersus lippitudinem, & vehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motū omnino interceperit, cum vino vtilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes, ieiunis trium drachmarum pōdere exhibeatur.

EX PLINIO.

Oculorum claritati multū conferre existimatur, & in cibo, & in medicamentis. Item diutina tussi ecligmate faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguinē concreescere non patitur è melle. Longas faucium destillationes extrà illita cum Sinapi extenuat: item stomachi & ventris vitia. Modicè tamen vtendum est, quoniam excalfacit, quanuis sistat aluum: quæ si exulcerata sit, denarij pondus in sextarium aceti & mellis addi oportet. Item si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace. Præcordiis medentur ex aceto cum melle: quæ potio datur & in alienatione mentis & melancholicis. Datur & comitialibus, quos correptos olfactus excitat Thymi. Aiunt & dormire eos oportere in molli Thymo. Prodest & orthopnoicis & anhelationi, mulierumq; mensibus retardatis. Vcl, si emorti sint in vtero partus, decoctum in aqua ad tertias.

tertias. Viris verò contra inflationes, cum melle & aceto. Et si venter turgeat, testésve aut vesicæ dolor exigat. E vino tumores & impetus tollit impositum. Item cum aceto, callum & verrucas. Coxen dicibus imponitur cum vino. Articularibus morbis trium obolorum pondere in tribus cyathis aceti & mellis. Et in fastidio, tritum cum sale.

DE TEUCRIO. CAP. CCCXXI.
NOMINA.

Θύγλιον, ἢ χαμαίδρις Græcis, Teucrion

T Latinis appellatur. Officinis ignotum. Germanis grosz Bathengel dicitur. Teucrium autē vocatum est Græcis pariter & Latinis, quòd Teucer Aiacis frater hoc inuenerit. Inuentum verò ab eo sic tradit Plinius. Quum exta in sacrificio super id proiecta fuissent, licni adhæsit, cumq; exinanivit. Proinde quod casus ostenderat, obseruatumq; à Teucro fuit, ad æternum humani beneficii decus & famam illi accreuit. Diuersum tamen hoc Teucrium ab Hemionitide, quod à Plinio etiā Teucrium appellari diximus. Chamædrys autem nominata est hæc herba, quòd Chamædry similima sit, ad eò vt vicissim etiam Chamædrys hoc nomine, vt suo dicemus loco, dicta sit Teucrium. Maius tamen est Teucrium quàm sit Chamædrys, vt merito Germanis grosz Batlengel nuncupari queat.

FORMA.

Herba est virgæ referens effigiem, Chamædry similis,

*similis, tenui folio, non multū Ciceri dissimile. Hac
quanquam breuissima sit Teucriti delineatio, tamē
abundē mōstrat herbam hanc, cuius pīcturam ex-
hibemus, esse verum Teucrium, cū nihil Chama-
dry magis simile dici queat, si diligenter vtriusque
plantæ notas expendas.*

LOCVS.

*Nusquam, quōd sciam, sponte sua in Germania
prouenit. Satum tamen copiose nascitur. In Cilicia
plurimum habetur. TEMPVS.*

*Floret Iunio & Iulio mensibus, ac subinde se-
men producit.*

TEMPERAMENTVM.

*In secundo exalfacientium, tertio autem exic-
cantium existit ordine.*

VIRES. EX DIOSCORIDE.

*Viride cum posca potum, aut aridum decoctum
ac haustum, lienem potenter minuit. Lienosis cum
fiscis & aceto illinitur. Venenatorum autem morsio-
bus cum aceto sine fiscis.*

EX GALENO.

*Teucrium incidendi, & tenuium partium fac-
cultatis est, quare lienes sanat.*

EX PLINIO.

*Recens Teucritia in posca, vel sicca deferuefacta,
potu lienem efficaciter consumit. Item ex aqua illi-
nitur. Pota arida & decocta quantum manus ca-
piat, ī aceti heminis trib. lieni medetur. Ad vulnus
illinit.*

illinitur eadem cum aceto, aut si tolerari non possit, ex fico vel aqua. Serpentium plagis imponitur cum aceto tantum.

DE HYPERICO. CAP.

CCCXXII.

NOMINA.

Υπερικόν, ἁνδροσαύμον, χαμαίπυτος
Græcis, Hypericum Latinis dicitur. Nomen

latinum in officinis seruat. Vulgus herbariorum Perforatam vocat, quod folia soli obiecta innumeris for-

Perforata ramminibus scatere, & omni ex parte punctis quibusdam pertundi videantur. Herbam quoque diuini Iohannis appellant. Germanis S. Iohans kraut

Androsæ = (Gallis Mille pertuis) nominatur. Androsæmon ob florem eius qui digitis confricatus sanguineum e-

Chamæpitys. mittit liquorcm, dixerunt. Chamæpitys verò ab odore seminis resinaceo nominata est. Fugam dæ-

Fuga dæmonum. num aliqui, quod superstitione quadam inducti, fugare posse dæmones crediderint, appellauerunt.

FORMA.

Folia Rutæ similia habet, surculosus frutex, drontalis, rubescens. Florem luteum, qui digitis attritus sanguineum emittit succum, qua ratione Androsæmon, quasi humanum dixeris sanguinem, appellatur. Siliquas gerit hirsutas, in rotunditate oblongas, hordei magnitudine, in quibus semen nigrum, resinam obolens. Cuius nimirum descriptionis nota ita herba illi, quam Perforatam vocat nostri temporis

poris herbarii, respondent, vt nemo nisi prorsus praefracto sit animo, Hypericum esse deinceps reclamare possit. Siquidem surculosa est herba, dodrantalis, subrubens, folio Ruta, flore luteo, quem si digitis libeat terere, manus profecto inuenies sanguineo succo cruentatas. Siliqua denique terere, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo itaque in Perforata inueniuntur, quae esse Hypericum certam tibi faciunt fidem, cruentus nempe floris triti succus, odorq; seminis resinaceus. qui diuersum sentiunt haud dubie Marcelli Florentini inter. Marcelli pretatione falsa seducti sunt, qui flore albo constare Florentini re Hypericum asserit, cum tamen in Dioscoride sit, erratum. *ὁρθὸς ἔχον μῆλινον*, hoc est, florem luteum habes.

LOCVS.

Gignitur in cultis, & asperis locis.

TEMPVS.

Aestate floret, Iulio potissimum & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Hypericum calefacit & exiccat, tenuisq; substantiae est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, menstrua ducit appositum. A tertianis quartanisq; cum vino potum liberat. Semē quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta.

EX GALENO.

LL Menses

PLANTARVM HISTORIAE

Menses & vrinas prouocat: sed ad hæc totus sum-
mendus est fructus, non tantum semen. Cum foliis
illitis viridis ad cicatricem ducit cum alia, tum et-
iam ambusta. Cæterum si sicca contusa inspergas,
humida & putredinosa vlcera sanabis. Sunt nonnul-
li qui ischiadicis bibendum exhibent.

EX PLINIO.

Natura semini Hyperici spissandi. Aluum sistit,
vrinam cit, ad calculos vesicæ cum vino bibitur.

DE HYOSCYAMO. CAP.

CCCXXXIII.

NOMINA.

Altercū. **Y** $\delta\sigma\upsilon\alpha\mu\omicron\varsigma$ Græcis, Hyoscyamus, Apol-
linaris Latinis dicitur. Arabibus Plinius
Altercum vocari testatur. Officinis cor-
rupta voce Iusquiamus dicitur. Germanis Bilsam-
kraut, vel simpliciter Bilsen, (Gallis du Iusquia-
me, ou de la Hanebane.) Hyoscyamon autem
Hyoscyamon vnde dictum. Græci videntur appellare quasi fabam suillam a-
prinamve, quod, vt in historia sua Helianus in-
quit, pastus huius herbe conuellantur sues aprive,
præsenti mortis periculo, nisi copiosa aqua statim
se foris & intus proluerint. Adeuntq; aquas non vt
proluant se tantum, verumetiam vt cancras venen-
tur: iis enim nactis protinus sanitati restituuntur.
Atque hinc est quod à nonnullis etiam Germanis
Apollinaris. Seuubon nominetur. Apollinarem verò Latini ab
Apolline medicinæ inuentore dixerunt.

G E N E R A.

Tria sunt Hyoscyami genera. Vnum purpureos *Niger* Hyfert flores, folia Smilaci similia, semen nigrum, *oscyamus*. cythinos duros & spinosos. Hoc nigrum herbarii appellant. Alterum flores luteos ceu mâli effigie, folia & siliquas teneriores, semen subflauū ceu Irion, *Flauus*. flauum vocant. Et hoc est quod pictum damus. Ter *Albus*. tium vtile ad medicinam, placidissimum existens, pingue, tenerum, lanuginosum, flore & semine candido: album nominant. Quod si verò illud non adsit, vtendum flauo erit. Nigrum vt deterrimum improbandum.

F O R M A.

Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, incisa, nigra, hirsuta. Per caulem deinceps flores prodeunt veluti mâli punici cytini, clypeolis septi, semine, vt Papaueris, plenis. Quid multa? frutex est tristi aspectu, folio lato, longo, pingui, hirsuto, venoso, & laciniato: caulibus crassis, e quorum latere flores prodeunt tanquam mâlorū punicorum cytini, muricatis calycibus, ramos continua serie vestientibus, semine intus Papaueris refertis.

L O C V S.

Primum genus in Galatia nascitur. Alterū passim circa littora, & inter ruinas & rudera prouenit. Tertium in Maritimis & rudcribus.

T E M P V S.

Semen nullum nisi postquā inaruerit legendum.

LL ŷ

Floret

PLANTARVM HISTORIAE

Floret ferè per integram æstatem, potissimum Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Candidus ex tertio quodammodo ordine refrigerantium est. Reliqua duo genera venosa.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Exprimitur succus ex tenero semine, foliis, caulibusq; , in quem vsus tunduntur omnia, expressusq; in sole siccatur. Vsus eius ad annum vsque: facile enim putrescit. Exprimitur priuatim etiã succus ex arido semine, aqua calida per fusso, tuso et expresso. Est verò succus liquore præstantior, & magis dolores finit. Herba autẽ virens contusa, & trimestri farina mixta in pastillos conformatur & reconditur. Prior verò succi expressio, & quod à semine exprimitur, collyriis dolorem lenientibus commodè miscetur, & contra acres calidasq; fluxiones, dolores aurium, & vuluæ vitia. Cum farina autẽ aut polenta, contra oculorum, pedum, aliasq; inflammationes. Semen eadem potest. Facit ad tussim, destillationẽ, oculorũ fluxionem, vehementes dolores, muliebria profluvia, aliasq; sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaueris semine, & aqua mulsæ potum. Cõfert podagris, testibus inflatis, mammisq; à partu turgentibus, si tritum cum vino illinitur. Miscetur vtiliter & aliis cataplasmatibus dolorem sedantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per se, & cum polenta mixta vtiliter illinũtur.

Recentia

Recentia ad mitigandos omnes dolores illinuntur. Tria aut quatuor cum vino pota, hepialas febres sanant. Decocta olerum modo, & triblii mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si in collo vlcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

EX GALENO.

Hyoscyamus cuius semen atrum est, insaniam & soporem affert. Huic is cui semen mediocriter flavum est, propinquam facultatem obtinet. Fugendi autem utriq; sunt ut inutiles & venenosi. Cæterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est.

EX PLINIO.

Hyoscyamum contra canum morsus valet, inq; vulnera cum melle imponitur. Contusum cum foliis ex vino datur peculiariter contra aspidas. Eius succus sanguinẽ excreantibus medetur. Nidor quoque accensi tuscentibus. Vsus seminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & caulibus foliisq; utuntur, & radice, temeraria in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiam foliis constat mentem corrumpi, si plura quàm quatuor bibantur. Etiam antiqui in vino febrem depelli arbitrabantur. Et oleum fit ex semine, quod ipsum auribus infusum tentat mentem.

PLANTARVM HISTORIAE
DE HYACINTHO .CAP.
CCCXXIII.

NOMINA.

Ἑλινθος Græcis, Hyacinthus Latinis, offic-
Y cinis incognitus, Germanis Blauu Mertz
enblumlin, quòd videlicet cū Viola pura
purca in Martio & primo vere erūpat, appellatur.
(Ga. Vne Iacinthe, ou vaciet.) GENERA.

Albi Hya
cynthi.
Duplices sunt Hyacinthi, albi & cœrulei, vt ex
hoc Columella carmine colligi potest. Necnon vel
niveos, vel cœruleos hyacinthos. Albos verò non in-
telligas prorsus candidos, sed eos potius qui s̄ cum
cœruleis conseras pallescere videntur, quemadmo-
dum pictura affabrè tibi demonstrat. Germani al-
bum sceminam, sicut cœruleum marem vocant. Sūt
qui ad ætatem hanc differentiã coloris referre vo-
lunt, quorum ego sententiam veriore esse existi-
mo: cū enim adolescunt, pallescere incipiunt. Cœ-
ruleū autē Hyacinthū nostra terra triplicē produ-
cit, vt è pictura manifestè cernere licet: maximū,
maiorē, & minorē. Minor floribus differt plurimū
à maiore: in illo enim maiores ac patētiores, in hoc
autem minores & quasi orbiculati sunt flores. O-
mnibus autem descriptio, vt ex iis quæ statim sub-
iiciemus planum fiet, pulchrè conuenit, vt hinc con-
generes herbas esse coniicere cuius liceat.

FORMA.

Folia Bulbo similia habet, caulem dodrantalem,
leuem,

leuem, minimo digito tenuiorē, viridem, comā adia-
centem incuruam, plenam florum purpureorum, ra-
dicem & ipsam bulbosam. Hæc certē descriptio ita
picturis quas damus quadrat, vt nulla prorsus sit
eius nota quæ illas non appositissimè exprimat. Fo-
lia siquidem Bulbi protinus à radice præcunt, cau-
lis dodrantalis, leuis, & minimo digito tenuior, her-
baceus, coma præcumbens incurua, plena florum pur-
pureorum, radix bulbacca. Verū posset aliquis cauilla-
ri, hos quos descripsimus flores non esse Hyacinthos,
quod in iis discurrentib. venis Græcarū literarū fi-
gura α, vt Pl. li. xxi. ca. xi. prodidit, & Poeta fa-
bulatur, haud inscripta legatur. Cui sic respondemus:
Hyacinthum, quem Dioscori. & alii historici de-
scribunt, diuersum esse ab eo de quo Poeta fabulan-
tur. Cuius rei testis est Pausanias, qui refert florem
qui natus est extincto Aiace apud Salamina, non
esse Hyacinthum, sed literis Hyacintho similem vi-
deri, ex candido rubentem, ac Lilio minorē, quem
admodum Ouidius, itēque Vergilius describunt.
Idem etiam autor Cosmosandalō dici florem apud
Hermionenses, Træcenis cōfines testatur. Cū ita-
que constet duplicem esse Hyacinthū, alterum ru-
bentem, cum literis illis inscriptis, qui à Poetis de-
scribitur: alterum verò purpureum seu cæruleum
(nihil enim refert vtrum dixeris, quod Diosc. per

Obiectis.

Ouid. xiii.

Met. Ipse
suos gemitus
foliis
inscribit,& α α
Flos habet
inscriptū,funestāq;
litera du-
cta est.

Theocri.

Idyl. xix.

Nūν ὕα-

LL iij purpu- κινθε λά.

λὰ τὰ σὰ γράμματα Ἐπλέον αὖ αὖ, λάμβανε τοῖς πᾶσι
τάλοισι. Hyacinthus poetarum. Hyacin

thus Dio purpureum colorem violaceū dilutum, hoc est, clauscoridis. riorem & apertiore, quem caeruleum vocamus, intellexerit: nam & Plinius lib. xxxv. ca. ix. Hyacinthi colorem violaceum dilutum vocauit) sine literis, à Dioscoride alijsq; historicis descriptum: nihil enim Diosco. in suo Hyacintho de literis comenit: Haud igitur temerè in Vergilio ferrugineos cinthi qui hyacinthos, non caeruleos, sed rubentes ad similitudinem ferruginis quispiam interpretabitur, potissimum cum Poetarum Hyacinthus, non caeruleus, Ver. Ecl. sed rubens sit, quemadmodum alibi Vergilius & tertia: Et Pausanias docuere. Rubet etiam color ferrugineus. Neque obstat quod Nonius ferrugineos hyacinthos caeruleos interpretatus est: is enim caeruleum tantum cinthius. Hyacinthū nouerat. Quod si verò hæc morosis quibusdam non probabuntur sed prorsus funestas literæ in ras inscriptas esse contendunt, iis ita responsum voHyacitho lo. Quas in Hyacintho literas appellant Poetae, vequales. ras non esse, sed potius notas quasdam nigras, id Vir. Dic quod hinc palam sit. Plinius lib. xviii. cap. xii. ubi quibus in de leguminibus loquitur, literas lugubres in flore ceteris in- tiam fabæ ex sententia M. Varronis reperiri tradit, scripti no- in quo tamen flore non literas ullas, sed nigras tantum notas, ut res ipsa & pictura docent, inspicere nascuntur licet. Quod si nec ista satisfecerint, dicemus tum petur flores. nitus fabulosum esse quod regum nominibus inscriptum Poeta, florem hunc canit. Si enim id credendum erit, credendum etiā quod idem ex puero transformato

formato natus sit. Vel, quod vero similis est, de regibus florum appellationibus Poeta iocum struxisse videtur, cum pastorem inducit sciscitantem, quibus in terris inscripti nomina regum nascuntur flores: sunt enim complures flores quibus à suis inuentoribus regibus nomina sunt indita. Neque nunc vlla prorsus regum permultorum extaret memoria, nisi in florum nomenclaturis, qui nominibus regum inscripti sunt, asservaretur.

LOCVS.

Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod Galli, apud quos, Plinii etiam testimonio, eximie provenit, ut in suis commentariis de Natura stirpium vir eruditione clarus Ioannes Ruellius autor est, nec Ruellius. moralem vel agrestem capam nominet. Et eius cer Agrestis tē magna est copia verno tempore in nemore haud capta. procul à vico Luschenau iuxta Tubingam sito, ut vel ex natali etiam satis constet flores hos quos pictos exhibemus, esse genuinos Hyacinthos.

TEMPVS.

Vere, mensibus nimirum Februario & Martio, cum viola purpurea, Theophrasto lib. vi. de Stirpium historia, cap. ultimo teste, erumpit: hinc Mar Martium florē Germanis nostris dictū esse supra monstraui. Hoc potissimum tempore prorumpit is quem Hyacinthum minorem nominauimus. Exit etiā, eodem Theophrasto autore, cum Gladiolo, qui vernus etiā flos est. Quo sanè tēpore is maximè floret,

PLANTARVM HISTORIAE

ret, quem maiorem appellauimus. Proinde cū tēpus etiam conueniat, nemo est qui deinceps veros esse Hiacinthos, dubitare meritò possit aut debeat.

TEMPERAMENTVM.

Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi verò completi, aut incipiētis in refrigerando. Semen autem tertio quadantenus ordine desiccatur, in medio caliditatis & frigiditatis consistens.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hyacinthi radix pueris cum vino albo illita impuberes seruare creditur. Sistit aluum. Pota vrinā ducit, & phalangiorum morsibus auxiliatur. Semen magis adstringit, & coeliacis prodest. Potum cum vino regium morbum emendat.

EX GALENO.

Radix pueros diutissimè seruare impuberes in vino illita creditur. Semen regio morbo affectis in vino exhibetur.

EX PLINIO.

Radix Hyacinthi in vino dulci illita pubertatē coercet, & non patitur erumpere. Torminibus & arancorum morsibus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumq; regium, semen eius cum Abrotono datur.

DE HYSSOPO. CAP.

CCCXXV.

NOMINA.

σσωτος Græcè, Hyssopus & Hyssopum
 y Latinè, officina nomen legitimum retine-
 runt. Germanicè Iſpen, oder Iſop, (Gal.

De l'Hyſſoppe) vocatur.

GENERA.

Duûm generum Dioscoridi Hyssopus est, hortens-
 sis & mōtana. Hortensis quæ in hortis provenit, ac Hortensis
 culinarum causa colitur, garten Iſpen Germanis
 vocatur. Montana quæ in montibus nascitur, & Montana.
 Germanicè Birg Iſpen appellari poteſt.

FORMA.

Herba est pedali altitudine hortensis, fruticosa,
 folio Satureiæ satina floribus in cœruleo purpura-
 scentibus, thyrsos spicæ modo vestiētibus, radice lon-
 ga & lignosa. Montana priori haud diſſimilis est.
 Errant qui noſtram Hyssopum hortensem non esse Hortensis
 verā putant: habet enim planè folium origani, nisi & noſtra
 quòd angustius est. Nec plures sunt eius apud Dio- Hyssopus
 scoridem notæ. Nam quæ de umbella quidam ob- est vera et
 iiciunt, nihil ad hyssopum attinent, cūm simplici genuina.
 ter scribat Dioscorides, Origanum non habere um-
 bellam rotæ speciē obtinentem. Id quod verum eſt.

LOCVS.

In hortis, vt diximus, hortensis, in montibus ve-
 rò mōtana nascitur. Cæteris præfertur quæ in Tan-
 ro monte provenit.

TEMPVS.

Æſtate

PLANTARVM HISTORIAE

Aestate floret, quo etiam potissimū tempore ca-
penda venit.

TEMPERAMENTVM.

Hyssopū calefacit & desiccatur ordine tertio: sed
& tenuium est partium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet extenuādi & calefaciendi. Decocta
cum ficis, aqua, melle acruta, & pota, peripneumo-
nicis, asthmaticis, tussi vetusta, destillationi & or-
thopnoea opitulatur. Lumbricos necat. Cum melle
linctā idem praestat. Decoctum eius cum oxymeli-
te potum, crassitudinem per aluum ducit. Estur cū
ficis viridibus, aluum subducens. Vehementius pur-
gat adiecto illi cardamomo, aut iride, aut erysimo.
Colorem bonum praebet. Cum fico & nitro illinitur
ad lienem, aquam intercutem. Cum vino ad inflā-
mationes. Discutit sugillata cum aqua feruenti illi-
ta. Angina laborantibus cum decocto fisorum opti-
mum gargarisma. Decocta cum aceto, dentium do-
lorem collutione mitigat. Inflammationes quae cir-
ca aures sunt suffitu soluit.

EX PLINIO.

Hyssopum in oleo contritum phthiriasi resistit,
& prurigini in capite. Stomacho est contrariū. Pur-
gat cum fico sumptum per inferna, cum melle vom-
itionibus. Putant & serpentium ictibus aduersari,
tritum cum melle & sale & cumino.

DE HYDROPIPERE.

CAP. CCCXXVI.

NOMINA.

Υδροπῖπερι Græcis, Hydropiper Latinis, officinis incognitum. Germanis Vuasserpfeffer, oder Muckenkraut (Gallis Curaige) nominatur. Hydropiper autem à locis quibus nasci Hydropiperis piperis sapore quem præ se fert, quasi dixeret per quare ris piper aquatile, appellatum est. Musca deniq; ab dictum. eo vehementer abhorrent: neque enim id quod succo eius aspersum est attingunt, hincq; adeò alteram appellationem Germani illi indiderunt.

FORMA.

Caulē adit geniculatum, robustū, circa quē alarū concavitates, & folia Mentha similia, maiora, teneriora, candidioraq; gustu piperis acri non tamen odorato. Semen in ramulis fert secundum folia nascens, continua serie congestum, racemosum, & acre. Radicē exiguā et inutile. Ex qua descriptione satis constat herbam hanc, cuius imaginē damus, esse Hydropiper: nulla siquidē nota est quæ illi non conveniat. Caulis enim eius geniculatus, solidus, circa quē alæ panduntur, & folia Menthæ cōsimilia, maiora tantū, hoc est, longiora multò, teneriora et albiora. Quæ singula faciliè diligēs quispiā oculis lustrabit. Si verò linguam consulat, folia meram piperis acrimoniam resipiunt, nullam tamen odoris suavitatem in eis deprehendet. Quòd si reli-

quam

PLANTARVM HISTORIAE

quam faciem excusserit, offendet semen prope folia enatum racematim congestum, & quadam serie coherens, ipsumq; acre. Accedunt denique natales, facultates, & alia, vt nullus planè ambigēdi locus relictus sit. Damus hīc etiam alterius herbæ quæ in aquis prouenit picturam, quam nonnulli Hydropiperis speciem esse arbitrantur, quæ ferè Hederae folia obtinet, & secundum ea semen, Ari semini haud dissimile. Nos à colore seminis appellauimus Hydropiper rubeum, germanicè rot Vuasserpfeffer. Huius herbæ & racemosus fructus, & folia acrimonia sunt prædita.

LOCVS.

Gignitur prope stantes aquas, aut quæ leniter fluūt. Copiosè prouenit ad flumen Pegnicum haud procul à Norimbergo.

TEMPVS.

Floret Augusto mense floribus albis spicatis coherentibus, ac subinde semen minutum profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est, non tamen vsque adeò vt piper, & siccum: id quod gustus abundè docet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum semine illita, ædemata, veteresq; duritias discutiunt. Sugillata delent. Siccata & tusa pro pipere sali & opsoniis miscetur. Radix parua, nullius in medicina vsus.

EX GALENO.

Hydropiper

Hydropiper à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cum Pipere in gustu est, nomē sortitum est. Ceterum calidum est, sed minus quam piper. Atque herba ipsa etiamnum viridis cū semine cataplasmatibus in modum imposita, sugillata & induratos tumores digerit.

EX AETIO.

Hydropiper herba est in aquosis nascent, ramusculis ac foliis Menthae similis, maior tantum, gustu acerrima ut piper, perexigua semina singulis foliis ferens. Calida quidem est, non tamen accedens piperi, quæ recens illita sugillata ac durities sanat. Hanc nonnulli condimentis piperis loco addunt.

APPENDIX.

Cum interea temporis dum sub prælo sunt nostri commentarii, quomodo veteribus sit appellata herba quam Hydropiper rubeum vocauimus, diligentius cogito, tertiam Dracotij apud Plinium li. xxiiij. cap. xvi. speciem esse comperio: hanc enim ita pingit: Tertiademōstratio fuit folio maiore quam Cornus radice harundinea, totidem ut affirmabant geniculata nodis, quot haberet annos: totidemque esse folia. Hi ea ex vino vel aqua contra serpentes dabant. Quæ quidem notæ huic etiam herbae competere videntur. Est enim folio maiore quam Cornus, radice harundinea, nodisque geniculata. An vero tot nodis sit geniculata, quot habet annos, totidemque foliis, nondum observare potuimus. Quinetiam
vniuersa

PLANTARVM HISTORIAE

vniversa tum foliorum tum fructus forma, acrisq;
sapor, Ari ac Dracontij genus esse euidenter ostens-
dunt. Facultas denique contra serpentes, quā Dio-
scorides suis etiam tribuit Dracontis, abundè quod
contendimus docet. Non est autem, vt quidam exis-
timant, Plinij Aris, quod eius radix oliuae grandis
magnitudinem atque formam non reseat. Hāc no-
stram de hac stirpe sententiam hoc loco referre pla-
cuit, ne quis nos illam Hydropiperis esse genus per-
tinaciter asserere ac tueri velle existimet.

DE PHLOMO. CAP. CCCXXVII. NOMINA.

Tapsus
barbatus.
Candela
regis.

λόμος Gracè, Verbasum Latinè, officina-
nis Tapsus barbatus dicitur. Sūt qui Cā-
delam regis, Candelariam, Lanariamq;
nominent. Germanicè Vullkraut, Kertzēkraut,
Vnholdenkertz, Himelbrant, Brennkraut,
(Gallicè du Boillon blanc ou noir) vocatur.
Phlomon autem haud dubiè dixerunt Graci, quòd
ea pro ellychniis vtantur. Candelariā quoque recē-
tiores nominarunt, quòd caulibus eius adipe, seuo,
vel aliquo pingui illitis, nōnulli pro lucernis vtātur.

Phlomos
tur dicta.
Candela-
ria.

GENERA.

Verbasum omnium veterum testimonio duo ha-
bet summa genera. Candidum enim alterum foliis,
nigrum alterum est. Cādidum rursus in marem &
foeminam digeritur. Præter tria hæc, & syluestre
habetur, Vuuld Vullkraut Germani appellant.

Sunt

Sūt etiam Verbascula duo, quæ à nostris herbariis
herbæ paralyfis, & vulgò arthetica, cūm arthriti-
cæ dicendū esset, vocantur. Germanicè Schluffel-
blumen. Horum vnum est odoratum, alterum o-
doris expers. Prius Germanicè simpliciter Schluf-
selblumen, oder gelb schluffelblumen, Him-
mel schluffel, oder S. Peters schluffel, alterum
Vuild Schluffelblumē, oder Vueisz Himel-
schluffel appellāt. Est & tertium Verbasculum,
quod Lychnitim, alij autem Thryallida appellant,
Germani Marienrosen vocant. Hæc sunt genera
Verbasci quemadmodum à Dioscoride & Galeno
cōmemorantur, quorum sanè omnium picturas da-
mus, excepto vltimo, quod hoc tempore nondū flo-
ruerat. Quāquam distingui genera hæc, vt Plinius
lib. xxv. cap. .x. ait, penè superuacū sit, quum sint
eiusdem effectus omnia. FORM A.

Verbascum candidum fœmina, Brassicæ similia
folia habet, multò tamen hirsutiora, latiora & cā-
dida. Caulis eius cubitalis & amplior, candidus,
subhirsutus. Flores albi aut subpallidi. Semē nigrū.
Radix longa, acerba, crassitudine digiti. Candidū Cādidum
mas à foliorum candore Leucophyllon Græcis di- mas.
Etum, oblongioribus & angustioribus foliis, & te-
nui caule. Nigrum in cunctis candido simile, nisi la Nigrum.
tioribus nigrioribusq; constaret foliis. Sylvestre vir Sylvestre.
gas fert altas & arborescentes folia salvia similia.
Habet verò circa virgas ramulos Marrubij modo.

MM

Florem

- Verbascula.** Florem luteum, auri fulgore. Verbascula duo hirsuta, terræ inhaerentia, humiliâve: foliis rotundis, & multò minoribus, rugosis, è quib. mediis stylus exilit tenuis, palmi altitudine, incanus, in cuius vertice terni, quaterni, & plures etiam dependent flores lutei, summis labris denticulati, in altero odorati, in altero inodori, calyculo in album pallescente.
- Lychnitis** Lychnitis siue Thryallis foliis ternis, aut quaternis, aut etiam plusculis, crassis, pinguibus, hirsutisq; ad lucernarum lumina vtilibus, floribus purpureis.

LOCVS.

Candidū & nigrum in campestribus, & in syluis etiam proueniunt. Syluestre in campestribus, potissimum siccis & lapidosis, nascitur. Verbascula duo passim in pratis & hortis producuntur. Lychnitis similiter aliis in campestribus nasci solet.

TEMPVS.

Verbascula duo primo statim vere emicant, ceterique huius appetentis nunciij. Hoc sanè tēpore carpenda veniunt, quòd confestim fugacia euanescat: vita enim illis cum plurimum menstrua, nec temerè ad summum sesquimensē excedunt. Reliqua genera autumnō, dum florent & semen proferunt, colligenda.

TEMPERAMENTVM.

Omnium folia desiccandi & detergendi vim possident.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix

Radix priorum duorum adstringit: vnde tali lucidiri magnitudine in alui profluvio vtiliter cū vino in potu datur. Decoctū eiusdem ruptis, convulsis, contusis, & antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aurei coloris, capillos tingit, & quocūque reponatur blattas in se contrahit. Folia in aqua decocta aduersus cedemata, & oculorum inflammationes illinuntur. Syderata vlcera cum melle aut vino, cum aceto autem vulnera sanat. Contra scorpionum ictus auxilio sunt. Sylvestris folia ambustis illinuntur. Ferūt fœminæ folia caricis interposita, incorruptas atque à putrefactione immunes seruare.

EX GALENO.

Priorum duorum radix gustu acerba est, & fluxionis affectibus prodest. Sed & ad dentium dolorē eam nonnulli colluunt. Folia tamen digerendi vim habēt. Sic etiam aliorum folia, potissimum autem eius quæ aureos flores obtinet. Capillos quoq; flavescere faciunt.

EX PLINIO.

Contra scorpiones bibitur radix cum Ruta ex aqua magna amaritudine, sed effectū pari. Verbasco priuatim tōsillis in aqua potū medetur. Tribus obolis bibitur. Verbascum cuius flos arcus est, contra omnia pectoris vitia, tussē, & purulenta excreantibus. Tanta huic vis est, vt inmentis etiam nō tussientibus modò, sed iliā trahētibus auxilietur potus. Lateris & pectoris dolores Verbascum cum

Ruta ex aqua sedat. *Panos* sanat cum sua radice tritum, vino aspersum, & ita cinere calfactum, ut imponatur calidum. Semen ex vino decoctum & contritum luxatis medetur, dolorem & tumorem tollens. Radicis medulla collyrii tenuitate in fistulam additur. Contusis, euersis, & si febris sit potatur in aqua *Verbasculi*, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in struma. Semine ac foliis decoctis in vino ac tritis, omnia corpori infixae extrahuntur.

A P P E N D I X.

Recentiores duobus *Verbasculis* hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto vesicae renūque obstructions solvuntur. Ius herbae propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata & liuentia. Quod verò haec eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, amara, & modicè acria sunt: ut hoc nomine desiccandi & detergendi facultatem, quam illis *Galenus* adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiā temporis herbarij calida & sicca esse statuunt. Et mulieres formae studentes, succo è floribus illorū expresso faciem illinunt, quod maculas rugasq; , & alia eiusdem vitia mirificè detergeāt. Ut hinc euidentissimum sit herbas, quas *Schlüsselblumen* vocant Germani, esse *Verbascula*.

DE FRAGARIA. CAP.

CCCXXVIII.

NOMINA.

GRacis vt herba qua fraga gerit nominata sit, certò constituere nobis nondū licet. Sunt tamen qui ῥά τῳ ἰδ' αἰῶν, hoc est, Rubum Idæum **Rubus Idæus** esse putent, cum potissimum qui sine spinis inueni-
tur. Quorū certē sententiā ob multas variasq; cau-
sas, vt in sequentibus dicemus, minimè repudiādam **Fragaria**.
existimamus. Apuleius Gracis ῥόμαρον appellari scribit: quod si verum est, alia sit à Comaro quam Dioscorides, Galenus & alij quidam depingūt, necesse est: hæc enim arbor est, illa autem herba. Ego tamen vidi codicem manuscriptū, in quo hæc verba: Comaron Graci, Romani Fragum nuncupant: non habebantur. Quicquid verò sit, ex numero Mororum esse constat eius fructum optimi odoris: hinc à fragro verbo, quod odorem reddo significat, herba **Fragaria** ipsa Latinis **Fragaria**, & fructus fragum dici ceperunt Germani **Erdbeer** (Galli **Fraises**, ou
herbe portant **Fraises**) vocant. Graci autē si **Comaron** appellarunt, ob fructum arboris eiusdem nominis qui fragis iis terrestribus similis est, haud dubiè sic dixerunt.

GENERA.

Duo **Fragariae** sunt genera. Vna flores fructusq; paulò maiores, altera minores obtinet. Nos vna pittura vtrunque expressimus.

FORMA.

Humi sine caule spargitur, multis à radice lanuginosis pediculis, quorum alij flore candido coronā-

PLANTARVM HISTORIAE

tur, alij trigemino comantur, folio per ambitum serrato atque venoso, alij fructum gerunt exiguis quidam Moris haud absimilem, cæterum sui generis solidum, callosum, tenerum, quum maturuit rubentẽ, tum gustu, tum etiam odore suauissimum. Radice foris atra aut rubescente, intus candida, multo fibrata capillitio.

LOCVS.

In syluis, dumetis, & in opacis mōtibz, ac secus vias sponte nascitur. Vnde etiam colligi potest esse Rubum Idaeum, quādo & is in lucis proueniat. In hortis etiam nonnunquam vt grandiore fructum ministret, colitur Fragaria.

TEMPVS.

Floret vere, & tota æstate, inq; maximam autũni partem. Fructus tamen eius fugax, rarò nisi æstatis initio inueniri potest.

TEMPERAMENTVM.

De temperamento Fragariæ recentiores diuersa tradunt. Serapio calidam & siccam in secũdo ordine tradit. Alij frigidam & humidam in primo: nõnulli, qui tamẽ prorsus meo iudicio hallucinari videntur, in tertio ordine scribunt. Nos folia ipsa gustu modicè esse amara, et adstringere deprehēdimus vt sicca esse hac ratione, & minimè humidã oporteat. Quapropter in tanta sententiarum de eius temperamento diuersitate animaduertendum, idem de Fragaria, quod de rubo sentiēdum esse, nẽpe quòd folia,

folia, flores, fructus & radix adstringant. Differre tamen inter se, quòd folia potissimum recens nata Folia Fragarum plurimū in se habeant aqueæ substantiæ, parū vergariæ. rō adstringant: adeò vt verisimile sit de iis locutos esse, qui frigidam & humidā in primo ordine Fragariam statuerunt. Est enim eorum temperies ex terrena frigida essentia, & aquea tepida. Fructus Fructus immaturus frigida terreasubstantia præditus est, eiusdem. vt frigidus et siccus hoc nomine dici mereatur. Maturus autem nō parū succi tēperati calidi qui dulcis est, modicamq; adstrictionem habet, ita vt calidus & siccus dicendus veniat. De fructu itaque intelligendi erunt, qui Fragariā calidam & siccā esse affirmant. Quare vbi de tēperamento Fragariæ agitur, nō simpliciter, sed cū prædicta distinctione respondendū est. Vnde cū idem sc̄rē cū Rubo temperamentū habeat Fragaria, iterum hanc ab Ideo Rubo nihil differre verisimile est.

VIRE S.

Quum recentiores in cōmemorandis Fragariæ facultatibus partim eas quas Dioscorides Rubo Ideo partim etiā quas Comaro tribuit Apuleius, vires Fragariæ adscripserint, operæpretiū me facturum arbitror, si vtriusq; de iis verba præmisero, vt nimirū quisq; hac ratione, quapropter iuniores iis facultatibus Fragariā ornaverūt, certius itelligere queat.

EX DIOSCORIDE.

Ideus Rubus eadē potest quæ Rubus. Amplius

PLANTARVM HISTORIAE

eius flos cum melle tritus & illitus, oculorum inflammationibus auxiliatur. Sacros ignes extinguit. Stomachicis cum aqua potui datur.

EX APVLEIO.

Ad lienis dolorem herbae Fragi succum ex mellis uncia potui datum mirifice proficere certum est. Ad suspiriosos eiusdem succus cum pipere albo & melle mixtus, potui datus, mirificum est remedium. Has facultates etiam antiquus manuscriptus herbarius Fragariae adscribit, nomine tamen Apulei in Dioscoridis nomen immutato. Addit tamen huius fructum comestum stomacho conferre & ex succo eius os contra foetorem collui, id quod Serapion quoque tradit.

EX RECENTIORIBVS.

Herba fragaria in cibo sumpta medetur lienosis, item succus ex melle potus. Idem cum pipere candido datur suspiriosis. Fraga sitim sedant, stomacho prosunt, sed praesertim bilioso. Succus Fragis exprimitur, vetustate vires accipiens, praesentaneo remedio ad faciei ulcera, oculorum suffusiones, neque non epiphoras. Radicis decoctum iecinoris feruores mulcet matutino & meridie potum. Vtuntur hodie frequenter Fragaria ad glutinanda vulnera, alium sistendam, menstrua cohibenda, gingiuas confirmandas, oris ulcera, eiusdemque foetorem tollendum, quae singula Rubus etiam Idaeus potest, ut inde rursus coniecere liceat Fragaria ab eodem nihil differre.

DE PHV GERMANICO.

CAP. CCCXXIX.

NOMINA.

ΦΟῦ, ἢ ἀγρία ῥάψδος græcis, *Phu & Nardus Nardus sylvestris* Latinis, *Valeriana officinis & her sylvestris bariis nostri temporis*, Germanis *Baldrion*, Den- *Valeriana* *nenmarck*, oder *Katzenkraut*, oder *Augen- na.* *uurtzel* (*Gallis Valeriane*) appellatur, quòd scilicet cati odore radicis eius, quo eorum oculi roborantur, impensè delectentur.

GENERA.

Duo sunt præcipua *Phu* genera. Magnum quod alio nomine *Theriaca* vocatur. Hoc descriptioni per omnia respondet. Germanicè grosz *Baldrion*, & *Triacks* appellatur. Vulgus herbariorum *Valerianam maiorem* nominat. Alterum vulgare, quod alio nomine *Valeriana* etiam vulgaris nuncupatur. Germanis *geimein Baldrion*, & *Katzenuurtzel* dicitur. Hoc etiã genus à *piçtura Dioscoridis*, vt paulò pòst fusius docebimus, non abhorret.

FORMA.

Folia *Elaphobosco*, siue *Olusatro* similia habet. Caulem cubitalem, aut proceriorem, leuem, tenerum, purpurascensem, in medio concavum, geniculis interfectum. Flores ad *Narcissi* flores accedentes, minores & teneriores, in subalbido purpurascētes. Radices in superiore parte minimi digiti crassitudine. Adnascentes etiã radículas obliquas veluti iun-

ti iuncus odoratus, aut veratrum nigrum, inuicem
 implicitas, subflauas, bene odoratas, nardum in gu-
 stu referentes, cum quadā virosa gravitate. Ex qua
 certē descriptione sole clarius fit, herbam quam vul-
 garem hodie Valerianam nominant, esse Dioscori-
 dis Phu, quòd omnia ferè sic illi respondeant, vt
 prorsus nulla reclamare nota videatur. Folia nanq;
 huius cū primū erumpunt, Elaphobosci præ se fe-
 runt imaginem: postea verò dum adolescit, in Olus-
 satri modum laciniantur. Caulis quoque eius cubi-
 talis, & maior (non enim rarò ad trium cubitorum
 longitudinem caulis à nobis visus est) leuis potissi-
 mum in infima eius parte, denique tener, purpura-
 scens, in medio concavus, geniculatus. Flores eiusdē
 qui summis caulibus emergunt, Narcissi certā ex-
 primunt effigiem, quanuis minores sint, atque ad cō-
 teneriores, vt hoc nomine cum Ruellio in Græcis
 codicibus Dioscoridis ἡ ὀσὸν pro μελίζονα legens
 Phu Pōti. dū esse putem. Nisi quis existimet Phu Pōti, quòd
 Dioscorides potissimum describit, fauentis cœli be-
 neficio maiusculos habere flosculos. Prædicti etiam
 flores acernatim coeuntes in purpuram candicant.
 Radices quoque in superiore parte minimi digiti
 crassitudinē obtinēt, multasq; radículas obliquas,
 Schæni, aut nigri Veratri modo sibiipsis īplicitas.
 subflauas, odoratas, Nardum, cū virosa tamen gra-
 vitate, imitantes. Quum itaque hæ omnes notæ, Va-
 lerianæ nostræ respondeant, multorumq; consensus
 nobis

Valeria-
 na vulga-
 ris.

Phu Pōti.

nobis subscribat, & facultates eius quas illi recensiores tribuunt, planè cum iis quæ Dioscorides Phu adscribit cōueniant, quid impediāt cur nō certò affirmemus Valerianā hāc vulgarem esse Phu Dioscoridis non video, præsertim cū manuscriptus etiam herbarius Phu esse Valerianā apertè doceat, ita vt mirari satis non queā, cur aliquot docti viri in Germania nostra diuersum astruere voluerint.

LOCVS.

Nascitur in humectis locis, & prope aquas, hæc q̃ ad mirandam altitudinem surgit. Prouenit etiā in lucis & caduis syluis, sed hac in tantam proceritatem non emergit.

TEMPVS.

Floret integra æstate.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse in secūdo ordine tradūt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Phu calefacit. Sicca pota vrinam mouet. Potest idem & decoctum eius. Ad lateris dolorem prodest. Menses ducit, & antidotis miscetur.

EX GALENO.

Odorata quodāmodo est huius herbe radix, Nardo viribus similis, sed tamen ad plurima infirmior. Vrinā plus mouet quā Indica aut Syriaca Nardus, similiter autem vt Celtica.

EX PLINIO.

Radix Phu datur potui trita, vel decocta ad strāgulationes,

PLANTARVM HISTORIAE

gulationes, vel pectoris dolores, vel laterum. Menses quoque cit. Bibitur cum vino.

APPENDIX.

Magni Phu radice hodie multi, magno cum errore, pro calamo aromatico vtuntur, quod hoc in loco monere placuit.

DE PHACO. CAP. CCCXXX.

NOMINA.

Lens. Φακός, ἡ φακὴ græcis, Lens & Lenticula latinus dicitur. Officinis & herbariis latinum nomen retinuit. Germani Linsen (Galli Lentille) appellant.

FORMA.

Lens racemosum legumen est, foliis Viciae, sed minoribus, floribus exiguis in candido purpurascētibus, siliquis paruis, molliter in latitudinem fuffis, in quibus tria aut quatuor grana inter legumina minima, sunt.

LOCVS.

Prouenit passim in agris satum.

TEMPVS.

Iulio mense floret, & deinceps in siliquis grana profert.

TEMPERAMENTVM.

Lentes medium tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in secundo ordine.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Lens crebro comesta, oculorum aciem hebetat.

Aegrè

Aegrè concoquitur. Stomacho nocet, cumq; & in-
 testina inflat. Aluum cum cortice suo comesta sistit.
 Præstat quæ facilius concoquitur, & nihil atri in
 maceratione reddens. Vim habet adstrictoriâ: quæ
 propter aluum sistit, si detracto antea cortice ac-
 curatè coquatur, primâque aqua inter coquendum
 effundatur. Primum enim eius decoctum aluum sol-
 uit. Sônia tumultuosa & grauiâ facit. Nervis, pul-
 moni & capiti inutilis. Melius suo fungetur officio
 contra alui fluxiones, admixto illi cum aceto inty-
 bo, aut portulaca, aut beta nigra, aut myrto, aut
 cortice punici mâli, aut rosis siccis, aut mespilis,
 aut sorbis, aut pyris Thebanis, aut cotoneis mâlis,
 aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ
 post decoctionem abiiciuntur, aut rhois quæ obsoniis
 inspargitur. Acetum autem cum eo diligenter per-
 coqui debet, aliâs aluum conturbat. Contra subuer-
 sionem stomachi triginta grana lentis suis cortici-
 bus denudata deuorata prosunt. Decocta cum po-
 lenta, & illita, podagrâ lenit. Sinus cum melle glu-
 tinat. Crustas rumpit, & vlcera purgat. Decocta
 in aceto duritias & strumas discutit. Cum melilo-
 to, aut cotoneo mâlo, medetur inflâtionibus ocu-
 lorum & sedis, addito rosaceo, in maioribus sedis
 inflâtionibus & sinu amplo cum malicorio aut
 siccis rosis, adiecto melle decocta. Contra nomas gâ-
 grenicas similiter vtuntur, aut adiuncta maris æ-
 qua. Aduersus autem pustulas, herpetas, erysipela-
 ta,

PLANTARVM HISTORIAE

ta, pernionesq; vt antea dictum est. Contra mamas
grumosum lac continentes, & lactis copia turgen-
tes, in aqua maris cocta & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Lentes non valenter adstringunt. ipsum itaque
earum corpus desiccant, & sistit ventrem: ceterum
decoctum irritat. Proinde etiam prior aqua abiici-
tur, ubi retentionis causa adhibentur. Cortex eius
vehementer adstringit, carnea substantia tenuiter,
quæ & crassi succi & terrestris est. Succus porro
Lētis adstringenti est cōtrarius. Quocirca si elixa
in aqua in sculū sale garo oleoq; conditum bibatur,
aluum deiiciet. At quod ex bis decocta Lēte fercu-
lum apparatus, cōtrariam succo vim obtinet. Nam
quæ ventri obueniunt fluxiones desiccant, os ventricu-
li, intestina, & totum denique vētrem corroborās.
Quamobrem celiacis & dysentericis accommodatus
est cibus. Lens verò decorticata, vt illam adstrin-
gendi vehementiā, cumq; hac alia videlicet omnia
quæ cōsequuntur, amittit, ita alibilior quā inter-
gra illa efficitur, crassum prauumq; succum gignēs,
tardē cōmeans: alui tamen fluores haud desiccant,
vti ea quæ cortice non est spoliata. Iurē igitur qui
modū in hoc edulio nō seruant, elephantiasim quā
vocant, & cancrum incurrūt. Siquidem crassa sic-
cāq; cibaria faciliē in melācholicos humores vertū-
tur. Quare iis dūtaxat quibus vitiosa est habitudo
ob aquā in carne diffusam, Lēs cibo vtiliter præbe-
tur,

tur, ceu aridis & squalentibus admodum damnosè. Eandem ob causam visum integrum & inculpatū hebetat, immoderatè exiccans. Ei verò qui contrariò modo se habet, humidiori videlicet, opitulatur. Mēstruis purgationibus inepta est: crassum enim et tardifluum sanguinem facit. At muliebri appellato proflusio conuenientissima.

EX PLINIO.

Lens optima quæ facilimè coquitur, eaq; quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidem oculorū obtundit, & stomachū inflat: sed aluum sistit in cibo, magisq; discocta cœlesti aqua. Eadem soluit, minus percocta. Crustulas vlcerū rūpit, eaq; quæ intra os sunt, purgat & adstringit. Collectiones omnes imposita sedat, maximèque exulceratas & rimosas. Oculorum autem epiphoras cum meliloto aut cotoneo. Contra suppurantia cum polenta imponitur. Decoctæ succus ad oris exulcerationes & genitalium adhibetur. Ad sedem cum rosaceo aut cotoneo. In iis quæ acius remedium exigunt cum putamine punici, melle modico adiecto. Ad id demū ne celeriter inarescat, adiiciunt & Beta folia. Imponitur & strumis panisque, vel maturis, vel maturiscentibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua mulsæ & gāgranis cū punici tegmine. Itē podagris, cū polenta, et vuluis, & renibus & pernionibus, vlcerebus difficilè cicatricē trahentibus. Propter dissolutionē stomachi triginta grana Lentis deuorantur.

In cho-

PLANTARVM HISTORIAE

In cholericis quoque & dysenteria, efficacior est in tribus aquis cocta in quo usu melius semper eam torrere aut tundere, ut quam tenuissima detur, vel per se, vel cum cotoneo malo, aut pyris, aut myrto, aut intubo erratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, nervosisq; omnibus, & felli, nec somno facilis. Ad pustulas utilis, ignique sacro, & mammis, in aqua marina decocta: in aceto autem, duritias & strumas discutit. Stomachi quidem causa, polenta modo potionibus inspergitur. Quae sunt ambusta, aqua semicocta curat, postea trita, & per cribrum effuso furfure, mox procedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad guttura.

EX SIMEONE SETHI.

Crassi succi est, & austeram vim atq; qualitatem possidet. Si quis ergo in aqua coquat, & ea aquae, oleo & sapa cum sale misceat, potionem faciet quae ventrem subducit. Bis autem cocta ventericulum & ad ipsum defluxus sistit. Inducit autem stomacho robur, & intestinis, & uniuerso venteri. Quapropter utilis est cibus coeliacis & dysentericis. Si vero cortice ablato sumatur, vehementiam adstringendi abicit, magis vero nutrit, cum tardi sit transitus, & crassus succi, non tamen adeo siccatur, ut antea dixi. Qui vero hoc edulio crebro utuntur, elephantiam contrahunt, & canculos & duritias, & nervorum dolores, & melancholicos affectus. Aptus enim est crassus & siccus sanguis,

sanguis, vt fiat succus melancholicus. Quibus igitur habitus quissiam malus aquosus in carne est, iis solum utile est edulium, quemadmodum siccis & squalidis maximè noxium. Similiter visum salubriter se habentem nimium exiccando habet, contrà verò affectum iuuat. Neque etiam ad menstruas purgationes utilis est, eò quòd crassum & difficulter fluentem sanguinem efficiat. Ad hæc veneris appetentiam semen exiccando, extinguit: ideo castè viuere volentibus ad hoc maximè confert. Grauiæ etiam somnia facit, eò quòd ex ea melancholici succi in totum distribuuntur corpus. Cū mentha decocta, plurimū inflationis deponit. Nonnulli & Betā huius rei gratia eo quo decoquitur tēpore iniiciūt. Lens verò probè decocta & trita, si vulneribus ex iaculo aut telo facta imponatur, sanguinis fluxum vehementer compescit. Paruæ verò lentis decoctum sumptum, difficilem partum soluit. Auribus ex quibus pus emanat instillatum, succurrit.

DE PHILYRA. CAP.

CCCXXXI.

NOMINA.

Ἰλνξ Græcis, Tilia Latinis, & officinarum,

¶ Germa. Linden (Gallis Tilet) appellatur.

Alia ab hac est arbor quæ Diosc. Φιλλυρίοι vocatur. Quòd non animaduertentes viri etiā nonnulli doctissimi, vtrasque arbores magno errore confundūt, quòd forma admodum discrepent, vt ex iis

NN

quæ

PLANTARVM HISTORIAE

quæ paulò pòst dicemus, & è Dioscoride & Theophrasto libro tertio de plantarum historia, cap. x. inuicem collatis, abundè constabit. Differunt itaque inter se Philyra & Phillyrea, neque vna vtraque voce arbor significatur, sed diuersæ.

GENERA.

Tilia Theophrasto loco iam citato autore, duo habentur genera, mas scilicet & fœmina. Distantq; inter se tum materiæ, tum totius corporis forma et quòd altera fructifera, altera sterilis. Materies mas dura, flaua, nodosior, spinosiorq; fœminæ candidior: & cortex mas crassior, detractusq; inflexibilis propter duritiam est: fœminæ candidior flexibiliorq; ex quo cunas faciunt: item fœminæ odoratiores. Et mas sterilis, nulloq; flore est: fœmina, cuius tibi picturam damus, & florem & fructum gignit.

FORMA.

Folio est hederaceo, molliore, & in angulum acutius rotundius & prolixius, & in orbem lentè crispo atque serrato: flore tantisperdum calyculo cõtinetur herbaceo, ubi emerfit flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semẽ prætenue quantum atriplicis, omnibus animantibus ingratum, cum foliorum pabulo maximè ducantur, eorumq; mira dulcedine capiantur. Nunc cum iis confer ea quæ Dioscorides de Phillyrea tradit, & senties esse diuersissima. Nam quis vnquam dixit Tiliam habere folia oleæ, & fructum ferre subdulcem

cem ad similitudinem Lentisci, nigrum, vuarū more congestum? Philyræ enim seu Tiliæ folia sunt heracea atque serrata, adeoq; ab olæ foliis dissidentia: fructum denique fert nō modò non subdulcem, sed qui à nullo mandī potest.

LOCVS.

Montes & valles diligit Tilia, sed plus montibus gaudet aquis.

TEMPVS.

Floret Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse Tiliam, vel ex eo liquet quòd frigidis cerebri malis, epilepsia, & id genus aliis mirificè conserat. Amaritudo etiam cum glutinositate quadam in ea reliquis qualitatibus præualere videtur, si hanc degustes. Quare abstergendi planè facultatem cum modica adstringentia, perinde atque ulmus, cuius facultates illi Plinius, vt ex iis quæ paulò post subiiciemus planum fiet, tribuit, habere euidentissimum est.

VIRES. EX GALENO.

Ulmi foliis aliquando recens vulnus glutinamus, confidentes adstringentē pariter & extergentem illis inesse facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est & adstringentior, itaque cum aceto leprā sanat. Porrò viridis etiānum & recens si vulneribus deligaturæ vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandē vim obtinent: proinde & de-

costo earum quidam perfundunt fracturas quibus callo inducto opus est.

EX PLINIO.

Cortex interior Tiliae lepras sedat, & folia ex aceto illita. Multi corticem commanducatum vulneribus vtilissimum esse putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori. Humor quoque est medulla castrate arboris effluens, capillum reddit capiti illitus, defluentesque continet. Humor denique cuti nitorem inducit, faciemque gratiorem praestat. Folia ad infantium ulcera in ore commanducata prosunt. decocta & pota, urinam ciunt & menses.

APPENDIX.

Quoniam Plinius fere omnes facultates Ulmi etiam Tiliae adscribat, ut ex eiusdem verbis patet, ideo est Galeno quae ille de Ulmo tradit produximus. Si vero quispiam vires quae à recentioribus Tiliae tribuuntur, probe expendet, nihil ab iis quae ex Plinij & Galeni sententia retulimus differre comperiet. Nam maculas facie abstergere scribunt Tiliam, si illa eius succo laetetur. Mederi etiam morbo comitiali bibitum eius liquorem stillatitium, oculis claritatem inducere, calculum sanare, tumores discutere iidem docent. Quid multa? omnes facultates Ulmi obtinet Tilia, ideoque vulneribus etiam recentibus succurrit, & alia quae à Dioscoride & Galeno in Ulmi historia commemorantur, potest.

DE CHELIDONIO MAIORE.

CAP. CCCXXXII.

NOMINA.

Xελιδόνιον μέγα Græcis, *Chelidonium ma-*
ius Latinis, *Officinis Chelidonia*, Germanis
Schelkraut, *Scheluurtz*, groß *Schuualben-*
kraut, (*Gallis Chelidoine*, ou esclere) dicitur.
Chelidonio autem, vel si *mauis Hirundinariae*, auis *Chelido-*
hirundo quæ Græcis *Χελιδών* vocatur, nomen in-
 nium vn-
 didit, vel, vt autor est *Plinius*, quòd hanc primùm de dictũ.
 inuenit, & ea oculis pullorum in nido restituit vi-
 sum, vt quidam tradunt, etiam erutis, vel quòd flo-
 ret aduentu hirũdinum, discessuq; commarcescit: id
 quod de minore verè dicitur.

FORMA.

Caulẽm emittit cubitalem & maiorem, gracilẽ,
 adnata foliis plena habentem. Folia *Ranunculo* si-
 milia, teneriora tamen, & colore subcæsia, iuxtaq;
 singula folia florem *Leucoio* similẽ. Succus illi cro-
 ceus, acris, mordax, cũ aliqua amaritudine & odo-
 ris grauitate. Radix supernè singularis, infernè au-
 tẽ plures. Fructus cornuti *Papaueris* instar tenuis,
 longus veluti *galeæ* conus, in quo exigua semina
 sunt, *Papaueris* semine maiora. Huius descriptionis
 notæ omnes *Chelidonio* nostro respondēt. Siquidem
 fruticosa est herba, cubitali altitudine, cauliculis la-
 nuginosi, teneris, folio *Ranunculi*, magis anguloso,
 tenuiori, aduersa parte cæsis, auersa incano, flore lu-

PLANTARVM HISTORIAE

teo, Leucoio confimili, semine Papaueris, quod in corniculis seu siliquis longis exilibus clauditur. Vulnerata succum croceum emittit, gustum vellicantē. Radix in superiore parte vna, in inferiore parte multis luteis fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in opacis & parietinis.

TEMPVS.

Chelidonium hirundinum aduentu florem excitat, atque adeo toto deinceps vere & æstate floret, quibus etiam temporibus carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Herba hæc tertii ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Succus Chelidonii mixtus melli, & in æneo vase in carbonibus decoctus, contra oculorum caliginem prodest. Exprimitur autem succus ex foliis, radicibus & floribus incipiente æstate, siccaturque in umbra & in pastillos conformatur. Radix cum Aniso & vino albo pota, regio morbo medetur. Sanat herpetas cum vino illita. Dentium dolores commāducata sedat.

EX GALENO.

Chelidonium admodum extergentis & calidae facultatis est. Sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, utique in quibus crassum quidam in pupilla colligitur discussione indigens. Vsi
sunt

sunt quidam radice eius ad morbum regium à icco-
ris obstructione proficiscentē, in vino albo eam po-
tius exhibentes, cum Aniso. Pari modo mansa, den-
tium doloribus confert.

EX PLINIO.

Florentibus succus exprimitur, & in arco vase
cum melle Attico leniter cinere feruētī decoquitur.
singulari remedio contra caligines oculorum. Vtun-
tur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia ap-
pellantur ab ea. Eadem oculorum aciem adiuuat, si
addita aqua foueantur. Succus eius cum melle cu-
lices, nubeculas, obscuritatemq; discutit, cicatrices
extenuat. Albugines etiam iumentorum.

DE CHELIDONIO MINORE.

CAP. CCCXXXIII.

NOMINA.

Xελιδόνιον μικρόν Græcis, Chelidonium mi-
nus Latinis, Officinis Scrofularia minor vo-
catur, quòd strumosa radix multis granorum fru-
menti grumis videatur coaluisse: vel quòd stru-
mis, quas imitatione Græca Scrofulas vocant, me-
deatur. Germanis Feiguartzen oder Blatern-
kraut, id est Ficariā, Pfaffēhodlin, klein Schel-
uurtz, oder Schuualbenuurtz, oder Meyen-
kraut nominatur. Chelidonium autem hæc herba
vocata est haud dubiè, quòd, vt Theophrastus libro
septimo, cap. xiiij. hirundinum aduentu florem ex-
citet.

Scrofula-
ria minor
cur dicta.

FORMA.

NN iij

Herbus

PLANTARVM HISTORIAE

Herbula est à stolonibus pediculisve pendens, sine caule, foliis Hederæ figura, rotundioribus minoribusq; item teneris & aliquatenus pinguibus. Radices habet paruas multas, ex eodẽ callo prodeũtes, tritici modo acervatim congestas, quarum tres aut quatuor in longitudinem progrediuntur. Hæc Dioscoridis delineatio prorsus herbæ illi quam Scrofulariam minorem vulgò nominant, convenire videtur. Nam hæc herbula est à pediculis pendens, viduali caule, foliis Hederæ, rotundioribus multò, minoribusq; teneris & modicè pinguibus. Radices ostendit ex eodem callo prodeũtes, paruas, complures in granorum tritici morem acervatim collectas, quarum tres vel quatuor in longum protenduntur. Flos ei Ranunculi vt maiori luteo colore nitens. His addunt locus, tempora, vires, & alia quæ iam commemorabuntur, quæ singula Scrofulariæ minori adamussim quadrant, vt nemo hanc Chelidonium minus esse inficias ire sine magna impudentia possit.

LOCVS.

In palustribus, prope aquas, & in limitibus humidis, omnibusque vliginosis tractibus ac hortis passim gignitur.

TEMPVS.

Verno tempore, Maio mense, & præsertim hirundinum aduentu floret, nec longo post tempore marcescens evanescit, sic vt irrigui limites, qui largo foliorum florumque stipatu pubescebant, confestim

is spoliati glabrescere conspiciantur.

TEMPERAMENTVM.

Chelidonium minus, Galeno teste, quarti ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando, ideoque magnam præ se fert acrimoniam, gustum erodentem. Nostrium autem vsqueadeò acre non est, vt com-
manducando sæpe nullam prorsus sentias acrimo-
niam, potissimum in eo quod in humido loco natum
sit. In hoc autem quòd locis siccis provenit, senties
& amaritudinem & acrimoniam, sensim tamen
gustum erodentem.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Acrem vim habet, Anemones modo summā cu-
tem exulcerantem. Scabiem & vnguium lepras
tollit. Ex radicibus expressus succus ad purgatio-
nem capitis addito melle naribus utiliter instilla-
tur. Similiter decoctum eius cum melle gargarissa-
tum, caput strenuè purgat, et omnia pectoris vitia.

EX GALENO.

Chelidonium minus cum acrius sit maiore, illi-
tum confestim cutem exulcerat, vnguesq; scabros
eiicit. Succus eius per nares purgat, utpote vehemē-
ter acris existens.

APPENDIX.

Recentiores ea herba in exterendis ficibus ma-
riscisve, & strumis, magna experientia vtuntur, vt
inde certè *Scrofularia* nominari, quemadmodū di-
ximus, meruerit. Antiquus etiam ac manuscriptus
herbarius,

PLANTARVM HISTORIAE

herbarius, sub nomine tamen Pedis vetuli, quo Aron nominatur, se à quodam qui expertus sit cognovisse scribit, quòd hæc herba contra mariscas ac strumas mirificè proficit.

DE CHAMAEDRY. CAP.

CCCXXXIII.

NOMINA.

αμυγδενος Græcè, Trissago Latine, officinis

X nis græcum nomen insedit, vulgo Quercula minor, & à serratis foliis Serratula appellatur.

Serratula Gallicè Chesnette, ou petit Chesne, ou Chamæ de la germandrée. Chamædrys verò Græcis dicta est, quasi humilis ac terrestris quercus, quòd scilicet folia Quercus habeat, & huius respectu quasi humi repat. Sunt qui Serratam nominatam ideo putèt, quòd ab ea serra inuenta sit. Dioscorides hæc Teucrium, etiam, propterea quòd Teucrio similis admodum sit, appellari à nonnullis scribit.

GENERA.

Et si Diosc. aliq; veteres unicam faciant Chamædryn, tamen nos, quia plures herbas ad eius formam ac picturam accedere videmus, duo eius genera produximus. Quorū sanè primum vera Chamædrys existit, & Germanicè Klein Bathengel nominatur. Illius autē rursus duo sunt genera. Vnū enim quod præ cæteris omnibus pictura Dioscoridis maximè accedit, mas dicitur, alterum verò fœmina: neque enim aliter nobis discrimen indicare li-

cuit nisi sexu ratione. Alterum genus vulgaris est Chamædrys, quod iterum duum est generum, mas scilicet & fœmina. Mas Germanicè Erdtuueirauch, Fœmina verò Gamenderle, Blauumenderle, Vergiszmeinnit appellatur.

FORMA.

Frutex dodrātalīs, foliis exiguis, forma & diuisuris quernis similibus, amarisq; flore subpurpureo, exili, semine in calyculis atro. Quæ utique descriptio ita herbis illis quas pictas exhibemus respondet, ut nulla prorsus nota reclamare videatur. Sūt enim herbæ palmum altæ ut plurimum, exili folio, effigie & diuisura Quercus, amaro, flore penè purpureo & exiguo, ita ut mirari satis non possim, cur nonnulli alteram speciem genuinā Chamædryn esse negent, cū tamen Germanica etiā appellatio pulchrè ad antiquum atque adeò græcum nomen alludat. Sed instabit forsitan quispiam dicens, Cha- Obiectio
mædrys Dioscoridis palmum alta est, hæc tua mēsurā nis solurā hanc excedit. Fateor sanè, attamen non multum
exuperat. quod si etiam plus exuperaret, nō tamen hoc nomine alterius speciei herba putāda esset: neque enim adeò statam atq; certam mēsurā herbis tribuit Dioscorides, ut quandoque ultra citraq; cōsistere non liceat: verū cū alicui herba mēsuram adscribit, id ea ratione facit, ut maiori parti indiuiduorū illius speciei quadrare existimet. In priorū itaque inopia, alterius vsus esse potest.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur asperis & petrosis locis, interdum etiã in montosis & campestribus solidis.

TEMPVS.

Primum genus Iunio & Iulio mensibus floret.
Alterum autem vere potissimum. Carpuntur semine pręgnantia.

TEMPERAMENTVM.

Ex tertio ordine calefacientium & desiccantium facit Galenus. Germanicę tamen minus calefacere & desiccare videntur, vtpote in regione frigidiore nata.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Recēs ac viridis in aqua decocta & pota, cōuulsis, tussiētibus, licni indurato vrinę difficultatibus, hydropicis inter initia auxiliatur. Cit menses, fœtusq; extrahit. Lienē ex aceto pota minuit. Aduersus venenata cum vino pota & illita efficax est. Trita ad prædicta in pilulas conformatur. cū melle vetera vlcera purgat. Cum oleo trita, inuncta & illita, oculorum caliginem discutit.

EX GALENO.

Chamędrys vincentem qualitatem amarā habet, & est quodāmodo acris. Quocirca meritò lienem colliquat, vrinam & menses mouet, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructiones expurgat.

EX THEOPHRASTO.

Trissaginis

Trissaginis folia adrupta, vulneraq; in oleo tri-
ta valent, & ad depascentia vlcera. Semen bilem
extrahit, & oculis quoque beneficium est. Foliū ad
albugines tritum in oleo prodest.

EX PLINIO.

Aduersus serpentium venena potu illituq; effica-
cissima. Item stomacho, tussi vetustæ, pituitæ in gua-
la coherescenti, ruptis, conuulsis, lateris doloribus.
Lienem consumit. Vrinam & menses cit, ob id in-
cipiētibus hydropicis efficax, manualibus scopis e-
ius in tribus heminis aquæ decoctis vsque ad ter-
tias. Sanat & vomicas, & sordida vlcera cū mel-
le. Fit & vinum ex ea pectoris vitiis. Foliorum suc-
cus cum oleo, caliginem oculorum discutit. Ad sple-
nem ex aceto sumitur.

DE CHAMAECYPARISSO.

CAP. CCCXXXV.

NOMINA.

Xαμακυτόρισος Plinio dicta est, quasi
pumila Cupressus. Apud Græcos, quod sciā,
cuius fruticis nulla fit mentio. Vulgo Cupressus, Ger-
manis Cypresz, (Gallis Cypres) nominatur. Cy= Cupressus
pressus ab odore & forma foliorum eiusdē nomen vnde di-
claturæ arboris vocata est.

Etā.

FORMA.

In arbusculi formam fruticat, foliis incanis, Ab=Chamæcy-
rotoni femine modo scissis. Floribus in summo au=parissusi. ō
ri instar fulgentibus. Totus frutex odoratus est. est Cha-

Errant mapitys.]

PLANTARVM HISTORIAE

Errant qui Chamæpityn esse arbitrantur: neque enim vt illa humi serpit, sed altius à terra, vt pictura monstrat, consurgit.

LOCVS.

In hortis passim ac figulinis provenit.

TEMPVS.

Aestate floret. Paucos autem frutices inuenies in quibus flores intueri liceat, quando per vniversam vitam nõ nisi vnum hunc, cuius picturam damus, fruticem in quo flores apparuerint, viderim.

TEMPERAMENTVM.

Apparet in ea, sicut gustus testificatur, levis quidem acrimonia, sed maior amaritudo, multoq; etiã plus acerbitatis in tota plãta. Resiccat itaque absque insigni caliditate.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Quum easdem quas arbor Cyparissus qualitates habeat Chamæcyparissus, necesse est vt etiam facultates easdem obtineat. Arboris igitur hæ sunt vires. Adstringit & refrigerat. Folia eius cum passulo & myrrha modica pota, vesicæ fluxionibus & vrinæ difficultati medentur. Pilulæ tusæ, & cū vino potæ, contra sanguinis reiectionem, dysenterias, alui fluxiones, orthopnoeam, tussimq; prosunt. Decoctum earum idem potest. Tusæ cum fico duritias emolliunt, & polypos in naribus sanant. Leprosos vngues cum aceto decoctæ & tritæ adiectis lupinis tollunt. Intestinorum ramices illitæ coercent. Folia
idem

idem possunt. Pilulæ cum coma suffitæ culices abigere creduntur. Folia trita & illita vulnera glutinant, sanguinemque supprimunt. Cum aceto autem trita, capillos tingunt. Illinitur per se aut cum polenta ad erysipelata herpetas, carbunculos, & oculorum phlegmonas. Cerato mixta & imposita venter triculum firman.

EX GALENO.

Cupressi folia, germina, pilulæ recetes & molles, magna vlcera in duris corporibus glutināt. Ex quo clarum est quòd resiccandi vim habeat, absque insigni acrimonia & caliditate. Tanta inest ei acrimonia caliditasq; quanta satis sit deducendæ in altum accerbitati: nullam tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficit. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates, sine molestia, tutòque depascitur, quum quæ calefaciunt & desiccant, eas quidem quæ cõtentæ sunt absumant, cæterùm acrimonia & caliditate alias attrahāt. Sic intestinorum ramice affectos inuat: siquidẽ exiccat & robur addit corporibus præ humiditate laxis, utpote quum adstrictio in altum subeat, cò quòd caliditas quæ illi admixta est deducat, ad eam quidem mensuram perueniens, ut præire quidem valeat, nondum tamen mordicare. Quidam ea vtuntur ad carbunculos & herpetas polenta miscentes, tanquam absumat citra calefactionem eos morbos efficientem humiditatem. Sũt
qui

PLANTARVM HISTORIAE

qui ad erysipelata vtantur, admista nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

EX PLINIO.

Cupressi folia trita serpentum ictibus imponuntur, & capiti cum polenta, si à sole doleat. Itē rami ci, qua de causa bibuntur. Testium quoque tumori cum cera illinuntur. Capillum denigrant ex aceto. Eadem trita cum duabus partibus panis mollis, & è vino Aminæo subacta, pedum ac neruorū dolores sedant, Pilula aduersus serpentium ictus bibuntur, aut si eiiciatur sanguis. Collectionibus illinuntur. Ramici quoque teneræ tussæ cū axungia & lomēto profunt. Bibuntur ex eadem causa. Parotidi & strumæ cum farina imponuntur. Exprimitur succus tussus cum semine, qui mixto oleo, caliginem oculorum aufert. Item victoriati pondere in vino potus illitusq; cū fico sicca pingui, exemptis granis, vitia testium sanat, tumores discutit, & cū fermento strumas. Radix cum foliis trita potaq; vesicæ & stræguriæ medetur, & cōtra phalangia. Ramenta pota

Chamæcy menses ciunt, scorpionum ictibus aduersantur. Chamæcy parissi fa- mæcy parissos herba ex vino pota contra venena serpentium omnium scorpionumq; pollet.

DE CHAMAECISSO. CAP.

CCCXXXVI.

NOMINA.

Hedera **X**ΑΜΑΙΝΙΩΣ, ἢ γῆς στέφανος græcis, Hedera terrestris. Terra coronæ latinis appellatur.

tur. Officina nomen Hederæ terrestris retinuerūt. Germanicè Gundelreb, corrupto sanè nomine vocatur, cùm dicendum esset Grundreb, hoc est, humi repens viticula. Nominatur etiam Germanis Erdepheuu, & Erdenkrätzlin, (Gallicè Lierre terrestre.) Chamæcissos verò dicta est, quòd Chamæ nunquam non repat humi, foliis Hederæ similibus. Corona terræ, quòd ramulos suos per terram de dicta. spargens, folioso veluti ferto eandem coronare videtur. Corona
terra.

F O R M A.

Folia Hederæ similia habet, minora tamen & tenuiora. Ramulos dodrantes multos, foliis plenos, à terra quinque aut sex procedentes. Flores Leucois similes, minores tamen, & in gustu vehementer amaros. Radix illi est tenuis, alba, & inutilis. Ex hac historia satis constat herbam hodie vocatā Hedram terrestrem, esse Dioscoridis Chamæcisson. Siquidem foliis Hederæ constat, minoribus tamen & tenuioribus, ac in circuitu incis. Legendum enim esse $\mu\iota\kappa\rho\gamma\tau\omicron\rho\alpha$, & non $\mu\alpha\kappa\rho\gamma\tau\omicron\rho\alpha$, res ipsa docet: nā etsi folia Chamæcissi aliquatenus Hederæ similia sint, tamen rotundiora, atque adeò minora etiam & tenuiora existunt. Et est hic lapsus ab ι in α apud Dioscoridem frequens, ut ex aliis etiam locis suprā notatis liquet. Ramulis etiam dodrantalibus multis foliosis, qui tamen antequā scindantur, quinque aut sex à radice procedunt. Flores
denique

PLANTARVM HISTORIAE

denique eius Leucois similes sunt, non quidem luteis, albis, aut purpureis, sed caeruleis: ita ut vehementer errent qui eius flores, neque figura, neque colore floribus Chamæcissi, qui Leucois adsimilatur, esse similes putant. Etsi enim colore neque albi, neque lutei sint, caeruleos tamen, qui color Leucoiorum est, esse constat. In gustu denique, sicut etiam folia, amari sunt. Radix quoque eius tenuis, & nullius prorsus usus est. His omnibus accedit, quod nomen etiam pulchrè quadrat: neque enim Græcis aliud sonat Chamæcissos, nisi humilem ac humilem Hederam. Cæterum non esse Elatinen, præter alia multa quæ referre superuacaneum arbitror, sapor manifestè ostendit, qui in Hedera terrestri amarus & modicè acris est, atque adeò calorem præse fert. Elatine verò refrigerat atque adstringit. Sic non esse Asclepiada, ut taceam quod Securidacæ simile semen non proferat, vel vnus locus natalis satis monstrat. Asclepias enim in montibus, Hedera autem terrestris in decliuibus locis & vallibus, ut Germanicum nomen Grundtreb abundè indicat, prouenire solet. Quæ autem herba sit, Asclepias, suo loco dictum à nobis est.

LOCVS.

Nascitur in cultis locis, iuxta etiā sepes & dumeta.

TEMPVS.

In Martio statim erumpit, & floret in magnam usque æstatis partem.

TE Ma.

Chamæcissos.

Hedera
terrestris
non est Elatine.

Non est
Asclepias.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudo exiguaq; acrimonia foliorum & florum satus monstrant herbam hanc calidam & siccam esse, ita vt hi qui frigidam esse statuunt, reprehensione non carcant. Error quorundā notatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia eius trioboli pondere in aquæ cyathis tribus, quadragenis aut quinquagenis diebus pota, ischiadicis presunt. Morbum quoque regium in senos septenósve dies similiter pota emendant atque expurgant.

EX GALENO.

Chamæcissi flos quum sit admodum amarus, iccoris obstructions soluit. Sunt qui illum etiā ischiadicis exhibeant.

EX PLINIO.

Chamæcisson appellant Hederam non attolentem se à terra. Et hæc confusa in vino acetabuli mensura lienî medetur. Eius folia bibunt ischiadici tribus obolis, in vini cyathis duobus septē diebus, admodum amara potione.

APPENDIX.

Has omnes iam commemoratas facultates Hedera terrestri recentiores tribuunt: neque dubium est, quum sit admodū amara, quin eadem habeat, & alia etiam possit quæ illi adscribunt, vt euocare suppressos menses, vrinam mouere, obtusum auditum remouere. Contra pestem etiam tradunt

PLANTARVM HISTORIAE

efficacē esse: id quod equites quoque sciunt: hi enim quoties fibula dicta pestis equum corripuerit, hac contra eandem herba magna efficacia vtuntur.

DE CHRYSANTHEMO.

CAP. CCCXXXVII.

NOMINA.

ΠΥΘΩΘΕΜΟΝ Græcis, Chrysanthemum latinis, officinis inusitatū, Germanis Goldtblum, Schmaltzblum, à pinguedine

quæ contrito digitis flosculo apparet, & Dratblū. (Gallis Marguerites blanches) nominatur.

Chrysanthemum
vnde dicitur
Etum.

Chrysanthemon verò à flosculis auri splendorem & colorem præ se ferentibus, dictum est.

FORMA.

Herba est tenera, fruticis tamen speciem obtinēs, leues proferens caules, & multifida folia: luteos flores, vehementer splendentes, & oculi instar circulares. Ex qua sanè descriptione satis clarum est, herbam quam pictam damus, esse Chrysanthemon, quòd illi omnes à Dioscoride traditæ notæ, nulla prorsus reclamante, conueniant. Quibus Democriti in Hydrosopico accedit testimonium, qui herbam hanc quæ Batrachio similis est, Chrysanthemon Græcis appellari scribit, foliisq; Apij esse, maioribus tamen, flore auri colore splendente. Addit denique ab Aquilegiis mirè celebratam esse, eò quòd aquam subesse certum sit, ubi solet emicare. Quæ quidem singula herba illi quam depictam exhibemus respondent.

spondent. Nam vt cetera omittam, vbi hæc nascitur aquæ latices subesse non est dubium. Quidam perperam Vuasserhanenfusz Germanicè nominant: nam hoc nomine appellata herba, alia ab ea est, vt in capite de Batrachio docuimus. Nam cum hæc nostra acrimonia vacet, quanquam Batrachii similis sit, tamen in numero illorum esse hoc nomine non potest.

LOCVS.

Nascitur prope vrbes, in pratis humidis, & aliis locis aquosis.

TEMPVS.

Maio mense eius floribus prata & loca humida splendescunt.

TEMPERAMENTVM.

Eiusdem esse cum Buphthalmo temperamenti, & gustus & facultates declarant. Calidum itaque esse & siccum constat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eius flores cum cerato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis coloris bonitatem tempestinè reddit, à balneo post longiorem in eo moram exitu pota.

EX PLINIO.

Vesica calculos Chrysanthemon eiicit.

DE CHAMAELEONE ALBO.

CAP. CCCXXXVIII.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Carduus αμοιλέωρ λευκός Græcis, Chamæleon
suarius. x *albus, Carduus suarius & varius* Lati-
Cardopa- nis, officinis & barbaris Cardopatiū ap-
tium. pellatur. Quod nomen haud dubiè corruptum est,
deductumq; à dictione Păcration, nam sic olim esse
nominatū Chamæleonem Apuleius testatur: aut à
Carduo vario, à qua dictione, v scilicet litera in p,
& r in t mutata, in Cardopatiū facilis est lapsus.
Germanis Eberuurtz, eleganti allusione ad Car-
duum suarium, nuncupatur. (Gallis Vne herbe
espineuse semblable à la carline, ou Arti-
Chamæ- chault saulnage.) Chamæleon autē à foliorum
leon vnde varietate dici cepit. Mutat enim cū terra colores,
dictus. Plinio teste: hīc niger, illic viridis, aliubi cyaneus,
aliubi croceus, atque aliis coloribus videtur. Sui-
Suarius rius autem Carduus dictus est, quod sues si in po-
Carduus lēta exhibeatur, perimat. Ob quam etiam causam
quare no- Eberuurtz Germanis nuncupatam puto.
minatus.

FORMA.

Folia habet Silybo aut Scolymo similia, asperio-
ra autem, acutiora, nigroq; Chamæleone validio-
ra. Caule vacat, verū ē medio spinam Echino ma-
rinō, aut Cinaræ similem erigit. Flores purpureos,
veluti capillos. qui in pappos evanescent. Semē Cni-
co simile. Radicem in pinguibus collibus crassam,
in montosis verò graciliorem, in profundo albam,
aliquatenus aromaticam, graecolentem & dulcē.

Plinius

Plinius lib. xxij. cap. xviij. breuius herbam hanc depingit, sic inquit: Asperiora folia habet, serpit in terra Echini modo spinas erigens, radice dulci, odore grauissimo. Quæ certè nota in vniuersum omnes, herba quæ hodie barbara & corrupta voce Cardo patium vocatur, adamussim respondent, ita vt nemo non esse Chamæleonè perspicuè intelligat. Huc accedit quòd facultates etiam eadem sint. Radix enim Chamæleonis albi hausta, venenis resistit. Radix etiam Cardopatij ex recentiorum traditione, mirificè venenis aduersari, & contra pestilentiam populatim scuientem, vt paulò post dicemus, efficacissimum esse remedium dicitur. Quòd si tamen rectiora quis protulerit, non grauabimur hinc, vt in aliis quoque, mutare sententiam.

LOCVS.

In glabretis montium provenit, & in syluis, vt hinc etiam syluaticus Carduus cognominatus sit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus cum suis floribus excodi potest.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius calefacit secundo ordine absoluto, desiccatur autem tertio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix pota acetabuli mensura, latos lumbricos pellit. Sumitur autem in vino austero, cum decocto Origani. Hydropicis commodè drachma in vino

OO iij datur:

PLANTARVM HISTORIAE

datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatē vrinæ decoctum eius propinatur. Pro theriaca cū vino pota est. Occidit canes & sues. Mures item necat subacta cum polenta, aut hydrelao madafacta.

EX GALENO.

Radix eius potui datur acetabuli mensura contra latos lumbricos cum vino austero. Exhibent etiam aqua inter cutem laborantibus.

EX PLINIO.

Hydropicos sanat succo radice decocta. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusdem in vino austero cum Origani scopis. Facit ad difficultatem vrinæ. Hic succus occidit canes suesque in polenta. Addita aqua & oleo contrahit in se mures & necat, nisi protinus aquam sorbeant. Radicē eius aliqui concisam seruari iubent funiculis pendentem, decoquuntque in cibo contra fluxiones, quas Graeci rheumatismos vocant.

APPENDIX.

Recentiores radicem Cardui suarū drachmæ pōdere in vino sumptam contra pestilentiae contagia prodesse tradunt. Eādem etiam in aceto decoctam, contra scabiem, impetiginē, & omnes cutis fœditates curatu difficiles conferre scribunt, si eius decoctō lauentur. Idem dentium etiam dolori succurrit.

DE CHAMAELEONE NIGRO.

CAP. CCCXXXIX.

NOMINA.

Xαμαλέωρ μέλας Græcis, *Carduus niger* aut *Vernilagium* Latinis dicitur. Officinis hæc planta incognita existit. Germanis allusione ad Latinam nomenclaturam schuuartzer Gartēdistel (Gallis Cardonette) vocari potest, quod scilicet in hortis tantum culta proueniat. Sunt qui eam à candore foliorum nominet Vuelsch Vueisz Distel, sed prior appellatio ad discriminandas plantas melior existit. *Chamæleon* verò dictus est à *va Chamæ* pietate foliorum, quæ pro terra & locorum differentia, aut admodum viridia, aut subalba, aut cærulea, aut rubra inueniuntur. *Niger* verò haud dubiè à radice appellari cæpit.

FORMA.

Foliis *Scolymo* similis est, minora tamen, tenuioraque, & rubentia ea habet. Caulem emittit digitali crassitudine, dodrantalem, subrubrum, qui in summo habet umbellam, & spinosos flores tenues, hyacinthi æmulos, versicolores. Radicem crassam, nigram, densam, & aliquando corrosam, quæ disseca subflavescit, & cōmanducata mordet. Hæc quidem notæ quanquam plantæ, cuius hîc picturâ dāmus, ferè omnes videantur quadrare: caulem enim euehit dodrantalem, & altiore etiam, digitum æquantem crassitudine, subrubrum, folia instar *Scolymi*, minora, subalba & leniter punicea, candidum ac hispidum florem, hyacinthina purpura variatum.

PLANTARVM HISTORIAE

tum, radicem nigrā & subflauam: tamen cū non admodum linguam vellicet commenducata: radix, sit vt non parum an legitimus sit Chamæleon niger addubitem. Verū cum multi huius temporis viri eruditi hanc plantam Chamæleonem nigrum esse credant, nolui hoc tempore ab iis prorsus dissentire, atque adeo eandem quæ illi, plantæ huic inde re appellationem volui, maximè cū nullā aliam eidem conuenire apud Dioscoridem descriptionem videam, donec aliquid certius de ea nobis aut aliis compertum fuerit.

LOCVS.

Nusquam sua sponte in Germania provenit, quare cultura indiget. Nascitur autem Chamæleon niger, Dioscoride autore, siccis, cāpestribus, clinosisq; & maritimis locis.

TEMPVS.

Iunio mense floret, ac subinde in capitulis rotundis Augusto mense semen hispidum profert.

TEMPERAMENTVM.

Chamæleontis nigri radix sicca est in tertio ordine, calefacit verò in secundo absoluto.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix trita additis exiguo atramento sutorio, cedrino oleo, & axungia, scabiū abigere potest. Abstergit etiam impetigines, admixtis sulphure & bitumine. Decoctum eius collutione dētium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cera oblita, dolētibus dentibus

dentibus auxiliatur. Quinetiā fouentur ea dentes, quum decocta in aceto, & calens imposita fuerit. Scriptorio stylo dolenti denti calida admota, eum frangit. Cum sulphure decolorem ob solem faciem, & alphas emendat. Miscetur medicamentis erodentibus. Phagedenas, ferinaq; ac tetra vlcera illita, ad mitiorem habitum transferens sanat.

EX GALENO.

Radix quiddam letale obtinet, quamobrem eius foris vsus ad scabies, impetigines, alphas, et in summa, ad omnia quæ deterfionem postulant. Præterea emollientibus & discutientibus medicamentis miscetur, ac illita phagedenica vlcera sanat.

EX PLINIO.

Radice eius lichenes curantur, cum sulphure & bitumine vnà coctis: commanducata verò dentes mobiles, aut in aceto decocta. Succo scabiem etiam quadrupedum sanant. Et ricinos canum necant.

DE CHAMAEPITY.

CAP. CCCXL.

NOMINA.

αμολπίτις Græcis, Aiuga siue Abiga,
 X autore Plinio, Latinis dicitur, Inuenitur
 & Ibiga vocari, quod nomen, Hermolao Ibiga.
 teste, ferè seruât hodie Illyrici. Hinc abiectionis duab.
 literis i & g, Iba, & ab Aiuga abiectione literarū
 a & g, Iua manauit in vulgi nomenclationē. Offi- Iua.
 cine Iuā cognomēto muscatā appellant, Germani
 ye leu

PLANTARVM HISTORIAE

Chamæpi ye lenger ye lieber (Galli lue Muscate.) *Cæ-*
ys vnde terum *Chamæpitys* dicta est, quasi humilis & bre-
 lieta. uis, humiq; depressa picea: nam eius folia piceam o-
Abiga lent. *Abiga* verò vocata propter abortus, quos, edu-
 quare vo- cendis iis quæ in utero sunt, excitare solet.
 cata.

GENERA.

Prima. Tria eius sunt genera. Vna foliis *Sedi* seu *Aixoi*,
Altera. quam nos *fœminam* fecimus. *Altera* ramis ancho-
Tertia. ra modo incuruis, quam nondum vidimus. *Tertja*
mas dicitur etiam *Dioscoridi*. Harum discrimina
 è descriptionibus certius cognosces.

FORMA.

Prima, herba est per terram serpens, subcurua,
 folia minori *Aixeo* similia habens, multò tamẽ te-
 nuiora, pinguiora: hoc est, vt *Serapion* interpreta-
 tur, super se plus humiditatis tenacis habentia, &
 hirsuta, circa ramos frequentia, odore piceæ, flores
 exiguos, luteos aut candidos, radicem *Cichorij*. *Al-*
tera cubitalibus est ramis anchora modo incuruis,
 tenuibus, coma supradicta simili, flore candido, se-
 mine nigro. Olet autem & ipsa piceam. *Tertia*
 quæ mascula appellatur, herbula est foliolis, tenuio-
 bus, candidis & hirsutis, caule aspero, candido, flos-
 culis luteis, semine secus alas pusillo. Piceam &
 hac olet.

LOCVS.

Sua sponte, quòd sciam, in Germania non proue-
 nit. Nunc tamen in hortis plantari cepit. *Plinius*
 tertiam

tertiam in petris nasci tradit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Chamæpitys gustu quidem amarum saporem acri validiorem obtinet. Est autem in calefaciendo secundi, in siccando verò tertij ordinis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia primæ septem diebus in vino pota, regio morbo medentur. Quadraginta verò ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter iecinorosis, vrinæ difficultatibus, & renũ vitiis. Prosunt etiam torminosis. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum lenta iure decocti macerata. Trita & cum fico pro pilulis data aluum emollit. Excepta melle, squama aris, & resina, purgat. Apposita ex melle, ex vtero ducit. Mammarum duritias discutit. Vulnera glutinat. Vlcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet. Secunda & tertia eandem vim obtinent, non tamẽ vsqueadco efficacem.

EX GALENO.

Effectu expurgat Chamæpitys, abstergitq; viscera plus quàm calfacit, Proinde regio morbo correptis, & omnino quibus facile iccur obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tũ pota, tum apposita cum melle. Sed & vrinæ mouẽda

da aptum est medicamen. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis decoctam in melicrato. Herba porro ipsa viridis magna vulnera conglutinat, & vlcera putrescentia sanat. Mammarum præterea durities discutit.

EX PLINIO.

Profunt aduersus scorpionum ictus. Item iecinori illita cum palmis aut cotoneis. Renibus & vesica decoctum earum cum farina hordeacea. Morbo quoque regio, & vrinae difficultatibus, ex aqua decocta bibuntur. Nouissima contra serpentes valet cum melle. Sic & apposita vulnus purgat. Sanguinem densatum extrahit pota. Sudores facit, perunctis ea. Peculiariter renibus utilis est. Fiunt ex ea & hydropicis pilulae, cum ficu aluum trahentes. Lumborum quoque dolorem victoriati pondere in vino finit, & trassim recentem. Mortuos foetus ex acetato decocta potaq; eiicere protinus dicitur.

APPENDIX.

Officina-
rum error.

Recentiores herbarum, & magna officinarum pars, aliam Chamæpityn ostendunt, folio Salviae rimoso, angustiore tamen, & ad radicem maiore, flore subcandido ac luteo, & semine nigro: quæ tamen legitima Chamæpitys non est, sed prima potius Sideritidis, ut suo diximus loco, species. Desinant igitur subinde hac herba pro Chamæpity vera uti, ac illius loco has quarum nunc picturas damus usurpent. Erroris autem huius nulla alia fuit causa, quam

quàm quòd Chamæpitys etiam veteribus alio nomine dicta sit Sideritis. Hinc plerique decepti eā herbā quæ priuatim ac propriè sic nominatur, pro Chamæpity usurpare cœperunt. Sideritis autē nulla alia de causa dicta est Chamæpitys, nisi quòd illi vulnera glutinandi insit facultas.

DE PSYLLIO. CAP. CCCXLI.

NOMINA.

Yύλλιον Græcè, herba Pulicaris Latinè, nomē Græcum in officinis retinet, Germanicè Psyllienkraut (Gallicè Herbe à Pucés) nominatur. Tam Græcam autem quàm Latinam appellatio- Psylliū vn
de dictum
nem à pulice, cuius effigiem semen eius refert, sortita est herba. Vel, vt nonnullis videtur, quia si viridis in domum feratur, generari in ea pulices prohibeat.

FORMA.

Psyllion folia Coronopo similia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantes. Tota herba ad fœnigraminísve formā accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut terna in summo cōtracta conuolutaue, in quibus semen pulicibus simile, nigrum durūque.

LOCVS.

In aruis & incultis nascitur. Nusquam tamen, quòd sciam, in Germania nisi satum prouenit.

TEMPVS.

Flores tota ferè æstate ex capitulis eius, quæ spicæ formam obtinent, erumpentes dependent, cari-

PLANTARVM HISTORIAE

no capiti haud dissimiles, ut pictura abundè monstrat. Semen verò autumnoprofert.

TEMPERAMENTVM.

Semen eius ex secundo refrigerantium est ordine, in desiccando verò & humectando mediū quod Mesues dammodo & symmetrum. Commentum Mesues de cōmentū. substantia eius interiore calida nihil moror.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Vis Psyllio refrigeratoria. Cū rosaceo, aceto, aut aqua illitum articularū doloribus, parotidibus, tuberculis, oedematis, luxatis, capitisq; doloribus prodest. Enterocœlis seu intestinorū ramicibus puerorum, & vmbilicis prominentibus cum aceto illitū medetur. Oportet autem acetabuli mensura tussum in aquæ heminis duabus maderc, & vbi aqua concreuerit illinire: egregiè siquidē refrigerat: deiectū enim in feruentem aquam, calorem eius reprimi. Prodest erysipelatis. Perhibent si viridis domū importetur, prohibere ne in ea pulices generētur. Tusa cum adipe, sordida & maligna vlcera expurgat. Succus eius cum melle ad aures fluxione tentatas, & vermiculosas conducit.

EX PLINIO.

Vis ei ad refrigerandum ingens. Semen in vsu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura, sextario aquæ densat ac contrahit. Tunc terere ac crassitudinem illinere oportet cuiuscunque

cunq; dolori, & collectioni inflammationiq; Tenasmo in aqua cū radicib. decoctum medetur. Omnibus articolorum morbis salutare est huius semē madefactū in aqua, admistis in heminā seminis duobus resina colophonia cochlearibus, thuris vno.

DE PSEVDONARDO.

CAP. CCCXLII.

NOMINA.

Yεψδοναρδος Græcè & Latine nominatur, Pseudonardus quod scilicet nō sit vera & genuina Nardus, dus vnde cuius Dioscorides & alij veteres meminerunt. dicta.

GENERA.

Duū cernitur generū. Alterum procerius est, & maiorem spirat odorem, nec minus quam Nardus placet. Hoc nos Pseudonardum mare diximus. Officinæ & vulgus herbariorum Spicam à spicatis floribus nominant, Germani Spicanardi (Gallidu Narde, ou Aspic.) Alterum amplitudine & odore minus, quod nos Pseudonardum fæminā appellauimus. Officinæ & herbarij recentiores Lauandulam vel Lauendulam, eo quod balneis & hominum lauacris expetatur, et utique omnia si permisceatur odoris commendet suauitate, vocant. Germani ad hoc nomen alludentes Lauendel (Galliu Lauende) nuncupant.

FORMA.

Frutex est folio crassiore, carnosio, angusto colore
 PP languido.

PLANTARVM HISTORIAE

languido, in candidum vergente, piloso, frequentibus spicis in aristas sparsis, flosculis in spica serè caeruleis, in Lauendula autem purpureis.

LOCVS.

Gaudent apricis & petrosis, tanta suauitatis fragrantia, vt penè flores odoris incunditate vincant, qua dote vestibus inseruntur.

TEMPVS.

Vtraque perpetua coma exitu veris canescit, Iunio & Iulio mēse spicatur, floribusque pragnās est.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur ordine secundo, tenuibusque constat partibus, haud multum à natura Celticae Nardi dissidens.

VIRE S.

Antiquus manuscriptus herbarius easdem serè facultates Pseudonardo, quas Celtica habet, tribuit, dum in hunc modum scribit: Stomachi dolorem frigidum eiusdem inflationes, vteri dolores, lienis duritiē, iecinorisque obstructions tollit. Stranguria & difficultati vrinae auxiliatur. Capiti admodum calefacit, eiusque humiditates exiccat. Hinc est quòd recentiores tantisper eius vsum in frigidis cerebri & nervorum morbis, apoplexia, paralyssi, & similibus commendent.

Sequentia duo Capita, quoniam opere ad finem iam serè perducto, in exemplari Germanico

manico circa finē serò inuenimus, & nos ea suo loco reponere non potuimus. Bono igitur animo candide lector, hæc in fine accipe.

DE DIGITALI. CAP.

CCCXLIII.

NOMINA.

Quòd appellatione tum Græca tum Latina herba hæc hodie destituta sit, nulla alia de causa factum existimamus, quàm quòd veteribus incognita fuerit. Nos pulchritudine eius illecti, ἀνὸν μὴον esse diutius non sumus passi. Appellauimus autem Digitalem, alludentes ad Germanicam nomenclaturā Fingerhut, sic enim Germani hanc stirpem nominant, à florum similitudine, quæ digitale pulchrè referunt ac exprimunt. Hac appellatione utemur, donec nos vel alij meliorem inuenerint.

Digitalis.

GENERA.

Quum est generum. Vna enim purpureos obtinet flores, ideòque Digitalem purpuream appellauimus. Germanis Brauner Fingerhut dicitur. Altera luteos habet flores, ob id Digitalis lutea dicta nobis est. Germanis Geeler Fingerhut nominatur. In aliis per omnia similes sunt.

Digitalis
purpurea.
Digitalis
lutea.

FORMA.

Herba est cubitalis, foliis latis & oblongis, Plā

PP ij tagini

PLANTARVM HISTORIAE

tagini non dissimilibus, in extremitatibus serratis, floribus à lateribus caulis ordine dependentibus digitalis formam referentibus, purpureis aut luteis. Quibus decidentibus, semen in calycibus latè & oblongū profert. Radix illi est exigua & capillata.

LOCVS.

Nascitur in montibus, vmbrosis & saxosis locis.

TEMPVS.

Floret Iulio potissimum mense, atque subinde cadentibus floribus semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Impensè amara est herba, perinde atque Gētiana, vt hoc nomine calidam & siccam esse evidētissimum sit.

VIRE S.

Hac herba haud dubiè quum opus est extenuatione, abstersione, purgatione, & obstructionis liberatione efficax admodum esse solet. Nam, vt testatur Galenus libro quartode simplici. medic. fasc. cult. cap. xvij. amari sapor es abstergunt, expurgāt, & quæ in venis est, crassitiem incidunt. Quamobrem menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, & ex thorace & pulmone pus educere. Quid multa? potest hac herba ferè omnia quæ Gentiana, cuius vires suo in loco inuenient studiosi.

DE OCIMASTRO. CAP.

CCCXLIII.

NOMINA.

Quipoedēs Græcis, Ocimastrum Latinis dicitur. Officinis inusitatum atque incognitū. Germanis Vuild Basilg, (Gallis Basilic saulua=ge) appellatur, Ocimoides vero Græcis haud alia Ocimois ratione dictum est, quàm quòd Ocimo, suis potissimè des cur dium foliis simile sit. Ocimastrum autem Latini, Etum. quasi sylvestre Ocimum appellauerunt. Nam sic i=Ocima=psum vocare videtur libro vigesimo capite decimo=strum, Syl=tertio Plinius. uestre Oci=

FORMA.

mum.

Folia habet Ocimo similia, ramulos dodrantales, eosdemq; hirsutos, siliquas Hyoscyamo persimiles, semine nigro plenas, Melanthio seu Nigellæ simili (legendum enim in Dioscoride τοῖνός τες, & nō Dioscori=τοῖνός τες, vt habent aliqua exemplaria.) Radix dislocus illi est gracilis & inutilis. Ex qua quidem delineat= emendat= tione omnibus palàm fit, stirpem, cuius effigiem at=tus. que picturā damus, esse Ocimastrum: siquidē folia fert Ocimi, ramulos palmares & quadratos (quod Dioscorides omisit) hirsutos, flores purpureos (quos itidem Dioscorides non explicauit) forma Ocimi floribus similes, qui tamen colore, qui illis candidus est, distant: decidētibus floribus siliquas Hyoscyamo similes, seminis nigri, Melanthio similis, plenas ostendit. Radice etiam nititur tenui & superuacua. His omnibus etiam accedit odor., qui plane

PLANTARVM HISTORIAE

Ocimum referre videtur: ita vt nemo dubitare debeat, quin hæc herba verum sit *Ocimastrum*, potissimum cum illi Dioscoridis descriptio sic quadret, vt nulla prorsus nota reclamare videatur.

LOCVS.

Nascitur arenosis in locis. Copiosè autem iuxta *Nirtingam* ad *Nicerum* oppidulum prouenit, vbi id ipsum primum vidi, ac reperi: aliàs, quòd sciam mihi nunquam visum.

TEMPVS.

Floret in fine Septembris & Octobri mense, atque simul in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Ocimastrum, maximè eius semen, est calida & sicca temperaturæ, quod sapor etiam satis ostendit, qui cum modica adstrictione amarus est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen *Ocimastri* in vino potum, medetur viperarum & aliarum serpentium morsibus. *Ischiadicis* datur cum *myrrha* & *pipere*.

EX GALENO.

Ocimoides quidem *philiterium* cognominant. *Radix* superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est.

EX PLINIO.

Syluestri *ocimo* vis efficacior ad eadem omnia, quæ *satiuo*. Peculiaris ad vitia quæ vomitionibus crebris

crebris contrahuntur. Vomicisq; vulua, contraq; be-
stiarum morsus radix in vino est efficacissima.

APPENDIX.

Vel sylvestre Plinij Ocimum diuersum est ab
Ocimaastro, aut in verbis eiusdem iam productis,
error subest. Quum enim Ocimaastri radix, Dios-
coridis & Galeni testimonio, inutilis sit, non rectè
à Plinio dicitur quòd eius radix in vino contra be-
stiarum morsus efficacissima sit: sed hoc potius, Dios-
coride teste, semini tribuendum erit. Quare in Pli-
nio legendum, contraque bestiarum morsus semen
in vino est efficacissimum. Quam sanè lectionem

Plinij lo-
cus emen-
datur.

Dioscoridis autoritas abundè confirmat, qui
Ocimaastri semen cum vino potum, con-
tra viperarum & aliorum re-
ptilium ictus efficax
esse tradit.

COMMENTARIORVM DE
Stirpium Historia finis.

PP iij

EXPLI

EXPLICATIO QVA-

R VNDAM VOCVM TOTO

hoc opere passim occurrentium, in quibus assequendis non admodum peritus lector hære-
re possit.

Acetabula.



Cetabula ab aceto denominata videtur: quanuis alij ab accipiendo dictum putent, atque hinc est quod scribant acceptabulum: vasculaque fuerunt orbiculata, concava, sine marginis latitudine, quæ aceto plena ad intinctus ponebatur. Dehinc vox ad omnia alia quæ similem cõcavitatem habent, trās-lata fuit. Primumq; sic cõcavas partes in polyporū flagellis, quibus id animal nititur, & velut adminiculis fultū exurgit, nominaverūt. Trās-lata etiam vox ad fœminarū locos, vocaueruntq; acetabula venarū arteriarumq; ora, quæ in uterū feruntur hiātia. Translulerunt postremo etiā hoc nomen ad herbam, quam eā ob causam Acetabulū dixerūt, quod folia acetabulo similia in orbem circumacta, sensimq; sic vt sensum fallāt, in cõcavam lacunā descendētia habeat, & γτυληδόνες Græcè nominantur.

Acinus.

Acinus nō tātūm grana interna vuæ, quemadmodū quidam existimant, sed totum fructū, qui ex
succo,

succo, & parte quæ veluti caro est, & ex vinaceis,
 & ambiente forinsecus cute cõstat, significat. Testis
 Galen. qui lib. 2. de facultatibus alimētorū sic scri-
 ptum reliquit: Acini corpus ex quatuor partibus cõ-
 stat, ex ea scilicet quæ eius veluti caro est: exq; hu-
 more per eam disperso, vnde vinū: præterea ex nu-
 cleo, atque eo quod omnia hæc foris circūcludit mē-
 branoso tegumento. ῥᾶξ Græcis dicitur. Aculei, Aculei.
 quæcunque duriuscula in cuspidem turbinata pū-
 ctionē infligūt spiculatorū modo, nominantur. Acus Acus.
 purgamentū frumenti, leuissimū scilicet in eo quod
 ventilabris extra aream iaculatur. Adnata, vel Adnata.
 Adnascentia, siue Appēdices, ramuli dicuntur quos
 caulis nonnunquam ex se mittit, quasi novā adsci-
 titiamq; prolem. Sic autem vocantur, quod quasi
 cauli adnascantur & superaccedāt. Græci πᾶρ-
 φυᾶδας, quod circū caulem erūpentes accrescāt,
 appellarunt. Alæ, caui inter caule, & ramulos an Alæ.
 fractus, vnde sinuatim nova proles egreditur, facta
 ab humanis alis trāslatione, dicuntur. Græci μα-
 ρᾶδας vocant. Alabastra sunt seruandis odoribus Alabastra
 ex solidissima & frigidissima materia facta
 vascula, sic dicta græcis, quod ob læuorem suū capi
 tenerique manibus non faciliè possent, lubricaq; dila-
 berentur. Hinc alabastrites lapis quē nunc Alaba-
 strū vocant, quoniā ex eo alabastra fierent, denomi-
 natus est. Aluta pellis seu coriū dicitur postquam Aluta.
 ad

ad vsum & opus calceorum & aliarũ rerũ concinnatum est. Hinc Alutamen, siue alutamentũ, opus ex cõcinnatis pellibus factum. Et Alutarj, pellium

Alsiosa. & coriorum concinnatores. Alsiosa non dicuntur ea quæ frigidis locis gaudent, sed cõtrà potius quæ

Amuleta. algores ferre non possunt. Amuleta remedia sunt præsentanea aduersus venena & fascinationes, quæ quidã in annulis, & è collo suspensa gestare solent,

Amphora Amphora mensura est quæ capit duas vinas, seu

Apices. octo congios. Apices quæ in medio calycis seu folliculi quo flos clauditur, erumpunt, stamina sunt, quæ veluti filamẽta ab intimo floris sinu profiliunt. Habent apices sæpius in summo quidpiam crassiusculum,

Arbor. à qua similitudine nomen acceperunt. Arbor est quicquid à radice statim simplici candice, brachiatum ramis, surculosum, dissolutumq; contra-

Articuli. max assurgit. Articuli sunt partes quæ in nodos quosdã intumescunt, à quibus persæperamuli pdeunt.

Asparagi. Asparagi quæ primũ in lucẽ produnt olerũ germina, priusquã in folia explicentur, recentissimiq;

Arista. turiones qui edẽdo sunt, dicuntur. Arista, est quæ vt acus tenuis, longa, cminet à gluma. In summa ariste quasi apices & cornua sunt spicarum.

Bacca. **B**acca sunt fetus minutiores herbarum, fruticum, arborumve, qui diffusus variusq; enascuntur: vt sunt partus lauri. Atque in hoc ab acinis

Brachia. differunt, quod ij densius proueniant. Brachia sunt plantarum,

plantarum, præcipuè autem arborum ramuli, quòd
instar brachiorum in homine extendantur. Bulbi.
bi radices sunt rotundæ tunicatæ, quales sunt hya-
cynthi, asphodeli, & colchici.

Cachryes sunt oblonga panicularum modò nu Cachryes
camenta, quæ squamatim compacta propens
dent è ramis. Crescunt hyeme, vere dehiscunt in fla
uescentes squamulas, & folio prodeunte, decidunt:
qualia in abiete, picca, & aliis permultis videre li
cet. Plinius pilulas nominat. Calathus est rectus Pilula.
turbo, hoc est, id quod ex angustis in latitudinem Calathus
se diffundit. Calathi effigiem planè referunt flores
liliorum. Calyx folliculus est, quo flos primum, Calyx.
mox seminis factus clauditur. Capillamenta Capilla
particulæ teretes & oblongæ in capilli modum ex- menta.
tenuatæ dicuntur. Caput est id quod sursum de- Caput.
orsumve in globum extuberat, aut in orbem glome
ratur. Si magnitudine cesserit, capitulum nomina
tur. Extremâ tamen vitis partè caput etiâ vocant.
id est, ultimum & productissimum flagellum. Ca Capreoli.
preoli sunt coliculi intorti veluti cincinni quidâ in
ipsis pampinis tenerioribus apparètes, quibus vitis
veluti manibus quibusdam adminicula complecti
tur, ac comprehendit. Ii enim ut vitem teneant, ser
punt ad locum capiendum: unde à capiendo capres
oli dicti sunt. Caro dicitur id quod cortici subest. Caro.
Caudex dicitur in arboribus & fruticibus, id quod Caudex.
à radice

- Caulis.** à radice supra terram simplex assurgit, & in quod à radice fertur alimonia. Caulis verò idem quod supra solum simplex prosilit in herbis nominatur. Sic utique caudex ad frutices & arbores, caulis ad herbas duntaxat pertinet. **Cervix.** Cervix est pars illa à capitis radicibus prodiens prælonga, teresque: sic dicta, quòd in colli speciem figuretur. **Cyathus.** Cyathus Græcis ἀπὸ τοῦ χύειν, id est, à fundendo dictus, est duodecima pars sextarii. **Cyma.** Cyma herbarum delicatiores tenerioresque coliculi, quos à prima germinatione, & in summa stirpe proferunt. Nam cum vernum tempus appetit, primo quoque foliorum pullulatu, præclusis adhuc florum calycibus, quosdam quasi turiones, olus subministrat, in quibus floris primum, mox seminis foetus concluditur. **Cirri.** Cirri sunt capillamenta quæ contorta crispantur. **Clavicula.** Clavicula coliculi sunt, quibus quasimanebus proreptans vitis adminicula comprehendit. **Coma.** Coma est quicquid hilari venustate criniū modo, summa ramorum vel coliculorū exornat. **Congius.** Congius, qui Græcè χοῦς dicitur, sex sextariorum capax mensura est. Eadem etiam congiarium appellatur. **Conus.** Conus Græcis, vel pyramus, est inuersus turbo, hoc est, id quod ex latitudine in arctius protrahitur ac fastigiatur. Cui calathus, ut diximus, contrarius existit. **Cor.** Cor est quod in medio ligni residet, & tertium à cortice continetur, velut in ossibus

bus medulla. Ab aliis *matrix*, à nonnullis *medulla Matrix* nominatur. *Corymbus* est *hederarum* vna depen- *Corym-*
dentibus *acinis* coacta. Transfertur tamen ad mul *bus*.
tos herbarum fructus. *Cortex* pars est *ultima* à *Cortex*.
subiecto corpore separabilis, veluti *crusta* quaedam
ad tegendum data. *Cotyle* vox est in *Gracia na-* *Cotyle*.
ta, nam *Romani* *heminae* vocabulo vtuntur. Vide
in dictione *Hemina.* *Crenæ* sunt quaedam in ex- *Crenæ*.
tremis oris incisurae, à quibus *crenata* *herbarum fo-*
lia vocantur, hoc est, *serrata*, per ambitumq; secta.

Cubitus est *mensura* quanta patet à *cubiti flexu-* *Cubitus*.
ra vsque ad summum medium *digitū*, quæ *sex pal-*
mis, *digitis* v^e *vigintiquatuor* constat. *Culmus* fru *Culmus*.
menti calamus est, qui *spicam* sustinet.

D *Decussis* antiquis ad *X* *litera figuram* fiebat, *Decussis*.
quæ apud *Latinos* *decem* significat. Hinc *de-*
cussari est in *speciem literæ X* diduci.

Dilutum dicitur, quod est *mixtum*: vnde *vinum Dilutum*.
aqua mixtum dicitur *dilutum*. *Dilutum* verò *sub-*
stantium factum, est id *liquidum*, in quo aliquid
certo tempore *maceratum* & *infusum* fuit: vt si in
vas vini appositū *absinthiū* fuerit, deinde post in-
teriectū tempus *abstractū*, id *vinum absinthij* *dilu-*
tum vocatur. *Dodrans* est *mensura duodenūm di-*
gitorum. Aliàs *palmus maior* *Latinis*, & *Græcis* *Dodrans*.
αὐθαμὴ dicitur. *Dodrantalis* itaque *cauliculus*
vocatur, qui *longitudine duodenos* æquat *digitos*.

Echinus

Echinus. **E**chinus est quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumen fuerit: sic dictus quòd globoso spinarum agmine maris herinaceum mentiatur.

Fibræ. **F**ibræ capillamentis germana sunt, quæ herbarum arborumq; minutiores sunt radiculæ, in quas velut extremas, crassiores effusa sparguntur.

Fimbriæ. Fimbriæ sunt vestimenti extremitates, à quibus & fimbriata folia dicuntur, quæ in ambitu in quasdam

Flagella. fimbrias exeunt. Flagella dicuntur cymæ arborum & ipsarum summæ partes, quæ ad cuiusque venti flatum mouentur: vnde etiam nomen traxerunt ab eo quòd flatibus petantur. Flagella etiam sunt vitium rami oblongiores, & productiores, aliis tamen minores, ab ipsis brachiis sursum ascēden-

Folliculus tes: dicta flabella prius, à venti flatu scilicet. Folliculus theca rei cuiuslibet, quæ granum vel semen continet inuolutum. Sic mēbranosa cutis acini fol-

Fructus. liculus dicitur. Fructus, quod carne & semine compactum est. Frequenter tamen pro eo, quod in uolucro perinde quasi carne & semine coactum

Frutex. est, accipi solet. Frutex est quod à radice caudice multiplici, ramosumq; sese attollit, ut rubus. Frons

Frons. interdum pro ramo ponitur. Propriè tamen dicitur id quod ipse ramus circumquaque producit, multa interdum folia habens, & nonnihil corticis, ac veluti cauliculi.

Gemma in vite idem est quod oculus, quia ve- Gemma.
 lutus ocellus quidam conspicuus, aut gemma
 quædam excellens conspici possit, cum primum è
 vite prodit, aut sarmento. Hæc incunte vere sese os-
 tendit, & ab ea primum flos, deinde fructus pro-
 dit tam in ipsis vitibus, quam arboribus. Geniculi.
 Geniculi siue genicula sunt nodi qui in herbis, aut legu-
 minibus, aut etiam sub fruticibus apparent. Sic ge-
 niculatae radices nominantur, quæ nodis quibusdam
 interstinctæ protuberant, rotunda & leuiter capi-
 tulata. Gluma est folliculus grani quod in spica Gluma.
 continetur, vel grani theca. Grossi appellantur Grossi.
 fici, quæ non maturescunt. Priuatim tamen in bife-
 ra sico eas intelligunt, quæ per messes maturantur,
 Has grossulos Græci vocant ὀλύνθους.

Hemina Romana vox est, ex Græco quidem Hemina.
 ἡμισυ, quod dimidia sextarii pars sit, deri-
 uata. Græcis κοτύλη nominatur. Caput uncias de-
 cem mensurales, ut copiose in annotationibus no-
 stris in quartum de Tuenda sanitate librum Galea-
 ni demonstrauimus. Herba est quod à radice fo-
 liatum, sine caudice prouenit, sæpiusque semen in Herba.
 caule fert.

Internodium, quod inter artus vel genicula me- Internod-
 dium intercedit, dici consuevit. Interuenium, dium.
 quod inter venas intercipitur. Iuba est arundina- Interue-
 cea coma effusa, qualis in milio est: metaphora de- nium.
 sumpta Iuba.

sumpta à iubis, hoc est crinibus animalium à collo pendentibus. Iulus tam Græcis quàm Latinis est quod in corylo compactili callo racematim cohaeret, & veluti praelongus vermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructum præcedit.

Lachryma. **L**achryma est is humor, qui statim defecto caudice, vel ramo, aut tantum ipso ligno, profilit,

Lanugo. & apparet. Lanugo in herbis atque arboribus lanata quadam est hirsuties, qua folia, coliculi que ca-

Liber. nesciunt. Liber pars corticis interior quæ ligno pressius adhæret. Is quibus scribimus libris nomen de-

Libra. dit. Libra Romana capit uncias duodecim men-

Ligula. surales. Ligula quarta pars cyathi dicitur, hoc

Locula- est, semuncia, demptis scilicet duobus scriptulis.

menta. Loculamenta sunt seminum involucra, quæ velu-

Lomentū. ti parvæ capsulæ ea recludunt. Lomentum faba-

Lacinia. rum farina est. Lacinia partes sunt extremæ particulatim decoris causa concisæ, orarumq; summæ rum casuræ. Inde folia membratim per flexuras digesta, vel natiuis segminibus discreta, laciniata vocitantur. Sunt tamen qui lacinosum pro sinuoso videntur.

Malicoriū **M**alicorium est mali punici putamen. **Malleolus** **M**alleolus novellus est palmes innatus prioris anni flagello, cognominatus à similitudine rei, quod in ea parte qua deceditur ex vetere sarmento, prominens utrinq; malleoli speciem præbet. Vel, quod capilla-

capillatus utrinque, & surculatus solebat feri. *Ma* Matrix.
trix, vide in dictione Cor. *Medulla*, vide ibi- *Medulla*.
dem. Mucro est acumen in quod pars quacunque *Mucro*.
 desinit. Sic foliorum multorum, siliquarum quarun-
 dam, & spinarum omnium extrema in mucronem
 acuminantur. Muscus est id quod in ipsa corticis *Muscus*,
 superficie quarundam arborum lanuginosum appa-
 ret, veluti cani quidam ipsarum arborum villi. In
 quibusdam etiam quedam ipsarum arborum qua
 visitur villosa flosculorum congeries, quæ quod con-
 ferta sit densaque florescat, muscus dici consuevit:
 ut in Ligustro, & complurib. aliis. Muscaria sunt *Muscaria*
 in orbem radiata herbarum coma, cacuminaq; in fas-
 ces coacta: à flabii similitudine, cuius ventilatus
 musca conuiuiis abiguntur, dicta.

Vcamenta dicuntur ea quæ callo squama- *Nucamen*
N tim compactili pendent è ramis nucum, ro- *ta*.
 borum, picearum: sic dicta, quod sint quasi
 quedam natura rudimenta, pincam nucem faceo
 re condiscantis.

Oculus gemmula illa in herbarum surculis, pri- *Oculus*.
 mum germinationis argumentum dicitur.

Alma dicitur manus vitis flagellum, unde *Palma*.

P nascuntur vna. Palmus veteribus duplex *Palmus*.
 fuit. Minor digitorum quatuor habebatur,
 Græcis τεταλυσὴς vocatus. Maior digitorum duos
 decim, αἰθαμή Græcis dictus. Palmites dicun- *Palmites*.
 tur

- tur qui è stirpibus ac surculis quotannis prodeunt: sic nominata, quòd in modum humanarum palmarum virgulas quasi digitos edant. Pampini sunt frondentium ramusculorum comæ coliculiq; fructû fœuentes, & ab impendente vindicantes iniuria. Hinc pampinare, est pampinos superfluos ex vinea detrahere, posteaquàm fronduit. Panicula dici potest quicquid sublonga vel subrotûdæ effigie tumet vt quæ pendet è piccarum ramis. Lanosam quoque comam in milio, panico, arundine, & qualem in arvis complures herbae, & in palustribus iunci gerunt, Latini paniculam dixere. Pappus tam Græcis quàm Latinis est lanugo ex floribus aut fructibus decidua. Sic etiam lanosi quidam villi, qui deflorescentibus aliquot herbis remanent, & postmodum in auras evanescent, pappi sunt, vt in senecione, soncho, & plerisque aliis fit. Pediculus, siue quod idem habetur, Petiolus, id est quo folium, fructus, aut flos dependet. Pedamenta quibus stat recta vinea dicuntur, hoc est, quibus veluti pedibus nititur. Nominantur etiam à quibusdam pedamina. Pilula, vide Cachrys. Pyramis, vide Conus. Propago. Propago dicitur vitis vetula depressa, atque in terram per inflexos arcus submersa, vt ex vna plures emergant. Pulpa in arboribus est, quod nos in animalium corporibus musculû appellamus. Pulvinus est quod inter sulcos eminulum protumet, sic dictus

dictus quòd quandam referat puluinorum in quibus sedemus, similitudinem.

Q Vincuncialis figura, eius figure quæ decussim antiquis significabat, media est. Fiebat verò decussis ad X literæ formam, quæ quidem apud Latinos decem significat. Atque hæc si per mediū secetur, remanebit V figura, quæ quinarium numerum, atque adeo quincuncem demonstrat. Sed hæc quidem multoties tum superius, tum etiā inferius multiplicata, figurā facit, quæ quincuncialis appellatur. Talem planè Trichomanis cauliculi efficiunt.

Acemus pro vva accipitur. Neque tantum Racemus

R ipsius vitis est, sed etiam hedera, & aliarum herbarum, aut fruticum vuas quasdam producentium. Dicitur etiam ramosum id, quo dependunt acini. Rami sunt, qui in caule fissi multiplices sparguntur.

Armenta prælongæ sunt vitium virgulæ, in Sarmenta

S quas vitis luxurians spargitur: hoc est, vitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tãdum sunt in ipsa vite, quàm dū execta, & exëpta sunt. Scapus est caulis qui in styli modū sursum proreptat, aut in altū fertur, ducta à colūnaribus scapis similitudine. Scopus ramosum id, quo dependunt acini. Sesqui vocabulum cū aliqua mensura vel modi, vel numeri, vel tēporis collocatum,

Q Q ü non

- non integrum modò id cui iungitur explicat, sed integrum & semis. Sic sesquilibra, librari vnā & semis significat. Sesquimensis, integrum mēsem.
- Sextarius** cū dimidio. Sextarius capit vncias viginti men-
- Siliqua.** furales. Siliqua tegumentum est, quo vel grana leguminum, vel herbarum semina concluduntur. Nam non modò legumina, sed & complures quo-
- Sinus.** que & herbe & frutices siliquas proferunt. Si-
- Spica.** nus alarū cani sunt. Spica est quod culmus ex- tulit. Hāc antiquitus rustici speciem vocabant, & aspe videtur nominata: eam enim quòd sperant fo- re, serunt. Tria verò continet, granum, glumam, & aristam. Spica mutica est, quæ non habet ari-
- Spongiæ.** stam. Et mutica, quasi mutila nominatur. Spon- gias antiqui olitores vocarunt radículas illigatas & connexas. Hinc Asparagi sativi & altilis ra- dices multis irretitæ capillamentis coalescentes, & inter se implicatæ, ac quasi in vnitatem coeuntes spongiolæ, & spongiæ spongiosæq; appellantur.
- Stamina.** Stamina sunt qui in medio calycis erumpūt api- ces: sic dicta, quòd veluti filamenta ab intimo floris
- Stipulæ.** sinu profiliant. Stipulæ folia sunt culmū ambien-
- Striæ.** tia. Striæ partes sunt quædam quæ protuberant et eminet. Hinc striatus caulis, qui huiusmodi striis est præditus, aut striaturis exasperatus. Strigiles etiam, si Vitruuius credimus, appellantur. Stolo-
- Stolones.** nes appellantur coliculorum soboles, inutilisque è radici-

radicibus fruticatio. Suffrutices sunt quæ com- Suffrutici.
 pluribus ramulis furculisquæ lignosis scatent, sed mi- ces.
 nutis constant foliis. Surculus, quod ex ramis sim Surculus.
 plex ac individuum oritur, estq; velut germẽ quod-
 dam ex ipso trunco vel caudice productum.

Thyrsus est caulis, idque nomen sibi vendica- Thyrsus.
 nit, quod virgulæ in modum, vel teli rectitu-
 dinem consurgat. Tomentum Latinis omne id Tomentum.
 quo culcitra ad molliorem & calidiorẽ quietem
 infarciuntur, dicitur, siue id lana sit siue pluma, si-
 ue quod voluerit aliquis, excipiendis molliter &
 & fouẽdis calore corporibus nostris aptum. Sic Dia-
 etamni folia, quod mollia videntur esse, tomentis-
 tia & lanca dicuntur à Dioscoride, hoc est, γνα-
 φαλοειδῆ. Tori prominentes partium calli, Tori.
 & in se pulparum modo collecti nominantur. Græ-
 ci κονδύλης vocant. Hinc κονδύλωδης, id est,
 torosus, quod idem Latinis est, ac nodi formam præ-
 se ferens. Triens quatuor cyathi. Tunica est Triens.
 tenuis cortex & veluti mēbranaceus, quo vel ar- Tunica.
 bor, vel radix inuestitur. Sic caepe folliculis est tu-
 nicatum. Turbo dicitur quicquid ex acumine tē- Turbo.
 dēs in amplius spaciatur. Hinc Turbinatum, quod
 ex angusto continenter in latius prodit. Sic turbi-
 nata conspicitur pyrorum forma. Per multa etiam
 herbarum folia in mucronem turbinantur.

Turiones sunt teneritates summitatum ipsarum Turiones.

QQ iij arborum,

Topiariū. arborum, quæ singulis annis crescunt. Topiarium opus est quod ex arbore, frutice, vel herba ad decorem componitur, in testudines aut cameras fornicatum. Hinc Topiaria dici merentur arbores vel herba quæ nimirum huic operi, quod flexiles sunt, ac suo lentore sequaces, accommodantur.

Vascula. **V**ascula, seminum inuolucra sunt. Venæ sunt
Venæ. quæ in plantarum foliis apparent, & ramus
Vermiculatus & humorem habentes. Vermiculatum quod
latum. rose modo, quasi purpurisso, rutilat, dicitur. Ver-
Verticillū ticillum florum vel foliorum ambitus, qui coliculus
 aut ramulos herbarū coronat, existit: ab instrumenti muliebris similitudine dictū, quod fuso vertendi gratia solitum est adhiberi. **Vinacei,** grana sunt acinorum, γίγας & Græcis nominantur, quæ pressis vuis cum folliculo abiiciuntur.

Virga. Virga est quæ ex radicibus, aut caudicis lateribus exit. A nonnullis virgæ appellatæ sunt soboles.

Virgultū. Virgultum, surculus is est, qui terræ committitur, ut in arborem insurgat.

Viticula. Viticulae non palmitibus aut sarmenta sunt, sed flagella quæ vitis modo reptantia longè latèque vagantur, ac vicinos frutices nacta sic intricat eos, ut iis perinde quasi pedamentibus abutantur: vel scandentia suis irretiunt clauiculis, quibus quasi digitis hærent, quales in cucumeribus, cucurbitis, & plerisque aliis inveniuntur.

Umbella. Umbella est floris seminisve pedamentum, in
 plures

plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem orti in latius continuo radiantur, singulique vel florem, vel semen sustinent, in orbem circumactum. Græci hunc floris habitum οὐλό-
διον, Latini verò quoniam umbellæ, qua mulieres vultum vindicant à sole, & æstum arcent, circinatam effigiem gerit, umbellā dixerunt. Umbilicus Umbilicus id in pomis est, quod in eis medium vel prominet, cuius vel conditur. Ungues in rosis & foliatis floribus Ungues intellexerunt veteres, imas suorum foliorum partes, quibus in capite suo coherent, decoloresq; dependent. Vel breuius: Unguis infima pars foliorum roseæ alba appellatur.

ERRATA.

- Fo. 2. pag. 2. vers. penult. lege in hunc modum, hypochondriis iecinori &c.
- Fo. 3. pag. 1. vers. 13. lege, Eadem potest præstare cum Sapa aut lenticula.
- Fo. 5. pag. 1. vers. 19. lege, Plinius lib. 21. cap. 21. Marem quidem campestre &c. Ibidem vers 22. legendum, eiusdem nomenclaturæ. expungenda itaque virgula post eiusdem. Ibidem vers. 25. lege, quod masculinum appellamus.
- Fo. 8. pag. 1. vers. 10. Ex Macro Aemilio.
- Fo. 11. pag. 1. vers. 11. lege, de Acoro vero affirmare.
- Fo. 12. pag. 1. vers. 22. lege, tubercula facultatem obtinet.
- Fo. 22. pag. 1. vers. 4. Sic legendum est, acris, ut piper, admodum sit.
- Fo. 25. pag. 2. vers. 15. cum axungia.
- Fo. 30. pag. 1. vers. 11. mollib. dūtaxat spinis prædita.
- Fo. 57. pag. 2. vers. 21. ἑρυνία
- Fo. 63. pag. 2. vers. 25. lege, κνίδι.
- Fo. 81. pag. 2. vers. 21. Ieiuno ieiunum.
- Fo. 99. pag. 2. vers. 12. ῥιτίον.
- Fo. 106. pag. 2. vers. 7. γλυκύρεσσα.
- Fo. 109. pag. 2. vers. 9. aspergula minor.
- Fo. 219 pag. 1. vers. 20. Hirundinariam.
- Fo. 392. pag. 2. minus contra minores.
- Fo. 395. pag. 1. vers. 15. suffitur.

Barba caprina.	101	Cardiaca.	216
Batrachium. 93. Beta.	434	Caron, vel carenum.	217
Beta sylvestris.	255	Caryophyllata.	210
Bellis siue bellius.	87	Cassutha.	188
Betonica. 190. &.	191	Casta herba.	113
Blattaria.	102	Castanea.	205
Blitum siue blitus.	99	Centummorbia.	219
Botrys. 101. Bovis lingua.	85	Cētūculum aut cētuncula	
Brassica sativa.	225	ris herba.	121
Bubula lingua.	85	Capa. 234. Cerasus.	232
Buglossum.	ibid.	Chamaecyparissus.	471
Buglossum magnum.	184	Chamaedaphne.	195
Bulbus sylvestris. 97. et 193		Chamaleon albus.	475
Buphthalmum.	86	Chamamelon.	16
Buxus.	346	Chelidonium maius.	467

C

C Alamintha.	237	Chelidonium minus.	468
C Callitrichum.	48	Chrysanthemum.	474
C Caltha vel calthula.	209	Cicer.	146
Campanula.	236	Cicerbita.	362
Canina brassica.	242	Cicuta. 221. Cinara.	426
Canina malus.	288	Cinannalis.	48
Cānabis. 215. Capillaris.		Citrago.	269
429 Capsella.	165	Clematis Daphnoides.	195
Carduus.	426	Enicus & Cnecus.	223
Carduus veneris.	122	Enicus sylvestris.	73
Carduus suarius.	478	Colubrina.	128
Carduus niger.	477	Columbaris seu columbina.	
		319 Colutea.	243
		bb Colus	

<i>Colus rustica.</i>	73	<i>Dracunculus maior.</i>	128
<i>Coma.</i>	443	<i>Dulcis radix.</i>	106
<i>Consolida media.</i>	215	E	
<i>Consolida minor.</i>	87	E <i>Biscus.</i>	11
<i>Convolvulus.</i>	142	E <i>Ebulus.</i>	37
<i>Corion seu Coriannon.</i>	185	<i>Echiū. 148. Eleniū. 133</i>	
<i>Corona regia.</i>	286	<i>Elleborus albus.</i>	149
<i>Corona veneris.</i>	387	<i>Elleborus niger adulteri-</i>	
<i>Cotonea malus.</i>	203	<i>nus.</i>	151
<i>Crambe.</i>	225	<i>Ephemerum.</i>	131
<i>Crista gallinacea.</i>	320	<i>Equinalis herba.</i>	174
<i>Crocus.</i>	241	<i>Equisetum ibidem</i>	
<i>Cruciata.</i>	228	<i>Erica. 141. Eruca. 144</i>	
<i>Cucumis, seu cucumer</i>	374	<i>Eruum.</i>	319
<i>Cucumis anguinus.</i>	378	<i>Eryngium.</i>	161
<i>Cucurbita.</i>	200	<i>Eupatorium.</i>	134
<i>Cucurbita sylvestris</i>	202	<i>Eupatorium adulterinum.</i>	
<i>Cunila.</i>	164	145	
<i>Cyanus.</i>	233	F	
<i>Cydonia.</i>	203	F <i>Aba.</i>	213
<i>Cynia.</i>	242	F <i>Farrago.</i>	413
<i>Cynosorchis.</i>	303	<i>Farsaria.</i>	84
<i>Cyperus & Cipirus.</i>	248	<i>Febrifuga.</i>	211
D		<i>Fel terra.</i>	i bidem
D <i>Amassonium.</i>	24	<i>Ficus sativa.</i>	402
D <i>Daphnoides.</i>	124	<i>Filicula.</i>	320
<i>Daucus</i>	127	<i>Filix.</i>	322
<i>Dolichi.</i>	281	<i>Flos frumentorum.</i>	234
		<i>Fœnis</i>	

<i>Fœniculum.</i>	271	<i>Hieracium.</i>	173
<i>Fœnumgræcum.</i>	430	<i>Hierobotane.</i>	320
<i>Fontalis.</i>	351	<i>Hirci barba.</i>	443
<i>Fragaria.</i>	458	<i>Hirudinaria.</i>	219
<i>Fumaria.</i>	182	<i>Hordeum.</i>	239
<i>Fusus agrestis.</i>	73	<i>Hordeum distichū.</i>	ibid.

G

G <i>Alcopsis.</i>	108	<i>Hordeum polystichum</i>	
G <i>Gallion.</i>	109	<i>Ibidem.</i>	
<i>Geminalis.</i>	308	<i>Hyacinthus.</i>	451
<i>Genista.</i>	120	<i>Hydropiper.</i>	455
<i>Genistella.</i>	121	<i>Hyoscyamus.</i>	449
<i>Gentiana.</i>	III	<i>Hypericum.</i>	448
<i>Geranium.</i>	115	<i>Hyssopus.</i>	454

I

<i>Gingidium.</i>	119.	I <i>Biga.</i>	478
<i>Gith.</i>	272	I <i>Ibiscus.</i>	II
<i>Gossipium.</i>	314	<i>Illecebra.</i>	432
<i>Gramen.</i>	80	<i>Inguinalis.</i>	79

H

H <i>Alicacabum.</i>	368	<i>Intubus.</i>	364
H <i>Hedera.</i>	229	<i>Inula.</i>	133
<i>Hedera terrestris.</i>	472	<i>Iouis glans.</i>	205
<i>Hedypnois.</i>	364	<i>Irion.</i>	141
<i>Helxine.</i>	152	<i>Iris.</i>	171
<i>Helxine Cissampelos.</i>	142	<i>Iris sylvestris.</i>	131
<i>Hemionitis.</i>	160	<i>Isatis.</i>	179
<i>Hepatorium.</i>	134	<i>Iuglans.</i>	207
<i>Hiberis.</i>	176	<i>Iuniperus.</i>	45
		<i>Iunonis rosa.</i>	198

bb ij

La

L

L abrum veneris.	122
Lactaria herba.	438
Lactuca.	162
Lactuca caprina, aut marina.	438
Lactuca syluatica.	173
Lamium.	256
Lanaria herba.	419
Larix seu Larex.	268
Lascer, seu Laserpitiū.	409
Lathyrus.	249
Lauer.	389
Laurus alexandrina, aut Idea.	130
Lens siue lenticula.	462
Lepidon.	176. & 263
Leporinus pes.	267
Leucoion Dioscoridis.	150
Leucoio Theophrasti.	264
Lolium.	75
Lichen.	258
Ligustrum.	261
Lilium.	198
Limonion.	255
Lingua canina.	222
Lingua serpentina.	312
Linum.	257

Lithospermum.	265
Lunaria minor.	262
Lupinus satiuus.	167
Lupus salictarius vel repti- tius.	95
Lychnitis.	457
Lycotum.	52
Lysimachia.	266

M

M Aiorana.	360
Mala insana.	290
Malua.	274
Malus Cotonea.	203
Marrubium.	318
Melilotus.	286
Melones.	375
Menta.	157
Menthastrum.	157
Mercurialis.	259
Mercurialis syluestris mas- 242	
Milium.	223
Millefolium.	314
Mors vermium.	4
Morus.	283
Myrice.	276
Myrrhis.	285

N

Napus

N

N apus.	100
Napus bunias sativus & sylvestris.	ibidem
Nardus sylvestris.	461.
Nasturtium agreste.	176
Nasturtium sativum.	196
Nepeta.	237.
Nerion.	295
Nigella.	272
Nummularia.	219
Nux auellana.	217
Nux regia & persica.	207
Nux castanea.	205
Nux pontica.	218
Nymphaea.	291

O

O Cimum.	298
Ocimastrum.	482
Oenanthe.	305
Olus atrum.	177
Ononis.	33
Ophioglossum.	312
Ophris. 307. Orchis.	303
origanū. 301. Orminū.	208
Osyris. 297. Oxalis.	253
Oxyacantha.	286
Oxylapathum.	253
Oxys.	306

P

P AEonia.	113
Panicum.	140
Papauer corniculatū.	282
Papauer nigrum.	272
Papauer rhœas.	279
Papauer sativum.	280
Parthenium.	314
Pastinaca.	366
Pedicularis herba.	422
Peplos.	327
Pepones.	374
Petasites.	347
Petroselinum.	353
Petroselinum sylvestre.	310
Perfoliata.	341
Persicaria.	ibidem
Persica malus.	326
Personatia.	42
Pes anserinus.	352
Pes cornicis.	244
Peucedanus.	324
Phu.	461
Pinastellus.	324
Piperitis.	392
Pistlochchia.	54
Pisum.	339
Pituitaria.	422

100 . bb iij Plantas

<i>Plantago.</i>	22	<i>Ricinus.</i>	183
<i>Polygonatum.</i>	316	<i>Rosa.</i>	354
<i>Polytrichon.</i>	340	<i>Rosmarinus.</i>	260
<i>Polytrichum.</i>	48	<i>Rubia.</i>	154
<i>Porrum.</i>	342	<i>Rubus.</i>	90
<i>Portulaca.</i>	66	<i>Rumex.</i>	252
<i>Potamogeton.</i>	351	<i>Ruta hortensis.</i>	332
<i>Pranestina nux.</i>	217	S	
<i>Proserpinaca.</i>	331	<i>Sabina siue samina.</i>	88
<i>Prunus.</i>	219	<i>Sagminalis herba.</i>	
<i>Pseudonardus.</i>	481	319.	
<i>Psilothrum.</i>	57	<i>Salinaris.</i>	345
<i>Pulegium.</i>	110	<i>Salix.</i>	180
<i>Pulicaris herba.</i>	480	<i>Salix equinalis.</i>	174
<i>Pulmonaria.</i>	344	<i>Salvia.</i>	136
<i>Pyrethrum sylvestre.</i>	345	<i>Salvia sylvestris.</i>	308
Q		<i>Sambucus.</i>	36
<i>Quercus.</i>	125	<i>Sanguinalis.</i>	244. & 331.
<i>Quinquefolium.</i>	337	<i>Sanguinaria.</i>	244
R		<i>Sanicula.</i>	361
R <i>Adicula.</i>	356. et 419	<i>Sardiana glans.</i>	205
<i>Radix.</i>	356	<i>Satyrium regium.</i>	383
<i>Ranunculus.</i>	93	<i>Satyrium trifolium.</i>	382
<i>Raphanus.</i>	356	<i>Saxifraga.</i>	391
<i>Raphanus sylvestris.</i>	78	<i>Scandulaceum.</i>	165
<i>Rapum.</i>	117. & 246	<i>Scilla.</i>	420
<i>Rhodia radix.</i>	359	<i>Scorpium.</i>	52
<i>Rhododendron.</i>	295	<i>Scythica radix.</i>	106

Seca

Secale. 413.	Sedum. 19	Solis oculus.	314
Semen.	155	Sonchus.	362
Semen lumbricorum.	4	Sorbus 311.	Spartū 406
Seminalis.	331	Spina alba.	29
Senetio. 156.	Sentes. 90	Spinacea vel spinaceum or	
Septifolium.	143	lus.	360
Seriola.	364	Spina molli.	184
Seris.	364	Stachys.	412
Serpentaria.	219	Steinutamentaria.	345
Serpentaria maior.	128	Stichas.	418
Serpyllum.	138	Stratiotes millefolia.	390
Sertula campana.	286	Strobilus.	425
Seseli Creticum.	437	Succisa.	384
Seseli Massiliense.	424	Supercilium terra.	48
Sideritis prima.	414	Sylva mater.	348
Siliquastrum.	392	Symphytum.	372
Sinapi.	293	T	
Sion.	389	Tamarix.	276
Sifer.	401	Telephium.	432
Sisymbrium.	387	Terminalis	215
Sisymbrium Cardamine.		Terra capillus.	48
388.		Terra corona.	472
Smilax aspera.	385	Terrestris malus.	288
Smilax hortensis.	381	Testiculus serapias siue ora	
Smilax lewis	386	chis.	304
Smyrnium.	407	Teucrium.	447
Solanum.	368	Teucrion Plinij.	160
Solidago.	372	Thlaspi.	165
		bb iij	Thyma

Thymbra.	164	Viola alba. 250. & 264
Thymus.	445	Viola matronalis. 170
Thryallis.	457	Viola muraria vel purpu-
Tilia.	465	rea. 169
Tintinabulum terræ.	255	Viscum. 178
Tithymalorum genera plu-		Vitis alba. 57
ra.	438	Vitis nigra. 59
Tordylō sine Tordyliō.	437	Vitis vinifera. 50
Trichomanes.	429	Vmbilicus terræ. 246
Trifolium odoratum.	440	Volucrum maius. 348
Trifolium pratense.	442	Vrceolaris. 152
Triticum.	349	Vrtica. 63
Trissago.	469	Vrtica labco. 103
Trixago palustris.	417	Vua crispa. 104
Tuber terræ.	246	
Tussilago.	84	
Typha.	444	

V

V eratrum albū.	149
Verbaſcum.	456
Verbaſcula.	457
Verbenaca.	319
Vernilagium.	477
Veficaria.	368
Vetonica.	190
Vicia.	99
Victoriola.	130
Viola.	250

X

X anthium.	313
Xylon.	314

Z

Zea.	155
------	-----

I N D E X N O -
menclationū quibus of-
ficinæ Seplafiariorū, &
Herbarii noſtri tempo-
ris vtuntur.

A

A brotonum.	5
Absinthium.	1
Acorum	

Acorum.	8	Asarum.	7
Acus pastoris.	115	Aspergula.	28
Acetosa.	253	Asprella.	174
Acutella.	33	Atriplex. 71. Avena.	103
Affodillus.	68	B	
Agrimonia. 134. &.	336	B Alsamita.	387
Alchimilla.	330	B Baptifecula.	233
Alliari & alliaria.	63	S. Barbara herba.	399
Alleluja.	306	Bardana.	42
Allium.	394	Basilicon.	299
Alkakengi.	368	Bedegarim, sine Bedeguar.	
Aloe.	82	29 Belzuinum.	410
Altercum.	449	Benedicta herba.	210
Ameos.	38	Berberis.	286
Amoris poma.	291	Betonica.	190
Anethum.	18	Bipennula.	329
Apium hortense.	397	Bistorta. 143 &.	416
Apium Agreste.	93	Bismalua.	11
Aquilegia. ANCE LICA	62	Bombasum.	314
Archangelica. 74/	256	Bombax.	ibidem
Arcocus.	426	Bonifacia.	110
Aristologia.	54	Bonus Henrichus.	253
Armoracia.	356	Borrage.	85
Artemisia.	25	Branca vrsina.	29
Arthanita.	246	Bruscandula.	95
Arthetica herba.	457	Bryonia.	57
Articocalus.	426	Bucheiden.	383
Asa foetida.	410	Buglossa.	184
		Buglossum	

Buglossum sylvestre. 148

Bursa pastoris. 166. et 330

C

C Alamentum. 237

Calendula. 209

Camomilla 16

Campana. 133

Camponella. 386

Canapus. 215

Candela regis, quæ & cā

delaria. 456

Capill⁹ veneris. 48. et 391

Caprifolium. 348

Caputi caules 225

Cardo fullonum, seu Car-

duus fullonius. 122

Cardopatum. 475

Carduus Benedictus. 73

Carota. 366

Cartamum. 223

Cartamus sylvestris. 73

Cartafilago. 391

Carui. 217

Castrangula. 108

Cataputia maior. 183

Cataputia minor. 249

Cauda equina. 176

Caulis. 225. Cauta. 315.

Cepa. 234

Cepa sylvestris 97

Centauria minor. 211

Centumnodia. 331

Centumcapita. 161

Chamaedrys. 469

Chereseolium. 119

Cheiri. 250

Chelidonia. 467

Cheruilla. 401

Cicer. 146

Cichorea. 364

Cicuta. 221

Cicutaria. 285

Citonia. 203

Citruli vel Citreoli. 375

Colequintida. 202

Colubrina. 416

Condisi. 419

Consolida maior. 372

Consolida minor. 87

Coriandrum. 185

Cornu ceruinum. 245

Corrigiola. 331

Cotula foetida. 315

Cotula non foetida. 86

Cotum. 314

Crassula maior. 432

Cresc

Cressio hortensis. 196

Crocus. 241

Crocus hortensis. 223

Cuculus. 368

Cucumer, seu cucumis.

374

Cucumer asininus. 378

Cucurbita. 200

Cuscuta. 188

Cyclamen. 246

Cypirus. 248

Cypressus. 471

D

D *Ens leonis.* 364

Diapensia. 361

Digitalis. 482

Digiti citrini. 383

E

E *Lleborus albus.* 149

Endivia vera. 364

Enula. 133

Enula campana. ibidem

Equina mentha. 157

Eruca. 144 *Esula.* 438

Esula rotunda. 327

Euisum. 11

Eupatoriū adulterinū. 145

Euphrasis. 135

F

F *Aba.* 213

Fabacraffa. 432

Faseoli. 381 *Ficaria.* 108

Ficus sativa. 402

Filipendula. 305

Filix. 322

Flammula. 93

Flos amoris. 61

Flos februarj. 264

Flos omnium mensiu. 209

Foeniculum. 271

Foeniculus porcinus. 324

Foenunigracum. 430

Fortis, seu sortis herba. 391

Fuga demonum. 448

Fumus terræ. 182

Funis arborum. 386

G

G *Allitrichum.* 308

Genista, siue

Genestra. 120

Gentiana. III *Glastū.* 179

Gratia Dei. 115

Guadum. 179

H

H *Edera terrestris* 472

Hepatica. 258

Her-

Herba diui Ioannis.	448	Lanaria.	419
Herba fortis.	391	Lapatium acutum.	259
Herba fullonum.	419	Lapparia inuersa.	313
Herba paralysis.	457	Lappa maior.	42
Herba Roberti.	115	Lappa minor.	313
Herba stella.	244	Larga.	268
Hermodactylus.	193	Laureola.	124
Hirundinaria.	77	Lens.	462
Hispanach.	361	Leuisticum.	407
Hispanicum olus. ibidem		Lilium album.	198
Hordcum.	239	Lilium conuallium.	131
Humulus.	95	Lilium inter spinas.	348
Hipericum.	448	Linaria.	297
Hyssopus.	454	Lingua bouis.	184
	I	Lingua ceruina.	160
Iacobi flos.	397	Linum.	257
Iarum.	39	Liquiritia.	106
Indicum.	179	Luparia. 52 Lupinus.	167
Iringus.	161	Lupulus.	95
Iris	171		M
Iua muschata.	478	M Aiorana.	360
Iuniperus.	45	M Malua.	274
Iusquiamus.	449	Maluaniscum.	11
	K	Mandragora.	288
Keirim. 250 Kerna.	383	Marrubium nigrum.	92
	L	Marrubiastrum. ibidem	
L Actuca.	162	Mater sylua.	348
Lactucella.	362	Matricaria.	25
			Melans

Melanxana.	290	Nux.	207
Melilotum.	286		
Melissa.	269	O	
Mentha.	157	Ocularia.	135
Mentha aquatica.	387	Oculus bonis aut	
Mentha Romana.	157	vacca	86
Mentha Saracenica. ibidē		Oleander.	295
Mercarialis.	259	Ophthalmica.	135
Milium.	223	Orobus.	309
Milium solis.	265	Origanum.	301
Millefolium.	390	Os mundi.	66
Millemorbia.	108	Osatis.	179
Mora Vaticana.	90	Osteritium.	409
Morella.	368	P	
Morsus diaboli.	384	PAEonia.	113
Morsus gallinae.	14	Pagana lingua.	130
Morus celsi.	283	Palma Christi. 183. et 383	
Muralis.	152	Pampinula.	329
Muscata.	115	Panis cuculi.	305
N		Panis porcinus. 79. et 246	
NAsturtium	186	Panis terræ.	ibidem
Nasturtium aquati-		Papauer.	280
cum.	387	Papauer cornut.	282
Nasturtium tectorum.	166	Papauer rubeum.	279
Nenuphar.	291	Parietaria.	152
Nigella.	272	Pastinaca.	401
Nil.	179	Pastoria bursa.	330
Nilech.	ibidem	Pentadactylon.	183
		Pera pastoris.	330
		Persea.	

Perforata.	448	Prunula.	220
Persica.	326	Prunus.	219
Peruinca.	195	Pseudomelanthion.	75
Pes anserinus.	352	Psyllium.	480
Pes asinus.	63	Pulegium.	110
Pes columbinus.	115	Pulegium sylvestre.	237
Pes corui.	93	Pyrethrum.	345
Pes leonis.	330	Pyrethrum sylvestre	ibid.
Pes vituli.	39	Pyrola.	255
Petroselinum.	310	Q	
Phaseoli.	381		
Pilosella.	328		
Pimpinella.	329		
Piper Hispanū, seu India- num.	392	R	
Piperitis.	263		
Plantago.	22	Raphanus minor & maior.	356
Podagra lini.	188	Rapistrum.	141
Polypodium.	320	Rapum.	117
Polytrichon.	429	Rapunculus.	ibidem
Porrum.	342	Remora aratri.	33
Portulaca.	66	Resta bovis.	ibidē.
Potentilla.	336	Rhabarbarum monacho- rum.	252
Prasium.	318	Ribe.	358
Prasium foetidum.	92	Roberti herba & Robere- tiana.	
Primula veris.	88	Rosa.	354
Prunella.	337	Rose canina.	ibid.
Pruneola, siue		Rosma-	

<i>Rosmarinus aculeatus.</i>	121
<i>Rostrum ciconiae.</i>	115
<i>Rostrum porcinum.</i>	364
<i>Rubea tinctorum.</i>	154
<i>Ruta.</i>	332

S

S <i>Acerdotis virile.</i>	39
<i>Salicaria.</i>	266
<i>Salvia.</i>	136
<i>Salvia vita.</i>	391
<i>Sanamunda.</i>	210
<i>Sancti spiritus radix.</i>	75
<i>Sandaracha arabum.</i>	46
<i>Sanguisorba.</i>	425
<i>Sanicula.</i>	361
<i>Saponaria.</i>	419
<i>Sardiana glandes.</i>	205
<i>Satureia.</i>	164
<i>Sauina vel Sabina.</i>	88
<i>Saxifraga lutea.</i>	400
<i>Saxifraga maior.</i>	ibid.
<i>Saxifraga rubea.</i>	305
<i>Scabiosa.</i>	385
<i>Scariola.</i>	364
<i>Scelerata.</i>	93
<i>Scolopendria.</i>	160
<i>Scrophularia.</i>	468
<i>Scrophularia maior.</i>	108

<i>Semperuium.</i>	19
<i>Semperuium marinū.</i>	82
<i>Sena.</i>	243
<i>Serrata, siue Serratula.</i>	469.
<i>Serpentaria minor.</i>	39
<i>Serpentaria officinarum</i>	415.
<i>Serpyllum.</i>	138
<i>Serpyllum Romanū.</i>	445
<i>Seruilla.</i>	401
<i>Serullum.</i>	ibidem
<i>Sigillum Salomonis.</i>	316
<i>Siler montanum.</i>	424
<i>Simeonis herba.</i>	47
<i>Sinapi.</i>	293
<i>Sinapi rusticum.</i>	166
<i>Sinapi sylvestre.</i>	141
<i>Sitamum.</i>	349
<i>Solatrum.</i>	368
<i>Solidago Saracenica.</i>	391
<i>Sorba. 3II. Sorgi.</i>	415.
<i>Sparagus.</i>	32
<i>Spelta.</i>	155
<i>Sphatula foetida.</i>	428
<i>Squilla.</i>	420
<i>Staphisagria.</i>	422
<i>Stellæ herba.</i>	244

Stichas

<i>Stichas arabica.</i>	418	<i>Vernix.</i>	46
<i>Stichas citrinum.</i>	60	<i>Veronica.</i>	96
<i>Stramonia.</i>	369	<i>Vincaperuinca.</i>	195
<i>Succus cyrenaicus.</i>	410	<i>Vincetoxicum.</i>	77

T

T <i>Amariscus.</i>	276	<i>Virga pastoris.</i>	122
<i>Tanacetū. 26. & 27</i>		<i>Viscum.</i>	178
<i>Tanacetum sylvestre.</i>	336	<i>Vitealis.</i>	143
<i>Tapſus barbatus.</i>	456	<i>Vicia sylvestris.</i>	66
<i>Taraxacon.</i>	362	<i>Viticella.</i>	57
<i>Testiculus canis.</i>	303	<i>Vngula caballina.</i>	84
<i>Testiculus vulpis, aut ſacerdotis.</i>	382	<i>Volubilis maior.</i>	386
<i>Tilia.</i>	465	<i>Volubilis media.</i>	143
<i>Tinctorius flos.</i>	436	<i>Vrinalis herba.</i>	297
<i>Tormentilla.</i>	143	<i>Vrtica.</i>	63
<i>Trifolium. 440. & 442</i>		<i>Vrtica iners, mortua, vel alba.</i>	256
<i>Trifolium acetosum.</i>	306	<i>Vua lupina.</i>	368
<i>Trifolium humile.</i>	267	<i>Vua verſa ſeu vulpina.</i>	52
<i>Trinitas</i>	<i>ibidem</i>		
<i>Trinitatis herba.</i>	434	<i>Vua vulpis</i>	368
<i>Triticum.</i>	349	<i>Vuularia.</i>	130
<i>Tunica.</i>	191		
<i>Turcicum frumentū. 444</i>			

V

V <i>Aleriana.</i>	461
<i>Verbena.</i>	319

Z

<i>Zinziber caninum.</i>	392
--------------------------	-----

Finis Indicis.

